

FACHSERIE

3

**LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

Reihe 3.5.1

Stand der Reben

Juni 1977

STATISTISCHES BUNDESAMT
BIBLIOTHEK



HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 2030351 – 77002

Statist. Bundesamt - Bibliothek



12-03819

Erschienen im August 1977

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,10

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
T a b e l l e n t e i l	
1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2 Allgemeiner Beginn der Blüte	6
3 Durchschnittliche Dauer der Blüte	7
4 Begutachtung des Standes der Reben	8

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau
(Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Bayern, Saarland)

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Ergebnisse der Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter unter der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Berichterstatter beurteilten die Witterung für die Entwicklung der Reben in der Berichtszeit vom 24.5. bis 30.6.1977 zu 34 % als gut und zu 63 % als mittel. Diese Einstufung liegt erheblich unter der des Vorjahres.

Obwohl nur geringe Wetterschäden auftraten und ausreichende Niederschläge fielen, trugen ein überwiegend mittelmäßiger Temperaturverlauf und eine nicht sehr reichliche Sonneneinstrahlung dazu bei, daß die Reben erst relativ spät verblühen konnten. Der Blüteverlauf selber erreichte zwar nicht die optimalen Werte von 1976, kann aber wegen der Kürze des Durchgangs in den meisten Fällen noch als befriedigend bis gut betrachtet werden. Der Gescheinsansatz wurde von den Berichterstattern zu 63 % als gut und zu 37 % als mittel bewertet.

Stand der Reben

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1964	1,8	2,0
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4
1974	2,3	2,5
1975	1,9	1,8
1976	2,1	2,5
1977	2,3	2,6

Unter dem Eindruck dieser Werte kamen die Berichterstatter für den Stand der Reben zu der Gesamtnote 2,3. Dies ist eine erheblich bessere Benotung als im Vormonat (2,6) und läßt noch alle Aussichten auf einen guten Herbst offen.

1 Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							Juni	Mai	Juni
							1977		1976
Wetterschäden									
keine	100	71	60	67	77	71	66	95	77
schwache	-	16	23	24	20	29	23	4	18
mittlere	-	8	12	7	2	-	8	1	4
starke	-	5	5	2	1	-	3	-	1
Niederschläge									
zu gering	-	18	6	2	7	-	4	18	95
ausreichend	100	82	90	89	92	100	90	79	5
zu hoch	-	-	4	9	1	-	6	3	-
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	32	22	14	10	57	18	42	4
normal	67	58	66	65	54	-	64	52	8
günstig	33	10	12	21	36	43	18	6	88
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	29	33	23	15	43	26	.	-
genügend	100	71	62	71	71	57	68	.	1
reichlich	-	-	5	6	14	-	6	.	99
Witterung für die Reben									
schlecht	-	8	5	1	3	-	3	.	1
mittel	67	74	69	60	45	71	63	.	14
gut	33	18	26	39	52	29	34	.	85
Gescheinansatz									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	.	1
mittel	33	50	43	32	32	100	37	.	21
gut	67	50	57	68	68	-	63	.	78
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	-	7	4	3	-	5	.	0
mittel	-	71	59	53	31	-	54	.	6
gut	100	29	34	43	66	100	41	.	94

2 Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1977

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1977	1976
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	-	1	1	-	-	1	29
	vom 11.-20.6.	33	44	26	27	15	-	26	67
	vom 21.-30.6.	67	56	64	68	76	100	67	3
	nach dem 30.6.	-	-	9	4	9	-	6	1
Riesling, Weißer	bis 10.6.	-	-	-	0	-	.	0	18
	vom 11.-20.6.	33	19	15	10	17	.	13	73
	vom 21.-30.6.	33	81	73	76	74	.	75	8
	nach dem 30.6.	34	-	12	14	9	.	12	1
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	-	-	0	0	-	.	0	20
	vom 11.-20.6.	-	27	25	12	15	.	18	71
	vom 21.-30.6.	100	73	68	77	70	.	73	8
	nach dem 30.6.	-	-	7	11	15	.	9	1
Elbling, Weißer	bis 10.6.	.	.	-	.	.	-	-	13
	vom 11.-20.6.	.	.	-	.	.	-	-	77
	vom 21.-30.6.	.	.	69	.	.	-	56	10
	nach dem 30.6.	.	.	31	.	.	100	44	-
Ruländer	bis 10.6.	.	.	.	0	.	-	0	28
	vom 11.-20.6.	.	.	.	30	.	-	29	66
	vom 21.-30.6.	.	.	.	62	.	100	63	6
	nach dem 30.6.	.	.	.	8	.	-	8	-
Burgunder, Blauer	bis 10.6.	-	-	-	1	-	.	0	27
	vom 11.-20.6.	-	33	27	27	22	.	27	66
	vom 21.-30.6.	-	67	69	63	67	.	65	6
	nach dem 30.6.	-	-	4	9	11	.	8	1
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	-	-	-	1	10	.	1	33
	vom 11.-20.6.	50	-	42	23	20	.	31	63
	vom 21.-30.6.	-	100	56	71	60	.	64	3
	nach dem 30.6.	50	-	2	5	10	.	4	1

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau	3	36	380	489	82	7	997	1 037
Riesling, Weißer	3	37	326	334	23	.	723	760
Silvaner, Grüner	1	22	266	314	78	.	681	720
Elbling, Weißer	.	.	29	.	.	7	36	30
Ruländer	.	.	.	296	.	7	303	308
Burgunder, Blauer	-	6	55	349	9	.	419	440
Portugieser, Blauer	2	1	167	236	10	.	416	447

3 Durchschnittliche Dauer der Blüte
% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Tage	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet	
								1977	1976
Müller-Thurgau	bis 4	33	3	8	4	3	-	5	15
	5 - 7	-	25	23	30	23	100	27	44
	8 - 10	-	55	50	39	45	-	44	34
	11 - 14	67	17	17	24	25	-	21	6
	15 u. mehr	-	-	2	3	4	-	3	1
Riesling, Weißer	bis 4	-	-	7	3	5	.	5	12
	5 - 7	33	38	21	26	33	.	25	40
	8 - 10	-	40	44	40	33	.	41	39
	11 - 14	67	22	23	28	24	.	25	8
	15 u. mehr	-	-	5	3	5	.	4	1
Silvaner, Grüner	bis 4	-	-	10	4	3	.	6	16
	5 - 7	-	50	26	25	31	.	27	42
	8 - 10	-	32	47	43	42	.	44	35
	11 - 14	100	18	16	26	18	.	21	6
	15 u. mehr	-	-	1	2	6	.	2	1
Elbling, Weißer	bis 4	.	.	4	.	.	-	3	7
	5 - 7	.	.	12	.	.	100	31	20
	8 - 10	.	.	48	.	.	-	38	60
	11 - 14	.	.	32	.	.	-	25	10
	15 u. mehr	.	.	4	.	.	-	3	3
Ruländer	bis 4	.	.	.	4	.	-	4	12
	5 - 7	.	.	.	23	.	100	25	53
	8 - 10	.	.	.	46	.	-	44	28
	11 - 14	.	.	.	25	.	-	25	6
	15 u. mehr	.	.	.	2	.	-	2	1
Burgunder, Blauer	bis 4	-	-	11	5	11	.	6	15
	5 - 7	-	-	19	28	-	.	25	52
	8 - 10	-	83	47	37	67	.	40	26
	11 - 14	-	17	23	28	-	.	26	6
	15 u. mehr	-	-	-	2	22	.	3	1
Portugieser, Blauer	bis 4	-	-	10	4	10	.	7	18
	5 - 7	50	-	28	30	20	.	28	50
	8 - 10	-	100	48	42	30	.	44	28
	11 - 14	50	-	13	22	30	.	19	4
	15 u. mehr	-	-	1	2	10	.	2	0

4 Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst,
 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering)
 = weniger als 1/4 Herbst

Land Reg.-Bezirk Anbaugebiet/Bereich	1977		1976
	Juni	Mai	Juni
	Note		
Nordrhein-Westfalen	2,0	3,0	1,8
Hessen	2,5	2,5	1,7
Hessische Bergstraße	2,3	2,3	1,6
Rheingau	2,5	2,6	1,7
Rheinland-Pfalz	2,3	2,6	2,2
Koblenz	2,4	2,6	2,1
Trier	2,3	2,5	2,2
Rheinhausen-Pfalz	2,3	2,6	2,0
Ahr	2,4	2,6	2,5
Mittelrhein	2,6	2,7	2,1
Bacharach	2,7	2,7	2,2
Rhein-Burgengau	2,6	2,7	2,0
Mosel-Saar-Ruwer	2,3	2,5	2,3
Bernkastel	2,3	2,5	2,3
Obermosel	2,5	2,5	2,6
Saar-Ruwer	2,2	2,7	2,2
Zell/Mosel	2,4	2,6	2,3
Nahe	2,4	2,6	1,9
Bad Kreuznach	2,4	2,6	1,9
Schloß-Böckelheim	2,5	2,7	2,0
Rheinhausen	2,3	2,7	2,1
Bingen	2,4	2,7	2,1
Nierstein	2,2	2,6	2,0
Wonnegau	2,3	2,7	2,2
Rheinpfalz	2,2	2,5	2,2
Südliche Weinstraße	2,2	2,5	2,2
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,3	2,5	2,2
Baden-Württemberg	2,2	2,4	1,8
Württemberg	2,1	2,3	1,9
Remstal-Stuttgart	2,3	2,5	2,0
Württembergisch Unterland	2,1	2,2	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	2,6	2,3
Baden	2,3	2,4	1,8
Badische Bergstraße- Kraichgau	2,1	2,5	1,9
Badisches Frankenland	1,9	2,2	2,5
Bodensee	2,0	2,1	1,9
Markgräflerland	2,2	2,5	1,9
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,3	2,1	1,7
Breisgau	2,4	2,4	1,7
Ortenau	2,6	3,0	1,8
Bayern	2,1	2,7	2,1
Unterfranken	2,1	2,7	2,1
Mittelfranken	2,3	2,8	1,9
Übrige Gebiete	2,4	2,4	1,9
Saarland	2,0	2,0	1,6
Bundesgebiet	2,3	2,6	2,1