

Statistisches Bundesamt




Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen DDR

Heft 24

Gesundheits- und Sozialwesen

in Übersichten (Teil II)



Statistisches Bundesamt

Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen DDR

Heft 24

Gesundheits- und Sozialwesen

in Übersichten (Teil II)



Für Auskünfte steht zur Verfügung:

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Berlin, Hans-Beimler-Str. 70-72
Gruppe DEO-A
Tel. (030) 2324 - 6292
2324 - 6291
10124 Berlin

Postanschrift:
Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Berlin
Postfach 276
10124 Berlin

Herausgeber:

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11

Postanschrift:

Statistisches Bundesamt
65180 Wiesbaden


Erschienen im Juli 1995

Preis: DM 29,50


Bestellnummer: 2290124– 95900

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1995

Alle Rechte vorbehalten. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne ausdrückliche Genehmigung des Statistischen Bundesamtes diese Veröffentlichung oder Teile daraus für gewerbliche Zwecke zu übersetzen, zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-fiche zu verfilmen oder in elektronische Systeme einzuspeichern.



Statistisches Bundesamt



Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen DDR

Heft 24

Gesundheits- und Sozialwesen

in Übersichten (Teil II)



Für Auskünfte steht zur Verfügung:

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Berlin, Hans-Beimler-Str. 70-72
Gruppe DEO-A
Tel. (030) 2324 - 6292
2324 - 6291
10124 Berlin

Postanschrift:

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Berlin
Postfach 276
10124 Berlin

Herausgeber:

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11

Postanschrift:

Statistisches Bundesamt
65180 Wiesbaden

Erschienen im Juli 1995

Preis: DM 29,50

Bestellnummer: 2290124– 95900

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1995

Alle Rechte vorbehalten. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne ausdrückliche Genehmigung des Statistischen Bundesamtes diese Veröffentlichung oder Teile daraus für gewerbliche Zwecke zu übersetzen, zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-fiche zu verfilmen oder in elektronische Systeme einzuspeichern.

Vorbemerkung

Die im Heft 17 der Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen DDR begonnene Veröffentlichung von Übersichten zum Gesundheits- und Sozialwesen (Teil I) wird mit den Heften 24 (Teil II) und 25 (Teil III) fortgesetzt.

Die im Teil I enthaltenden Beiträge über die meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten, die Schwangerschaftsabbrüche; die Berufstätigen im Gesundheits- und Sozialwesen; die Krankenhäuser, die ambulante medizinische und stomatologische Betreuung; die Feierabend- und Pflegeheime sowie Wohnhäuser für ältere bzw. behinderte Bürger; das Kur- und Bäderwesen sowie über die Apotheken werden im Teil II und III ergänzt um Übersichten zur stationären Morbidität, zu den abgeschlossenen Arbeitsbefreiungen, zur gesundheitlichen Überwachung von Kindern und Jugendlichen und zu den Schulsportbefreiungen.

Mit den statistischen Übersichten soll ein Einblick in die umfangreichen, zum Teil unveröffentlichten Datensammlungen, die sich in der Zweigstelle Berlin des Statistischen Bundesamtes befinden, gegeben werden. Besonders umfangreich waren die Datenauswertungen auf dem Gebiet des Krankenblattes, so daß nur Auswertungen der Berichtsjahre 1987 bis 1989 in diesem Heft veröffentlicht werden. Die Ergebnisse der Jahre 1968 bis 1990 befinden sich in einem unterschiedlichen Umfang im Robert-Koch-Institut, wohin diese visuell lesbaren Ergebnisse aus dem ehemaligen Institut für Medizinische Statistik und Datenverarbeitung aufgrund des Einigungsvertrages im Jahre 1991 überführt worden sind. Die Zweigstelle Berlin des Statistischen Bundesamtes verfügt hauptsächlich über statistische Daten aus dem Jahre 1985 bis 1990 auf Disketten bzw. auf Magnetbandkassetten gesichert, die auch dem Robert-Koch-Institut zur Verfügung stehen.

Wegen des Umfanges der Auswertungstabellen zur stationären Morbidität ist folgende Teilung der Ergebnisdarstellung vorgenommen worden:

Heft 24 (Teil II)

Krankenhausabgänge absolut nach Altersgruppen und Diagnosen 1989,
darunter Krankenhausabgänge durch Tod,

Krankenhausabgänge absolut nach Altersgruppen und Diagnoseklassen 1987 bis 1989,
darunter Krankenhausabgänge durch Tod,

Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts nach
Altersgruppen und Diagnosen,

Krankenhausabgänge je 10 000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts nach
Diagnoseklassen 1987 bis 1989.

Heft 25 (Teil III)

Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) nach Altersgruppen und Diagnosen 1989,

durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) nach Altersgruppen und Diagnoseklassen 1987 bis 1989,

Krankenhausfälle mit operativem Eingriff absolut nach Altersgruppen und Diagnosen 1989,

Krankenhausfälle mit operativem Eingriff absolut nach Altersgruppen und Diagnoseklassen 1987 bis 1989.

Darüberhinaus sind im Heft 25 Tabellen über die abgeschlossenen Arbeitsbefreiungen, die gesundheitliche Überwachung von Kindern und Jugendlichen der Jahre von 1980 bis 1988 bzw. 1989 und über die Schulsportbefreiungen des Schuljahres 1986/1987 veröffentlicht. Den veröffentlichten Daten liegen die Definitionen der Begriffe und Merkmale zugrunde, die in der ehemaligen DDR zum jeweiligen Zeitpunkt gültig waren. Eine Umrechnung auf die Methodik der Bundesstatistik ließ sich auf der Basis des vorhandenen Datenmaterials nicht durchführen.

Einmal gab es zu diesen langen Reihen keine vergleichbaren amtlichen Bundesstatistiken, und zum anderen wurde die Bundesstatistik für Krankenhäuser, die die bisherige gleichnamige Länderstatistik ablöste, stufenweise erst im Jahre 1990 in den Altbundesländern und im Jahr 1991 in den neuen Bundesländern eingeführt.

Die Statistik der abgeschlossenen Arbeitsunfähigkeitsfälle war in der ehemaligen DDR eine fachliche Berichterstattung der vom Bundesvorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes geleiteten Verwaltung der Sozialversicherung. Ihre statistischen Daten lassen sich hinsichtlich der angewendeten Methodik nicht mit denen vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung alljährlich im herausgegebenen Bericht der "Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten" vergleichen.

Ebenfalls wenig übereinstimmend sind die statistischen Daten aus den ehemaligen DDR Statistiken zur gesundheitlichen Überwachung von Kindern und Jugendlichen des fachlichen Berichtswesens des Gesundheits- und Sozialwesens mit denen in einem unterschiedlichen Umfang veröffentlichten Daten der "Jahresgesundheitsberichte" des öffentlichen Gesundheitsdienstes in den alten Bundesländern.

Ausführungen zu den einzelnen Begriffsbestimmungen sind in dem folgenden Abschnitt - Methodik und Begriffserläuterungen - enthalten.

Durchgängige Ergebnisse mit tiefer regionaler Gliederung waren für den überwiegenden Teil der Statistiken nicht verfügbar, so daß die Veränderungen in der Kreisstruktur, die sich aus dem Ländereinführungsgesetz vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 51 S. 955) ergeben haben, nicht berücksichtigt werden konnten.

Die Länderangaben in den statistischen Übersichten sind Summierungen der Bezirksdaten der ehemaligen DDR.

Die Veröffentlichung wurde im Arbeitsbereich "Deutsche Einheit Osteuropa" in der Arbeitsgruppe "Sammlung, Aufbereitung und Rückrechnung statistischer Daten für die ehemalige DDR" erarbeitet.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen.....	3
Inhalt.....	5
Methodik und Begriffserläuterungen.....	6

Tabellenteil

1	Stationäre Morbidität	
1.1	Krankenhausabgänge absolut nach Altersgruppen und Diagnosen 1989.....	8
1.1.1	Darunter Krankenhausabgänge durch Tod.....	92
1.2	Krankenhausabgänge absolut nach Altersgruppen und Diagnoseklassen 1987 bis 1989.....	170
1.2.1	Darunter Krankenhausabgänge durch Tod.....	184
1.3	Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen.....	198
1.4	Krankenhausabgänge je 10 000 der Bevölkerung gleichen Alters und Geschlechts nach Diagnoseklassen 1987 bis 1989.....	282
	Literaturverzeichnis.....	296
	Rechtsvorschriften.....	297
	Anhang.....	299

Zeichenerklärung

- = Ergebnis gleich Null
- . = Entsprechende Angaben liegen nicht vor
- % = Prozent

Abkürzungen

- GBI. = Gesetzblatt
- Verf. u. Mitt. des MfGe = Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums
für Gesundheitswesens
- ZNS = Zentralnervensystem

Methodik und Begriffserklärungen

Stationäre Morbidität

Als Fachberichterstattung des Gesundheitswesens diente der Krankenblattsignierstreifen seit seiner Einführung im Jahre 1968 zur Erfassung der stationären Morbidität in den Krankenhäusern und ambulanten Gesundheitseinrichtungen mit Krankenhausbetten ohne Rücksicht auf deren Unterstellung und Eigentumsform.

Pflegeheime und Kureinrichtungen, auch wenn sie zur Erfüllung der Dokumentationspflicht vereinheitlichte Krankenblätter verwendeten, waren von der Abgabe und zentralen Auswertung der Krankenblattsignierstreifen ausgeschlossen.

In die Erfassung waren alle Krankenhäuser des sogenannten x-Bereiches (Armee, Polizei, Strafvollzug, Staatssicherheit) und das Regierungskrankenhaus nicht einbezogen.

Dagegen waren die konfessionellen bzw. kirchlichen Krankenhäuser (Einrichtungen der Caritas und Diakonie), die privaten Krankenhäuser und die Krankenhäuser der Direktion Gesundheitswesen Wismut in der Erhebung enthalten.

Die Auswertung der erfaßten Merkmale konnte sowohl nach dem Wohnort (des Patienten) als auch nach dem Behandlungsort (dem Krankenhaus) durchgeführt werden und lieferte Informationen

- zu den Behandlungsfällen bzw. den Krankenhausabgängen,
- zur Zahl der Operationen und
- zu den Todesfällen nach Geschlecht und Altersgruppen.

Darüber hinaus wurden Informationen gewonnen

- zum Leistungsumfang der Krankenhäuser,
- zum fachlich-nosologischen Betreuungsprofil,
- zu den Patientenströmen,
- zum Betreuungsbedarf,
- zur Morbidität.

Die Erhebung der Merkmale über die in stationärer Betreuung befindlichen Patienten erfolgte seit dem Jahre 1968 jährlich vom 01.01. bis 31.12., (letzte Erhebung zum 31.12.1990).

Das Aufnahmepersonal, die Schwestern und die Ärzte verschlüsselten die Angaben ihrer Patienten einschließlich der ausländischen Patienten auf den Krankenblattsignierstreifen. Für die Kontrolle der ordnungsgemäßen Führung der Krankenblätter und für die korrekte Verschlüsselung der Angaben waren von den Ärztlichen Direktoren der Krankenhäuser beauftragte Ärzte verantwortlich.

Als **Abgang** eines Patienten von einer Station bzw. einer Fachabteilung zählte die **Entlassung**, die **Verlegung** oder der **Tod**.

Bei Verlegung des Patienten in eine andere Fachabteilung innerhalb derselben Einrichtung hatte die verlegende Fachabteilung das Krankenblatt abzuschließen und die aufnehmende Fachabteilung ein neues Krankenblatt anzulegen. Die Verlegung von einer Station auf eine andere Station innerhalb der gleichen Fachabteilung zählte nicht als neuer Behandlungsfall, siehe auch Definitionen im Anhang.

Dabei ist zu bemerken, daß die Einteilung der Fachabteilungen in den Kodiervorschriften zum allgemeinen dokumentationsgerechten Krankenblatt nicht identisch mit deren Gruppierung in der Bettenmeldung war, s. auch Heft 17 der "Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen DDR - Gesundheits- und Sozialwesen in Übersichten" (Teil I).

In dem Tabellenteil - Stationäre Morbidität - werden ausgewählte Auswertungsergebnisse aus den Berichtsjahren 1987 bis 1989 für die ehemalige DDR insgesamt vorgestellt.

Schon diese Auswahl hat wegen ihres Seitenumfanges zu einer getrennten Veröffentlichung in zwei Heften (Heft 24 und 25) der Sonderreihe geführt, s. auch Vorbemerkung.

Die gespeicherten Daten (Merkmale) der Krankenblattsigrierstreifen aus den vorangegangenen Berichtsjahren 1985 bis 1990 hat die Zweigstelle Berlin des Statistischen Bundesamtes auf Magnetbandkassetten gespeichert und archiviert.

Von den drei auf den Krankenblattsigrierstreifen angegebenen möglichen Behandlungsdiagnosen wurden für die Auswertung die 1. Behandlungsdiagnosen der Krankenhausabgänge verwendet. Das betrifft auch die Behandlungsdiagnosen bei denen ein Operationsdatum angegeben war. Dagegen bei letalem bzw. tödlichen Ausgang ist die 3. Behandlungsdiagnose die Todesursache - das Grundleiden bzw. die direkt zum Tode führende Krankheit oder der Krankheitszustand ausgewertet worden. Dabei hatte bei der Eintragung in den Sigrierstreifen die Sektionsdiagnose den Vorrang gegenüber der klinischen Diagnose.

Die Diagnosen liegen vierstellig nach der "Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD bzw. IKK), 9. Revision, der Weltgesundheitsorganisation vor. Mit einem Stern "*" (Manifestion) versehene Schlüsselnummern und die Schlüsselnummern der E-Klassifikation waren für die Kodierung (lt. Anweisung über das dokumentationgerechte Krankenblatt vom 19. Oktober 1978, Verfügungen und Mitteilungen des ehemaligen Ministeriums für Gesundheitswesen Nr. 10 S. 85) nicht zugelassen.

Die Internationale Operationsklassifikation kam nicht zur Anwendung, so daß die Krankheit, die zur Operation führte, nach der ICD verschlüsselt wurde. Bei mehreren operativen Eingriffen war das Datum der Operation zu kodieren, das die größte klinische Bedeutung für den Patienten besaß.

Methodische Unterschiede bestehen zu der Krankheitsartenstatistik der gesetzlichen Krankenversicherung der Bundesrepublik Deutschland und zu der im Jahre 1990 neu eingeführten Krankenhausstatistik in den alten als auch neuen Bundesländern (seit 1991). Im Gegensatz zum ehemaligen DDR-Krankenblatt ist im Diagnosenteil der amtlichen Krankenhausstatistik nur die Hauptdiagnose zum Zeitpunkt der Entlassung der vollstationär behandelten Patienten und Sterbefälle anzugeben, die ebenfalls nach der "Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesfälle" der 9. Revision zu verschlüsseln ist.

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
Klasse I												
Infektiöse und Parasitäre Krankheiten (001-139)												
1	002 (EXKL.002.0)	Männl.	15	1	4	1	-	1	3	-		
2	Paratyphus	Weibl.	14	-	3	3	1	-	-	1		
3		Insges.	29	1	7	4	1	1	3	1		
4	002.0	Männl.	20	-	3	-	2	1	-	2		
5	Typhus abdominalis	Weibl.	22	1	5	1	-	1	-	4		
6		Insges.	42	1	8	1	2	2	-	6		
7	003,005	Männl.	975	166	348	133	48	45	32	45		
8	Salmonelleninfektionen und	Weibl.	894	168	291	88	32	44	40	27		
9	sonstige bakterielle Lebens- mittelvergiftungen	Insges.	1869	334	639	221	80	89	72	72		
10	004	Männl.	996	15	169	190	120	75	135	101		
11	Shigellose	Weibl.	1016	5	141	165	123	110	159	115		
12		Insges.	2012	20	310	355	243	185	294	216		
13	001, 006-009	Männl.	4048	1367	1749	304	173	63	84	88		
14	Alle sonstige Darminfektionen	Weibl.	3191	1133	1298	222	122	62	72	53		
15		Insges.	7239	2500	3047	526	295	125	156	141		
16	011	Männl.	1824	-	6	2	2	29	82	132		
17	Lungentuberkulose	Weibl.	902	-	4	1	8	20	81	60		
18		Insges.	2726	-	10	3	10	49	163	192		
19	010, 012	Männl.	147	2	4	8	-	9	11	17		
20	Sonstige Tuberkulose der Atmungs- organe	Weibl.	97	-	3	-	-	3	4	17		
21		Insges.	244	2	7	8	-	12	15	34		
22	013	Männl.	6	-	1	-	-	-	-	-		
23	Tuberkulose der Meningen und des	Weibl.	9	-	-	-	1	1	-	-		
24	Zentralnervensystems	Insges.	15	-	1	-	1	1	-	-		
25	015	Männl.	79	-	-	-	-	1	7	3		
26	Tuberkulose der Knochen und	Weibl.	44	1	-	-	-	-	-	1		
27	Gelenke	Insges.	123	1	-	-	-	1	7	4		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1
-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	2
-	-	2	1	2	1	1	-	1	2	1	-	3
2	2	1	-	5	1	-	1	-	-	-	-	4
-	-	3	-	-	-	-	3	1	2	1	-	5
2	2	4	-	5	1	-	4	1	2	1	-	6
30	14	9	18	16	19	14	13	2	11	7	5	7
37	29	13	16	20	20	11	9	12	17	11	9	8
67	43	22	34	36	39	25	22	14	28	18	14	9
62	44	16	24	16	11	9	-	2	4	3	-	10
57	45	21	21	18	11	10	6	4	5	-	-	11
119	89	37	45	34	22	19	6	6	9	3	-	12
58	34	23	21	21	23	17	4	6	5	3	5	13
30	23	26	18	25	30	16	16	6	19	10	10	14
88	57	49	39	46	53	33	20	12	24	13	15	15
126	131	87	154	219	228	195	136	73	119	73	30	16
59	43	36	51	55	47	76	99	65	106	67	24	17
185	174	123	205	274	275	271	235	138	225	140	54	18
13	7	9	7	8	16	20	5	4	5	2	-	19
8	7	7	5	5	3	2	3	11	13	3	3	20
21	14	16	12	13	19	22	8	15	18	5	3	21
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	22
-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	23
2	3	1	2	1	-	-	-	-	2	-	1	24
2	5	4	9	8	10	9	10	5	6	-	-	25
1	-	-	3	6	2	3	12	4	6	4	1	26
3	5	4	12	14	12	12	22	9	12	4	1	27

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
28	016	Männl.	168	-	-	-	-	-	3	5		
29	Tuberkulose des Urogenitalsystems	Weibl.	132	-	-	-	2	1	6	4		
30		Insges.	300	-	-	-	2	1	9	9		
31	014, 017	Männl.	132	-	4	2	4	8	15	19		
32	Tuberkulose sonstiger Organe	Weibl.	205	3	1	4	1	12	28	16		
33		Insges.	337	3	5	6	5	20	43	35		
34	018	Männl.	21	-	-	-	-	-	1	-		
35	Miliartuberkulose	Weibl.	26	-	-	-	-	-	2	-		
36		Insges.	47	-	-	-	-	-	3	-		
37	023	Männl.	10	-	-	-	-	1	-	-		
38	Brucellose	Weibl.	4	-	-	-	1	-	-	-		
39		Insges.	14	-	-	-	1	1	-	-		
40	034	Männl.	704	45	384	158	38	21	28	11		
41	Streptokokkenangina und	Weibl.	642	35	291	161	44	36	19	16		
42		Scharlach	Insges.	1346	80	675	319	82	57	47	27	
43	035	Männl.	1158	5	21	21	18	33	46	50		
44	Erysipel	Weibl.	1497	1	30	18	35	21	28	50		
45		Insges.	2655	6	51	39	53	54	74	100		
46	036	Männl.	251	65	80	27	16	26	9	4		
47	Meningokokkeninfektion	Weibl.	207	47	76	18	7	25	6	3		
48		Insges.	458	112	156	45	23	51	15	7		
49	037	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	1		
50	Tetanus	Weibl.	5	1	-	-	-	1	-	-		
51		Insges.	12	1	-	-	-	1	-	1		
52	038	Männl.	413	62	33	10	6	18	14	15		
53	Sepsis	Weibl.	323	49	15	10	5	10	11	6		
54		Insges.	736	111	48	20	11	28	25	21		
55	REST 020-041	Männl.	275	45	23	12	4	14	16	8		
56	Sonstige bakterielle Krankheiten	Weibl.	225	42	27	12	5	6	16	10		
57		Insges.	500	87	50	24	9	20	32	18		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2	13	12	15	21	44	26	17	3	7	-	-	28
5	5	12	22	19	15	11	12	6	9	3	-	29
7	18	24	37	40	59	37	29	9	16	3	-	30
9	12	3	3	7	5	7	11	8	11	2	2	31
11	2	3	11	19	14	17	11	13	19	14	6	32
20	14	6	14	26	19	24	22	21	30	16	8	33
3	1	2	5	1	2	-	-	1	4	-	1	34
3	2	-	2	1	-	1	5	1	4	3	2	35
6	3	2	7	2	2	1	5	2	8	3	3	36
-	-	-	-	3	5	1	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	38
-	-	-	-	4	6	1	1	-	-	-	-	39
3	3	2	2	7	1	-	-	1	-	-	-	40
10	5	1	9	6	4	-	2	1	1	1	-	41
13	8	3	11	13	5	-	2	2	1	1	-	42
75	75	81	143	150	147	94	84	32	48	26	9	43
50	65	49	132	203	144	137	128	88	149	113	56	44
125	140	130	275	353	291	231	212	120	197	139	65	45
2	6	3	2	2	3	4	1	-	-	-	1	46
3	3	2	6	2	4	2	-	2	1	-	-	47
5	9	5	8	4	7	6	1	2	1	-	1	48
-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	49
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	50
1	-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	1	51
16	22	16	29	42	41	25	25	18	9	9	3	52
10	13	6	19	25	24	27	31	15	23	22	2	53
26	35	22	48	67	65	52	56	33	32	31	5	54
10	14	6	18	29	27	19	13	7	7	3	-	55
10	6	11	12	15	11	8	11	5	7	9	2	56
20	20	17	30	44	38	27	24	12	14	12	2	57

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
58	047	Männl.	295	17	90	79	21	16	11	20
59	Meningitis durch Enteroviren	Weibl.	205	6	32	29	24	15	24	24
60		Insges.	500	23	122	108	45	31	35	44
61	053	Männl.	352	-	16	18	18	10	13	11
62	Zoster	Weibl.	477	2	11	10	13	3	4	5
63		Insges.	829	2	27	28	31	13	17	16
64	055	Männl.	26	3	9	3	1	3	3	4
65	Masern	Weibl.	32	5	9	7	1	1	1	2
66		Insges.	58	8	18	10	2	4	4	6
67	056	Männl.	119	22	39	12	7	19	11	5
68	Röteln	Weibl.	139	15	39	18	12	14	12	22
69		Insges.	258	37	78	30	19	33	23	27
70	062-064	Männl.	11	1	2	-	3	-	1	-
71	Virusenzephalitis, durch Arthropoden übertragen	Weibl.	30	1	-	4	-	3	10	6
72		Insges.	41	2	2	4	3	3	11	6
73	070	Männl.	765	24	22	40	25	47	99	104
74	Virushepatitis	Weibl.	813	15	17	33	31	63	108	92
75		Insges.	1578	39	39	73	56	110	207	196
76	072	Männl.	201	8	86	53	13	11	14	8
77	Mumps	Weibl.	88	1	31	18	4	3	5	5
78		Insges.	289	9	117	71	17	14	19	13
79	075	Männl.	682	5	178	121	56	170	104	30
80	Infektiöse Mononukleose	Weibl.	571	2	87	101	92	214	47	14
81		Insges.	1253	7	265	222	148	384	151	44
82	REST 045-088	Männl.	2729	518	719	258	146	139	250	180
83	Sonstige Viruskrankheiten und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	Weibl.	2742	387	513	200	112	258	417	249
84		Insges.	5471	905	1232	458	258	397	667	429
85	090-097	Männl.	524	7	7	1	-	20	103	137
86	Syphilis	Weibl.	314	6	6	2	4	35	69	57
87		Insges.	838	13	13	3	4	55	172	194

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
11	7	6	8	2	2	4	1	-	-	-	-	-	58
11	6	6	7	9	1	2	5	1	2	1	-	-	59
22	13	12	15	11	3	6	6	1	2	1	-	-	60
10	6	6	15	18	36	31	37	20	47	26	14	-	61
4	3	4	14	20	34	49	68	44	104	58	27	-	62
14	9	10	29	38	70	80	105	64	151	84	41	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	65
1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	66
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	68
8	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	69
2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	70
3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	71
5	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	72
72	65	30	71	58	43	33	18	5	5	3	1	-	73
77	64	57	56	64	47	25	24	14	21	5	-	-	74
149	129	87	127	122	90	58	42	19	26	8	1	-	75
2	-	-	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	76
5	1	2	3	1	1	2	1	-	2	2	1	-	77
7	1	2	6	2	1	2	2	-	3	2	1	-	78
7	3	1	2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	79
4	1	3	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-	80
11	4	4	3	5	-	2	1	-	1	-	1	-	81
102	60	46	78	87	45	35	23	9	14	15	5	-	82
119	90	53	84	55	40	22	33	36	37	27	10	-	83
221	150	99	162	142	85	57	56	45	51	42	15	-	84
71	52	30	40	27	14	6	6	1	-	1	1	-	85
40	29	20	16	9	2	10	5	2	2	-	-	-	86
111	81	50	56	36	16	16	11	3	2	1	1	-	87

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
88	098	Männl.	201	1	1	1	1	35	86	48
89	Gonokokkeninfektionen	Weibl.	320	-	6	-	1	136	107	45
90		Insges.	521	1	7	1	2	171	193	93
91	099	Männl.	67	-	-	1	-	5	23	10
92	Sonstige Geschlechtskrankheiten	Weibl.	16	-	-	1	-	7	5	1
93		Insges.	83	-	-	2	-	12	28	11
94	100-104	Männl.	148	1	5	4	1	7	16	28
95	Sonstige Spirochätenkrankheiten	Weibl.	83	-	1	4	3	4	16	12
96		Insges.	231	1	6	8	4	11	32	40
97	110	Männl.	453	-	5	2	10	31	33	41
98	Dermatophytie	Weibl.	267	-	4	6	7	10	12	20
99		Insges.	720	-	9	8	17	41	45	61
100	112	Männl.	482	370	18	4	2	1	6	4
101	Candidosis	Weibl.	533	319	25	7	2	9	14	11
102		Insges.	1015	689	43	11	4	10	20	15
103	111,114-118	Männl.	128	17	1	1	3	8	9	5
104	Sonstige Mykosen	Weibl.	111	15	3	-	2	2	2	4
105		Insges.	239	32	4	1	5	10	11	9
106	122,123	Männl.	120	-	15	7	9	1	4	15
107	Echinokokkose und sonstige	Weibl.	133	1	8	20	21	7	6	5
108	Zestodeninfektionen	Insges.	253	1	23	27	30	8	10	20
109	120,121,124-129	Männl.	251	-	19	31	13	29	56	40
110	Sonstige Helminthosen	Weibl.	217	1	30	43	20	8	16	18
111		Insges.	468	1	49	74	33	37	72	58
112	130	Männl.	123	29	5	13	17	18	17	6
113	Toxoplasmose	Weibl.	567	37	9	15	13	80	216	136
114		Insges.	690	66	14	28	30	98	233	142
115	135	Männl.	778	2	-	-	-	10	45	142
116	Sarkoidose	Weibl.	1002	-	-	-	-	3	52	134
117		Insges.	1780	2	-	-	-	13	97	276

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
12	7	1	2	2	2	1	-	-	-	1	-	88
19	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	89
31	12	1	2	3	2	1	-	-	-	1	-	90
10	9	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	91
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	92
10	10	2	5	1	-	1	-	1	-	-	-	93
23	11	7	11	12	11	3	5	1	2	-	-	94
7	6	6	7	4	3	2	3	4	-	1	-	95
30	17	13	18	16	14	5	8	5	2	1	-	96
41	62	33	53	54	39	17	5	6	10	9	2	97
23	29	20	36	27	22	14	10	7	10	9	1	98
64	91	53	89	81	61	31	15	13	20	18	3	99
5	7	2	12	8	6	10	5	9	10	3	-	100
6	6	7	15	20	21	14	17	8	19	9	4	101
11	13	9	27	28	27	24	22	17	29	12	4	102
4	16	6	14	13	16	2	5	3	2	1	2	103
5	7	3	11	5	8	9	15	7	3	8	2	104
9	23	9	25	18	24	11	20	10	5	9	4	105
5	13	7	11	8	10	6	5	3	1	-	-	106
3	7	6	7	12	6	5	15	1	3	-	-	107
8	20	13	18	20	16	11	20	4	4	-	-	108
18	8	4	6	6	7	8	2	3	1	-	-	109
9	6	8	10	12	6	8	9	3	6	4	-	110
27	14	12	16	18	13	16	11	6	7	4	-	111
5	4	2	3	2	-	1	-	-	1	-	-	112
33	13	6	2	3	-	-	2	-	1	1	-	113
38	17	8	5	5	-	1	2	-	2	1	-	114
139	128	108	69	55	46	22	10	1	-	1	-	115
121	136	93	123	138	80	64	42	8	7	1	-	116
260	264	201	192	193	126	86	52	9	7	2	-	117

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
118	137	Männl.	160	-	-	-	-	1	3	3
119	Spätfolgen der Tuberkulose	Weibl.	100	-	-	-	-	2	1	5
120		Insges.	260	-	-	-	-	3	4	8
121	138	Männl.	55	-	-	-	-	-	-	3
122	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	Weibl.	56	-	-	1	-	-	2	3
123		Insges.	111	-	-	1	-	-	2	6
124	131-134,136,139	Männl.	247	19	47	18	15	15	29	15
125	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten und deren Spätfolgen	Weibl.	242	15	35	11	11	37	32	21
126		Insges.	489	34	82	29	26	52	61	36
Klasse II										
Neubildungen (140 - 239)										
127	140-149	Männl.	2381	3	5	2	7	5	15	15
128	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	Weibl.	755	-	2	1	5	2	10	5
129		Insges.	3136	3	7	3	12	7	25	20
130	150	Männl.	1104	-	-	-	-	1	-	6
131	Bösartige Neubildungen des Öso- phagus	Weibl.	313	-	1	-	-	-	-	2
132		Insges.	1417	-	1	-	-	1	-	8
133	151	Männl.	4005	2	-	-	-	2	8	13
134	Bösartige Neubildungen des Magens	Weibl.	3657	-	-	-	-	-	6	34
135		Insges.	7662	2	-	-	-	2	14	47
136	152,153	Männl.	3172	1	-	2	1	4	10	10
137	Bösartige Neubildungen des Dün- ndarms, inkl. Duodenum und des Kolons, exkl. Rektum	Weibl.	4839	-	1	3	5	6	9	18
138		Insges.	8011	1	1	5	6	10	19	28
139	154	Männl.	4160	1	-	-	-	1	4	10
140	Bösartige Neubildungen des Rek- tums, des Rektum-Sigma-Übergangs und des Anus	Weibl.	4655	1	-	-	-	4	2	17
141		Insges.	8815	2	-	-	-	5	6	27
142	156	Männl.	505	-	-	-	-	-	1	2
143	Bösartige Neubildungen der Gallen- blase und der extrahepatischen Gallengänge	Weibl.	1382	-	1	-	-	-	1	-
144		Insges.	1887	-	1	-	-	-	2	2

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
6	4	4	12	27	26	29	21	5	9	8	2	118
3	3	4	9	22	16	14	10	-	7	3	1	119
9	7	8	21	49	42	43	31	5	16	11	3	120
6	8	7	5	10	3	7	1	5	-	-	-	121
1	1	3	7	13	7	5	7	3	2	1	-	122
7	9	10	12	23	10	12	8	8	2	1	-	123
22	17	7	8	5	9	9	3	1	3	4	1	124
20	7	8	10	5	2	6	3	6	6	6	1	125
42	24	15	18	10	11	15	6	7	9	10	2	126
25	48	94	384	487	424	277	228	116	145	74	27	127
11	28	20	72	78	86	92	98	63	104	54	24	128
36	76	114	456	565	510	369	326	179	249	128	51	129
2	4	30	90	214	201	185	131	68	111	49	12	130
4	3	2	9	19	32	28	76	27	54	37	19	131
6	7	32	99	233	233	213	207	95	165	86	31	132
42	53	73	189	407	509	605	689	405	636	276	96	133
33	60	72	163	239	236	393	588	459	737	468	169	134
75	113	145	352	646	745	998	1277	864	1373	744	265	135
29	68	86	247	375	457	474	474	272	401	195	66	136
27	54	78	223	329	420	575	899	608	939	484	161	137
56	122	164	470	704	877	1049	1373	880	1340	679	227	138
24	53	119	286	521	555	629	615	373	532	337	100	139
13	54	145	204	382	426	553	851	562	808	475	158	140
37	107	264	490	903	981	1182	1466	935	1340	812	258	141
3	7	4	35	57	61	61	63	48	92	54	17	142
3	3	14	47	103	116	170	244	173	272	180	55	143
6	10	18	82	160	177	231	307	221	364	234	72	144

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
145	157	Männl.	1125	-	-	-	-	1	-	1
146	Bösartige Neubildungen des	Weibl.	1131	-	-	-	-	1	-	4
147	Pankreas	Insges.	2256	-	-	-	-	2	-	5
148	155,158,159	Männl.	827	1	9	1	5	11	7	23
149	Sonstige bösartige Neubildungen der	Weibl.	1073	3	13	4	3	6	6	3
150	Verdauungsorgane und des Peri- toneums	Insges.	1900	4	22	5	8	17	13	26
151	161	Männl.	1393	-	-	1	-	1	-	5
152	Bösartige Neubildungen des Larynx	Weibl.	149	-	-	-	-	1	-	-
153		Insges.	1542	-	-	1	-	2	-	5
154	162	Männl.	12082	4	2	1	2	7	9	14
155	Bösartige Neubildungen der Trachea,	Weibl.	2172	-	-	-	-	3	6	15
156	des Bronchus und der Lunge	Insges.	14254	4	2	1	2	10	15	29
157	160,163-165	Männl.	697	3	3	4	2	10	20	11
158	Sonstige bösartige Neubildungen der	Weibl.	440	2	2	6	3	3	25	27
159	Atmungs- und der intrathorakalen Organe	Insges.	1137	5	5	10	5	13	45	38
160	170	Männl.	597	2	6	12	17	90	77	35
161	Bösartige Neubildungen des	Weibl.	434	4	5	5	31	34	67	24
162	Knochens und des Gelenknorpels	Insges.	1031	6	11	17	48	124	144	59
163	171	Männl.	631	8	17	18	14	36	17	45
164	Bösartige Neubildungen des Binde-	Weibl.	693	1	17	18	19	31	40	23
165	gewebes und sonstiger Weichteilge- webe	Insges.	1324	9	34	36	33	67	57	68
166	172	Männl.	1268	1	-	-	1	3	14	18
167	Bösartiges Melanom der Haut	Weibl.	1561	-	-	-	2	2	21	38
168		Insges.	2829	1	-	-	3	5	35	56
169	173	Männl.	1592	-	-	1	3	5	7	2
170	Sonstige bösartige Neubildungen	Weibl.	1764	-	1	1	1	2	5	7
171	der Haut	Insges.	3356	-	1	2	4	7	12	9
172	174,175	Männl.	128	-	-	-	-	-	5	1
173	Bösartige Neubildungen der Brust- drüse	Weibl.	23795	6	4	5	1	9	39	185
174		Insges.	23923	6	4	5	1	9	44	186

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
9	11	32	123	158	135	164	174	74	154	63	26	145
2	6	15	73	66	84	139	196	148	216	126	55	146
11	17	47	196	224	219	303	370	222	370	189	81	147
30	28	29	71	93	110	105	95	70	85	35	19	148
21	29	39	52	123	113	112	187	102	144	77	36	149
51	57	68	123	216	223	217	282	172	229	112	55	150
13	23	42	165	268	237	240	170	71	118	25	14	151
10	8	1	14	15	18	32	17	18	10	3	2	152
23	31	43	179	283	255	272	187	89	128	28	16	153
44	120	213	863	1768	2583	2504	1893	799	852	323	81	154
16	26	29	143	211	307	390	453	224	238	85	26	155
60	146	242	1006	1979	2890	2894	2346	1023	1090	408	107	156
23	20	18	68	79	115	105	63	46	64	33	10	157
9	15	24	22	45	29	42	77	27	52	21	9	158
32	35	42	90	124	144	147	140	73	116	54	19	159
25	46	21	44	47	62	43	27	17	22	3	1	160
13	21	15	33	24	32	36	42	10	22	13	3	161
38	67	36	77	71	94	79	69	27	44	16	4	162
42	39	34	25	57	69	47	45	28	43	28	19	163
34	28	22	64	62	45	56	65	28	76	44	20	164
76	67	56	89	119	114	103	110	56	119	72	39	165
43	67	83	212	200	163	161	148	45	57	42	10	166
69	113	97	191	243	153	157	217	79	104	57	18	167
112	180	180	403	443	316	318	365	124	161	99	28	168
6	23	24	70	114	153	166	194	157	313	209	145	169
9	14	28	88	75	80	135	219	168	380	319	232	170
15	37	52	158	189	233	301	413	325	693	528	377	171
10	2	1	5	14	18	24	18	9	13	3	5	172
497	1158	1571	3345	3603	2970	3001	3085	1487	1730	815	284	173
507	1160	1572	3350	3617	2988	3025	3103	1496	1743	818	289	174

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
175	180	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Bösartige Neubildungen der Cervix	Weibl.	6982	-	-	1	-	3	87	550
177	uteri	Insges.	6982	-	-	1	-	3	87	550
178	179,182	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Bösartige Neubildungen des Corpus	Weibl.	5284	1	-	1	1	2	4	16
180	uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	Insges.	5284	1	-	1	1	2	4	16
181	183	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildungen der Ovarien	Weibl.	9498	1	-	1	6	33	104	149
183	und sonstiger uteriner Adnexe	Insges.	9498	1	-	1	6	33	104	149
184	181,184	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildungen der Plazenta	Weibl.	1413	-	4	1	-	4	17	15
186	und sonstiger nicht näher bezeichne- ter weiblicher Genitalorgane	Insges.	1413	-	4	1	-	4	17	15
187	185	Männl.	4281	-	2	2	-	4	5	10
188	Bösartige Neubildungen der Prostata	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
189		Insges.	4281	-	2	2	-	4	5	10
190	186,187	Männl.	3686	-	17	6	14	151	438	920
191	Bösartige Neubildungen des Hodens,	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
192	des Penis und sonstiger männlicher Genitalorgane	Insges.	3686	-	17	6	14	151	438	920
193	188	Männl.	6228	-	4	6	8	4	4	13
194	Bösartige Neubildungen der Harn- blase	Weibl.	1944	-	1	6	-	-	1	2
195		Insges.	8172	-	5	12	8	4	5	15
196	189	Männl.	2658	1	50	43	2	4	7	7
197	Bösartige Neubildungen der Niere	Weibl.	1967	13	28	24	6	6	4	4
198	sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	Insges.	4625	14	78	67	8	10	11	11
199	190	Männl.	196	16	38	18	2	-	-	2
200	Bösartige Neubildungen des Auges	Weibl.	204	5	45	11	2	3	-	2
201		Insges.	400	21	83	29	4	3	-	4
202	191,192	Männl.	1722	13	70	117	66	46	54	87
203	Bösartige Neubildungen des Gehirns	Weibl.	1435	15	45	58	82	55	62	47
204	und sonstiger Teile des Nerven- systems	Insges.	3157	28	115	175	148	101	116	134

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
848	837	504	773	652	582	546	653	355	353	177	61	176
848	837	504	773	652	582	546	653	355	353	177	61	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
27	62	97	285	579	673	922	1030	524	657	311	92	179
27	62	97	285	579	673	922	1030	524	657	311	92	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
212	248	407	1201	1735	1438	1324	1387	470	504	208	70	182
212	248	407	1201	1735	1438	1324	1387	470	504	208	70	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
32	24	21	100	99	109	170	206	172	240	141	58	185
32	24	21	100	99	109	170	206	172	240	141	58	186
1	4	9	76	159	359	639	846	647	891	464	163	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
1	4	9	76	159	359	639	846	647	891	464	163	189
703	515	221	215	175	83	74	47	31	36	27	13	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
703	515	221	215	175	83	74	47	31	36	27	13	192
13	25	55	242	487	811	1071	1207	752	947	460	119	193
2	11	13	55	106	157	231	368	235	452	232	72	194
15	36	68	297	593	968	1302	1575	987	1399	692	191	195
20	67	78	246	449	482	449	277	193	189	77	17	196
20	18	59	113	263	286	296	353	167	233	49	25	197
40	85	137	359	712	768	745	630	360	422	126	42	198
5	3	4	10	14	22	17	19	9	7	7	3	199
6	-	3	11	16	11	22	22	11	26	7	1	200
11	3	7	21	30	33	39	41	20	33	14	4	201
78	156	111	185	231	199	175	92	20	18	2	2	202
96	96	73	119	219	177	147	91	37	14	2	-	203
174	252	184	304	450	376	322	183	57	32	4	2	204

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
205	193,194	Männl.	629	3	9	9	6	15	12	24
206	Bösartige Neubildungen der Schild-	Weibl.	1639	3	13	12	13	22	58	75
207	drüse und sonstiger endokriner Drü- sen und verwandter Strukturen	Insges.	2268	6	22	21	19	37	70	99
208	195-199	Männl.	1879	1	8	17	2	11	13	33
209	Sekundäre bösartige Neubildungen,	Weibl.	2527	2	7	1	2	8	14	20
210	wie sonstige bösartige Neubildungen und nicht näher bezeichneter Lokali- sationen	Insges.	4406	3	15	18	4	19	27	53
211	201	Männl.	2213	1	3	7	17	138	387	276
212	Hodgkin' Krankheit	Weibl.	1788	1	2	12	17	182	280	272
213		Insges.	4001	2	5	19	34	320	667	548
214	200,202	Männl.	3385	3	33	13	26	60	97	91
215	Lymphosarkom u. Retikulosarkom,	Weibl.	3117	6	22	10	6	29	40	59
216	sowie sonstige bösartige Neubil- dungen des lymphoiden und histio- zytären Gewebes	Insges.	6502	9	55	23	32	89	137	150
217	203	Männl.	1822	-	-	2	-	3	2	-
218	Multiples Myelom und immunopro-	Weibl.	2206	1	-	1	-	1	4	10
219	liferative Neubildungen	Insges.	4028	1	-	3	-	4	6	10
220	204	Männl.	1637	5	87	130	88	65	44	27
221	Lymphatische Leukämie	Weibl.	1297	2	57	90	47	21	39	11
222		Insges.	2934	7	144	220	135	86	83	38
223	205	Männl.	1127	-	16	19	11	43	40	83
224	Myeloische Leukämie	Weibl.	1139	1	19	9	23	26	24	66
225		Insges.	2266	1	35	28	34	69	64	149
226	206-208	Männl.	377	1	7	11	3	5	7	6
227	Sonstige Formen der Leukämie	Weibl.	412	2	10	7	4	6	14	7
228		Insges.	789	3	17	18	7	11	21	13
229	210,211	Männl.	2320	8	29	19	28	33	62	74
230	Gutartige Neubildungen der Lippe,	Weibl.	2562	14	26	48	23	33	65	92
231	Mundhöhle und des Pharynx und sonstiger Teile des Verdauungs- systems	Insges.	4882	22	55	67	51	66	127	166
232	213	Männl.	848	2	20	104	155	130	67	60
233	Gutartige Neubildungen des Kno-	Weibl.	719	3	18	54	100	107	60	58
234	chens und des Gelenkknorpels	Insges.	1567	5	38	158	255	237	127	118

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
35	50	27	61	98	73	69	77	24	16	20	1	205
94	137	101	200	144	186	159	194	77	94	44	13	206
129	187	128	261	242	259	228	271	101	110	64	14	207
49	64	60	148	278	284	237	235	143	163	94	39	208
43	82	70	260	228	338	330	375	201	293	184	69	209
92	146	130	408	506	622	567	610	344	456	278	108	210
242	245	113	198	157	108	122	96	40	51	8	4	211
130	78	116	68	114	85	154	131	69	44	29	4	212
372	323	229	266	271	193	276	227	109	95	37	8	213
106	125	159	421	449	438	440	420	218	209	62	15	214
63	101	91	272	231	380	393	598	314	329	141	32	215
169	226	250	693	680	818	833	1018	532	538	203	47	216
4	46	30	114	227	289	432	258	165	180	60	10	217
-	3	38	124	203	201	308	417	329	335	199	32	218
4	49	68	238	430	490	740	675	494	515	259	42	219
22	18	30	130	122	156	126	209	133	157	62	26	220
8	39	33	55	69	77	151	190	109	190	68	41	221
30	57	63	185	191	233	277	399	242	347	130	67	222
68	66	39	114	94	110	104	102	54	106	34	24	223
48	89	59	85	109	89	114	136	81	100	49	12	224
116	155	98	199	203	199	218	238	135	206	83	36	225
18	13	11	17	32	27	42	77	33	39	20	8	226
9	15	6	10	13	64	38	52	44	71	33	7	227
27	28	17	27	45	91	80	129	77	110	53	15	228
84	117	106	216	300	321	358	240	119	116	71	19	229
109	126	116	215	280	279	281	336	170	232	84	33	230
193	243	222	431	580	600	639	576	289	348	155	52	231
44	52	39	58	50	23	22	11	6	3	2	-	232
46	54	26	64	49	37	15	14	8	4	1	1	233
90	106	65	122	99	60	37	25	14	7	3	1	234

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
235	214	Männl.	1129	1	13	13	19	16	28	64
236	Lipom	Weibl.	1721	1	11	16	8	37	67	74
237		Insges.	2850	2	24	29	27	53	95	138
238	216	Männl.	2099	41	110	145	109	75	100	131
239	Gutartige Neubildungen der Haut	Weibl.	2626	46	118	171	143	120	121	137
240		Insges.	4725	87	228	316	252	195	221	268
241	217	Männl.	704	-	-	2	32	82	66	49
242	Gutartige Neubildungen der Brustdrüse	Weibl.	3938	-	1	1	6	122	255	328
243		Insges.	4642	-	1	3	38	204	321	377
244	218	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Leiomyom des Uterus	Weibl.	15078	2	-	1	2	4	41	189
246		Insges.	15078	2	-	1	2	4	41	189
247	219	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Sonstige gutartige Neubildungen des	Weibl.	2389	-	-	-	3	6	50	113
249	Uterus	Insges.	2389	-	-	-	3	6	50	113
250	220	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Gutartige Neubildungen des Ovars	Weibl.	5108	3	5	5	32	295	597	657
252		Insges.	5108	3	5	5	32	295	597	657
253	223	Männl.	571	-	2	2	-	5	12	10
254	Gutartige Neubildungen der Niere und	Weibl.	501	-	2	1	-	4	4	9
255	sonstiger Harnorgane	Insges.	1072	-	4	3	-	9	16	19
256	225	Männl.	792	4	19	37	31	33	41	57
257	Gutartige Neubildungen des Gehirns	Weibl.	1224	1	34	29	38	31	31	54
258	und sonstiger Teile des Nerven- systems	Insges.	2016	5	53	66	69	64	72	111
259	REST 210-229	Männl.	2803	75	140	136	97	136	172	166
260	Sonstige gutartige Neubildungen	Weibl.	3453	88	179	140	97	141	222	242
261		Insges.	6256	163	319	276	194	277	394	408
262	230-234 (EXKL.233.1)	Männl.	163	-	3	-	2	1	5	1
263	Carcinoma in situ	Weibl.	519	-	-	1	1	1	16	34
264		Insges.	682	-	3	1	3	2	21	35

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
85	102	101	163	169	130	93	74	24	18	15	1		235
102	145	140	253	272	187	147	149	55	41	13	3		236
187	247	241	416	441	317	240	223	79	59	28	4		237
99	118	85	142	188	156	149	148	73	121	80	29		238
146	136	114	212	197	167	162	167	110	168	120	71		239
245	254	199	354	385	323	311	315	183	289	200	100		240
38	32	29	48	54	59	68	49	36	41	18	1		241
365	450	448	711	467	214	221	167	65	77	29	11		242
403	482	477	759	521	273	289	216	101	118	47	12		243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		244
690	2147	3222	5539	2562	370	136	98	31	28	12	4		245
690	2147	3222	5539	2562	370	136	98	31	28	12	4		246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		247
140	225	322	587	515	186	80	84	23	38	11	6		248
140	225	322	587	515	186	80	84	23	38	11	6		249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		250
578	513	418	530	363	259	210	237	130	162	77	37		251
578	513	418	530	363	259	210	237	130	162	77	37		252
11	9	13	25	44	73	108	65	48	90	36	18		253
12	16	12	26	42	51	72	72	53	74	40	11		254
23	25	25	51	86	124	180	137	101	164	76	29		255
61	60	43	112	126	66	58	25	14	5	-	-		256
50	82	55	174	209	135	128	126	23	19	4	1		257
111	142	98	286	335	201	186	151	37	24	4	1		258
156	184	161	254	252	262	229	149	80	92	46	16		259
243	255	236	371	355	234	220	224	81	71	40	14		260
399	439	397	625	607	496	449	373	161	163	86	30		261
3	5	9	9	17	24	22	20	13	17	9	3		262
56	40	32	61	66	44	33	40	23	47	19	5		263
59	45	41	70	83	68	55	60	36	64	28	8		264

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
265	233.1	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Carcinoma in situ der Cervix uteri	Weibl.	4416	-	1	-	-	6	289	1068
267		Insges.	4416	-	1	-	-	6	289	1068
268	235-239	Männl.	3183	21	42	77	55	65	79	123
269	Neubildungen ungewissen Verhaltens	Weibl.	4028	24	34	39	45	59	115	183
270	und nicht näher bezeichneter Natur	Insges.	7211	45	76	116	100	124	194	306
Klasse III										
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen										
sowie Immunitätsstörungen (240 - 279)										
271	240	Männl.	633	6	10	12	12	15	28	43
272	Blande diffuse und nicht näher be-	Weibl.	2697	11	8	10	25	72	129	259
273	zeichnete Struma	Insges.	3330	17	18	22	37	87	157	302
274	241	Männl.	1468	-	-	-	7	21	56	103
275	Blande knotige Struma	Weibl.	8169	-	3	1	32	152	392	780
276		Insges.	9637	-	3	1	39	173	448	883
277	242	Männl.	833	1	1	3	6	14	28	34
278	Hyperthyreose mit oder ohne Struma	Weibl.	5351	-	4	7	21	65	125	266
279		Insges.	6184	1	5	10	27	79	153	300
280	243-246	Männl.	187	23	13	8	5	11	8	8
281	Hyperthyreose, Thyreoiditis und	Weibl.	592	32	19	19	19	17	24	46
282	sonstige Krankheiten der Schilddrüse	Insges.	779	55	32	27	24	28	32	54
283	250	Männl.	17502	6	73	272	450	492	537	654
284	Diabetes mellitus	Weibl.	27723	6	69	269	487	543	967	850
285		Insges.	45225	12	142	541	937	1035	1504	1504
286	251-259	Männl.	1837	39	91	140	201	150	93	93
287	Sonstige Krankheiten endokriner	Weibl.	2325	47	82	134	142	117	125	140
288	Drüsen	Insges.	4162	86	173	274	343	267	218	233
289	260-269	Männl.	282	106	61	5	5	2	5	7
290	Alimentäre Mangelzustände	Weibl.	392	96	60	5	4	1	10	18
291		Insges.	674	202	121	10	9	3	15	25

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
1230	773	369	322	147	79	49	52	17	11	1	2	266
1230	773	369	322	147	79	49	52	17	11	1	2	267
87	152	121	280	395	463	400	281	176	210	124	32	268
193	224	178	371	521	359	366	459	234	362	181	81	269
280	376	299	651	916	822	766	740	410	572	305	113	270
50	73	73	66	84	58	45	23	16	10	8	1	271
294	329	267	315	297	243	160	167	52	38	17	4	272
344	402	340	381	381	301	205	190	68	48	25	5	273
121	192	172	221	205	165	117	56	17	13	1	1	274
847	1011	808	1046	1060	755	518	460	140	127	31	6	275
968	1203	980	1267	1265	920	635	516	157	140	32	7	276
45	76	48	87	130	112	112	70	33	27	5	1	277
322	378	298	582	706	602	505	725	318	320	97	10	278
367	454	346	669	836	714	617	795	351	347	102	11	279
16	14	17	13	19	12	7	11	1	-	1	-	280
30	48	34	73	67	47	34	33	20	22	7	1	281
46	62	51	86	86	59	41	44	21	22	8	1	282
793	1006	853	1478	2331	2256	1831	1592	972	1150	591	165	283
605	690	495	1165	2047	2380	3000	4519	3035	3934	2052	610	284
1398	1696	1348	2643	4378	4636	4831	6111	4007	5084	2643	775	285
95	103	88	168	189	125	88	59	32	49	23	11	286
169	117	118	173	177	157	143	145	97	138	80	24	287
264	220	206	341	366	282	231	204	129	187	103	35	288
6	5	1	6	19	9	11	4	4	7	10	9	289
8	7	13	17	15	19	17	19	16	29	13	25	290
14	12	14	23	34	28	28	23	20	36	23	34	291

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
292	274	Männl.	425	-	-	2	-	-	6	12
293	Gicht	Weibl.	155	-	-	-	4	-	5	4
294		Insges.	580	-	-	2	4	-	11	16
295	278	Männl.	1 218	2	12	54	133	51	46	71
296	Fettsucht und sonstige Überernäh-	Weibl.	2 486	1	7	75	142	96	107	168
297	rung	Insges.	3 704	3	19	129	275	147	153	239
298	270-273,275-277,	Männl.	1 959	187	167	158	139	70	79	85
299	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	Weibl.	1 542	135	174	112	117	64	47	73
300	und Immunitätsstörungen	Insges.	3 501	322	341	270	256	134	126	158
Klasse IV										
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (280 - 289)										
301	280	Männl.	790	103	29	8	7	19	15	17
302	Eisenmangelanämien	Weibl.	2 115	70	29	5	19	81	56	69
303		Insges.	2 905	173	58	13	26	100	71	86
304	281	Männl.	681	36	9	1	4	5	7	15
305	Sonstige Mangelanämien	Weibl.	1 296	24	12	5	4	5	18	11
306		Insges.	1 977	60	21	6	8	10	25	26
307	282-285	Männl.	1 922	119	92	45	62	65	50	45
308	Sonstige Anämien	Weibl.	2 879	88	76	97	28	54	49	48
309		Insges.	4 801	207	168	142	90	119	99	93
310	286,287	Männl.	2 652	48	449	837	323	148	87	175
311	Blutgerinnungsstörungen und	Weibl.	1 095	24	251	235	61	21	56	50
312	sonstige hämorrhagen Zustände	Insges.	3 747	72	700	1 072	384	169	143	225
313	288,289	Männl.	2 683	32	282	750	529	205	123	77
314	Krankheiten der Leukozyten und	Weibl.	2 960	29	182	679	587	284	172	153
315	sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Insges.	5 643	61	464	1 429	1 116	489	295	230
Klasse V										
Psychische Krankheiten (290 - 319)										
316	291	Männl.	3 250	-	-	-	-	9	95	314
317	Alkoholpsychosen	Weibl.	630	-	1	-	1	5	16	42
318		Insges.	3 880	-	1	-	1	14	111	356

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
19	42	37	63	82	51	37	28	9	17	14	6	292
3	5	3	11	11	10	15	24	8	25	19	8	293
22	47	40	74	93	61	52	52	17	42	33	14	294
97	131	104	155	154	127	51	17	5	5	1	2	295
209	326	264	337	357	216	95	46	15	15	6	4	296
306	457	368	492	511	343	146	63	20	20	7	6	297
79	135	143	187	164	143	117	53	21	17	11	4	298
47	71	58	149	166	76	82	60	40	46	18	7	299
126	206	201	336	330	219	199	113	61	63	29	11	300
18	29	27	45	52	50	59	62	46	95	80	29	301
85	111	101	206	176	88	91	157	141	304	207	119	302
103	140	128	251	228	138	150	219	187	399	287	148	303
9	15	16	35	41	63	65	75	77	104	61	43	304
44	35	22	60	64	67	87	132	144	260	199	103	305
53	50	38	95	105	130	152	207	221	364	260	146	306
60	49	36	75	83	193	151	237	109	184	194	73	307
62	87	50	170	167	148	248	259	221	468	383	176	308
122	136	86	245	250	341	399	496	330	652	577	249	309
136	69	38	74	86	53	39	53	25	6	4	2	310
33	27	26	38	54	43	32	63	21	28	24	8	311
169	96	64	112	140	96	71	116	46	34	28	10	312
56	50	30	74	84	95	95	63	41	51	31	15	313
98	90	71	93	100	85	84	78	51	67	45	12	314
154	140	101	167	184	180	179	141	92	118	76	27	315
532	569	326	483	459	283	113	45	5	12	4	1	316
71	73	77	119	85	70	38	18	4	8	1	1	317
603	642	403	602	544	353	151	63	9	20	5	2	318

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
319	290,292-294	Männl.	1 107	2	4	2	6	16	28	28
320	Sonstige organische psychotische	Weibl.	2 154	1	2	5	4	15	34	38
321	Zustände	Insges.	3 261	3	6	7	10	31	62	66
322	295	Männl.	4 790	2	2	-	6	143	608	777
323	Schizophrene Psychosen	Weibl.	5 424	2	1	-	2	125	418	668
324		Insges.	10 214	4	3	-	8	268	1 026	1 445
325	296	Männl.	1 991	-	1	2	1	21	106	151
326	Affektive Psychosen	Weibl.	4 728	-	1	1	5	35	145	260
327		Insges.	6 719	-	2	3	6	56	251	411
328	297-299	Männl.	1 039	1	8	14	18	37	79	99
329	Sonstige Formen der Psychosen	Weibl.	1 990	-	4	7	14	56	103	123
330		Insges.	3 029	1	12	21	32	93	182	222
331	300	Männl.	3 951	26	1	32	78	123	412	613
332	Neurosen	Weibl.	7 772	15	1	19	46	226	634	926
333		Insges.	11 723	41	2	51	124	349	1 046	1 539
334	301	Männl.	866	-	2	5	15	63	119	167
335	Persönlichkeitsstörungen	Weibl.	852	-	1	7	11	91	115	129
336		Insges.	1 718	-	3	12	26	154	234	296
337	303	Männl.	20 444	3	3	3	5	123	776	2 348
338	Alkoholismus	Weibl.	4 633	2	1	1	2	41	142	459
339		Insges.	25 077	5	4	4	7	164	918	2 807
340	304	Männl.	126	-	-	2	2	2	11	17
341	Arzneimittel- oder Rauschgiftab-	Weibl.	243	-	-	-	-	10	11	23
342	hängigkeit	Insges.	369	-	-	2	2	12	22	40
343	306	Männl.	3 094	9	23	42	67	106	231	320
344	Psychosomatische Funktions-	Weibl.	4 424	5	21	50	109	233	299	399
345	störungen	Insges.	7 518	14	44	92	176	339	530	719
346	307	Männl.	1 786	12	199	1 095	336	42	14	24
347	Spezielle Symptome und Syndrome,	Weibl.	1 841	10	239	798	311	178	101	55
348	nicht andernorts klassifizierbar	Insges.	3 627	22	438	1 893	647	220	115	79

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
37	52	34	75	111	104	129	98	85	118	121	57	319
35	46	34	95	147	157	167	249	221	428	303	173	320
72	98	68	170	258	261	296	347	306	546	424	230	321
794	780	438	508	370	199	90	33	15	15	5	5	322
679	703	452	657	667	384	269	228	64	72	21	12	323
1 473	1 483	890	1 165	1 037	583	359	261	79	87	26	17	324
173	249	169	310	320	226	122	84	22	24	9	1	325
287	392	313	588	653	536	528	503	231	189	57	4	326
460	641	482	898	973	762	650	587	253	213	66	5	327
114	135	79	123	91	84	59	40	26	21	7	4	328
162	146	104	191	216	185	191	192	96	127	47	26	329
276	281	183	314	307	269	250	232	122	148	54	30	330
642	641	402	428	285	157	68	20	10	8	4	1	331
1 230	1 268	857	1 135	692	340	155	136	44	31	11	6	332
1 872	1 909	1 259	1 563	977	497	223	156	54	39	15	7	333
128	131	66	67	48	36	13	1	3	2	-	-	334
97	98	56	89	62	33	24	15	8	9	5	2	335
225	229	122	156	110	69	37	16	11	11	5	2	336
3 737	3 908	2 228	3 005	2 329	1 243	475	164	35	36	13	10	337
719	799	530	797	588	299	141	79	18	11	3	1	338
4 456	4 707	2 758	3 802	2 917	1 542	616	243	53	47	16	11	339
10	16	13	24	13	8	1	5	1	-	-	1	340
26	34	31	45	31	9	12	2	4	3	2	-	341
36	50	44	69	44	17	13	7	5	3	2	1	342
376	462	301	439	348	192	106	43	12	10	6	1	343
459	572	455	611	493	320	189	123	39	26	19	2	344
835	1 034	756	1 050	841	512	295	166	51	36	25	3	345
13	13	9	11	6	6	-	3	2	1	-	-	346
39	30	22	20	15	5	9	4	2	2	-	1	347
52	43	31	31	21	11	9	7	4	3	-	1	348

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
349	308,309	Männl.	2 175	4	5	55	105	163	285	341
350	Akute Streßreaktion und Anpas-	Weibl.	2 799	1	7	13	50	212	294	309
351	sungsstörung	Insges.	4 974	5	12	68	155	375	579	650
352	310	Männl.	674	1	14	53	26	11	20	27
353	Spezifische nichtpsychotische psy-	Weibl.	397	1	7	11	3	12	6	13
354	chische Störungen nach organischer Hirnschädigung	Insges.	1 071	2	21	64	29	23	26	40
355	313-315	Männl.	1 106	80	303	493	173	26	3	5
356	Emotionelle Störungen, hyperkineti-	Weibl.	483	51	151	159	74	25	2	5
357	sches Syndrom des Kindesalters und spezifische Entwicklungsverzöge- rungen	Insges.	1 589	131	454	652	247	51	5	10
358	REST 300-316	Männl.	5 162	1	36	312	336	407	552	672
359	Sonstige psychische Störungen	Weibl.	2 583	-	21	57	77	232	195	254
360		Insges.	7 745	1	57	369	413	639	747	926
361	317	Männl.	724	2	61	137	75	114	65	91
362	Leichte geistige Retardierung	Weibl.	431	3	42	78	36	56	39	59
363		Insges.	1 155	5	103	215	111	170	104	150
364	318,319	Männl.	1 366	13	137	227	125	143	181	163
365	Sonstige geistige Retardierung	Weibl.	834	5	120	109	68	93	85	83
366		Insges.	2 200	18	257	336	193	236	266	246
Klasse VI										
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
367	320-322	Männl.	1 006	149	267	166	63	45	35	47
368	Meningitis	Weibl.	726	125	176	89	34	32	22	18
369		Insges.	1 732	274	443	255	97	77	57	65
370	323-326	Männl.	601	14	45	37	35	49	49	53
371	Sonstige entzündliche Krankheiten	Weibl.	567	14	58	36	23	39	47	43
372	des Zentralen Nervensystems	Insges.	1 168	28	103	73	58	88	96	96
373	332	Männl.	1 037	-	1	-	-	5	2	2
374	Parkinson' Krankheit	Weibl.	920	-	-	-	-	-	2	2
375		Insges.	1 957	-	1	-	-	5	4	4

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
266	257	151	174	157	88	47	34	15	15	10	3	349
321	343	236	319	236	128	95	109	53	45	20	8	350
587	600	387	493	393	216	142	143	68	60	30	11	351
23	30	42	54	111	126	102	8	12	7	4	3	352
9	19	16	35	72	75	26	29	16	27	12	8	353
32	49	58	89	183	201	128	37	28	34	16	11	354
4	2	1	7	5	2	1	1	-	-	-	-	355
5	2	-	3	3	-	1	-	-	2	-	-	356
9	4	1	10	8	2	2	1	-	2	-	-	357
614	555	337	394	385	253	134	90	36	22	18	8	358
280	248	183	248	194	151	133	127	70	68	34	11	359
894	803	520	642	579	404	267	217	106	90	52	19	360
65	36	24	15	19	13	2	3	-	1	-	1	361
44	11	14	12	14	14	6	2	-	-	-	1	362
109	47	38	27	33	27	8	5	-	1	-	2	363
117	67	55	34	52	24	17	7	-	3	-	1	364
70	36	28	36	40	32	11	6	4	4	2	2	365
187	103	83	70	92	56	28	13	4	7	2	3	366
26	35	23	37	27	27	15	14	9	15	5	1	367
17	24	19	32	22	19	22	27	13	21	10	4	368
43	59	42	69	49	46	37	41	22	36	15	5	369
57	46	30	51	39	45	40	8	3	-	-	-	370
50	38	44	56	41	31	11	17	8	2	7	2	371
107	84	74	107	80	76	51	25	11	2	7	2	372
8	15	20	93	156	196	180	174	88	73	21	3	373
-	9	19	59	89	122	194	187	116	82	35	4	374
8	24	39	152	245	318	374	361	204	155	56	7	375

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
376	330,331,333-337	Männl.	1 601	129	133	87	76	50	65	69
377	Sonstige hereditäre und degenerative	Weibl.	1 395	110	87	84	57	47	27	70
378	Krankheiten des Zentralen Nerven-	Insges.	2 996	239	220	171	133	97	92	139
379	340	Männl.	838	1	3	1	3	13	62	78
380	Multiple Sklerose	Weibl.	1 583	1	-	3	4	26	82	154
381		Insges.	2 421	2	3	4	7	39	144	232
382	341-344	Männl.	1 261	70	230	230	90	95	47	44
383	Sonstige Lähmungserscheinungen als	Weibl.	1 116	49	198	175	95	86	48	44
384	Krankheiten des Zentralen Nerven-	Insges.	2 377	119	428	405	185	181	95	88
385	345	Männl.	7 232	190	1 083	799	505	426	548	732
386	Epilepsien	Weibl.	5 325	159	802	738	455	491	401	480
387		Insges.	12 557	349	1 885	1 537	960	917	949	1 212
388	346-349	Männl.	1 092	42	78	146	109	60	62	78
389	Migräne und sonstige Krankheiten	Weibl.	1 635	22	67	87	91	67	72	95
390	des Zentralen Nervensystems	Insges.	2 727	64	145	233	200	127	134	173
391	350-352	Männl.	783	11	31	31	28	27	45	45
392	Krankheiten der Hirnnerven	Weibl.	1 099	4	21	28	41	38	31	39
393		Insges.	1 882	15	52	59	69	65	76	84
394	353-359	Männl.	2 142	27	45	44	73	76	105	128
395	Sonstige Krankheiten des peripheren	Weibl.	2 223	13	24	29	35	70	96	115
396	Nervensystems	Insges.	4 365	40	69	73	108	146	201	243
397	361	Männl.	1 131	3	11	25	30	27	43	36
398	Netzhautablösung und Netzhaut-	Weibl.	1 066	3	4	7	5	19	24	27
399	defekte	Insges.	2 197	6	15	32	35	46	67	63
400	362	Männl.	980	14	22	17	10	6	15	32
401	Sonstige Krankheiten der Netzhaut	Weibl.	1 068	16	15	8	7	7	6	13
402		Insges.	2 048	30	37	25	17	13	21	45
403	364	Männl.	800	2	7	33	28	22	49	75
404	Krankheiten der Iris und des Ziliar-	Weibl.	748	1	11	16	21	30	28	35
405	körpers	Insges.	1 548	3	18	49	49	52	77	110

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
80	83	77	136	148	177	130	86	22	34	13	6	376
61	76	61	127	124	106	102	100	54	52	36	14	377
141	159	138	263	272	283	232	186	76	86	49	20	378
94	141	92	144	86	67	39	10	2	-	1	1	379
192	235	197	238	242	110	56	23	12	3	4	1	380
286	376	289	382	328	177	95	33	14	3	5	2	381
55	39	46	67	54	59	46	43	19	19	6	2	382
47	37	39	58	58	40	37	43	18	32	7	5	383
102	76	85	125	112	99	83	86	37	51	13	7	384
656	553	300	435	394	285	149	86	37	42	7	5	385
403	325	185	259	198	148	94	111	21	35	16	4	386
1 059	878	485	694	592	433	243	197	58	77	23	9	387
77	88	51	78	85	58	36	21	11	6	4	2	388
177	165	157	254	197	80	37	31	10	13	5	8	389
254	253	208	332	282	138	73	52	21	19	9	10	390
44	46	42	69	94	88	50	56	26	31	14	5	391
79	71	53	97	109	88	69	99	74	104	40	14	392
123	117	95	166	203	176	119	155	100	135	54	19	393
146	168	135	274	297	248	189	104	32	33	14	4	394
139	177	167	295	372	216	170	132	76	69	23	5	395
285	345	302	569	669	464	359	236	108	102	37	9	396
46	55	34	80	131	140	140	155	78	58	29	10	397
28	15	25	69	93	126	161	191	106	110	45	8	398
74	70	59	149	224	266	301	346	184	168	74	18	399
27	59	50	72	109	120	111	107	72	71	49	17	400
28	27	22	53	99	101	117	174	106	152	91	26	401
55	86	72	125	208	221	228	281	178	223	140	43	402
59	82	56	76	85	75	57	38	13	23	13	7	403
56	55	25	82	70	56	53	69	32	68	28	12	404
115	137	81	158	155	131	110	107	45	91	41	19	405

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
406	365	Männl.	2 682	7	7	19	16	24	26	56
407	Glaukom	Weibl.	3 673	7	20	12	22	25	32	34
408		Insges.	6 355	14	27	31	38	49	58	90
409	366	Männl.	6 177	11	22	36	21	20	33	61
410	Katarakt	Weibl.	10 281	9	22	22	7	17	17	22
411		Insges.	16 458	20	44	58	28	37	50	83
412	368	Männl.	82	3	4	5	2	5	10	2
413	Sehstörungen	Weibl.	141	-	4	7	3	8	14	24
414		Insges.	223	3	8	12	5	13	24	26
415	370	Männl.	537	2	10	28	20	13	22	32
416	Keratitis	Weibl.	458	7	12	13	6	12	10	19
417		Insges.	995	9	22	41	26	25	32	51
418	372	Männl.	544	68	68	40	16	12	13	22
419	Krankheiten der Konjunktiva	Weibl.	468	54	55	17	8	11	36	28
420		Insges.	1 012	122	123	57	24	23	49	50
421	375	Männl.	391	116	100	19	7	10	8	9
422	Krankheiten des Tränensystems	Weibl.	605	89	96	16	5	6	10	9
423		Insges.	996	205	196	35	12	16	18	18
424	377	Männl.	351	2	5	11	19	14	32	29
425	Krankheiten des Nervus opticus und	Weibl.	445	2	14	8	12	12	34	46
426	der Sehbahn	Insges.	796	4	19	19	31	26	66	75
427	378	Männl.	1 781	4	367	812	157	87	73	74
428	Strabismus und sonstige Störungen	Weibl.	2 011	4	392	786	143	104	91	95
429	der Bewegungen beider Augen	Insges.	3 792	8	759	1 598	300	191	164	169
430	REST 360-379	Männl.	2 714	44	193	155	97	90	133	150
431	Sonstige Augenkrankheiten	Weibl.	2 911	32	154	119	87	86	116	126
432		Insges.	5 625	76	347	274	184	176	249	276
433	380	Männl.	777	13	47	97	53	47	51	69
434	Krankheiten des äußeren Ohres	Weibl.	498	11	26	112	53	33	45	35
435		Insges.	1 275	24	73	209	106	80	96	104

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
72	122	126	253	322	370	321	319	206	243	127	46	406
45	61	74	229	394	373	421	557	360	600	274	133	407
117	183	200	482	716	743	742	876	566	843	401	179	408
55	67	75	267	416	606	727	944	652	1 059	778	327	409
39	54	66	183	288	478	846	1 723	1 430	2 541	1 768	749	410
94	121	141	450	704	1 084	1 573	2 667	2 082	3 600	2 546	1 076	411
3	2	5	7	9	9	3	5	3	2	3	-	412
14	6	5	11	6	8	5	7	6	8	5	-	413
17	8	10	18	15	17	8	12	9	10	8	-	414
35	30	22	42	46	49	49	38	21	37	32	9	415
13	14	11	33	24	29	24	59	39	62	50	21	416
48	44	33	75	70	78	73	97	60	99	82	30	417
26	40	21	45	52	48	24	20	11	15	3	-	418
32	28	22	31	37	27	31	20	15	10	4	2	419
58	68	43	76	89	75	55	40	26	25	7	2	420
5	7	12	15	19	10	19	7	12	7	3	6	421
8	16	18	37	32	33	44	50	29	52	37	18	422
13	23	30	52	51	43	63	57	41	59	40	24	423
27	25	18	27	42	32	22	23	5	11	6	1	424
46	37	26	35	48	35	14	29	14	22	8	3	425
73	62	44	62	90	67	36	52	19	33	14	4	426
33	23	28	34	32	20	16	7	4	5	4	1	427
107	64	35	51	46	30	16	20	9	12	3	3	428
140	87	63	85	78	50	32	27	13	17	7	4	429
146	168	128	196	186	191	197	163	127	183	127	40	430
127	131	100	184	186	167	177	248	189	338	240	104	431
273	299	228	380	372	358	374	411	316	521	367	144	432
62	60	37	74	50	36	32	20	10	9	7	3	433
32	29	17	26	21	14	11	8	9	7	7	2	434
94	89	54	100	71	50	43	28	19	16	14	5	435

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
436	381	Männl.	3 668	891	1 538	524	146	56	64	87
437	Nichteitrige Otitis media und Krank-	Weibl.	2 835	666	1 156	389	113	43	46	66
438	heiten der Tuba auditiva	Insges.	6 503	1 557	2 694	913	259	99	110	153
439	382	Männl.	2 787	530	1 047	250	157	72	66	91
440	Eitrige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	2 171	436	793	198	90	55	53	83
441	Otitis media	Insges.	4 958	966	1 840	448	247	127	119	174
442	383-385	Männl.	1 808	76	480	286	148	83	81	113
443	Mastoiditis und sonstige Krankheiten	Weibl.	1 485	70	433	192	92	75	61	79
444	des Trommelfells, des Mittelohrs und des Warzenfortsatzes	Insges.	3 293	146	913	478	240	158	142	192
445	386	Männl.	1 523	-	4	8	15	19	39	68
446	Schwindelsyndrome und sonstige	Weibl.	1 531	1	4	5	7	20	31	50
447	Störungen des Vestibularapparates	Insges.	3 054	1	8	13	22	39	70	118
448	387,388	Männl.	1 812	5	10	22	23	54	89	118
449	Otosklerose und sonstige Krank-	Weibl.	1 695	1	10	23	13	44	47	108
450	heiten des Ohres	Insges.	3 507	6	20	45	36	98	136	226
451	389	Männl.	695	14	173	142	36	20	15	46
452	Schwerhörigkeit und Taubheit	Weibl.	521	9	119	104	28	26	13	26
453		Insges.	1 216	23	292	246	64	46	28	72
Klasse VII										
Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 459)										
454	390-392	Männl.	157	4	7	17	9	14	13	15
455	Akutes rheumatisches Fieber	Weibl.	161	-	2	15	9	10	11	15
456		Insges.	318	4	9	32	18	24	24	30
457	394	Männl.	538	1	-	2	1	3	6	9
458	Krankheiten der Mitralklappe	Weibl.	1 327	-	1	-	1	6	3	8
459		Insges.	1 865	1	1	2	2	9	9	17
460	393,395-398	Männl.	1 419	5	4	9	6	23	25	40
461	Sonstige chronische rheumatische	Weibl.	912	-	1	3	6	8	9	18
462	Herzkrankheit	Insges.	2 331	5	5	12	12	31	34	58
463	401	Männl.	8 966	6	5	22	50	161	189	294
464	Essentieller Hochdruck	Weibl.	11 118	2	1	11	54	69	69	114
465		Insges.	20 084	8	6	33	104	230	258	408

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
68	54	38	56	51	40	25	15	2	7	6	-	436
54	59	34	58	56	25	26	16	8	9	8	3	437
122	113	72	114	107	65	51	31	10	16	14	3	438
117	73	64	103	71	57	34	23	8	15	5	4	439
74	69	48	70	66	54	27	23	9	11	12	-	440
191	142	112	173	137	111	61	46	17	26	17	4	441
105	83	58	99	73	50	36	21	10	4	1	1	442
87	76	45	86	82	33	30	16	11	10	2	5	443
192	159	103	185	155	83	66	37	21	14	3	6	444
86	149	112	215	258	218	168	86	35	31	11	1	445
92	145	120	188	243	194	159	124	61	59	26	2	446
178	294	232	403	501	412	327	210	96	90	37	3	447
140	171	143	261	284	193	153	84	24	26	10	2	448
127	167	146	261	241	177	136	110	40	32	11	1	449
267	338	289	522	525	370	289	194	64	58	21	3	450
36	27	28	45	43	24	22	9	7	3	3	2	451
35	22	13	39	30	18	9	7	10	5	4	4	452
71	49	41	84	73	42	31	16	17	8	7	6	453
14	13	9	9	13	7	8	5	-	-	-	-	454
10	17	6	13	16	13	7	6	1	3	3	4	455
24	30	15	22	29	20	15	11	1	3	3	4	456
7	28	42	84	135	108	74	22	5	6	4	1	457
25	38	70	203	252	214	230	158	45	47	23	3	458
32	66	112	287	387	322	304	180	50	53	27	4	459
60	91	101	181	246	277	220	87	22	13	7	2	460
9	38	35	128	169	133	146	109	34	43	20	3	461
69	129	136	309	415	410	366	196	56	56	27	5	462
360	612	554	1 101	1 508	1 540	1 203	509	271	317	198	66	463
229	415	606	1 284	1 727	1 510	1 005	1 142	783	1 095	670	332	464
589	1 027	1 160	2 385	3 235	3 050	2 208	1 651	1 054	1 412	868	398	465

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
466	402	Männl.	2 012	-	-	-	-	1	10	22
467	Hochdruck-Herzkrankheit	Weibl.	4 032	-	1	-	-	2	2	6
468		Insges.	6 044	-	1	-	-	3	12	28
469	403	Männl.	284	1	3	1	3	14	5	13
470	Hochdruck-Nierenkrankheit	Weibl.	270	1	3	-	10	7	9	3
471		Insges.	554	2	6	1	13	21	14	16
472	404,405	Männl.	171	1	12	2	4	4	2	5
473	Hochdruck-Herz-und Nierenkrankheit	Weibl.	195	1	1	1	4	1	3	5
474	und sekundärer Hochdruck	Insges.	366	2	13	3	8	5	5	10
475	410	Männl.	16 268	5	1	2	1	5	18	53
476	Akuter Myokardinfarkt	Weibl.	8 105	1	-	2	1	2	10	8
477		Insges.	24 373	6	1	4	2	7	28	61
478	411	Männl.	1 140	-	2	1	-	-	1	2
479	Sonstige akute und subakute Formen	Weibl.	730	-	-	-	1	-	1	1
480	der ischämischen Herzkrankheit	Insges.	1 870	-	2	1	1	-	2	3
481	413	Männl.	7 575	-	3	-	1	10	15	50
482	Angina pectoris	Weibl.	3 138	1	1	1	2	2	5	14
483		Insges.	10 713	1	4	1	3	12	20	64
484	412,414	Männl.	22 966	6	4	3	5	12	14	61
485	Alter Myokardinfarkt und sonstige	Weibl.	17 500	2	6	5	5	5	16	18
486	Formen der chronischen ischämi- schen Herzkrankheit	Insges.	40 466	8	10	8	10	17	30	79
487	415-417(EXKL.415.1)	Männl.	2 686	6	4	1	-	7	13	10
488	Krankheiten des Lungenkreislaufs	Weibl.	1 284	-	3	1	1	6	5	10
489		Insges.	3 970	6	7	2	1	13	18	20
490	415.1	Männl.	1 597	-	-	-	1	2	4	24
491	Lungenembolie	Weibl.	2 245	-	-	-	-	10	16	28
492		Insges.	3 842	-	-	-	1	12	20	52
493	420-422	Männl.	897	9	11	8	9	29	67	87
494	Akute Perikarditis und Myokarditis	Weibl.	749	8	10	10	5	21	49	64
495	sowie akute und subakute Endo-	Insges.	1 646	17	21	18	14	50	116	151

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
20	42	75	173	286	383	346	184	124	176	126	44	466
24	51	78	199	427	420	353	546	426	769	510	218	467
44	93	153	372	713	803	699	730	550	945	636	262	468
8	13	25	43	33	42	35	20	6	11	6	2	469
14	14	15	34	45	32	24	22	12	16	7	2	470
22	27	40	77	78	74	59	42	18	27	13	4	471
3	13	23	15	20	18	22	15	5	4	1	2	472
6	9	4	22	25	13	24	21	20	19	7	9	473
9	22	27	37	45	31	46	36	25	23	8	11	474
126	353	462	1 260	2 165	2 718	2 628	2 209	1 300	1 773	897	292	475
33	53	77	183	427	635	853	1 350	1 139	1 885	1 034	412	476
159	406	539	1 443	2 592	3 353	3 481	3 559	2 439	3 658	1 931	704	477
6	20	32	93	161	192	180	135	79	134	65	37	478
5	6	7	12	42	44	65	88	89	165	115	89	479
11	26	39	105	203	236	245	223	168	299	180	126	480
114	268	434	902	1 501	1 531	1 249	664	292	348	157	36	481
20	63	93	269	424	425	419	485	306	357	192	59	482
134	331	527	1 171	1 925	1 956	1 668	1 149	598	705	349	95	483
129	352	527	1 680	3 304	4 330	3 910	2 402	1 495	2 384	1 591	757	484
26	75	153	458	968	1 312	1 410	2 264	2 056	3 915	3 080	1 726	485
155	427	680	2 138	4 272	5 642	5 320	4 666	3 551	6 299	4 671	2 483	486
10	27	21	111	226	352	494	453	286	388	215	62	487
13	13	23	49	87	112	132	233	165	228	136	67	488
23	40	44	160	313	464	626	686	451	616	351	129	489
28	34	40	104	154	201	227	219	140	207	142	70	490
47	73	62	122	139	148	227	307	228	389	285	164	491
75	107	102	226	293	349	454	526	368	596	427	234	492
85	88	54	104	113	97	54	32	18	23	6	3	493
74	73	68	85	79	53	29	49	24	24	18	6	494
159	161	122	189	192	150	83	81	42	47	24	9	495

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
496	423,424	Männl.	1 055	8	14	11	4	21	31	37
497	Sonstige Krankheiten des Perikards	Weibl.	912	2	10	2	3	8	16	25
498	und des Endokards	Insges.	1 967	10	24	13	7	29	47	62
499	426	Männl.	2 200	4	8	6	13	13	18	27
500	Erregungsleitungsstörungen	Weibl.	2 445	7	2	4	6	8	23	22
501		Insges.	4 645	11	10	10	19	21	41	49
502	427	Männl.	10 081	79	39	59	52	119	189	185
503	Kardiale Rhythmusstörungen	Weibl.	9 261	53	24	66	38	65	131	212
504		Insges.	19 342	132	63	125	90	184	320	397
505	428	Männl.	6 546	5	8	4	3	11	16	31
506	Herzversagen	Weibl.	8 143	3	6	3	2	11	10	12
507		Insges.	14 689	8	14	7	5	22	26	43
508	425,429	Männl.	2 233	24	21	12	9	28	37	69
509	Kardiomyopathie, unzureichend be-	Weibl.	1 800	13	9	6	12	14	16	36
510	schriebene Herzkrankheiten und Komplikationen einer Herzkrankheit	Insges.	4 033	37	30	18	21	42	53	105
511	430	Männl.	694	-	-	-	1	7	30	56
512	Subarachnoidalblutung	Weibl.	704	-	1	-	4	6	24	40
513		Insges.	1 398	-	1	-	5	13	54	96
514	431,432	Männl.	1 189	12	6	4	3	20	13	24
515	Intrazerebrale und sonstige und nicht	Weibl.	1 036	11	4	1	6	4	17	7
516	näher bezeichnete intrakranielle Blutungen	Insges.	2 225	23	10	5	9	24	30	31
517	433,434	Männl.	1 958	-	3	2	2	13	16	19
518	Verschuß und Stenose präzerebraler	Weibl.	2 067	1	2	4	1	8	9	28
519	und zerebraler Arterien	Insges.	4 025	1	5	6	3	21	25	47
520	435	Männl.	2 421	1	1	2	1	9	8	21
521	Transistorische zerebrale Ischämie	Weibl.	2 622	-	2	4	3	8	11	15
522		Insges.	5 043	1	3	6	4	17	19	36
523	436	Männl.	8 338	1	2	2	1	14	18	25
524	Akute, aber ungenau bezeichnete	Weibl.	11 188	2	4	1	-	9	16	42
525	zerebrovaskuläre Krankheit	Insges.	19 526	3	6	3	1	23	34	67

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
52	65	62	112	162	207	136	61	30	20	17	5	496
17	25	37	77	134	107	134	122	65	79	39	10	497
69	90	99	189	296	314	270	183	95	99	56	15	498
26	27	39	68	104	167	246	311	239	429	316	139	499
26	32	18	49	60	102	192	344	314	589	442	205	500
52	59	57	117	164	269	438	655	553	1 018	758	344	501
259	428	478	995	1 337	1 415	1 426	1 029	597	780	415	200	502
240	342	320	652	824	817	1 001	1 220	811	1 337	779	329	503
499	770	798	1 647	2 161	2 232	2 427	2 249	1 408	2 117	1 194	529	504
33	71	68	181	412	585	689	822	686	1 276	1 048	597	505
32	42	33	126	195	280	478	963	883	1 995	1 770	1 299	506
65	113	101	307	607	865	1 167	1 785	1 569	3 271	2 818	1 896	507
119	151	150	297	312	289	198	132	86	133	101	65	508
37	60	63	114	132	103	122	194	163	283	249	174	509
156	211	213	411	444	392	320	326	249	416	350	239	510
47	48	54	88	140	91	74	23	14	13	6	2	511
72	62	49	90	103	69	80	45	21	17	10	11	512
119	110	103	178	243	160	154	68	35	30	16	13	513
48	66	77	130	176	171	159	102	50	63	46	19	514
32	37	57	88	105	106	90	117	70	161	83	40	515
80	103	134	218	281	277	249	219	120	224	129	59	516
52	65	88	193	277	332	307	199	98	147	105	40	517
46	56	62	149	179	167	164	265	174	341	285	126	518
98	121	150	342	456	499	471	464	272	488	390	166	519
29	51	62	167	254	376	343	268	226	319	211	72	520
19	43	32	115	139	142	231	336	328	584	423	187	521
48	94	94	282	393	518	574	604	554	903	634	259	522
40	118	120	367	698	937	1 027	1 199	867	1 413	1 057	432	523
50	77	83	207	331	447	789	1 438	1 415	2 811	2 237	1 229	524
90	195	203	574	1 029	1 384	1 816	2 637	2 282	4 224	3 294	1 661	525

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
526	437	Männl.	6 816	1	2	1	2	14	17	31
527	Sonstige und ungenau bezeichnete	Weibl.	11 045	4	-	2	1	7	14	29
528	zerebrovaskuläre Krankheiten	Insges.	17 861	5	2	3	3	21	31	60
529	438	Männl.	277	1	3	-	2	4	2	-
530	Spätfolgen einer zerebrovaskulären	Weibl.	275	-	-	-	-	-	1	2
531	Krankheit	Insges.	552	1	3	-	2	4	3	2
532	440	Männl.	9 964	1	2	1	1	2	7	18
533	Atherosklerose	Weibl.	7 437	1	1	1	-	8	17	16
534		Insges.	17 401	2	3	2	1	10	24	34
535	443	Männl.	1 158	-	4	3	-	12	9	14
536	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	Weibl.	586	-	2	4	2	7	13	23
537		Insges.	1 744	-	6	7	2	19	22	37
538	444	Männl.	1 294	3	2	1	1	4	12	15
539	Arterielle Embolie und Thrombose	Weibl.	1 702		1	8	1	5	15	21
540		Insges.	2 996	3	3	9	2	9	27	36
541	441,442,446-448	Männl.	1 221	12	29	33	11	11	27	21
542	Sonstige Krankheiten der Arterien,	Weibl.	680	8	17	22	12	27	20	29
543	Arteriolen und Kapillaren	Insges.	1 901	20	46	55	23	38	47	50
544	451-453	Männl.	3 344	7	7	7	16	30	113	127
545	Phlebitis, Thrombophlebitis, venöse	Weibl.	4 091	1	2	5	18	90	143	179
546	Embolien und Thrombosen	Insges.	7 435	8	9	12	34	120	256	306
547	454	Männl.	4 144	1	1	2	2	21	89	234
548	Varizen der unteren Extremitäten	Weibl.	10 614	1	3	1	4	19	123	626
549		Insges.	14 758	2	4	3	6	40	212	860
550	455	Männl.	2 834	1	18	4	4	27	80	188
551	Hämorrhoiden	Weibl.	1 955	-	4	5	4	16	41	72
552		Insges.	4 789	1	22	9	8	43	121	260
553	458	Männl.	1 251	1	7	62	130	76	79	77
554	Hypotension	Weibl.	2 084	4	8	69	146	186	176	164
555		Insges.	3 335	5	15	131	276	262	255	241

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
22	82	87	289	478	759	901	742	572	1 158	1 032	626	526
61	75	88	212	375	469	553	1 012	1 123	2 527	2 487	2 006	527
83	157	175	501	853	1 228	1 454	1 754	1 695	3 685	3 519	2 632	528
3	3	9	18	40	54	52	35	19	16	11	5	529
5	8	5	12	22	24	13	31	33	66	32	21	530
8	11	14	30	62	78	65	66	52	82	43	26	531
54	128	234	703	1 160	1 648	1 627	1 220	659	1 187	822	490	532
32	65	68	139	259	327	476	720	743	1 501	1 586	1 477	533
86	193	302	842	1 419	1 975	2 103	1 940	1 402	2 688	2 408	1 967	534
34	27	43	98	139	189	191	131	84	118	47	15	535
24	18	23	41	44	43	30	74	57	94	59	28	536
58	45	66	139	183	232	221	205	141	212	106	43	537
25	39	44	89	140	173	167	170	88	152	111	58	538
20	35	29	47	55	78	127	222	166	380	303	189	539
45	74	73	136	195	251	294	392	254	532	414	247	540
27	23	17	68	81	157	171	219	109	125	58	22	541
32	28	22	65	40	49	35	79	43	83	49	20	542
59	51	39	133	121	206	206	298	152	208	107	42	543
174	209	156	331	487	427	384	334	164	232	109	30	544
255	313	278	496	466	343	329	375	221	337	179	61	545
429	522	434	827	953	770	713	709	385	569	288	91	546
332	441	451	776	695	484	264	134	70	75	51	21	547
1 053	1 458	1 212	1 863	1 500	869	404	336	231	444	313	154	548
1 385	1 899	1 663	2 639	2 195	1 353	668	470	301	519	364	175	549
295	359	294	440	397	263	203	116	62	47	30	6	550
142	200	193	363	316	198	129	85	74	68	31	14	551
437	559	487	803	713	461	332	201	136	115	61	20	552
78	93	77	120	122	109	70	48	28	31	27	16	553
201	185	132	179	180	125	98	73	36	64	48	10	554
279	278	209	299	302	234	168	121	64	95	75	26	555

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
556	456,457,459	Männl.	3 345	12	25	66	724	582	336	282
557	Varizen sonstiger Lokalisationen,	Weibl.	989	3	10	20	23	27	30	50
558	Krankheiten der Lymphwege und sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems	Insges.	4 334	15	35	86	747	609	366	332
Klasse VIII										
Krankheiten des Atmungssystems (460 - 519)										
559	461	Männl.	1 667	18	307	236	153	115	127	156
560	Akute Sinusitis, inkl. Nasenhöhlen- abszeß	Weibl.	1 176	19	215	214	122	41	79	89
561		Insges.	2 843	37	522	450	275	156	206	245
562	462	Männl.	763	186	312	148	58	7	9	6
563	Akute Pharyngitis	Weibl.	662	160	264	133	40	14	7	12
564		Insges.	1 425	346	576	281	98	21	16	18
565	463	Männl.	4 234	532	2 491	595	208	115	89	64
566	Akute Tonsillitis	Weibl.	3 471	401	1 876	560	182	128	72	72
567		Insges.	7 705	933	4 367	1 155	390	243	161	136
568	464	Männl.	3 683	582	2 351	386	67	13	11	27
569	Akute Laryngitis und Tracheitis	Weibl.	2 086	327	1 247	173	46	21	24	16
570		Insges.	5 769	909	3 598	559	113	34	35	43
571	460,465	Männl.	12 150	3 471	5 492	1 474	538	173	149	132
572	Akute Rhinopharyngitis und sonstige akute Infektionen der oberen Atem- wege mehrerer oder nicht näher bezeichnete Lokalisation	Weibl.	10 136	2 814	4 411	1 244	438	175	154	140
573		Insges.	22 286	6 285	9 903	2 718	976	348	303	272
574	466	Männl.	8 327	2 861	4 219	523	117	29	29	39
575	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	Weibl.	5 393	1 474	2 664	339	102	42	50	44
576		Insges.	13 720	4 335	6 883	862	219	71	79	83
577	470	Männl.	4 169	3	18	20	68	449	636	745
578	Septumdeviation	Weibl.	1 401	-	2	11	28	162	194	261
579		Insges.	5 570	3	20	31	96	611	830	1 006
580	471	Männl.	1 517	4	26	36	35	29	48	54
581	Nasenpolypen	Weibl.	902	3	21	31	32	24	32	49
582		Insges.	2 419	7	47	67	67	53	80	103

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
175	135	128	188	230	171	96	77	42	46	22	8	556
58	67	81	112	109	83	84	81	47	57	39	8	557
233	202	209	300	339	254	180	158	89	103	61	16	558
121	103	62	85	77	51	30	17	3	6	-	-	559
67	67	33	54	63	39	25	16	11	12	7	3	560
188	170	95	139	140	90	55	33	14	18	7	3	561
7	6	1	4	6	4	2	2	2	1	1	1	562
2	6	2	4	3	6	3	3	2	1	-	-	563
9	12	3	8	9	10	5	5	4	2	1	1	564
40	21	13	18	15	13	7	2	1	4	5	1	565
31	22	13	23	25	23	12	8	7	9	4	3	566
71	43	26	41	40	36	19	10	8	13	9	4	567
33	24	14	31	55	33	24	11	7	7	4	3	568
22	30	23	35	41	18	15	11	11	15	6	5	569
55	54	37	66	96	51	39	22	18	22	10	8	570
124	91	61	112	90	83	54	30	24	25	20	7	571
100	77	48	107	87	72	62	57	31	61	38	20	572
224	168	109	219	177	155	116	87	55	86	58	27	573
29	29	27	59	54	67	64	44	22	50	45	20	574
51	27	34	57	68	57	55	63	55	92	74	45	575
80	56	61	116	122	124	119	107	77	142	119	65	576
622	513	279	352	235	135	62	18	5	5	2	2	577
218	186	96	101	67	31	24	10	3	5	1	1	578
840	699	375	453	302	166	86	28	8	10	3	3	579
91	108	84	214	242	180	147	121	36	41	15	6	580
61	63	47	99	111	87	83	73	29	34	21	2	581
152	171	131	313	353	267	230	194	65	75	36	8	582

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
583	472,473	Männl.	2 166	5	229	146	67	73	129	167
584	Chronische Pharyngitis, Rhinopharyngitis und Sinusitis	Weibl.	1 762	9	171	113	73	60	119	156
585		Insges.	3 928	14	400	259	140	133	248	323
586	474 (EXKL.474.2)	Männl.	10 952	8	2 618	3 327	914	969	851	796
587	Chronische Krankheit der Gaumen- und Rachenmandeln	Weibl.	12 597	4	1 925	3 120	1 384	1 919	1 323	1 135
588		Insges.	23 549	12	4 543	6 447	2 298	2 888	2 174	1 931
589	474.2	Männl.	16 500	22	10 324	5 585	409	52	37	16
590	Adenoide Vegetationen	Weibl.	12 574	16	7 602	4 355	413	76	28	19
591		Insges.	29 074	38	17 926	9 940	822	128	65	35
592	475	Männl.	1 346	4	75	95	57	190	188	162
593	Paratonsillarabszeß, inkl. peritonsilläre Phlegmose	Weibl.	1 016	1	50	99	108	173	101	122
594		Insges.	2 362	5	125	194	165	363	289	284
595	476-478	Männl.	2 710	24	63	91	70	110	139	181
596	Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis, allergische Rhinitis und sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	Weibl.	2 023	20	53	61	38	69	128	166
597		Insges.	4 733	44	116	152	108	179	267	347
598	480	Männl.	301	23	63	13	4	12	7	16
599	Viruspneumonie	Weibl.	224	12	43	8	2	7	11	24
600		Insges.	525	35	106	21	6	19	18	40
601	481-484	Männl.	1 263	53	218	64	32	17	25	21
602	Sonstige Pneumonien durch näher bezeichneten Erreger	Weibl.	903	37	172	52	26	13	23	44
603		Insges.	2 166	90	390	116	58	30	48	65
604	485	Männl.	13 080	1 653	3 350	354	96	82	85	183
605	Bronchopneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	Weibl.	10 319	1 105	2 774	283	70	56	92	136
606		Insges.	23 399	2 758	6 124	637	166	138	177	319
607	486	Männl.	3 542	181	673	192	60	46	38	88
608	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	Weibl.	2 435	146	537	118	62	16	47	71
609		Insges.	5 977	327	1 210	310	122	62	85	159

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
151	200	141	228	232	199	96	52	11	25	14	1	583
147	140	104	181	149	124	81	62	34	25	9	5	584
298	340	245	409	381	323	177	114	45	50	23	6	585
586	345	175	163	119	32	21	12	-	9	6	1	586
680	443	185	215	116	73	25	21	7	14	5	3	587
1 266	788	360	378	235	105	46	33	7	23	11	4	588
12	7	4	5	6	7	2	2	6	3	-	1	589
13	6	2	9	9	4	7	6	3	1	2	3	590
25	13	6	14	15	11	9	8	9	4	2	4	591
139	98	49	77	103	48	28	18	7	4	4	-	592
71	46	26	66	52	25	30	17	5	13	9	2	593
210	144	75	143	155	73	58	35	12	17	13	2	594
193	258	193	324	330	300	225	98	50	39	18	4	595
215	239	153	223	195	149	110	105	37	32	21	9	596
408	497	346	547	525	449	335	203	87	71	39	13	597
21	10	7	18	20	24	16	19	6	12	9	1	598
15	8	7	6	15	11	9	10	6	16	9	5	599
36	18	14	24	35	35	25	29	12	28	18	6	600
50	64	41	72	109	100	83	66	63	81	66	38	601
29	25	21	30	36	39	38	67	46	92	80	33	602
79	89	62	102	145	139	121	133	109	173	146	71	603
230	231	229	443	668	749	729	686	585	1 170	987	570	604
129	103	88	190	243	302	346	589	604	1 263	1 147	799	605
359	334	317	633	911	1 051	1 075	1 275	1 189	2 433	2 134	1 369	606
119	154	108	223	270	287	235	215	141	269	156	87	607
58	45	34	70	80	98	120	161	144	291	208	129	608
177	199	142	293	350	385	355	376	285	560	364	216	609

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
610	487	Männl.	1 704	250	413	212	116	80	79	86
611	Grippe	Weibl.	1 501	200	302	228	131	84	83	68
612		Insges.	3 205	450	715	440	247	164	162	154
613	490,491	Männl.	11 119	392	878	252	94	75	98	154
614	Chronische und nicht näher be- zeichnete Bronchitis	Weibl.	6 252	167	488	154	75	85	112	144
615		Insges.	17 371	559	1 366	406	169	160	210	298
616	492	Männl.	899	-	3	1	2	1	7	7
617	Emphysem	Weibl.	316	-	2	1	3	2	3	7
618		Insges.	1 215	-	5	2	5	3	10	14
619	493	Männl.	5 239	40	335	814	455	221	241	315
620	Asthma bronchiale	Weibl.	5 682	14	162	422	287	273	287	367
621		Insges.	10 921	54	497	1 236	742	494	528	682
622	494-496	Männl.	526	6	12	27	17	17	14	18
623	Bronchiektasie, exogene allergische Alveolitis und chronische Atemwegs- obstruktion, nicht andernorts klassi- fizierbar	Weibl.	463	1	7	10	12	18	22	38
624		Insges.	989	7	19	37	29	35	36	56
625	500-508	Männl.	1 314	39	35	7	5	8	10	19
626	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Agenzien	Weibl.	247	42	18	10	4	6	6	9
627		Insges.	1 561	81	53	17	9	14	16	28
628	511	Männl.	858	3	4	2	5	16	23	58
629	Pleuritis	Weibl.	585	1	4	2	7	10	21	34
630		Insges.	1 443	4	8	4	12	26	44	92
631	512	Männl.	1 717	12	1	-	8	141	234	212
632	Pneumothorax	Weibl.	432	6	-	1	3	49	45	62
633		Insges.	2 149	18	1	1	11	190	279	274
634	510,513	Männl.	524	2	4	3	2	9	18	16
635	Empyem und Abszeß der Lunge und des Mediastinums	Weibl.	180	-	3	1	1	2	6	17
636		Insges.	704	2	7	4	3	11	24	33
637	514-519	Männl.	2 362	33	20	27	17	62	46	58
638	Sonstige Krankheiten der Lunge und des Atmungssystems	Weibl.	2 895	9	17	20	9	32	24	54
639		Insges.	5 257	42	37	47	26	94	70	112

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
75	55	33	67	59	52	35	18	12	26	28	8		610
51	44	31	46	50	38	28	27	22	35	20	13		611
126	99	64	113	109	90	63	45	34	61	48	21		612
193	243	248	662	1 107	1 738	1 730	1 098	652	859	477	169		613
193	259	245	555	645	670	530	587	414	539	282	108		614
386	502	493	1 217	1 752	2 408	2 260	1 685	1 066	1 398	759	277		615
13	13	9	39	74	162	167	108	82	113	76	22		616
4	7	6	13	16	20	27	43	33	62	46	21		617
17	20	15	52	90	182	194	151	115	175	122	43		618
248	303	233	446	468	417	332	184	57	86	35	9		619
346	521	414	639	602	459	330	279	104	113	51	12		620
594	824	647	1 085	1 070	876	662	463	161	199	86	21		621
26	24	25	49	63	57	51	41	30	24	20	5		622
32	29	29	56	56	38	23	32	16	18	19	7		623
58	53	54	105	119	95	74	73	46	42	39	12		624
16	23	11	50	96	304	313	153	90	82	40	13		625
5	9	5	19	17	16	12	18	8	25	9	9		626
21	32	16	69	113	320	325	171	98	107	49	22		627
42	53	52	82	105	107	80	64	62	50	34	16		628
21	19	16	47	51	43	55	59	46	85	48	16		629
63	72	68	129	156	150	135	123	108	135	82	32		630
149	98	73	102	132	125	125	111	53	92	42	7		631
50	39	16	27	24	13	14	32	20	18	7	6		632
199	137	89	129	156	138	139	143	73	110	49	13		633
37	51	31	50	97	64	48	46	11	15	15	5		634
12	3	14	11	22	18	14	12	15	19	9	1		635
49	54	45	61	119	82	62	58	26	34	24	6		636
61	75	66	148	192	222	196	185	151	306	292	205		637
41	67	56	99	120	135	153	235	212	531	572	509		638
102	142	122	247	312	357	349	420	363	837	864	714		639

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
Klasse IX										
Krankheiten des Verdauungsystems (520 - 579)										
640	520-526	Männl.	1 603	6	30	66	155	146	156	180
641	Krankheiten der Zähne, des Zahn-	Weibl.	1 380	4	27	38	97	145	172	141
642	halteapparates und der Kiefer	Insges.	2 983	10	57	104	252	291	328	321
643	527-529	Männl.	1 968	49	343	105	62	79	180	183
644	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle	Weibl.	1 763	39	313	93	59	83	129	136
645	und der Speicheldrüsen	Insges.	3 731	88	656	198	121	162	309	319
646	530	Männl.	1 434	23	19	12	12	17	36	66
647	Krankheiten des Ösophagus	Weibl.	766	19	17	4	10	14	17	28
648		Insges.	2 200	42	36	16	22	31	53	94
649	531	Männl.	6 634	-	4	6	9	51	171	315
650	Ulcus ventriculi	Weibl.	4 270	1	6	5	2	10	29	48
651		Insges.	10 904	1	10	11	11	61	200	363
652	532	Männl.	7 298	-	1	3	14	109	371	703
653	Ulcus duodeni	Weibl.	2 903	-	1	1	11	21	48	116
654		Insges.	10 201	-	2	4	25	130	419	819
655	533,534	Männl.	474	2	3	1	-	3	5	17
656	Ulcus pepticum jejuni und nicht näher	Weibl.	196	-	4	7	1	2	4	7
657	bezeichnete Lokalisation	Insges.	670	2	7	8	1	5	9	24
658	535	Männl.	4 120	2	23	69	73	201	372	436
659	Gastritis und Duodentitis	Weibl.	2 896	3	25	76	90	194	254	182
660		Insges.	7 016	5	48	145	163	395	626	618
661	536,537	Männl.	2 045	298	130	130	70	66	78	139
662	Störungen der Magenfunktion sowie	Weibl.	2 020	214	99	142	80	86	103	97
663	sonstige Krankheiten des Magens	Insges.	4 065	512	229	272	150	152	181	236
	des Duodenums									
664	540	Männl.	17 213	26	481	2 405	3 082	2 198	1 786	1 511
665	Akute Appendizitis	Weibl.	17 135	8	342	1 902	2 531	2 867	1 980	1 492
666		Insges.	34 348	34	823	4 307	5 613	5 065	3 766	3 003

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
133	114	83	135	128	95	73	53	17	17	14	2	640
120	121	61	84	88	75	73	48	28	39	12	7	641
253	235	144	219	216	170	146	101	45	56	26	9	642
148	151	99	127	141	99	60	61	33	22	20	6	643
115	119	48	89	122	77	85	86	49	56	38	27	644
263	270	147	216	263	176	145	147	82	78	58	33	645
88	122	78	161	170	171	120	101	83	85	54	16	646
22	30	26	64	71	73	83	68	53	92	51	24	647
110	152	104	225	241	244	203	169	136	177	105	40	648
448	496	408	751	928	846	633	491	290	464	244	79	649
121	158	121	305	401	405	404	563	451	638	424	178	650
569	654	529	1 056	1 329	1 251	1 037	1 054	741	1 102	668	257	651
842	770	512	822	888	727	483	347	167	296	193	50	652
173	208	149	281	317	276	236	245	185	330	226	79	653
1 015	978	661	1 103	1 205	1 003	719	592	352	626	419	129	654
29	41	39	64	91	60	41	26	9	29	13	1	655
6	14	8	14	24	20	14	25	15	14	13	4	656
35	55	47	78	115	80	55	51	24	43	26	5	657
444	424	276	423	366	320	239	153	99	105	71	24	658
188	172	158	253	235	199	164	212	131	193	125	42	659
632	596	434	676	601	519	403	365	230	298	196	66	660
100	123	110	147	172	124	114	101	31	55	35	22	661
92	118	69	150	145	107	119	142	74	99	64	20	662
192	241	179	297	317	231	233	243	105	154	99	42	663
1 074	836	553	740	726	543	403	344	149	204	116	36	664
1 015	779	428	737	655	526	465	457	231	365	253	102	665
2 089	1 615	981	1 477	1 381	1 069	868	801	380	569	369	138	666

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
667	541	Männl.	2 217	1	92	463	494	314	241	157
668	Ungenau bezeichnete Appendizitis	Weibl.	3 080	1	82	404	586	610	411	244
669		Insges.	5 297	2	174	867	1 080	924	652	401
670	542,543	Männl.	3 669	2	99	591	708	497	398	320
671	Sonstige Formen der Appendizitis und	Weibl.	6 420	1	98	616	987	1 332	848	532
672	Krankheiten des Appendix	Insges.	10 089	3	197	1 207	1 695	1 829	1 246	852
673	550	Männl.	29 971	3 183	4 097	2 638	435	255	653	882
674	Hernia inguinalis	Weibl.	7 150	845	1 419	2 031	244	54	90	126
675		Insges.	37 121	4 028	5 516	4 669	679	309	743	1 008
676	551	Männl.	141	1	2	6	-	2	1	3
677	Sonstige Hernien der Bauchhöhle mit	Weibl.	247	-	5	-	2	2	2	3
678	Gangrän	Insges.	388	1	7	6	2	4	3	6
679	552,553	Männl.	5 429	86	764	685	112	43	90	152
680	Sonstige Hernien der Bauchhöhle	Weibl.	5 942	66	830	629	78	39	73	146
681	ohne Anzeichen von Gangrän	Insges.	11 371	152	1 594	1 314	190	82	163	298
682	557	Männl.	354	3	1	2	1	6	4	10
683	Gefäßinsuffizienz des Darmes	Weibl.	567	4	1	2	4	1	5	1
684		Insges.	921	7	2	4	5	7	9	11
685	555,556,558	Männl.	11 792	2 431	3 153	734	515	510	541	524
686	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und	Weibl.	11 648	2 129	2 401	618	486	605	705	638
687	Kolitis	Insges.	23 440	4 560	5 554	1 352	1 001	1 115	1 246	1 162
688	560	Männl.	2 666	244	140	146	125	77	101	92
689	Ileus, ohne Angabe einer Hernie	Weibl.	3 756	127	81	67	101	95	147	127
690		Insges.	6 422	371	221	213	226	172	248	219
691	564	Männl.	4 557	77	380	632	404	201	237	255
692	Funktionelle Darmstörungen, nicht	Weibl.	6 243	63	314	511	429	341	293	281
693	andernorts klassifizierbar	Insges.	10 800	140	694	1 143	833	542	530	536
694	565	Männl.	2 530	36	43	17	18	46	108	180
695	Analfissur und Analfistel	Weibl.	1 449	15	32	5	15	40	79	79
696		Insges.	3 979	51	75	22	33	86	187	259

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
105	77	50	52	43	34	24	20	11	21	10	8	667
151	110	55	94	89	59	44	47	23	38	20	12	668
256	187	105	146	132	93	68	67	34	59	30	20	669
238	170	94	139	107	88	74	44	35	31	22	12	670
412	300	214	248	222	133	120	129	66	87	57	18	671
650	470	308	387	329	221	194	173	101	118	79	30	672
1 000	1 209	1 113	1 965	2 475	2 399	2 498	2 127	1 035	1 289	531	187	673
136	139	148	255	248	210	187	303	222	269	144	80	674
1 136	1 348	1 261	2 220	2 723	2 609	2 685	2 430	1 257	1 558	675	267	675
4	12	6	18	13	13	15	14	13	5	8	5	676
4	5	4	11	20	22	10	22	28	52	36	19	677
8	17	10	29	33	35	25	36	41	57	44	24	678
212	310	280	457	626	493	440	283	126	137	78	55	679
148	197	163	391	493	501	506	525	267	435	279	176	680
360	507	443	848	1 119	994	946	808	393	572	357	231	681
9	17	6	11	18	19	30	45	30	58	57	27	682
6	6	6	14	10	17	30	59	49	137	112	103	683
15	23	12	25	28	36	60	104	79	195	169	130	684
537	424	293	467	450	388	323	209	92	113	60	28	685
585	516	333	458	484	372	306	362	181	244	151	74	686
1 122	940	626	925	934	760	629	571	273	357	211	102	687
76	89	58	108	218	168	205	211	150	223	159	76	688
139	105	102	195	185	192	267	381	294	494	398	259	689
215	194	160	303	403	360	472	592	444	717	557	335	690
207	209	163	294	358	263	208	197	101	184	122	65	691
299	319	285	458	531	374	340	392	231	332	288	162	692
506	528	448	752	889	637	548	589	332	516	410	227	693
243	359	243	348	347	220	150	96	37	23	13	3	694
109	187	168	248	196	94	70	55	22	22	9	4	695
352	546	411	596	543	314	220	151	59	45	22	7	696

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
697	566	Männl.	2 525	63	42	37	22	69	170	269
698	Abszeß der Anal- und Rektalregion	Weibl.	902	11	35	14	7	71	75	74
699		Insges.	3 427	74	77	51	29	140	245	343
700	567,568	Männl.	741	3	6	19	12	12	20	20
701	Krankheiten des Peritoneums	Weibl.	1 080	4	12	30	20	29	26	38
702		Insges.	1 821	7	18	49	32	41	46	58
703	562,569	Männl.	3 594	17	101	43	25	27	48	104
704	Darmdivertikel und sonstige Krank-	Weibl.	3 963	14	90	37	28	35	42	62
705	heiten des Darmes	Insges.	7 557	31	191	80	53	62	90	166
706	570	Männl.	129	5	6	3	2	3	5	3
707	Akute und subakute Lebernekrose	Weibl.	112	3	1	1	1	3	3	3
708		Insges.	241	8	7	4	3	6	8	6
709	571	Männl.	7 593	7	11	22	17	57	116	328
710	Chronische Leberkrankheit und	Weibl.	4 035	8	8	16	27	31	74	108
711	Leberzirrhose	Insges.	11 628	15	19	38	44	88	190	436
712	572,573	Männl.	1 502	25	32	52	24	50	56	127
713	Leberabszeß und sonstige Krank-	Weibl.	1 467	20	23	43	27	73	73	92
714	heiten der Leber	Insges.	2 969	45	55	95	51	123	129	219
715	574	Männl.	18 718	11	8	8	19	59	177	442
716	Cholelithiasis	Weibl.	46 329	5	6	12	83	497	1 863	2 937
717		Insges.	65 047	16	14	20	102	556	2 040	3 379
718	575	Männl.	2 427	-	-	7	9	18	54	70
719	Sonstige Krankheiten der Gallenblase	Weibl.	3 894	1	3	9	11	81	139	205
720		Insges.	6 321	1	3	16	20	99	193	275
721	576	Männl.	1 054	3	2	-	2	3	11	15
722	Sonstige Krankheiten der Gallengänge	Weibl.	2 092	8	5	4	-	10	25	37
723		Insges.	3 146	11	7	4	2	13	36	52
724	577	Männl.	6 453	1	7	8	8	35	183	499
725	Krankheiten des Pankreas	Weibl.	3 449	3	10	16	19	46	92	162
726		Insges.	9 902	4	17	24	27	81	275	661

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
300	308	210	255	296	167	144	83	40	35	12	3		697
100	82	55	91	52	74	46	41	26	30	12	6		698
400	390	265	346	348	241	190	124	66	65	24	9		699
30	33	34	63	72	85	88	72	44	56	44	28		700
50	40	45	63	100	72	84	95	85	132	87	68		701
80	73	79	126	172	157	172	167	129	188	131	96		702
103	194	173	349	483	550	476	365	199	203	97	37		703
77	110	129	253	472	440	470	604	300	448	258	94		704
180	304	302	602	955	990	946	969	499	651	355	131		705
4	11	7	21	17	11	18	3	4	4	-	2		706
7	7	8	13	12	10	13	5	9	9	2	2		707
11	18	15	34	29	21	31	8	13	13	2	4		708
455	737	631	1 117	1 339	1 129	729	449	165	196	70	18		709
171	217	248	515	576	534	441	396	250	259	125	31		710
626	954	879	1 632	1 915	1 663	1 170	845	415	455	195	49		711
109	138	95	149	163	160	136	80	37	38	22	9		712
88	97	100	141	170	139	115	95	48	66	42	15		713
197	235	195	290	333	299	251	175	85	104	64	24		714
845	1 292	1 093	2 162	2 839	2 484	2 392	1 820	934	1 282	634	217		715
3 099	3 284	2 513	4 381	5 638	5 071	4 626	4 682	2 330	2 903	1 699	700		716
3 944	4 576	3 606	6 543	8 477	7 555	7 018	6 502	3 264	4 185	2 333	917		717
116	137	108	212	274	275	281	230	138	253	169	76		718
199	260	174	275	347	336	286	362	259	436	334	177		719
315	397	282	487	621	611	567	592	397	689	503	253		720
28	59	36	81	121	143	159	117	81	108	65	20		721
82	101	82	219	253	215	241	267	162	226	117	38		722
110	160	118	300	374	358	400	384	243	334	182	58		723
812	904	658	878	775	580	371	261	118	213	101	41		724
230	223	167	337	358	333	302	348	204	294	214	91		725
1 042	1 127	825	1 215	1 133	913	673	609	322	507	315	132		726

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
727	578,579	Männl.	2 712	137	347	119	39	23	50	84
728	Gastrointestinale Blutung und in-	Weibl.	2 231	109	263	98	45	29	35	42
729	testinale Malabsorption	Insges.	4 943	246	610	217	84	52	85	126
Klasse X										
Krankheiten des Urogenitalsystems (580 - 629)										
730	580,581	Männl.	716	6	107	145	85	32	40	36
731	Akute Glomerulonephritis und	Weibl.	508	4	65	57	61	21	29	40
732	nephrotisches Syndrom	Insges.	1 224	10	172	202	146	53	69	76
733	582	Männl.	812	-	6	18	23	71	64	66
734	Chronische Glomerulonephritis	Weibl.	487	1	8	18	12	41	49	49
735		Insges.	1 299	1	14	36	35	112	113	115
736	584-586	Männl.	3 445	15	59	35	40	66	135	165
737	Nierenversagen	Weibl.	3 725	24	65	26	37	35	76	116
738		Insges.	7 170	39	124	61	77	101	211	281
739	583,587-589	Männl.	515	14	29	49	35	24	16	37
740	Sonstige Nephropatien	Weibl.	560	12	41	39	31	20	28	22
741		Insges.	1 075	26	70	88	66	44	44	59
742	590	Männl.	3 348	427	202	100	93	89	100	102
743	Infektiöse Krankheiten der Niere	Weibl.	9 846	470	1 195	1 292	424	353	416	338
744		Insges.	13 194	897	1 397	1 392	517	442	516	440
745	591,593	Männl.	2 111	275	226	222	92	85	79	78
746	Hydronephrose und sonstige Krank-	Weibl.	3 131	119	378	424	237	96	121	174
747	heiten der Niere und des Ureters	Insges.	5 242	394	604	646	329	181	200	252
748	592,594	Männl.	8 806	14	53	85	106	110	259	383
749	Steine in Niere und Harnwegen	Weibl.	6 382	5	24	75	67	142	331	457
750		Insges.	15 188	19	77	160	173	252	590	840
751	595	Männl.	698	4	15	15	19	20	22	23
752	Zystitis	Weibl.	1 363	10	38	74	48	100	88	68
753		Insges.	2 061	14	53	89	67	120	110	91

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
101	117	129	264	269	228	210	160	105	170	106	54	727
62	67	69	102	136	111	161	170	133	231	218	150	728
163	184	198	366	405	339	371	330	238	401	324	204	729
29	37	20	39	38	33	32	17	6	8	5	1	730
25	30	14	33	27	29	24	17	7	16	7	2	731
54	67	34	72	65	62	56	34	13	24	12	3	732
85	82	45	85	94	72	39	34	13	10	5	-	733
51	51	38	39	40	35	19	16	7	11	1	1	734
136	133	83	124	134	107	58	50	20	21	6	1	735
168	228	173	355	422	424	334	297	117	207	153	52	736
143	165	94	327	449	483	498	431	226	316	150	64	737
311	393	267	682	871	907	832	728	343	523	303	116	738
32	30	19	43	45	33	38	32	8	15	11	5	739
18	29	23	58	52	36	32	45	26	25	16	7	740
50	59	42	101	97	69	70	77	34	40	27	12	741
124	116	87	177	269	269	247	247	161	270	184	84	742
317	306	249	506	530	532	525	714	467	670	382	160	743
441	422	336	683	799	801	772	961	628	940	566	244	744
86	71	66	114	148	146	134	121	60	72	27	9	745
164	176	86	204	199	190	160	165	93	96	37	12	746
250	247	152	318	347	336	294	286	153	168	64	21	747
522	640	550	1 115	1 283	1 259	956	713	269	331	120	38	748
473	497	349	593	838	714	593	571	233	259	120	41	749
995	1 137	899	1 708	2 121	1 973	1 549	1 284	502	590	240	79	750
12	25	17	39	46	58	74	81	61	81	63	5	751
48	70	50	85	75	88	91	127	92	103	71	37	752
60	95	67	124	121	146	165	208	153	184	134	60	753

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
754	596-599	Männl.	4 270	189	223	303	207	107	140	158
755	Sonstige Krankheiten der Harnblase,	Weibl.	3 205	191	513	552	248	138	130	103
756	der Harnröhre und der Harnwege	Insges.	7 475	380	736	855	455	245	270	261
757	600	Männl.	9 264	2	8	9	1	3	1	15
758	Hyperplasie der Prostata	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
759		Insges.	9 264	2	8	9	1	3	1	15
760	603	Männl.	3 555	120	552	383	119	165	108	99
761	Hydrozele von Funiculus spermaticus, Testitis oder Tunica vaginalis testis	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
762		Insges.	3 555	120	552	383	119	165	108	99
763	604	Männl.	1 886	8	19	29	73	120	206	139
764	Orchitis und Epididymitis	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
765		Insges.	1 886	8	19	29	73	120	206	139
766	605	Männl.	9 553	33	3 460	2 701	696	295	310	254
767	Überhängende Vorhaut und Phimose	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
768		Insges.	9 553	33	3 460	2 701	696	295	310	254
769	601, 602, 606-608	Männl.	3 824	74	360	329	510	422	298	330
770	Alle sonstigen Krankheiten der männlichen Genitalorgane	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
771		Insges.	3 824	74	360	329	510	422	298	330
772	610, 611	Männl.	239	4	3	2	7	28	20	11
773	Krankheiten der Mamma	Weibl.	6 162	8	-	4	33	193	389	595
774		Insges.	6 401	12	3	6	40	221	409	606
775	614	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Entzündliche Krankheiten des Ovars,	Weibl.	12 138	-	-	4	25	1 853	2 802	2 319
777	der Tuba uterina, des Beckenbindegewebes und des Peritoneums	Insges.	12 138	-	-	4	25	1 853	2 802	2 319
778	615	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
779	Entzündliche Krankheiten des Uterus,	Weibl.	1 448	-	-	-	-	73	250	225
780	exkl. Cervix uteri	Insges.	1 448	-	-	-	-	73	250	225
781	616	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
782	Entzündliche Krankheiten der Cervix uteri, der Vagina und der Vulva	Weibl.	4 486	6	62	35	31	284	619	632
783		Insges.	4 486	6	62	35	31	284	619	632

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
146	149	115	212	255	290	368	435	297	377	223	76	754
78	108	58	124	149	130	113	148	101	166	107	48	755
224	257	173	336	404	420	481	583	398	543	330	124	756
9	12	19	107	311	816	1 653	1 986	1 299	1 791	904	318	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
9	12	19	107	311	816	1 653	1 986	1 299	1 791	904	318	759
99	121	111	246	346	335	296	205	132	87	26	5	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
99	121	111	246	346	335	296	205	132	87	26	5	762
120	119	65	154	163	156	145	125	80	102	46	17	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
120	119	65	154	163	156	145	125	80	102	46	17	765
162	191	127	215	233	203	195	145	83	122	100	28	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
162	191	127	215	233	203	195	145	83	122	100	28	768
223	177	133	204	218	188	127	83	47	49	33	19	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
223	177	133	204	218	188	127	83	47	49	33	19	771
15	11	21	16	26	9	19	20	9	13	3	2	772
659	740	657	1 188	767	301	224	185	86	92	30	11	773
674	751	678	1 204	793	310	243	205	95	105	33	13	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
1 712	1 366	717	690	345	136	66	38	24	23	14	4	776
1 712	1 366	717	690	345	136	66	38	24	23	14	4	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
224	231	140	156	71	23	10	12	13	9	10	1	779
224	231	140	156	71	23	10	12	13	9	10	1	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
561	545	331	510	369	140	99	86	61	69	31	15	782
561	545	331	510	369	140	99	86	61	69	31	15	783

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
784	617	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
785	Endometriose	Weibl.	935	-	-	1	1	9	63	140		
786		Insges.	935	-	-	1	1	9	63	140		
787	618	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
788	Genitalprolaps	Weibl.	6 660	-	6	2	-	5	35	72		
789		Insges.	6 660	-	6	2	-	5	35	72		
790	619-621	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
791	Fisteln des Genitaltrakts, nichtent-	Weibl.	10 471	41	17	9	49	333	765	894		
792	zündliche und sonstige Krankheiten des Uterus und der Anhangsgebilde	Insges.	10 471	41	17	9	49	333	765	894		
793	622	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
794	Nichtentzündliche Krankheiten der	Weibl.	18 006	-	-	2	2	158	1 435	3 210		
795	Cervix uteri	Insges.	18 006	-	-	2	2	158	1 435	3 210		
796	623,624	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
797	Nichtentzündliche Krankheiten der	Weibl.	1 665	10	17	38	31	155	158	135		
798	Vagina, der Vulva und des Perineums	Insges.	1 665	10	17	38	31	155	158	135		
799	626	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
800	Menstruationsstörungen und andere	Weibl.	40 513	4	5	2	114	895	2 687	3 923		
801	abnorme Blutungen aus dem weib- lichen Genitaltrakt	Insges.	40 513	4	5	2	114	895	2 687	3 923		
802	628	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
803	Sterilität bei der Frau	Weibl.	10 044	-	-	1	1	67	2 721	4 972		
804		Insges.	10 044	-	-	1	1	67	2 721	4 972		
805	625,627,629	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
806	Alle sonstigen Krankheiten der	Weibl.	30 790	2	5	21	88	419	748	760		
807	weiblichen Genitalorgane	Insges.	30 790	2	5	21	88	419	748	760		
Klasse XI												
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (630 - 676)												
808	633	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
809	Ektopische Gravidität	Weibl.	3 085	-	-	-	1	102	732	1 099		
810		Insges.	3 085	-	-	-	1	102	732	1 099		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
144	172	143	151	78	18	2	4	2	6	-	1	785
144	172	143	151	78	18	2	4	2	6	-	1	786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787
164	393	441	926	1 200	995	764	764	375	320	143	55	788
164	393	441	926	1 200	995	764	764	375	320	143	55	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
821	871	803	1 935	2 252	653	308	309	152	165	75	19	791
821	871	803	1 935	2 252	653	308	309	152	165	75	19	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
3 166	2 560	1 679	2 361	1 842	753	334	272	93	103	27	9	794
3 166	2 560	1 679	2 361	1 842	753	334	272	93	103	27	9	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
128	135	89	168	189	116	87	83	36	54	26	10	797
128	135	89	168	189	116	87	83	36	54	26	10	798
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799
4 361	5 479	5 279	9 602	6 539	968	255	194	69	80	47	10	800
4 361	5 479	5 279	9 602	6 539	968	255	194	69	80	47	10	801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802
1 850	330	35	22	14	6	4	6	3	4	2	6	803
1 850	330	35	22	14	6	4	6	3	4	2	6	804
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805
644	641	908	5 328	11 808	4 372	1 845	1 519	621	725	258	78	806
644	641	908	5 328	11 808	4 372	1 845	1 519	621	725	258	78	807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808
723	340	76	10	2	-	-	-	-	-	-	-	809
723	340	76	10	2	-	-	-	-	-	-	-	810

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
811	634	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Spontanabort	Weibl.	18 261	-	-	-	9	1 565	6 208	5 415
813		Insges.	18 261	-	-	-	9	1 565	6 208	5 415
814	635	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
815	Legal eingeleiteter Abort	Weibl.	74 318	-	-	-	110	5 801	16 188	19 540
816		Insges.	74 318	-	-	-	110	5 801	16 188	19 540
817	636,637	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Illegal eingeleiteter und nicht näher	Weibl.	874	-	-	-	-	71	280	260
819	bezeichneter Abort	Insges.	874	-	-	-	-	71	280	260
820	630-632,638,639	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Sonstige Komplikationen der	Weibl.	5 219	-	-	-	1	355	1 727	1 685
822	Schwangerschaft mit abortivem	Insges.	5 219	-	-	-	1	355	1 727	1 685
	Ausgang									
823	640,641	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
824	Blutung in der Schwangerschaft,	Weibl.	11 297	-	-	-	2	916	4 540	3 945
825	vorzeitige Lösung der Plazenta und	Insges.	11 297	-	-	-	2	916	4 540	3 945
	Placenta praevia									
826	642	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Hochdruck als Komplikation von	Weibl.	5 102	-	-	-	1	505	2 150	1 475
828	Schwangerschaft, Geburt und	Insges.	5 102	-	-	-	1	505	2 150	1 475
	Wochenbett									
829	643	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Übermäßiges Erbrechen während	Weibl.	2 263	-	-	-	3	421	1 024	573
831	der Schwangerschaft	Insges.	2 263	-	-	-	3	421	1 024	573
832	644-646	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Alle sonstigen Komplikationen der	Weibl.	23 917	-	-	-	5	3 245	10 386	6 793
834	Schwangerschaft	Insges.	23 917	-	-	-	5	3 245	10 386	6 793
835	647,648	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
836	Krankheiten der Mutter, die	Weibl.	3 665	-	-	-	1	308	1 437	1 055
837	Schwangerschaft, Geburt und	Insges.	3 665	-	-	-	1	308	1 437	1 055
	Wochenbett komplizieren									
838	650	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
839	Völlig normale Geburt	Weibl.	139892	-	-	-	18	11 186	60 573	47 933
840		Insges.	139892	-	-	-	18	11 186	60 573	47 933

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
2 620	1 575	619	217	33	-	-	-	-	-	-	-	812
2 620	1 575	619	217	33	-	-	-	-	-	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814
15 843	12 492	3 811	502	31	-	-	-	-	-	-	-	815
15 843	12 492	3 811	502	31	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
121	83	32	14	13	-	-	-	-	-	-	-	818
121	83	32	14	13	-	-	-	-	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820
774	465	149	42	21	-	-	-	-	-	-	-	821
774	465	149	42	21	-	-	-	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823
1 389	433	60	8	4	-	-	-	-	-	-	-	824
1 389	433	60	8	4	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
663	263	39	3	3	-	-	-	-	-	-	-	827
663	263	39	3	3	-	-	-	-	-	-	-	828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829
178	55	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	830
178	55	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
2 426	943	99	11	9	-	-	-	-	-	-	-	833
2 426	943	99	11	9	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
575	243	41	3	2	-	-	-	-	-	-	-	836
575	243	41	3	2	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
15 382	4 314	435	29	22	-	-	-	-	-	-	-	839
15 382	4 314	435	29	22	-	-	-	-	-	-	-	840

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
841	652	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
842	Lage-, Haltungs- und Einstellungs-	Weibl.	4 279	-	-	-	1	301	1 847	1 419
843	anomalien des Feten	Insges.	4 279	-	-	-	1	301	1 847	1 419
844	653,654	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
845	Mißverhältnis und Anomalie der	Weibl.	6 542	-	-	-	2	592	2 674	2 223
846	Organe und Weichteile des Beckens	Insges.	6 542	-	-	-	2	592	2 674	2 223
847	655,656	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
848	Fetale Anomalie und Zustände, die	Weibl.	7 969	-	-	-	-	745	3 438	2 306
849	sich auf die Behandlung der Mutter auswirken	Insges.	7 969	-	-	-	-	745	3 438	2 306
850	651,657-659	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Mehrlingsschwangerschaft und	Weibl.	5 752	-	-	-	2	444	2 381	1 871
852	sonstige besondere Zustände bei der Geburt	Insges.	5 752	-	-	-	2	444	2 381	1 871
853	664	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Verletzung des Perineums und der	Weibl.	15 113	-	-	-	4	1 487	6 978	4 946
855	Vulva unter der Geburt	Insges.	15 113	-	-	-	4	1 487	6 978	4 946
856	660-663,665-669	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
857	Sonstige Komplikationen, die vor-	Weibl.	25 393	-	-	-	4	2 389	11 852	7 744
858	wiegend während des Geburtsablaufs auftreten	Insges.	25 393	-	-	-	4	2 389	11 852	7 744
859	670-676	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
860	Komplikationen des Wochenbettes	Weibl.	2 124	-	-	-	-	168	965	678
861		Insges.	2 124	-	-	-	-	168	965	678
Klasse XII										
Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes (680 - 709)										
862	680	Männl.	1 633	25	76	72	70	125	168	172
863	Karbunkel und Furunkel	Weibl.	988	28	64	59	53	86	83	70
864		Insges.	2 621	53	140	131	123	211	251	242
865	681,682	Männl.	9 277	228	503	377	306	513	763	875
866	Zellgewebsentzündungen und	Weibl.	6 514	236	359	262	208	307	360	388
867	Abszesse	Insges.	15 791	464	862	639	514	820	1 123	1 263

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
549	146	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	842
549	146	9	6	1	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
757	263	23	5	3	-	-	-	-	-	-	-	845
757	263	23	5	3	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
772	568	122	12	6	-	-	-	-	-	-	-	848
772	568	122	12	6	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850
754	259	35	3	3	-	-	-	-	-	-	-	851
754	259	35	3	3	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
1 329	341	23	1	4	-	-	-	-	-	-	-	854
1 329	341	23	1	4	-	-	-	-	-	-	-	855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
2 450	852	86	12	4	-	-	-	-	-	-	-	857
2 450	852	86	12	4	-	-	-	-	-	-	-	858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
200	71	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	860
200	71	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	861
154	130	80	106	132	100	75	62	26	27	21	12	862
50	62	44	53	71	68	48	62	27	33	23	4	863
204	192	124	159	203	168	123	124	53	60	44	16	864
808	765	476	696	816	626	480	408	201	246	134	56	865
346	333	238	438	502	448	428	553	309	407	268	124	866
1 154	1 098	714	1 134	1 318	1 074	908	961	510	653	402	180	867

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
868	683	Männl.	724	44	237	128	55	49	36	32
869	Akute Lymphadenitis	Weibl.	510	31	165	78	59	27	30	17
870		Insges.	1 234	75	402	206	114	76	66	49
871	684-686	Männl.	1 505	171	291	109	37	104	192	185
872	Sonstige Infektionen der Haut und des Unterhautgewebes	Weibl.	914	107	245	92	41	103	81	43
873		Insges.	2 419	278	536	201	78	207	273	228
874	691	Männl.	1 949	175	509	205	125	195	174	102
875	Dermatitis atopica und verwandte Krankheiten	Weibl.	1 817	109	315	208	133	241	199	136
876		Insges.	3 766	284	824	413	258	436	373	238
877	692	Männl.	1 933	27	52	20	27	68	121	146
878	Kontaktdermatitis und sonstige Formen des Ekzems	Weibl.	1 749	24	27	22	29	124	119	143
879		Insges.	3 682	51	79	42	56	192	240	289
880	696	Männl.	3 358	2	12	41	52	121	234	379
881	Psoriasis und ähnliche Krankheiten	Weibl.	2 479	1	14	58	83	208	220	247
882		Insges.	5 837	3	26	99	135	329	454	626
883	690,693-695,697,	Männl.	1 273	228	87	51	34	30	52	75
884	Sonstige entzündliche Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes	Weibl.	1 737	184	71	48	39	77	112	128
885		Insges.	3 010	412	158	99	73	107	164	203
886	708	Männl.	773	25	113	91	53	38	63	68
887	Urtikaria	Weibl.	1 004	13	80	54	43	73	79	89
888		Insges.	1 777	38	193	145	96	111	142	157
889	700-707,709	Männl.	3 119	50	95	124	188	290	277	274
890	Sonstige Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes	Weibl.	3 680	28	94	137	182	187	171	212
891		Insges.	6 799	78	189	261	370	477	448	486
Klasse XIII										
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (710 - 739)										
892	714	Männl.	2 195	-	72	120	110	52	67	81
893	Rheumatoid-Arthritis und sonstige Polyarthritiden	Weibl.	5 941	3	76	134	112	93	116	196
894		Insges.	8 136	3	148	254	222	145	183	277

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
30	23	17	13	25	14	12	2	5	1	1	-	868
17	15	6	11	15	11	10	5	2	3	2	6	869
47	38	23	24	40	25	22	7	7	4	3	6	870
122	88	43	53	39	22	15	17	9	5	3	-	871
34	21	15	25	33	16	10	21	8	11	5	3	872
156	109	58	78	72	38	25	38	17	16	8	3	873
98	77	38	63	60	50	27	25	11	7	7	1	874
88	77	36	73	67	32	20	24	22	17	17	3	875
186	154	74	136	127	82	47	49	33	24	24	4	876
137	157	109	180	215	192	147	89	70	90	60	26	877
109	119	86	150	142	136	90	101	64	131	93	40	878
246	276	195	330	357	328	237	190	134	221	153	66	879
403	433	245	369	344	252	152	122	61	71	50	15	880
198	171	132	193	234	136	146	130	79	117	77	35	881
601	604	377	562	578	388	298	252	140	188	127	50	882
84	79	46	69	93	87	48	54	39	58	35	24	883
92	141	108	128	134	113	78	72	54	80	49	29	884
176	220	154	197	227	200	126	126	93	138	84	53	885
65	62	23	47	41	40	22	11	6	4	1	-	886
94	105	66	91	71	50	38	27	12	12	6	1	887
159	167	89	138	112	90	60	38	18	16	7	1	888
245	204	120	224	255	186	141	154	76	113	78	25	889
205	201	149	254	278	224	241	258	167	329	241	122	890
450	405	269	478	533	410	382	412	243	442	319	147	891
79	120	99	239	269	330	261	144	63	60	22	7	892
273	347	262	677	871	753	607	659	305	320	104	33	893
352	467	361	916	1 140	1 083	868	803	368	380	126	40	894

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
895	715	Männl.	6 815	3	3	4	10	29	63	93
896	Osteoarthrose und verwandte	Weibl.	11 910	3	7	5	17	25	72	106
897	Krankheiten	Insges.	18 725	6	10	9	27	54	135	199
898	711-713,716	Männl.	1 078	19	171	163	78	39	54	49
899	Arthropatien	Weibl.	1 032	12	106	107	55	40	39	51
900		Insges.	2 110	31	277	270	133	79	93	100
901	717	Männl.	6 684	1	9	17	97	557	887	1 049
902	Innere Kniegelenkschädigung	Weibl.	2 708	-	3	21	118	517	341	243
903		Insges.	9 392	1	12	38	215	1 074	1 228	1 292
904	710,718,719	Männl.	2 966	7	47	92	143	348	375	331
905	Diffuse Krankheiten des Bindegewe-	Weibl.	3 147	3	47	84	196	361	239	276
906	bes sowie sonstige Gelenkkrankhei- ten	Insges.	6 113	10	94	176	339	709	614	607
907	720,721	Männl.	2 395	2	7	12	13	22	52	91
908	Spondylitis und Spondylose sowie	Weibl.	2 550	-	7	8	13	15	25	52
909	verwandte Krankheiten	Insges.	4 945	2	14	20	26	37	77	143
910	722	Männl.	5 399	2	3	12	11	41	145	244
911	Bandscheibenkrankheiten	Weibl.	4 315	8	5	1	10	35	80	180
912		Insges.	9 714	10	8	13	21	76	225	424
913	723	Männl.	1 257	2	21	19	10	11	19	43
914	Sonstige Krankheiten der Zervikal-	Weibl.	1 714	3	16	22	11	29	31	61
915	region	Insges.	2 971	5	37	41	21	40	50	104
916	724	Männl.	5 960	-	5	18	28	53	152	316
917	Sonstige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	5 598	5	7	15	34	72	119	216
918	Krankheiten des Rückens	Insges.	11 558	5	12	33	62	125	271	532
919	725-729	Männl.	9 420	23	200	363	226	240	363	485
920	Weichteilrheumatismus, exkl. im	Weibl.	6 040	19	124	227	224	272	295	304
921	Rückenbereich	Insges.	15 460	42	324	590	450	512	658	789
922	730	Männl.	1 320	33	72	56	60	54	82	88
923	Osteomyelitis, Periostitis und	Weibl.	667	16	64	59	43	22	26	23
924	sonstige den Knochen betreffende	Insges.	1 987	49	136	115	103	76	108	111

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
143	192	217	476	824	1 334	1 186	963	544	545	151	35	895
146	200	250	729	1 453	1 744	1 665	2 139	1 250	1 442	524	133	896
289	392	467	1 205	2 277	3 078	2 851	3 102	1 794	1 987	675	168	897
51	58	38	75	60	77	61	31	18	20	12	4	898
44	38	28	73	74	68	55	57	40	78	54	13	899
95	96	66	148	134	145	116	88	58	98	66	17	900
961	859	529	725	537	274	136	28	8	6	3	1	901
248	227	192	280	236	151	59	30	12	13	11	6	902
1 209	1 086	721	1 005	773	425	195	58	20	19	14	7	903
229	243	151	238	257	209	113	79	36	44	23	1	904
182	216	158	306	319	235	153	148	68	92	48	16	905
411	459	309	544	576	444	266	227	104	136	71	17	906
130	163	175	375	396	397	307	110	42	63	32	6	907
94	132	160	375	470	379	227	195	133	156	80	29	908
224	295	335	750	866	776	534	305	175	219	112	35	909
472	771	713	978	844	549	390	121	54	29	17	3	910
336	645	604	888	682	391	160	128	68	75	14	5	911
808	1 416	1 317	1 866	1 526	940	550	249	122	104	31	8	912
68	102	104	215	229	187	138	51	14	19	4	1	913
85	140	152	335	327	234	89	73	34	46	21	5	914
153	242	256	550	556	421	227	124	48	65	25	6	915
521	711	588	977	928	721	475	198	106	106	48	9	916
365	552	585	931	928	582	323	305	191	216	124	28	917
886	1 263	1 173	1 908	1 856	1 303	798	503	297	322	172	37	918
595	812	729	1 328	1 320	1 127	803	445	156	133	56	16	919
404	460	410	861	854	540	366	311	148	154	48	19	920
999	1 272	1 139	2 189	2 174	1 667	1 169	756	304	287	104	35	921
89	84	61	102	118	131	86	83	36	60	20	5	922
21	25	21	46	48	63	49	49	23	29	23	17	923
110	109	82	148	166	194	135	132	59	89	43	22	924

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
925	731-733	Männl.	2 001	5	129	286	323	220	124	110
926	Alle sonstigen Krankheiten des	Weibl.	2 326	19	50	92	223	107	44	43
927	Knochens und des Knorpels	Insges.	4 327	24	179	378	546	327	168	153
928	734-736	Männl.	1 079	6	20	64	58	57	70	82
929	Erworbene Deformitäten der Extre-	Weibl.	6 113	9	16	45	147	202	241	298
930	mitäten	Insges.	7 192	15	36	109	205	259	311	380
931	737	Männl.	423	4	8	84	169	74	7	6
932	Wirbelsäulenverkrümmung	Weibl.	984	4	11	130	482	197	10	10
933		Insges.	1 407	8	19	214	651	271	17	16
934	738,739	Männl.	560	1	15	17	35	45	21	33
935	Sonstige erworbene Deformitäten	Weibl.	697	1	11	17	49	64	20	33
936	sowie Funktionsstörungen mit seg- mentaler Reaktion, nicht andernorts klassifizierbar	Insges.	1 257	2	26	34	84	109	41	66
Klasse XIV										
Angeborene Anomalien (740 - 759)										
937	740-742	Männl.	743	242	174	145	77	55	12	8
938	Angeborene Anomalien des Ner-	Weibl.	722	280	140	133	62	42	25	14
939	vensystems	Insges.	1 465	522	314	278	139	97	37	22
940	743,744	Männl.	2 778	102	234	1 327	472	217	118	78
941	Angeborene Anomalien des Auges,	Weibl.	2 834	69	215	1 408	495	140	144	102
942	des Ohres, des Gesichts und des Halses	Insges.	5 612	171	449	2 735	967	357	262	180
943	745-747	Männl.	2 444	1 083	538	327	191	104	41	36
944	Angeborene Anomalien des Kreis-	Weibl.	2 215	831	423	363	160	75	61	53
945	laufsystems	Insges.	4 659	1 914	961	690	351	179	102	89
946	749	Männl.	1 186	387	336	221	43	108	35	20
947	Gaumenspalte und Lippenspalte	Weibl.	803	226	265	155	39	61	21	19
948		Insges.	1 989	613	601	376	82	169	56	39
949	750,751	Männl.	1 101	739	156	57	23	12	9	9
950	Sonstige angeborene Anomalien	Weibl.	677	349	142	44	17	7	7	4
951	des Verdauungssystems	Insges.	1 778	1 088	298	101	40	19	16	13

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
75	80	55	115	134	114	87	50	33	38	17	6	925
45	62	53	134	235	201	173	253	164	253	132	43	926
120	142	108	249	369	315	260	303	197	291	149	49	927
54	69	57	112	133	125	87	49	10	17	6	3	928
327	380	442	961	1 207	852	444	302	99	95	39	7	929
381	449	499	1 073	1 340	977	531	351	109	112	45	10	930
7	13	5	12	7	8	4	3	2	6	2	2	931
9	11	10	21	18	20	12	6	11	9	8	5	932
16	24	15	33	25	28	16	9	13	15	10	7	933
53	47	39	52	69	49	29	29	7	13	5	1	934
18	60	46	109	90	53	25	33	30	24	14	-	935
71	107	85	161	159	102	54	62	37	37	19	1	936
6	5	3	2	3	4	2	2	-	3	-	-	937
5	2	1	3	4	5	4	2	-	-	-	-	938
11	7	4	5	7	9	6	4	-	3	-	-	939
60	52	22	25	23	17	13	6	3	6	2	1	940
78	46	35	28	22	11	13	14	7	5	2	-	941
138	98	57	53	45	28	26	20	10	11	4	1	942
19	30	7	16	27	13	9	1	-	-	-	2	943
36	45	35	40	40	22	16	10	1	2	-	2	944
55	75	42	56	67	35	25	11	1	2	-	4	945
12	6	6	8	2	-	1	-	-	-	1	-	946
3	5	1	5	-	2	1	-	-	-	-	-	947
15	11	7	13	2	2	2	-	-	-	1	-	948
5	9	6	15	18	8	7	9	7	4	8	-	949
7	6	5	15	9	15	5	20	5	11	5	4	950
12	15	11	30	27	23	12	29	12	15	13	4	951

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
952	752 (EXKL.752.5)	Männl.	1 358	52	459	579	207	31	5	4		
953	Angeborene Anomalien der Genital-	Weibl.	326	33	52	50	36	52	26	32		
954	organe	Insges.	1 684	85	511	629	243	83	31	36		
955	752.5	Männl.	6 366	62	2 281	2 823	1 020	80	25	26		
956	Ausgebliebener Descensus testi-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
957	culorum	Insges.	6 366	62	2 281	2 823	1 020	80	25	26		
958	753	Männl.	794	246	136	124	52	15	16	13		
959	Angeborene Anomalien des Harn-	Weibl.	606	134	86	87	52	11	17	14		
960	systems	Insges.	1 400	380	222	211	104	26	33	27		
961	754-756 (EXKL.754)	Männl.	1 877	551	476	320	172	129	54	42		
962	Angeborene Anomalien des Muskel-	Weibl.	1 766	406	422	237	234	174	59	28		
963	Skelett-Systems	Insges.	3 643	957	898	557	406	303	113	70		
964	754.3	Männl.	384	124	146	40	10	6	4	3		
965	Angeborene Hüftluxation	Weibl.	1 679	712	550	104	42	30	15	22		
966		Insges.	2 063	836	696	144	52	36	19	25		
967	748,757-759	Männl.	823	260	147	75	59	45	40	39		
968	Alle sonstigen angeborenen Ano-	Weibl.	1 092	230	108	137	147	102	75	80		
969	malien	Insges.	1 915	490	255	212	206	147	115	119		
Klasse XV												
Bestimmte in der Perinatalperiode entstandene Zustände (760 - 779)												
970	760	Männl.	18	12	6	-	-	-	-	-		
971	Schädigung des Feten oder Neuge-	Weibl.	11	11	-	-	-	-	-	-		
972	borenen durch Zustände der Mutter,	Insges.	29	23	6	-	-	-	-	-		
die zur vorliegenden Schwangerschaft keine Beziehung haben müssen												
973	761-763	Männl.	1 105	1 101	4	-	-	-	-	-		
974	Schädigung des Feten oder Neuge-	Weibl.	975	973	2	-	-	-	-	-		
975	borenen durch Komplikationen der	Insges.	2 080	2 074	6	-	-	-	-	-		
Schwangerschaft und Geburt												
976	764,765	Männl.	6 603	6 574	29	-	-	-	-	-		
977	Fetale Wachstumsretardierung,	Weibl.	6 588	6 561	27	-	-	-	-	-		
978	Mangelernährung und Unreife	Insges.	13 191	13 135	56	-	-	-	-	-		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
7	3	2	2	4	2	-	-	1	-	-	-	952
16	12	2	6	3	2	1	2	-	1	-	-	953
23	15	4	8	7	4	1	2	1	1	-	-	954
13	12	4	3	9	3	2	-	1	-	-	2	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
13	12	4	3	9	3	2	-	1	-	-	2	957
15	27	16	32	44	29	9	11	4	2	3	-	958
12	22	13	45	17	31	21	16	7	14	5	2	959
27	49	29	77	61	60	30	27	11	16	8	2	960
22	31	25	15	17	13	6	2	-	-	1	1	961
37	50	20	23	34	14	15	8	1	1	2	1	962
59	81	45	38	51	27	21	10	1	1	3	2	963
8	10	3	5	8	4	6	2	1	3	1	-	964
31	32	12	45	32	14	13	14	4	3	3	1	965
39	42	15	50	40	18	13	16	5	6	4	1	966
36	34	14	23	17	13	6	8	3	3	-	1	967
53	40	25	35	24	9	5	11	8	1	1	1	968
89	74	39	58	41	22	11	19	11	4	1	2	969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
979	767	Männl.	236	236	-	-	-	-	-	-		
980	Geburtstrauma	Weibl.	180	176	4	-	-	-	-	-		
981		Insges.	416	412	4	-	-	-	-	-		
982	768-770	Männl.	2 342	2 324	18	-	-	-	-	-		
983	Hypoxie, Asphyxie und sonstige re-	Weibl.	1 620	1 612	8	-	-	-	-	-		
984	spiratorische Krankheitszustände des Feten und Neugeborenen	Insges.	3 962	3 936	26	-	-	-	-	-		
985	773,774	Männl.	3 004	2 996	8	-	-	-	-	-		
986	Hämolytische Krankheiten des Feten	Weibl.	2 458	2 453	5	-	-	-	-	-		
987	und Neugeborenen	Insges.	5 462	5 449	13	-	-	-	-	-		
988	776	Männl.	148	148	-	-	-	-	-	-		
989	Hämatologische Krankheiten des	Weibl.	172	171	1	-	-	-	-	-		
990	Feten und Neugeborenen	Insges.	320	319	1	-	-	-	-	-		
991	REST 760-779	Männl.	2 356	2 193	163	-	-	-	-	-		
992	Alle sonstigen Zustände, die in der	Weibl.	1 612	1 582	30	-	-	-	-	-		
993	Perinatalperiode entstanden sind	Insges.	3 968	3 775	193	-	-	-	-	-		
Klasse XVI												
Symptome, unspezifische abnorme Befunde und ungenau bezeichnete Zustände (780 - 799)												
994	780	Männl.	3 299	278	1 133	271	203	102	115	129		
995	Allgemeine Symptome	Weibl.	2 887	222	912	270	165	109	93	82		
996		Insges.	6 186	500	2 045	541	368	211	208	211		
997	784	Männl.	1 536	6	41	150	142	44	70	57		
998	Symptome, die Kopf und Hals be-	Weibl.	1 490	8	20	121	122	63	71	65		
999	treffen	Insges.	3 026	14	61	271	264	107	141	122		
1000	787	Männl.	1 376	173	340	315	100	21	27	30		
1001	Symptome, die das Verdauungs-	Weibl.	1 523	150	315	279	107	46	46	38		
1002	system betreffen	Insges.	2 899	323	655	594	207	67	73	68		
1003	788	Männl.	544	4	25	55	20	18	19	26		
1004	Symptome, die das Harnsystem	Weibl.	560	3	22	55	29	22	23	24		
1005	betreffen	Insges.	1 104	7	47	110	49	40	42	50		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993
111	128	91	139	167	133	113	80	31	38	28	9	994
89	104	81	155	131	112	101	84	59	62	39	17	995
200	232	172	294	298	245	214	164	90	100	67	26	996
85	83	76	108	159	162	103	76	50	55	44	25	997
84	79	75	120	105	96	73	110	51	101	96	30	998
169	162	151	228	264	258	176	186	101	156	140	55	999
35	44	25	56	47	44	47	29	10	20	11	2	1000
50	46	37	67	54	46	45	52	32	54	38	21	1001
85	90	62	123	101	90	92	81	42	74	49	23	1002
39	32	27	44	47	48	36	38	18	23	16	9	1003
34	29	30	64	62	35	33	36	15	25	12	7	1004
73	61	57	108	109	83	69	74	33	48	28	16	1005

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1006	REST 780-789	Männl.	5 449	597	375	626	526	301	267	268
1007	Symptome sonstiger und nicht näher	Weibl.	6 396	510	338	648	656	428	383	295
1008	bezeichneter Organe	Insges.	11 845	1 107	713	1 274	1 182	729	650	563
1009	790-796	Männl.	681	37	93	81	37	55	32	32
1010	Unspezifische abnorme Befunde	Weibl.	767	29	99	100	52	37	51	58
1011		Insges.	1 448	66	192	181	89	92	83	90
1012	797-799	Männl.	273	29	9	8	4	1	8	3
1013	Ungenau bezeichnete und unbekannte	Weibl.	335	15	7	7	5	3	5	7
1014	Ursachen von Morbidität und Morta- lität	Insges.	608	44	16	15	9	4	13	10
Klasse XVII										
Verletzungen und Vergiftungen (800 - 999)										
1015	801	Männl.	1 345	3	27	77	25	138	159	131
1016	Schädelbasisfraktur	Weibl.	476	3	22	30	12	41	42	18
1017		Insges.	1 821	6	49	107	37	179	201	149
1018	802	Männl.	4 302	3	31	112	127	673	844	705
1019	Gesichtsknochenfraktur	Weibl.	1 262	3	36	83	70	110	121	149
1020		Insges.	5 564	6	67	195	197	783	965	854
1021	800,803,804	Männl.	2 241	204	240	172	85	156	189	173
1022	Sonstige Frakturen des Schädels	Weibl.	877	137	142	109	23	44	30	34
1023		Insges.	3 118	341	382	281	108	200	219	207
1024	805,806	Männl.	2 216	-	7	19	48	196	272	242
1025	Fraktur der Wirbelsäule	Weibl.	1 332	2	4	14	22	81	80	84
1026		Insges.	3 548	2	11	33	70	277	352	326
1027	807-809	Männl.	2 884	-	6	22	34	118	161	195
1028	Sonstige Frakturen von Hals und	Weibl.	1 828	2	4	12	15	71	60	62
1029	Rumpf	Insges.	4 712	2	10	34	49	189	221	257
1030	810,811	Männl.	1 157	6	19	25	46	253	178	127
1031	Klavikula- und Skapulafraktur	Weibl.	444	-	20	32	19	61	47	30
1032		Insges.	1 601	6	39	57	65	314	225	157

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
210	195	163	276	356	327	235	217	134	196	129	51	1006
285	290	224	348	316	253	280	303	205	327	200	107	1007
495	485	387	624	672	580	515	520	339	523	329	158	1008
27	33	20	36	56	48	36	23	18	11	4	2	1009
58	45	36	46	35	41	27	23	15	11	3	1	1010
85	78	56	82	91	89	63	46	33	22	7	3	1011
3	5	8	15	26	22	22	19	16	30	23	22	1012
5	8	9	12	14	22	18	17	32	47	56	46	1013
8	13	17	27	40	44	40	36	48	77	79	68	1014
153	118	77	110	101	101	52	21	13	17	19	3	1015
32	33	18	36	28	20	24	28	18	21	25	25	1016
185	151	95	146	129	121	76	49	31	38	44	28	1017
501	364	220	200	201	131	76	44	13	22	24	11	1018
98	108	55	74	74	40	36	47	31	60	46	21	1019
599	472	275	274	275	171	112	91	44	82	70	32	1020
164	149	74	156	158	105	70	43	26	40	21	16	1021
44	28	34	32	31	35	25	27	19	34	21	28	1022
208	177	108	188	189	140	95	70	45	74	42	44	1023
212	167	130	204	221	177	108	80	40	38	42	13	1024
82	63	43	87	141	123	109	105	76	98	73	45	1025
294	230	173	291	362	300	217	185	116	136	115	58	1026
179	215	179	310	372	284	217	173	101	172	93	53	1027
53	69	64	110	134	116	92	131	129	246	267	191	1028
232	284	243	420	506	400	309	304	230	418	360	244	1029
116	74	50	64	68	46	38	13	7	14	7	6	1030
17	19	15	29	16	31	12	18	18	17	25	18	1031
133	93	65	93	84	77	50	31	25	31	32	24	1032

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1033	812	Männl.	2 888	28	177	805	454	256	98	103
1034	Humerusfraktur	Weibl.	3 611	17	145	572	314	62	42	31
1035		Insges.	6 499	45	322	1 377	768	318	140	134
1036	813	Männl.	5 380	5	207	1 418	1 279	510	352	324
1037	Radius- und Ulnafraktur	Weibl.	5 584	3	147	968	607	158	104	80
1038		Insges.	10 964	8	354	2 386	1 886	668	456	404
1039	814-819	Männl.	1 957	2	30	73	116	308	326	291
1040	Sonstige Frakturen der oberen	Weibl.	436	1	18	48	42	41	49	20
1041	Extremitäten	Insges.	2 393	3	48	121	158	349	375	311
1042	820	Männl.	3 116	2	7	25	22	52	57	75
1043	Schenkelhalsfraktur	Weibl.	10 896	1	14	12	28	12	19	16
1044		Insges.	14 012	3	21	37	50	64	76	91
1045	821	Männl.	3 035	39	242	228	190	601	382	263
1046	Fraktur sonstiger und nicht näher	Weibl.	2 327	33	114	108	108	220	101	44
1047	bezeichneten Teile des Femurs	Insges.	5 362	72	356	336	298	821	483	307
1048	822	Männl.	1 296	-	3	7	56	181	127	107
1049	Patellafraktur	Weibl.	999	-	-	5	14	72	37	43
1050		Insges.	2 295	-	3	12	70	253	164	150
1051	823	Männl.	7 042	4	172	367	435	1 029	833	742
1052	Tibia- und Fibulafraktur	Weibl.	3 579	2	114	205	248	274	174	122
1053		Insges.	10 621	6	286	572	683	1 303	1 007	864
1054	824	Männl.	5 230	2	8	44	161	505	573	660
1055	Knöchelfraktur	Weibl.	5 596	2	11	33	162	222	238	274
1056		Insges.	10 826	4	19	77	323	727	811	934
1057	825-829	Männl.	2 238	-	16	50	70	237	263	256
1058	Sonstige Frakturen der unteren	Weibl.	840	2	11	32	52	67	56	49
1059	Extremitäten	Insges.	3 078	2	27	82	122	304	319	305
1060	831	Männl.	1 084	2	2	-	6	84	173	176
1061	Schultergelenkluxation, inkl. Skapula	Weibl.	496	-	1	1	4	20	28	18
1062		Insges.	1 580	2	3	1	10	104	201	194

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
89	99	80	98	129	113	86	65	41	70	56	41	1033
43	58	39	80	138	179	210	305	229	449	399	299	1034
132	157	119	178	267	292	296	370	270	519	455	340	1035
235	225	126	173	163	135	84	40	18	41	27	18	1036
92	110	105	206	305	399	445	516	274	495	353	217	1037
327	335	231	379	468	534	529	556	292	536	380	235	1038
196	134	71	146	118	61	43	20	6	7	8	1	1039
18	11	12	27	23	24	23	13	13	19	23	11	1040
214	145	83	173	141	85	66	33	19	26	31	12	1041
82	116	96	171	186	251	237	321	196	427	436	357	1042
23	30	37	98	200	350	602	1 053	1 013	2 353	2 641	2 394	1043
105	146	133	269	386	601	839	1 374	1 209	2 780	3 077	2 751	1044
153	122	64	164	137	100	84	75	34	53	57	47	1045
41	42	31	47	74	82	135	180	128	296	287	256	1046
194	164	95	211	211	182	219	255	162	349	344	303	1047
114	110	57	122	117	78	59	46	31	46	20	15	1048
28	43	29	46	71	85	113	111	86	116	63	37	1049
142	153	86	168	188	163	172	157	117	162	83	52	1050
673	597	400	567	488	292	189	98	45	67	30	14	1051
162	221	132	267	254	273	282	303	134	218	130	64	1052
835	818	532	834	742	565	471	401	179	285	160	78	1053
620	613	354	480	429	326	180	125	46	55	35	14	1054
351	350	316	551	679	611	564	544	222	269	129	68	1055
971	963	670	1 031	1 108	937	744	669	268	324	164	82	1056
267	221	140	204	212	151	73	40	9	14	12	3	1057
32	50	51	61	78	50	54	71	41	38	27	18	1058
299	271	191	265	290	201	127	111	50	52	39	21	1059
102	93	74	86	83	61	50	41	19	15	10	7	1060
25	18	8	23	25	25	36	52	43	76	59	34	1061
127	111	82	109	108	86	86	93	62	91	69	41	1062

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1063	836	Männl.	2 039	2	1	6	63	320	372	327
1064	Kniegelenkluxation	Weibl.	787	-	3	10	108	213	123	65
1065		Insges.	2 826	2	4	16	171	533	495	392
1066	830,832-835,837-	Männl.	1 051	-	22	100	101	116	128	135
1067	Sonstige Luxationen	Weibl.	584	2	17	57	72	33	21	40
1068		Insges.	1 635	2	39	157	173	149	149	175
1069	844,845	Männl.	7 788	4	26	121	322	1 347	1 393	1 317
1070	Verstauchung und Zerrung des Knies, Unterschenkels, Knöchels und Fußes	Weibl.	3 303	3	22	83	401	803	425	283
1071		Insges.	11 091	7	48	204	723	2 150	1 818	1 600
1072	840-843,846-848	Männl.	1 815	2	22	61	83	154	226	209
1073	Verstauchung und Zerrung sonstiger Gelenke und angrenzender Muskeln	Weibl.	747	4	17	35	52	70	43	37
1074		Insges.	2 562	6	39	96	135	224	269	246
1075	850	Männl.	20 378	294	1 801	3 092	1 718	2 295	2 126	1 741
1076	Gehirnerschütterung	Weibl.	12 086	220	1 462	1 811	794	1 087	718	656
1077		Insges.	32 464	514	3 263	4 903	2 512	3 382	2 844	2 397
1078	851-854	Männl.	1 742	23	50	97	56	175	156	168
1079	Sonstige intrakranielle Verletzung, exkl. mit Schädelfraktur	Weibl.	646	12	33	61	19	72	29	15
1080		Insges.	2 388	35	83	158	75	247	185	183
1081	860-869	Männl.	1 734	5	79	156	113	236	230	140
1082	Innere Verletzung des Thorax, Ab- domens und Beckens	Weibl.	521	3	47	67	33	50	38	38
1083		Insges.	2 255	8	126	223	146	286	268	178
1084	870,871	Männl.	1 275	2	66	126	110	113	164	150
1085	Offene Wunde der Augenanhangs- gebilde und des Augapfels	Weibl.	321	1	40	47	15	20	21	21
1086		Insges.	1 596	3	106	173	125	133	185	171
1087	872,873	Männl.	3 231	16	290	292	157	206	298	327
1088	Offene Wunde des Ohres und sonstige offene Wunden des Kopfes	Weibl.	1 433	6	170	120	72	82	77	83
1089		Insges.	4 664	22	460	412	229	288	375	410
1090	874-879	Männl.	780	2	33	92	56	72	87	102
1091	Offene Wunde des Halses und und Rumpfes	Weibl.	294	1	28	54	22	27	21	17
1092		Insges.	1 074	3	61	146	78	99	108	119

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
262	216	133	167	116	31	15	5	2	-	1	-	1063
47	46	40	49	43	30	2	2	2	2	2	-	1064
309	262	173	216	159	61	17	7	4	2	3	-	1065
116	68	51	66	57	32	28	13	5	8	4	1	1066
39	22	21	50	44	40	36	29	15	19	17	10	1067
155	90	72	116	101	72	64	42	20	27	21	11	1068
994	782	422	385	280	170	105	54	25	22	8	11	1069
220	195	118	193	170	127	62	59	30	49	34	26	1070
1 214	977	540	578	450	297	167	113	55	71	42	37	1071
168	166	109	182	167	122	65	33	15	12	16	3	1072
53	47	33	80	68	43	27	23	29	25	33	28	1073
221	213	142	262	235	165	92	56	44	37	49	31	1074
1 369	1 106	703	1 027	937	658	398	326	150	290	210	137	1075
527	500	371	599	519	377	323	372	299	558	534	359	1076
1 896	1 606	1 074	1 626	1 456	1 035	721	698	449	848	744	496	1077
158	104	100	150	137	134	74	60	33	39	20	8	1078
36	38	35	44	48	40	36	44	20	36	23	5	1079
194	142	135	194	185	174	110	104	53	75	43	13	1080
135	96	68	105	117	102	55	33	22	20	16	6	1081
32	29	17	28	25	22	18	21	8	12	21	12	1082
167	125	85	133	142	124	73	54	30	32	37	18	1083
123	88	55	73	71	50	37	18	10	9	4	6	1084
22	23	11	19	9	10	6	13	6	15	13	9	1085
145	111	66	92	80	60	43	31	16	24	17	15	1086
291	261	166	231	232	138	105	60	34	52	47	28	1087
63	63	53	75	73	45	35	67	45	107	97	100	1088
354	324	219	306	305	183	140	127	79	159	144	128	1089
64	61	47	43	45	25	11	9	9	14	6	2	1090
19	17	11	17	16	10	8	9	3	6	7	1	1091
83	78	58	60	61	35	19	18	12	20	13	3	1092

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1093	880-887	Männl.	4 597	10	114	201	189	507	662	620
1094	Offene Wunde der oberen Extremitäten	Weibl.	1 209	8	65	79	78	102	104	107
1095		Insges.	5 806	18	179	280	267	609	766	727
1096	890-897	Männl.	2 727	5	69	236	297	464	369	293
1097	Offene Wunde der unteren Extremitäten	Weibl.	1 494	4	49	128	87	193	91	67
1098		Insges.	4 221	9	118	364	384	657	460	360
1099	900-904	Männl.	207	1	3	13	12	25	18	17
1100	Verletzung der Blutgefäße	Weibl.	87	-	-	2	3	7	5	5
1101		Insges.	294	1	3	15	15	32	23	22
1102	905-909	Männl.	2 596	3	26	84	98	261	429	370
1103	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen, toxischen Wirkungen und sonstigen äußeren Ursachen	Weibl.	1 448	1	27	44	64	121	116	99
1104		Insges.	4 044	4	53	128	162	382	545	469
1105	910-919	Männl.	1 207	16	93	139	91	146	153	139
1106	Oberflächliche Verletzung	Weibl.	597	9	73	66	35	55	23	28
1107		Insges.	1 804	25	166	205	126	201	176	167
1108	921	Männl.	1 128	2	24	128	160	155	145	132
1109	Kontusion des Auges und der Augenanhangsgebilde	Weibl.	228	-	10	26	27	36	15	15
1110		Insges.	1 356	2	34	154	187	191	160	147
1111	920,922-924	Männl.	10 313	97	712	1 368	807	1 236	1 061	1 072
1112	Sonstige Kontusion ohne Hautverletzung	Weibl.	6 066	85	512	747	402	585	335	272
1113		Insges.	16 379	182	1 224	2 115	1 209	1 821	1 396	1 344
1114	925-929	Männl.	493	2	53	34	29	54	56	52
1115	Quetschwunde	Weibl.	227	2	34	15	9	30	13	18
1116		Insges.	720	4	87	49	38	84	69	70
1117	930-939	Männl.	1 293	43	220	186	102	61	68	66
1118	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers in eine Körperöffnung	Weibl.	1 034	34	191	110	40	37	30	45
1119		Insges.	2 327	77	411	296	142	98	98	111
1120	940	Männl.	491	2	10	18	19	53	61	62
1121	Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und die Augenanhangsgebilde	Weibl.	91	1	14	5	4	11	7	10
1122		Insges.	582	3	24	23	23	64	68	72

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
489	422	218	315	292	236	147	68	28	45	22	12	1093
99	112	59	101	78	53	40	39	14	29	19	23	1094
588	534	277	416	370	289	187	107	42	74	41	35	1095
211	183	86	114	123	91	69	53	19	24	14	7	1096
75	61	42	62	88	67	81	111	63	105	86	34	1097
286	244	128	176	211	158	150	164	82	129	100	41	1098
16	14	15	14	16	14	10	3	1	9	4	2	1099
4	5	5	4	9	5	3	2	10	6	7	5	1100
20	19	20	18	25	19	13	5	11	15	11	7	1101
286	224	145	231	188	108	72	31	15	16	6	3	1102
100	113	68	121	131	91	88	96	52	67	26	23	1103
386	337	213	352	319	199	160	127	67	83	32	26	1104
69	77	43	45	68	41	19	17	13	7	11	20	1105
35	32	18	22	30	27	26	30	12	38	17	21	1106
104	109	61	67	98	68	45	47	25	45	28	41	1107
83	72	46	47	44	36	20	19	6	4	4	1	1108
17	11	13	10	7	8	5	8	2	10	6	2	1109
100	83	59	57	51	44	25	27	8	14	10	3	1110
741	613	349	526	526	362	220	165	80	169	119	90	1111
258	255	148	239	243	228	203	209	189	410	402	344	1112
999	868	497	765	769	590	423	374	269	579	521	434	1113
55	30	32	31	22	17	13	4	4	2	2	1	1114
12	9	11	15	9	13	4	4	7	12	7	3	1115
67	39	43	46	31	30	17	8	11	14	9	4	1116
64	71	51	60	88	49	49	41	21	28	15	10	1117
33	44	32	54	82	40	52	64	39	60	33	14	1118
97	115	83	114	170	89	101	105	60	88	48	24	1119
48	57	28	35	37	20	20	8	6	2	5	-	1120
12	2	3	1	5	5	3	2	2	2	1	1	1121
60	59	31	36	42	25	23	10	8	4	6	1	1122

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1123	941-949	Männl.	3 194	162	929	283	146	209	229	252
1124	Verbrennungen oder Verätzungen	Weibl.	1 728	104	598	149	57	100	83	60
1125	sonstiger Körperteile oder Organe	Insges.	4 922	266	1 527	432	203	309	312	312
1126	950-957	Männl.	372	1	9	11	7	48	65	51
1127	Verletzung der Nerven und des	Weibl.	243	1	5	5	10	20	23	26
1128	Rückenmarks	Insges.	615	2	14	16	17	68	88	77
1129	958,959	Männl.	519	6	29	34	40	48	46	52
1130	Bestimmte traumatische Komplika-	Weibl.	268	4	19	27	14	16	20	11
1131	tionen und nicht näher bezeichne- te Verletzungen	Insges.	787	10	48	61	54	64	66	63
1132	965	Männl.	255	7	43	7	3	36	38	41
1133	Vergiftung durch Analgetika, Anti-	Weibl.	332	6	33	4	12	58	35	38
1134	pyretika und Antirheumatika	Insges.	587	13	76	11	15	94	73	79
1135	967 (EXKL.967.0)	Männl.	490	2	44	8	2	31	45	56
1136	Vergiftung durch Sedativa und Hyp-	Weibl.	1 183	2	32	9	8	63	72	105
1137	notika	Insges.	1 673	4	76	17	10	94	117	161
1138	967.0	Männl.	181	2	14	3	-	7	14	16
1139	Vergiftung durch Baborate	Weibl.	384	1	10	3	2	25	31	36
1140		Insges.	565	3	24	6	2	32	45	52
1141	969	Männl.	832	-	102	24	8	33	78	93
1142	Vergiftung durch Psychopharmaka	Weibl.	1 597	1	63	15	16	91	124	144
1143		Insges.	2 429	1	165	39	24	124	202	237
1144	960-964,966,968,	Männl.	1 669	37	685	82	17	66	128	113
1145	Vergiftung durch sonstige Drogen,	Weibl.	1 893	22	550	78	30	146	94	104
1146	Arzneimittel und biologisch aktive Stoffe	Insges.	3 562	59	1 235	160	47	212	222	217
1147	980	Männl.	433	-	17	7	19	53	50	62
1148	Toxische Wirkung von Alkohol	Weibl.	175	-	7	2	10	16	19	19
1149		Insges.	608	-	24	9	29	69	69	81
1150	986	Männl.	403	7	14	8	12	24	41	55
1151	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	Weibl.	453	7	12	10	8	19	31	26
1152		Insges.	856	14	26	18	20	43	72	81

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
217	176	86	144	144	84	43	22	16	21	22	9	1123
73	82	47	54	55	34	34	35	31	59	39	34	1124
290	258	133	198	199	118	77	57	47	80	61	43	1125
44	20	13	27	33	16	10	4	6	4	3	-	1126
24	22	16	21	12	14	5	17	4	7	8	3	1127
68	42	29	48	45	30	15	21	10	11	11	3	1128
46	42	20	35	30	27	17	19	5	12	7	4	1129
10	13	13	20	18	13	10	12	15	14	13	6	1130
56	55	33	55	48	40	27	31	20	26	20	10	1131
25	17	11	11	7	2	2	2	1	1	1	-	1132
44	23	22	19	8	8	9	3	1	1	7	1	1133
69	40	33	30	15	10	11	5	2	2	8	1	1134
54	46	49	63	27	25	12	3	4	7	9	3	1135
126	135	116	128	76	63	52	55	34	66	25	16	1136
180	181	165	191	103	88	64	58	38	73	34	19	1137
23	16	14	14	25	12	3	10	2	3	3	-	1138
30	44	36	36	37	23	19	13	12	10	11	5	1139
53	60	50	50	62	35	22	23	14	13	14	5	1140
114	102	55	63	52	40	22	14	7	9	13	3	1141
186	181	122	210	118	94	69	58	34	43	20	8	1142
300	283	177	273	170	134	91	72	41	52	33	11	1143
111	93	53	57	56	40	27	24	23	31	19	7	1144
105	127	72	114	82	57	43	48	54	78	62	27	1145
216	220	125	171	138	97	70	72	77	109	81	34	1146
53	47	30	30	26	18	6	7	5	1	1	1	1147
20	10	14	16	12	12	2	7	2	2	4	1	1148
73	57	44	46	38	30	8	14	7	3	5	2	1149
42	33	19	27	25	21	7	9	6	16	23	14	1150
27	18	25	24	17	17	7	21	19	61	58	46	1151
69	51	44	51	42	38	14	30	25	77	81	60	1152

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1163	981-985,987-989	Männl.	1 672	34	595	176	68	72	85	117
1164	Toxische Wirkung von sonstigen	Weibl.	1 071	31	397	136	52	57	44	40
1165	vorwiegend medizinisch nichtge- bräuchlichen Substanzen	Insges.	2 743	65	992	312	120	129	129	157
1166	990-995	Männl.	3 042	68	306	223	126	189	322	343
1167	Sonstige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	3 204	37	192	124	81	132	221	211
1168	Folgen äußerer Ursachen	Insges.	6 246	105	498	347	207	321	543	554
1169	996-999	Männl.	2 984	28	67	86	81	83	154	183
1180	Nicht anderenorts klassifizierte	Weibl.	3 061	27	47	76	50	74	143	154
1181	Komplikationen bei der chirurgischen und medizinischen Behandlung	Insges.	6 045	55	114	162	131	157	297	337
V-Klassifikation										
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (V01 - V82)										
1182	V01-V07	Männl.	1 090	57	101	236	199	71	64	67
1183	Potentielle Gesundheitsgefährdung	Weibl.	880	38	59	151	139	106	81	61
1184	hinsichtlich übertragbarer Krankheiten	Insges.	1 970	95	160	387	338	177	145	128
1185	V22,V23,V28	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
1186	Schwangerenbetreuung und -beo- achtung	Weibl.	2 710	-	-	-	3	343	1 004	732
1187		Insges.	2 711	-	-	-	3	343	1 004	732
1188	REST V10-V49	Männl.	2 584	845	347	189	195	47	54	85
1189	Sonstige potentielle Gesundheitsge- fährdungen sowie Gesundheitsbe- einträchtigungen	Weibl.	7 865	826	360	256	210	121	649	1 188
1170		Insges.	10 449	1 671	707	445	405	168	703	1 273
1171	V56	Männl.	11	-	-	-	-	-	-	2
1172	Nachbehandlung durch intermittie- rende Dialyse	Weibl.	10	-	-	-	-	1	-	2
1173		Insges.	21	-	-	-	-	1	-	4
1174	V50-V55,V57-V59	Männl.	7 362	41	73	216	218	506	684	609
1175	Nachsorge, Prothetik, plastische	Weibl.	8 234	34	61	136	163	224	251	255
1176	Chirurgie sowie Spender	Insges.	15 596	75	134	352	381	730	935	864
1177	V60-V68	Männl.	5 319	1 054	933	360	190	124	112	128
1178	Sonstige Inanspruchnahmes des Ge- sundheitswesens	Weibl.	7 767	1 068	770	366	118	119	554	689
1179		Insges.	13 086	2 122	1 703	726	308	243	666	817

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
88	90	55	86	73	44	26	20	16	14	11	2	1153
43	37	38	54	38	21	18	24	4	15	11	11	1154
131	127	93	140	111	65	44	44	20	29	22	13	1155
214	293	156	244	208	121	72	86	14	30	17	10	1156
292	372	283	432	305	177	140	91	39	36	24	15	1157
506	665	439	676	513	298	212	177	53	66	41	25	1158
134	180	131	250	339	352	282	262	123	139	88	22	1159
162	212	154	256	314	250	272	322	175	232	112	29	1160
296	392	285	506	653	602	554	584	298	371	200	51	1161
54	39	36	39	42	41	22	11	4	5	1	1	1162
38	40	27	30	30	20	14	8	12	17	8	1	1163
92	79	63	69	72	61	36	19	16	22	9	2	1164
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1165
291	278	44	7	3	-	-	3	1	1	-	-	1166
291	278	44	7	3	-	1	3	1	1	-	-	1167
67	90	69	129	125	125	72	68	23	30	20	4	1168
1 302	1 550	648	283	160	73	53	53	43	42	33	15	1169
1 369	1 640	717	412	285	198	125	121	66	72	53	19	1170
1	2	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	1171
1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1172
2	3	-	3	2	2	3	-	1	-	-	-	1173
507	565	324	603	602	649	541	429	243	349	146	57	1174
382	435	459	935	1 028	834	826	962	411	475	271	92	1175
889	1 000	783	1 538	1 630	1 483	1 367	1 391	654	824	417	149	1176
140	181	159	275	334	379	285	128	78	159	147	153	1177
419	296	175	277	375	293	174	245	174	433	588	634	1178
559	477	334	552	709	672	459	373	252	592	735	787	1179

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1180	V70-V72	Männl.	10 131	1 070	1 533	951	675	276	326	449
1181	Allgemeine und spezielle ärztliche	Weibl.	9 632	829	1 349	934	701	376	490	513
1182	Untersuchungen und Beobachtungen ohne angegebene Diagnose	Insges.	19 763	1 899	2 882	1 885	1 376	652	816	962
1183	V73,V74,V75	Männl.	43	4	4	1	3	3	9	7
1184	Spezielles Screening auf näher be-	Weibl.	69	7	6	4	2	14	15	7
1185	zeichnete übertragbare Krankheiten	Insges.	112	11	10	5	5	17	24	14
1186	V76	Männl.	28	3	-	2	-	-	1	1
1187	Spezielles Screening auf bösartige	Weibl.	116	2	-	2	1	-	1	14
1188	Neubildungen	Insges.	144	5	-	4	1	-	2	15
1189	V77	Männl.	269	26	80	41	32	25	19	16
1190	Spezielles Screening auf endokrine,	Weibl.	296	26	69	45	35	13	28	19
1191	Ernährungs- und Stoffwechselkrank- heiten sowie Immunitätsstörungen	Insges.	565	52	149	86	67	38	47	35
1192	V80	Männl.	92	14	18	16	15	3	1	3
1193	Spezielles Screening auf neurologi-	Weibl.	93	12	15	11	9	5	6	6
1194	sche, Augen- und Ohrenkrankheiten	Insges.	185	26	33	27	24	8	7	9
1195	V81	Männl.	242	24	33	56	32	6	11	19
1196	Spezielles Screening auf kardio-	Weibl.	353	24	95	104	43	6	7	5
1197	vasculäre, respiratorische und Uroge- nitalkrankheiten	Insges.	595	48	128	160	75	12	18	24
1198	V78,V79,V82	Männl.	126	16	39	26	11	1	1	2
1199	Sonstiges spezielles Screening	Weibl.	128	14	32	23	23	2	3	7
1200		Insges.	254	30	71	49	34	3	4	9

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
533	589	443	673	735	728	564	278	109	135	48	16	1180
518	557	400	620	665	475	366	363	189	191	68	28	1181
1 051	1 146	843	1 293	1 400	1 203	930	641	298	326	116	44	1182
3	1	1	3	3	-	-	-	-	1	-	-	1183
3	1	1	1	2	2	3	-	-	-	1	-	1184
6	2	2	4	5	2	3	-	-	1	1	-	1185
1	2	2	4	2	3	3	1	2	1	-	-	1186
13	10	11	12	19	8	6	3	5	6	3	-	1187
14	12	13	16	21	11	9	4	7	7	3	-	1188
7	5	2	3	6	4	1	1	-	1	-	-	1189
11	10	6	9	10	6	3	1	2	2	1	-	1190
18	15	8	12	16	10	4	2	2	3	1	-	1191
3	3	3	2	1	3	4	3	-	-	-	-	1192
6	6	2	4	4	3	-	2	1	-	1	-	1193
9	9	5	6	5	6	4	5	1	-	1	-	1194
13	5	7	6	7	6	9	3	4	1	-	-	1195
6	5	7	7	9	5	11	6	2	9	2	-	1196
19	10	14	13	16	11	20	9	6	10	2	-	1197
2	5	2	2	7	8	2	-	-	-	2	-	1198
4	4	1	2	2	5	3	1	-	2	-	-	1199
6	9	3	4	9	13	5	1	-	2	2	-	1200

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge absolut 1989 nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
Klasse I										
Infektiöse und Parasitäre Krankheiten (001-139)										
1	003,005	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	1
2	Salmonelleninfektionen und	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	1
3	sonstige bakterielle Lebens- mittelvergiftungen	Insges.	7	-	-	-	-	-	-	2
4	001, 006-009	Männl.	3	-	2	-	-	-	-	-
5	Alle sonstige Darminfektionen	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
6		Insges.	8	-	2	-	-	-	-	-
7	011	Männl.	47	-	-	-	-	-	-	-
8	Lungentuberkulose	Weibl.	23	-	-	-	-	-	-	-
9		Insges.	70	-	-	-	-	-	-	-
10	010, 012	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
11	Sonstige Tuberkulose der Atmungs- organe	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
12		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-
13	013	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
14	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
16	015	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
17	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
18		Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
19	014, 017	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
20	Tuberkulose sonstiger Organe	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
21		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
22	018	Männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
23	Miliartuberkulose	Weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-
24		Insges.	14	-	-	-	-	-	-	-
25	034	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Streptokokkenangina und Scharlach	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
27		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5
-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	6
-	2	2	2	-	6	4	2	3	13	11	2	7
-	-	1	-	-	1	1	4	1	5	7	3	8
-	2	3	2	-	7	5	6	4	18	18	5	9
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	12
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	17
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	18
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	21
1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	22
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	23
1	-	1	1	-	-	-	2	2	2	2	3	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	27

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
28	035	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
29	Erysipel	Weibl.	8	-	-	-	-	-	-	-		
30		Insges.	12	-	-	-	-	-	-	-		
31	036	Männl.	12	3	4	2	-	1	-	-		
32	Meningokokkeninfektion	Weibl.	11	2	7	-	1	-	-	-		
33		Insges.	23	5	11	2	1	1	-	-		
34	037	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
35	Tetanus	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
36		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
37	038	Männl.	133	5	-	-	-	-	4	5		
38	Sepsis	Weibl.	138	7	2	-	1	4	3	-		
39		Insges.	271	12	2	-	1	4	7	5		
40	REST 020-041	Männl.	11	1	-	-	-	-	-	-		
41	Sonstige bakterielle Krankheiten	Weibl.	8	1	-	-	-	-	-	-		
42		Insges.	19	2	-	-	-	-	-	-		
43	047	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
44	Meningitis durch Enteroviren	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
45		Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-		
46	053	Männl.	2	-	-	-	1	-	-	-		
47	Zoster	Weibl.	8	-	-	-	-	-	-	-		
48		Insges.	10	-	-	-	1	-	-	-		
49	055	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	Masern	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
51		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-		
52	056	Männl.	2	-	-	-	-	1	-	-		
53	Röteln	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
54		Insges.	3	-	-	-	-	1	-	-		
55	070	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
56	Virushepatitis	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
57		Insges.	8	-	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	28
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	29
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	3	30
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
4	8	6	9	18	22	17	11	10	7	5	2	37
3	3	3	5	13	10	15	20	12	18	17	2	38
7	11	9	14	31	32	32	31	22	25	22	4	39
-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	-	-	40
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	41
-	-	1	-	-	2	2	3	3	3	3	-	42
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	44
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	1	47
-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	1	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	50
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	51
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	55
-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	56
-	1	-	1	-	4	-	1	1	-	-	-	57

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
58	REST 045-088	Männl.	20	3	3	1	-	1	-	-
59	Sonstige Viruskrankheiten und	Weibl.	14	1	1	1	1	-	1	3
60	sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	Insges.	34	4	4	2	1	1	1	3
61	090-097	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-
62	Syphilis	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
63		Insges.	6	-	-	-	-	-	-	-
64	098	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
65	Gonokokkeninfektionen	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
66		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
67	100-104	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
68	Sonstige Spirochätenkrankheiten	Weibl.	1	-	-	-	-	1	-	-
69		Insges.	4	-	-	-	-	1	-	-
70	110	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
71	Dermatophytie	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
72		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
73	112	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-
74	Candidosis	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
75		Insges.	9	-	-	-	-	-	-	-
76	111,114-118	Männl.	6	-	-	-	1	-	-	-
77	Sonstige Mykosen	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
78		Insges.	9	-	-	-	1	-	-	-
79	122,123	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Echinokokkose und sonstige	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
81	Zestodeninfektionen	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
82	120,121,124-129	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
83	Sonstige Helminthosen	Weibl.	7	-	-	-	-	-	-	-
84		Insges.	9	-	-	-	-	-	-	-
85	130	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Toxoplasmose	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
87		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2	1	-	1	1	1	2	-	1	-	3	-	58
-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	59
2	2	-	3	2	2	3	-	1	-	3	-	60
-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	61
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	62
-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	63
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	69
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	72
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	73
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	74
-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	-	75
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	76
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	77
-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	1	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	82
-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	2	-	83
-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	2	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
88	135	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
89	Sarkoidose	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
90		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-		
91	137	Männl.	8	-	-	-	-	-	-	-		
92	Spätfolgen der Tuberkulose	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
93		Insges.	9	-	-	-	-	-	-	-		
94	138	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	1		
95	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
96		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	1		
97	131-134,136,139	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
98	Sonstige infektiöse und parasitäre	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-		
99	Krankheiten und deren Spätfolgen	Insges.	7	-	-	-	-	-	-	-		
	Klasse II											
	Neubildungen (140 - 239)											
100	140-149	Männl.	199	-	-	-	-	-	-	-		
101	Bösartige Neubildungen der Lippe,	Weibl.	55	-	-	-	-	-	-	1		
102	der Mundhöhle und des Pharynx	Insges.	254	-	-	-	-	-	-	1		
103	150	Männl.	184	-	-	-	-	-	-	-		
104	Bösartige Neubildungen des Öso-	Weibl.	64	-	-	-	-	-	-	-		
105	phagus	Insges.	248	-	-	-	-	-	-	-		
106	151	Männl.	689	1	-	-	-	-	1	1		
107	Bösartige Neubildungen des Magens	Weibl.	717	-	-	-	-	-	2	3		
108		Insges.	1406	1	-	-	-	-	3	4		
109	152,153	Männl.	397	-	-	-	-	1	2	1		
110	Bösartige Neubildungen des Dünn-	Weibl.	669	-	-	-	-	-	-	1		
111	darms, inkl. Duodenum und des Kolons, exkl. Rektum	Insges.	1066	-	-	-	-	1	2	2		
112	154	Männl.	415	-	-	-	-	-	-	-		
113	Bösartige Neubildungen des Rek-	Weibl.	545	-	-	-	-	-	-	2		
114	tums, des Rektum-Sigma-Übergangs und des Anus	Insges.	960	-	-	-	-	-	-	2		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	89
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	98
-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1	-	-	99
1	2	7	32	46	30	21	29	7	14	7	3	-	100
2	1	-	2	6	8	6	4	4	12	5	4	-	101
3	3	7	34	52	38	27	33	11	26	12	7	-	102
-	2	3	16	30	38	19	21	11	27	13	4	-	103
1	-	-	1	4	5	2	10	7	14	10	10	-	104
1	2	3	17	34	43	21	31	18	41	23	14	-	105
6	10	9	25	56	64	100	105	70	131	74	36	-	106
4	6	7	24	28	40	56	97	94	171	124	61	-	107
10	16	16	49	84	104	156	202	164	302	198	97	-	108
2	6	10	18	43	45	46	53	37	68	45	20	-	109
-	5	7	10	20	31	60	103	88	150	133	61	-	110
2	11	17	28	63	76	106	156	125	218	178	81	-	111
-	3	14	15	38	37	53	48	38	80	66	23	-	112
1	6	6	9	18	27	45	78	80	119	94	60	-	113
1	9	20	24	56	64	98	126	118	199	160	83	-	114

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
115	156	Männl.	140	-	-	-	-	-	-	-
116	Bösartige Neubildungen der Gallen-	Weibl.	483	-	-	-	-	-	-	-
117	blase und der extrahepatischen Gallengänge	Insges.	623	-	-	-	-	-	-	-
118	157	Männl.	332	-	-	-	-	1	-	-
119	Bösartige Neubildungen des	Weibl.	376	-	-	-	-	-	-	2
120	Pankreas	Insges.	708	-	-	-	-	1	-	2
121	155,158,159	Männl.	208	1	1	-	1	-	1	1
122	Sonstige bösartige Neubildungen der	Weibl.	271	1	1	-	-	2	1	-
123	Verdauungsorgane und des Peri- toneums	Insges.	479	2	2	-	1	2	2	1
124	161	Männl.	105	-	-	1	-	-	-	1
125	Bösartige Neubildungen des Larynx	Weibl.	19	-	-	-	-	-	-	-
126		Insges.	124	-	-	1	-	-	-	1
127	162	Männl.	2081	-	-	-	-	-	1	3
128	Bösartige Neubildungen der Trachea,	Weibl.	505	-	-	-	-	-	-	2
129	des Bronchus und der Lunge	Insges.	2586	-	-	-	-	-	1	5
130	160,163-165	Männl.	89	-	-	-	-	-	1	1
131	Sonstige bösartige Neubildungen der	Weibl.	60	-	-	-	-	-	4	4
132	Atmungs- und der intrathorakalen Organe	Insges.	149	-	-	-	-	-	5	5
133	170	Männl.	44	-	-	1	1	4	2	-
134	Bösartige Neubildungen des	Weibl.	25	-	-	-	-	2	1	-
135	Knochens und des Gelenkknorpels	Insges.	69	-	-	1	1	6	3	-
136	171	Männl.	53	1	1	2	2	2	1	6
137	Bösartige Neubildungen des Binde-	Weibl.	37	-	2	3	-	3	-	1
138	gewebes und sonstiger Weichteilge- webe	Insges.	90	1	3	5	2	5	1	7
139	172	Männl.	58	-	-	-	-	-	-	2
140	Bösartiges Melanom der Haut	Weibl.	61	-	-	-	-	-	1	1
141		Insges.	119	-	-	-	-	-	1	3
142	173	Männl.	20	-	-	-	-	-	-	-
143	Sonstige bösartige Neubildungen	Weibl.	34	-	-	-	-	-	-	-
144	der Haut	Insges.	54	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
1	1	2	5	7	9	17	21	13	30	26	8		115
1	1	4	5	20	25	57	70	62	111	94	33		116
2	2	6	10	27	34	74	91	75	141	120	41		117
1	2	4	22	35	39	47	53	31	58	26	13		118
1	-	2	16	19	22	32	61	50	84	59	28		119
2	2	6	38	54	61	79	114	81	142	85	41		120
5	4	1	10	23	32	28	24	21	27	19	9		121
1	1	2	8	16	18	34	40	32	56	42	16		122
6	5	3	18	39	50	62	64	53	83	61	25		123
-	1	1	10	25	11	12	15	9	16	2	1		124
1	1	-	-	1	3	4	1	2	3	1	2		125
1	2	1	10	26	14	16	16	11	19	3	3		126
5	12	23	123	230	324	353	332	205	285	143	42		127
2	7	3	25	28	39	69	95	82	85	53	15		128
7	19	26	148	258	363	422	427	287	370	196	57		129
1	3	2	5	2	11	14	12	8	15	13	1		130
-	-	3	2	5	2	7	8	7	12	3	3		131
1	3	5	7	7	13	21	20	15	27	16	4		132
1	1	1	4	5	10	2	3	3	5	-	1		133
-	1	-	1	-	3	2	5	2	4	2	2		134
1	2	1	5	5	13	4	8	5	9	2	3		135
2	3	2	4	5	3	4	4	2	3	2	4		136
1	-	1	2	1	4	3	5	4	6	1	-		137
3	3	3	6	6	7	7	9	6	9	3	4		138
-	3	7	6	8	6	9	5	3	3	6	-		139
3	5	1	4	4	5	6	14	3	9	5	-		140
3	8	8	10	12	11	15	19	6	12	11	-		141
-	-	-	1	1	1	-	1	6	2	5	3		142
-	-	-	-	1	-	3	6	1	6	9	8		143
-	-	-	1	2	1	3	7	7	8	14	11		144

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
145	174,175	Männl.	5	-	-	-	-	-	-	-		
146	Bösartige Neubildungen der Brust-	Weibl.	1196	-	-	-	-	-	1	6		
147	drüse	Insges.	1201	-	-	-	-	-	1	6		
148	180	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
149	Bösartige Neubildungen der Cervix	Weibl.	378	-	-	-	-	-	-	8		
150	uteri	Insges.	378	-	-	-	-	-	-	8		
151	179,182	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
152	Bösartige Neubildungen des Corpus	Weibl.	271	-	-	-	-	-	-	-		
153	uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	Insges.	271	-	-	-	-	-	-	-		
154	183	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
155	Bösartige Neubildungen der Ovarien	Weibl.	587	-	-	-	-	1	1	1		
156	und sonstiger uteriner Adnexe	Insges.	587	-	-	-	-	1	1	1		
157	181,184	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
158	Bösartige Neubildungen der Plazenta	Weibl.	134	-	-	-	-	-	-	-		
159	und sonstiger nicht näher bezeichne- ter weiblicher Genitalorgane	Insges.	134	-	-	-	-	-	-	-		
160	185	Männl.	392	-	-	-	-	-	-	-		
161	Bösartige Neubildungen der Prostata	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
162		Insges.	392	-	-	-	-	-	-	-		
163	186,187	Männl.	102	-	-	-	-	5	10	16		
164	Bösartige Neubildungen des Hodens,	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
165	des Penis und sonstiger männlicher Genitalorgane	Insges.	102	-	-	-	-	5	10	16		
166	188	Männl.	321	-	1	1	-	-	-	-		
167	Bösartige Neubildungen der Harn-	Weibl.	129	-	-	-	-	-	-	-		
168	blase	Insges.	450	-	1	1	-	-	-	-		
169	189	Männl.	276	-	-	-	-	-	2	1		
170	Bösartige Neubildungen der Niere	Weibl.	200	-	-	1	-	-	1	1		
171	sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	Insges.	476	-	-	1	-	-	3	2		
172	190	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-		
173	Bösartige Neubildungen des Auges	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-		
174		Insges.	13	-	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	145
12	29	39	99	152	140	154	165	88	169	93	49	146
13	30	39	99	152	140	155	165	89	170	93	49	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
31	24	19	47	32	27	34	47	31	40	28	10	149
31	24	19	47	32	27	34	47	31	40	28	10	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
-	-	-	4	13	19	36	59	33	52	41	14	152
-	-	-	4	13	19	36	59	33	52	41	14	153
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
5	4	12	41	68	62	75	98	60	89	49	21	155
5	4	12	41	68	62	75	98	60	89	49	21	156
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
1	-	1	5	6	6	10	16	18	39	21	11	158
1	-	1	5	6	6	10	16	18	39	21	11	159
-	-	1	3	13	21	36	46	53	97	78	44	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
-	-	1	3	13	21	36	46	53	97	78	44	162
15	13	4	4	7	4	3	2	1	6	6	6	163
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
15	13	4	4	7	4	3	2	1	6	6	6	165
2	-	-	8	8	25	39	55	50	65	43	24	166
-	1	-	1	6	6	12	16	14	37	25	11	167
2	1	-	9	14	31	51	71	64	102	68	35	168
1	4	4	20	44	54	44	28	22	30	17	5	169
2	-	2	5	18	26	27	38	18	43	9	9	170
3	4	6	25	62	80	71	66	40	73	26	14	171
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	172
-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	1	-	173
-	-	-	-	1	2	1	3	1	4	1	-	174

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
175	191,192	Männl.	192	1	3	8	4	3	2	5
176	Bösartige Neubildungen des Gehirns	Weibl.	187	1	2	3	3	3	3	6
177	und sonstiger Teile des Nervensystems	Insges.	379	2	5	11	7	6	5	11
178	193,194	Männl.	34	-	-	1	-	1	-	-
179	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse	Weibl.	78	1	1	1	-	-	-	1
180	und sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	Insges.	112	1	1	2	-	1	-	1
181	195-199	Männl.	325	-	-	-	-	-	-	5
182	Sekundäre bösartige Neubildungen,	Weibl.	481	1	-	-	-	-	3	-
183	wie sonstige bösartige Neubildungen und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	Insges.	806	1	-	-	-	-	3	5
184	201	Männl.	85	-	-	-	-	3	9	9
185	Hodgkin' Krankheit	Weibl.	42	-	-	-	1	3	1	2
186		Insges.	127	-	-	-	1	6	10	11
187	200,202	Männl.	170	-	3	3	2	3	3	7
188	Lymphosarkom u. Retikulosarkom,	Weibl.	161	2	-	-	1	1	1	5
189	sowie sonstige bösartige Neubildungen des lymphoiden und histiozytären Gewebes	Insges.	331	2	3	3	3	4	4	12
190	203	Männl.	92	-	-	-	-	-	-	-
191	Multiples Myelom und immunoproliferative Neubildungen	Weibl.	117	-	-	-	-	1	-	1
192		Insges.	209	-	-	-	-	1	-	1
193	204	Männl.	101	-	3	5	1	6	7	2
194	Lymphatische Leukämie	Weibl.	93	-	1	4	2	3	3	-
195		Insges.	194	-	4	9	3	9	10	2
196	205	Männl.	149	-	1	-	-	2	8	8
197	Myeloische Leukämie	Weibl.	183	1	5	-	-	1	5	2
198		Insges.	332	1	6	-	-	3	13	10
199	206-208	Männl.	36	1	1	-	-	-	-	-
200	Sonstige Formen der Leukämie	Weibl.	49	1	-	-	-	-	-	-
201		Insges.	85	2	1	-	-	-	-	-

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
6	11	10	24	26	32	27	22	1	6	1	-		175
5	13	6	14	24	20	37	27	13	6	1	-		176
11	24	16	38	50	52	64	49	14	12	2	-		177
-	2	1	1	3	3	4	7	6	1	4	-		178
-	-	-	1	5	5	9	16	14	13	6	5		179
-	2	1	2	8	8	13	23	20	14	10	5		180
7	3	13	29	38	31	39	54	27	43	26	10		181
3	8	13	23	38	34	53	75	54	80	57	39		182
10	11	26	52	76	65	92	129	81	123	83	49		183
4	8	4	4	7	9	7	10	5	4	2	-		184
2	1	1	4	3	5	2	4	5	5	2	1		185
6	9	5	8	10	14	9	14	10	9	4	1		186
4	4	6	12	11	23	23	18	13	24	10	1		187
4	2	-	11	2	10	23	21	22	31	20	5		188
8	6	6	23	13	33	46	39	35	55	30	6		189
-	2	-	4	9	6	16	11	14	22	5	3		190
-	-	1	5	7	7	16	28	11	21	12	7		191
-	2	1	9	16	13	32	39	25	43	17	10		192
-	1	1	6	7	6	6	14	12	14	8	2		193
1	5	-	7	1	3	8	18	5	15	9	8		194
1	6	1	13	8	9	14	32	17	29	17	10		195
7	3	7	9	14	13	16	22	10	16	6	7		196
5	6	8	9	21	19	23	20	20	28	8	2		197
12	9	15	18	35	32	39	42	30	44	14	9		198
2	-	1	-	3	3	2	4	4	4	8	3		199
1	-	1	1	1	4	5	6	8	12	8	1		200
3	-	2	1	4	7	7	10	12	16	16	4		201

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
202	210,211	Männl.	8	-	-	-	-	-	-	-
203	Gutartige Neubildungen der Lippe,	Weibl.	11	-	-	-	-	-	-	-
204	Mundhöhle und des Pharynx und sonstiger Teile des Verdauungs- systems	Insges.	19	-	-	-	-	-	-	-
205	213	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
206	Gutartige Neubildungen des Kno-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
207	chens und des Gelenkknorpels	Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
208	214	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
209	Lipom	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
210		Insges.	7	-	-	-	-	-	-	-
211	216	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
212	Gutartige Neubildungen der Haut	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
213		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-
214	217	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Gutartige Neubildungen der Brustdrüse	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
216		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
217	218	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Leiomyom des Uterus	Weibl.	17	-	-	-	-	-	-	-
219		Insges.	17	-	-	-	-	-	-	-
220	219	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Sonstige gutartige Neubildungen des	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
222	Uterus	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
223	220	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Gutartige Neubildungen des Ovars	Weibl.	14	-	-	-	-	-	-	-
225		Insges.	14	-	-	-	-	-	-	-
226	223	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
227	Gutartige Neubildungen der Niere und	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
228	sonstiger Harnorgane	Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	-	1		202
-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	3			203
-	-	-	-	1	1	3	3	-	5	3	3		204
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		205
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		206
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		207
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		208
-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1		209
-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1		210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		211
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1		212
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1		213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		214
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		215
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		216
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		217
-	1	2	7	5	-	-	1	-	-	1	-		218
-	1	2	7	5	-	-	1	-	-	1	-		219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		220
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		221
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		222
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		223
-	1	1	-	-	-	2	3	-	4	2	1		224
-	1	1	-	-	-	2	3	-	4	2	1		225
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1		226
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		227
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1		228

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
229	225	Männl.	22	-	1	2	-	-	-	3
230	Gutartige Neubildungen des Gehirns	Weibl.	33	-	-	-	-	-	-	-
231	und sonstiger Teile des Nerven- systems	Insges.	55	-	1	2	-	-	-	3
232	REST 210-229	Männl.	22	-	-	-	1	1	-	1
233	Sonstige gutartige Neubildungen	Weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-
234		Insges.	31	-	-	-	1	1	-	1
235	230-234 (EXKL.233.1)	Männl.	11	-	1	-	-	-	-	-
236	Carcinoma in situ	Weibl.	6	-	-	-	-	-	-	-
237		Insges.	17	-	1	-	-	-	-	-
238	233.1	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Carcinoma in situ der Cervix uteri	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
240		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
241	235-239	Männl.	65	2	-	-	-	-	-	-
242	Neubildungen ungewissen Verhaltens	Weibl.	112	-	-	-	-	1	2	1
243	und nicht näher bezeichneter Natur	Insges.	177	2	-	-	-	1	2	1
Klasse III										
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen										
sowie Immunitätsstörungen (240 - 279)										
244	240	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
245	Blande diffuse und nicht näher be-	Weibl.	11	-	-	-	-	-	-	-
246	zeichnete Struma	Insges.	12	-	-	-	-	-	-	-
247	241	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
248	Blande knotige Struma	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-
249		Insges.	11	-	-	-	-	-	-	-
250	242	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
251	Hyperthyreose mit oder ohne Struma	Weibl.	22	-	-	-	-	-	-	-
252		Insges.	24	-	-	-	-	-	-	-
253	243-246	Männl.	2	1	-	-	-	-	-	-
254	Hyperthyreose, Thyreoiditis und	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
255	sonstige Krankheiten der Schilddrüse	Insges.	5	1	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	2	1	1	4	1	4	3	-	-	-	-	229
1	-	1	5	6	4	5	7	2	1	-	1	230
1	2	2	6	10	5	9	10	2	1	-	1	231
-	1	1	1	-	2	1	4	-	3	4	2	232
-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	3	-	233
-	1	2	1	1	3	2	6	-	3	7	2	234
-	-	1	-	2	1	1	-	3	1	-	1	235
-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	236
-	-	2	-	2	2	2	-	4	2	-	2	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	239
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	240
-	1	-	4	12	8	9	5	5	12	7	-	241
4	2	1	4	3	8	10	22	9	29	10	6	242
4	3	1	8	15	16	19	27	14	41	17	6	243
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	244
-	1	-	2	1	-	2	1	1	-	2	1	245
-	1	-	2	1	-	2	2	1	-	2	1	246
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247
1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	2	1	248
1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	2	1	249
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	250
-	-	-	2	1	-	3	1	8	4	2	1	251
-	-	-	2	1	-	3	3	8	4	2	1	252
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	253
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	254
-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	255

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
256	250	Männl.	434	-	-	-	1	-	1	2
257	Diabetes mellitus	Weibl.	983	-	1	-	-	-	2	1
258		Insges.	1417	-	1	-	1	-	3	3
259	251-259	Männl.	13	1	1	-	-	1	-	1
260	Sonstige Krankheiten endokriner	Weibl.	20	2	1	-	-	-	-	1
261	Drüsen	Insges.	33	3	2	-	-	1	-	2
262	260-269	Männl.	23	-	-	1	1	-	-	-
263	Alimentäre Mangelzustände	Weibl.	48	-	-	-	1	-	-	1
264		Insges.	71	-	-	1	2	-	-	1
265	274	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
266	Gicht	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
267		Insges.	6	-	-	-	-	-	-	-
268	278	Männl.	9	-	-	-	-	-	1	-
269	Fettsucht und sonstige Überernäh-	Weibl.	25	-	-	-	-	-	-	-
270	rung	Insges.	34	-	-	-	-	-	1	-
271	270-273,275-277,	Männl.	35	4	1	2	3	2	-	1
272	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	Weibl.	20	5	1	1	-	1	-	-
273	und Immunitätsstörungen	Insges.	55	9	2	3	3	3	-	1
Klasse IV										
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (280 - 289)										
274	280	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	-
275	Eisenmangelanämien	Weibl.	20	-	-	-	-	-	-	-
276		Insges.	29	-	-	-	-	-	-	-
277	281	Männl.	14	-	-	-	-	-	-	-
278	Sonstige Mangelanämien	Weibl.	19	-	-	-	-	-	-	-
279		Insges.	33	-	-	-	-	-	-	-
280	282-285	Männl.	77	2	1	1	1	-	-	-
281	Sonstige Anämien	Weibl.	125	-	1	1	1	1	-	1
282		Insges.	202	2	2	2	2	1	-	1
283	286,287	Männl.	13	-	1	1	-	-	2	-
284	Blutgerinnungsstörungen und	Weibl.	22	-	-	-	-	-	-	-
285	sonstige hämorrhagen Zustände	Insges.	35	-	1	1	-	-	2	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	1	5	19	24	27	33	63	68	90	80	20	256
-	4	6	11	9	22	53	166	137	275	197	99	257
-	5	11	30	33	49	86	229	205	365	277	119	258
-	1	1	-	1	-	1	1	1	2	1	-	259
-	-	-	-	2	1	2	1	1	3	5	1	260
-	1	1	-	3	1	3	2	2	5	6	1	261
-	1	-	1	-	3	1	1	1	1	6	6	262
1	-	2	-	3	2	2	2	2	10	6	16	263
1	1	2	1	3	5	3	3	3	11	12	22	264
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	265
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	266
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	267
1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	268
1	-	-	1	3	3	6	3	1	3	1	3	269
2	-	-	2	5	3	7	3	2	5	1	3	270
2	1	-	-	3	4	4	2	1	2	1	2	271
1	-	2	-	-	3	-	1	1	3	1	-	272
3	1	2	-	3	7	4	3	2	5	2	2	273
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	274
-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	4	4	275
-	-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	5	276
-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	4	2	277
-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	6	3	278
-	-	-	-	1	3	-	5	2	7	10	5	279
2	1	1	3	5	4	7	6	11	13	12	7	280
-	-	-	2	5	3	12	16	13	30	21	18	281
2	1	1	5	10	7	19	22	24	43	33	25	282
-	-	1	1	1	3	-	1	2	-	-	-	283
1	1	-	1	2	1	2	4	3	3	2	2	284
1	1	1	2	3	4	2	5	5	3	2	2	285

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
286	288,289	Männl.	17	1	-	1	-	-	-	-
287	Krankheiten der Leukozyten und	Weibl.	12	-	-	-	-	-	-	-
288	sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Insges.	29	1	-	1	-	-	-	-
Klasse V										
Psychische Krankheiten (290 - 319)										
289	291	Männl.	84	-	-	-	-	-	-	4
290	Alkoholpsychosen	Weibl.	18	-	-	-	-	-	-	-
291		Insges.	102	-	-	-	-	-	-	4
292	290,292-294	Männl.	152	-	-	-	-	-	-	-
293	Sonstige organische psychotische	Weibl.	366	-	-	-	-	-	-	1
294	Zustände	Insges.	518	-	-	-	-	-	-	1
295	295	Männl.	63	-	-	-	-	1	4	4
296	Schizophrene Psychosen	Weibl.	115	-	-	-	-	-	-	-
297		Insges.	178	-	-	-	-	1	4	4
298	296	Männl.	16	-	-	-	-	-	-	1
299	Affektive Psychosen	Weibl.	69	-	-	-	-	-	-	3
300		Insges.	85	-	-	-	-	-	-	4
301	297-299	Männl.	11	-	-	-	-	-	-	-
302	Sonstige Formen der Psychosen	Weibl.	39	-	-	-	-	-	2	-
303		Insges.	50	-	-	-	-	-	2	-
304	300	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	1
305	Neurosen	Weibl.	7	-	-	-	-	-	1	-
306		Insges.	14	-	-	-	-	-	1	1
307	301	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
308	Persönlichkeitsstörungen	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	1
309		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	1
310	303	Männl.	139	-	-	-	-	-	3	1
311	Alkoholismus	Weibl.	34	-	-	-	-	-	-	-
312		Insges.	173	-	-	-	-	-	3	1

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
1	1	-	-	2	2	2	-	1	3	2	1		286
-	-	-	-	1	1	-	6	1	2	1	-		287
1	1	-	-	3	3	2	6	2	5	3	1		288
3	9	5	14	18	16	10	3	1	-	1	-		289
2	-	-	2	3	5	-	1	2	2	-	1		290
5	9	5	16	21	21	10	4	3	2	1	1		291
3	-	-	1	4	9	7	13	25	34	35	21		292
-	-	1	-	4	7	13	37	45	110	91	57		293
3	-	1	1	8	16	20	50	70	144	126	78		294
6	5	3	6	8	13	8	2	-	-	1	2		295
1	2	3	15	16	14	14	11	18	10	5	6		296
7	7	6	21	24	27	22	13	18	10	6	8		297
-	1	1	1	1	3	3	1	1	3	-	-		298
1	-	-	2	4	8	6	14	13	10	7	1		299
1	1	1	3	5	11	9	15	14	13	7	1		300
-	-	-	1	1	3	1	2	2	-	-	1		301
2	1	-	2	1	3	3	2	4	6	5	8		302
2	1	-	3	2	6	4	4	6	6	5	9		303
-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-		304
1	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-		305
1	1	1	4	2	2	1	-	-	-	-	-		306
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		307
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		308
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-		309
8	11	10	25	30	23	15	8	3	2	-	-		310
-	1	4	2	3	7	5	6	2	2	1	1		311
8	12	14	27	33	30	20	14	5	4	1	1		312

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
313	306	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
314	Psychosomatische Funktions- störungen	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
315		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
316	308,309	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	-		
317	Akute Streßreaktion und Anpas- sungsstörung	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
318		Insges.	11	-	-	-	-	-	-	-		
319	310	Männl.	9	-	-	-	1	-	-	-		
320	Spezifische nichtpsychotische psy- chische Störungen nach organischer Hirnschädigung	Weibl.	8	-	-	-	-	-	-	-		
321		Insges.	17	-	-	-	1	-	-	-		
322	313-315	Männl.	1	-	1	-	-	-	-	-		
323	Emotionelle Störungen, hyperkineti- sches Syndrom des Kindesalters und spezifische Entwicklungsverzöge- rungen	Weibl.	3	1	-	-	-	-	-	-		
324		Insges.	4	1	1	-	-	-	-	-		
325	REST 300-316	Männl.	14	-	-	-	-	-	-	-		
326	Sonstige psychische Störungen	Weibl.	7	-	-	-	-	-	-	-		
327		Insges.	21	-	-	-	-	-	-	-		
328	317	Männl.	3	-	-	-	-	1	-	1		
329	Leichte geistige Retardierung	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
330		Insges.	5	-	-	-	-	1	-	1		
331	318,319	Männl.	43	-	2	3	3	3	7	5		
332	Sonstige geistige Retardierung	Weibl.	39	-	2	2	-	4	4	-		
333		Insges.	82	-	4	5	3	7	11	5		
Klasse VI												
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)												
334	320-322	Männl.	50	11	2	1	-	-	-	-		
335	Meningitis	Weibl.	44	4	2	-	-	2	1	-		
336		Insges.	94	15	4	1	-	2	1	-		
337	323-326	Männl.	30	-	1	1	2	2	4	2		
338	Sonstige entzündliche Krankheiten des Zentralen Nervensystems	Weibl.	23	1	1	2	-	-	-	-		
339		Insges.	53	1	2	3	2	2	4	2		

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	älter	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	313
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	315
-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	316
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	317
-	-	-	1	1	3	1	2	1	1	-	1	318
1	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	1	319
-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	-	-	320
1	-	-	-	1	3	2	3	2	3	-	1	321
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	323
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	324
-	-	-	3	4	1	3	1	1	-	-	1	325
-	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	326
-	1	-	3	4	1	5	3	3	-	-	1	327
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	328
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	329
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	330
2	2	3	-	2	7	1	1	-	1	-	1	331
4	4	2	4	4	2	1	3	2	-	1	-	332
6	6	5	4	6	9	2	4	2	1	1	1	333
3	3	3	5	4	5	-	1	7	3	1	1	334
1	1	-	-	1	7	7	3	3	6	5	1	335
4	4	3	5	5	12	7	4	10	9	6	2	336
2	2	1	-	3	6	3	1	-	-	-	-	337
-	1	2	3	3	-	1	4	2	-	3	-	338
2	3	3	3	6	6	4	5	2	-	3	-	339

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
340	332	Männl.	31	-	-	-	-	-	-	-		
341	Parkinson' Krankheit	Weibl.	27	-	-	-	-	-	-	-		
342		Insges.	58	-	-	-	-	-	-	-		
343	330,331,333-337	Männl.	52	4	2	2	-	1	-	1		
344	Sonstige hereditäre und degenerative	Weibl.	96	7	1	2	-	2	2	1		
345	Krankheiten des Zentralen Nerven-	Insges.	148	11	3	4	-	3	2	2		
346	340	Männl.	16	-	-	-	-	-	-	-		
347	Multiple Sklerose	Weibl.	21	-	-	-	-	-	-	-		
348		Insges.	37	-	-	-	-	-	-	-		
349	341-344	Männl.	21	-	2	1	2	-	-	1		
350	Sonstige Lähmungserscheinungen als	Weibl.	19	1	1	2	-	-	-	2		
351	Krankheiten des Zentralen Nerven-	Insges.	40	1	3	3	2	-	-	3		
352	345	Männl.	34	1	2	3	3	3	-	3		
353	Epilepsien	Weibl.	16	-	-	-	1	1	-	1		
354		Insges.	50	1	2	3	4	4	-	4		
355	346-349	Männl.	57	-	2	2	1	2	9	1		
356	Migräne und sonstige Krankheiten	Weibl.	50	-	2	1	-	3	2	2		
357	des Zentralen Nervensystems	Insges.	107	-	4	3	1	5	11	3		
358	350-352	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
359	Krankheiten der Hirnnerven	Weibl.	2	-	-	-	-	-	1	-		
360		Insges.	4	-	-	-	-	-	1	-		
361	353-359	Männl.	19	1	-	-	1	1	2	-		
362	Sonstige Krankheiten des peripheren	Weibl.	16	2	-	-	1	-	-	-		
363	Nervensystems	Insges.	35	3	-	-	2	1	2	-		
364	361	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
365	Netzhautablösung und Netzhaut-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
366	defekte	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
367	362	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
368	Sonstige Krankheiten der Netzhaut	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-		
369		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	1	3	9	8	9	1	-	340
-	-	-	-	-	1	4	2	6	8	6	-	341
-	-	-	-	-	2	7	11	14	17	7	-	342
3	1	2	-	6	3	3	8	4	6	3	3	343
-	3	1	4	8	7	9	11	11	9	6	12	344
3	4	3	4	14	10	12	19	15	15	9	15	345
-	1	3	5	1	2	3	1	-	-	-	-	346
-	-	4	2	5	3	3	1	-	-	2	1	347
-	1	7	7	6	5	6	2	-	-	2	1	348
1	-	-	1	2	1	1	3	1	3	2	-	349
-	-	1	1	1	1	-	2	2	3	2	-	350
1	-	1	2	3	2	1	5	3	6	4	-	351
-	1	2	3	4	3	2	2	-	1	1	-	352
-	-	-	1	1	4	2	1	1	1	2	-	353
-	1	2	4	5	7	4	3	1	2	3	-	354
2	4	2	5	15	3	2	2	3	-	1	1	355
1	2	2	2	11	3	1	6	3	3	1	5	356
3	6	4	7	26	6	3	8	6	3	2	6	357
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	358
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	359
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	360
-	1	1	1	-	-	3	2	1	4	1	-	361
1	1	-	1	-	1	2	-	4	2	1	-	362
1	2	1	2	-	1	5	2	5	6	2	-	363
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	366
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	367
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	368
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	369

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
370	365	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
371	Glaukom	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
372		Insges.	5	-	-	-	-	-	-	-
373	366	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
374	Katarakt	Weibl.	11	-	-	-	-	-	-	-
375		Insges.	14	-	-	-	-	-	-	-
376	372	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
377	Krankheiten der Konjunktiva	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
378		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
379	375	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
380	Krankheiten des Tränensystems	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
381		Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
382	377	Männl.	2	-	-	-	-	1	-	-
383	Krankheiten des Nervus opticus und der Sehbahn	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
384		Insges.	4	-	-	-	-	1	-	-
385	378	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
386	Strabismus und sonstige Störungen der Bewegungen beider Augen	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
387		Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
388	REST 360-379	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
389	Sonstige Augenkrankheiten	Weibl.	4	1	-	-	-	-	-	-
390		Insges.	7	1	-	-	-	-	-	-
391	380	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
392	Krankheiten des äußeren Ohres	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
393		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
394	382	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
395	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
396		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
397	383-385	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
398	Mastoiditis und sonstige Krankheiten des Trommelfells, des Mittelohrs und	Weibl.	2	-	-	1	-	-	-	-
399		Insges.	5	-	-	1	-	-	-	-

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	älter	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	370
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	371
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	373
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	1	374
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	3	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	377
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	378
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	379
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	380
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	382
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	383
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	386
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	387
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	389
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	390
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	393
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	394
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	396
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	397
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	398
-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	399

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
400	386	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
401	Schwindelsyn-drome und sonstige	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
402	Störungen des Vestibularapparates	Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-		
403	387,388	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
404	Otosklerose und sonstige Krank-	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
405	heiten des Ohres	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
406	389	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
407	Schwerhörigkeit und Taubheit	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
408		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
	Klasse VII											
	Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 459)											
409	390-392	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
410	Akutes rheumatisches Fieber	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
411		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-		
412	394	Männl.	18	-	-	-	-	-	-	-		
413	Krankheiten der Mitralklappe	Weibl.	79	-	-	-	-	-	-	-		
414		Insges.	97	-	-	-	-	-	-	-		
415	393,395-398	Männl.	55	2	-	-	-	1	-	-		
416	Sonstige chronische rheumatische	Weibl.	55	-	-	-	-	-	-	1		
417	Herzkrankheit	Insges.	110	2	-	-	-	1	-	1		
418	401	Männl.	210	-	-	-	-	-	1	1		
419	Essentieller Hochdruck	Weibl.	454	-	-	-	-	-	-	-		
420		Insges.	664	-	-	-	-	-	1	1		
421	402	Männl.	167	-	-	-	-	-	-	1		
422	Hochdruck-Herzkrankheit	Weibl.	386	-	-	-	-	-	-	-		
423		Insges.	553	-	-	-	-	-	-	1		
424	403	Männl.	13	-	-	-	-	-	-	-		
425	Hochdruck-Nierenkrankheit	Weibl.	17	-	-	-	-	-	-	-		
426		Insges.	30	-	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	401
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	407
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	408
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	410
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	411
-	1	2	-	3	2	5	2	-	2	1	-	-	412
-	1	-	2	6	9	17	14	12	15	2	1	1	413
-	2	2	2	9	11	22	16	12	17	3	1	1	414
-	2	-	3	5	11	11	12	4	3	1	-	-	415
-	1	1	3	1	6	14	12	5	7	3	1	1	416
-	3	1	6	6	17	25	24	9	10	4	1	1	417
3	-	3	8	9	15	25	29	22	46	33	15	-	418
1	1	2	6	11	17	28	66	52	114	98	58	-	419
4	1	5	14	20	32	53	95	74	160	131	73	-	420
-	-	-	2	9	14	19	17	12	41	40	12	-	421
-	1	-	-	4	8	17	42	36	116	102	60	-	422
-	1	-	2	13	22	36	59	48	157	142	72	-	423
-	1	1	-	-	1	2	3	-	4	1	-	-	424
-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	5	1	-	425
-	1	1	-	-	3	3	5	1	9	6	1	-	426

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
427	404,405	Männl.	20	-	-	-	-	-	1	-
428	Hochdruck-Herz-und Nierenkrankheit	Weibl.	34	-	-	-	-	-	-	1
429	und sekundärer Hochdruck	Insges.	54	-	-	-	-	-	1	1
430	410	Männl.	2863	1	-	-	-	1	3	3
431	Akuter Myokardinfarkt	Weibl.	2305	1	-	-	1	-	1	1
432		Insges.	5168	2	-	-	1	1	4	4
433	411	Männl.	235	-	-	-	-	-	-	-
434	Sonstige akute und subakute Formen	Weibl.	308	-	-	-	-	-	-	-
435	der ischämischen Herzkrankheit	Insges.	543	-	-	-	-	-	-	-
436	413	Männl.	32	-	-	-	-	-	-	1
437	Angina pectoris	Weibl.	24	-	-	-	-	-	-	-
438		Insges.	56	-	-	-	-	-	-	1
439	412,414	Männl.	1519	-	-	-	-	-	-	-
440	Alter Myokardinfarkt und sonstige	Weibl.	2213	-	1	-	-	-	1	-
441	Formen der chronischen ischämi- schen Herzkrankheit	Insges.	3732	-	1	-	-	-	1	-
442	415-417(EXKL.415.1)	Männl.	971	1	1	-	-	1	5	3
443	Krankheiten des Lungenkreislaufs	Weibl.	531	-	-	-	-	1	-	1
444		Insges.	1502	1	1	-	-	2	5	4
445	415.1	Männl.	976	-	-	-	1	1	1	5
446	Lungenembolie	Weibl.	1432	-	-	-	-	2	3	3
447		Insges.	2408	-	-	-	1	3	4	8
448	420-422	Männl.	53	3	-	1	-	1	-	1
449	Akute Perikarditis und Myokarditis	Weibl.	40	-	-	-	-	-	-	2
450	sowie akute und subakute Endo-	Insges.	93	3	-	1	-	1	-	3
451	423,424	Männl.	80	3	-	-	-	-	-	-
452	Sonstige Krankheiten des Perikards	Weibl.	80	-	-	-	-	-	-	2
453	und des Endokards	Insges.	160	3	-	-	-	-	-	2
454	426	Männl.	53	-	-	-	-	1	-	-
455	Erregungsleitungsstörungen	Weibl.	65	-	-	-	-	-	-	-
456		Insges.	118	-	-	-	-	1	-	-

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	2	-	2	2	1	3	1	2	3	1	2	427
-	1	-	-	3	-	3	7	6	4	5	4	428
-	3	-	2	5	1	6	8	8	7	6	6	429
3	12	23	85	148	281	365	457	340	594	399	148	430
2	6	3	8	48	88	153	331	335	656	451	220	431
5	18	26	93	196	369	518	788	675	1250	850	368	432
-	2	1	4	18	16	19	33	23	58	43	18	433
-	-	1	3	3	4	14	30	39	82	67	65	434
-	2	2	7	21	20	33	63	62	140	110	83	435
-	-	-	-	1	11	5	4	2	4	2	2	436
-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	3	5	437
-	-	-	-	1	11	6	8	7	10	5	7	438
-	3	3	10	38	77	109	185	160	376	335	223	439
-	-	1	4	10	28	67	165	228	577	672	459	440
-	3	4	14	48	105	176	350	388	953	1007	682	441
1	3	4	18	47	82	152	173	113	208	120	39	442
2	1	3	9	16	43	53	101	71	108	80	42	443
3	4	7	27	63	125	205	274	184	316	200	81	444
9	10	12	33	67	98	124	139	106	175	126	69	445
8	16	18	41	63	75	121	192	169	311	256	154	446
17	26	30	74	130	173	245	331	275	486	382	223	447
1	2	1	5	5	7	6	5	1	7	4	3	448
2	2	1	4	4	1	3	3	7	4	4	3	449
3	4	2	9	9	8	9	8	8	11	8	6	450
3	2	1	3	12	16	9	14	5	7	4	1	451
-	1	1	-	5	8	11	12	10	15	11	4	452
3	3	2	3	17	24	20	26	15	22	15	5	453
-	1	1	1	1	3	3	3	2	18	8	11	454
-	-	-	-	-	3	3	3	6	17	19	14	455
-	1	1	1	1	6	6	6	8	35	27	25	456

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
457	427	Männl.	216	2	-	-	-	1	1	-
458	Kardiale Rhythmusstörungen	Weibl.	313	1	-	-	1	2	-	-
459		Insges.	529	3	-	-	1	3	1	-
460	428	Männl.	4089	3	6	4	-	7	14	21
461	Herzversagen	Weibl.	5325	2	5	2	2	10	10	9
462		Insges.	9414	5	11	6	2	17	24	30
463	425,429	Männl.	290	-	1	-	-	1	4	3
464	Kardiomyopathie, unzureichend be- schriebene Herzkrankheiten und Komplikationen einer Herzkrankheit	Weibl.	363	2	1	1	-	-	-	2
465		Insges.	653	2	2	1	-	1	4	5
466	430	Männl.	104	-	-	-	1	1	4	2
467	Subarachnoidalblutung	Weibl.	119	-	-	-	-	-	2	2
468		Insges.	223	-	-	-	1	1	6	4
469	431,432	Männl.	527	-	-	-	-	2	1	2
470	Intrazerebrale und sonstige und nicht näher bezeichnete intrakranielle Blutungen	Weibl.	575	1	-	-	-	2	-	3
471		Insges.	1102	1	-	-	-	4	1	5
472	433,434	Männl.	388	-	-	-	-	2	-	1
473	Verschluß und Stenose präzerebraler und zerebraler Arterien	Weibl.	708	-	1	-	-	1	-	1
474		Insges.	1096	-	1	-	-	3	-	2
475	435	Männl.	54	-	-	-	-	-	-	-
476	Transistorische zerebrale Ischämie	Weibl.	57	-	-	-	-	-	-	-
477		Insges.	111	-	-	-	-	-	-	-
478	436	Männl.	2976	-	-	1	-	-	1	-
479	Akute, aber ungenau bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheit	Weibl.	5293	-	-	-	-	-	2	2
480		Insges.	8269	-	-	1	-	-	3	2
481	437	Männl.	1455	-	-	-	-	-	2	1
482	Sonstige und ungenau bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten	Weibl.	2880	-	-	-	-	-	-	-
483		Insges.	4335	-	-	-	-	-	2	1
484	438	Männl.	20	-	-	-	-	-	-	-
485	Spätfolgen einer zerebrovaskulären Krankheit	Weibl.	34	-	-	-	-	-	-	-
486		Insges.	54	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	1	3	6	17	16	17	29	21	47	30	25	457
2	-	-	3	6	7	13	27	31	77	77	66	458
2	1	3	9	23	23	30	56	52	124	107	91	459
23	40	42	98	206	308	363	451	428	830	768	477	460
26	31	23	77	110	138	276	541	516	1254	1254	1039	461
49	71	65	175	316	446	639	992	944	2084	2022	1516	462
7	7	10	24	25	23	28	19	16	41	41	40	463
1	1	-	5	7	9	19	24	40	74	93	84	464
8	8	10	29	32	32	47	43	56	115	134	124	465
4	8	9	16	14	13	11	5	5	5	5	1	466
9	4	9	14	16	17	12	9	9	6	4	6	467
13	12	18	30	30	30	23	14	14	11	9	7	468
12	18	17	54	81	70	84	59	30	43	37	17	469
8	13	12	27	47	55	77	77	59	119	71	32	470
20	31	29	81	128	125	133	136	89	162	108	49	471
3	2	7	9	26	37	28	53	40	78	71	31	472
1	2	6	5	9	21	26	84	73	195	190	93	473
4	4	13	14	35	58	54	137	113	273	261	124	474
-	-	-	-	2	5	1	5	6	20	8	7	475
-	-	-	-	2	1	1	6	1	17	15	14	476
-	-	-	-	4	6	2	11	7	37	23	21	477
1	4	9	24	66	138	200	402	365	759	688	318	478
3	2	6	10	37	81	202	493	667	1497	1410	881	479
4	6	15	34	103	219	402	895	1032	2256	2098	1199	480
2	3	5	6	17	24	69	123	142	358	413	290	481
-	4	3	3	10	23	64	194	250	744	850	735	482
2	7	8	9	27	47	133	317	392	1102	1263	1025	483
-	-	-	-	2	1	-	4	4	5	2	2	484
-	-	-	-	1	1	2	5	6	6	8	5	485
-	-	-	-	3	2	2	9	10	11	10	7	486

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
487	440	Männl.	798	1	1	1	-	-	-	1
488	Atherosklerose	Weibl.	1332	-	-	-	-	-	2	-
489		Insges.	2130	1	1	1	-	-	2	1
490	443	Männl.	29	-	-	-	-	-	-	-
491	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	Weibl.	22	-	-	-	-	-	-	-
492		Insges.	51	-	-	-	-	-	-	-
493	444	Männl.	144	-	-	-	-	-	-	-
494	Arterielle Embolie und Thrombose	Weibl.	292	-	-	-	-	-	-	1
495		Insges.	436	-	-	-	-	-	-	1
496	441,442,446-448	Männl.	235	-	-	-	-	1	1	-
497	Sonstige Krankheiten der Arterien,	Weibl.	71	-	-	-	-	1	-	1
498	Arteriolen und Kapillaren	Insges.	306	-	-	-	-	2	1	1
499	451-453	Männl.	58	-	1	-	1	-	-	-
500	Phlebitis, Thrombophlebitis, venöse	Weibl.	77	-	-	-	-	-	-	-
501	Embolien und Thrombosen	Insges.	135	-	1	-	1	-	-	-
502	454	Männl.	12	-	-	-	-	-	-	-
503	Varizen der unteren Extremitäten	Weibl.	25	-	-	-	-	-	-	-
504		Insges.	37	-	-	-	-	-	-	-
505	455	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
506	Hämorrhoiden	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
507		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
508	458	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	-
509	Hypotension	Weibl.	7	-	-	-	-	-	-	-
510		Insges.	16	-	-	-	-	-	-	-
511	456,457,459	Männl.	189	-	-	-	-	-	2	1
512	Varizen sonstiger Lokalisationen,	Weibl.	79	1	1	1	-	-	-	-
513	Krankheiten der Lymphwege und sonstige Krankheiten des Kreislauf- systems	Insges.	268	1	1	1	-	-	2	1

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1	-	2	3	14	27	40	67	83	177	209	171	487
-	-	-	6	-	11	28	74	130	293	371	417	488
1	-	2	9	14	38	68	141	213	470	580	588	489
-	-	1	1	3	1	3	3	7	3	6	1	490
-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	4	4	491
-	-	1	1	4	1	3	5	11	10	10	5	492
-	1	3	2	4	6	14	14	15	32	29	24	493
-	-	1	3	3	3	10	25	23	71	87	65	494
-	1	4	5	7	9	24	39	38	103	116	89	495
2	1	2	3	12	19	27	58	30	39	28	12	496
1	1	-	1	4	1	4	10	8	17	13	9	497
3	2	2	4	16	20	31	68	38	56	41	21	498
2	1	1	2	4	4	5	10	4	9	8	6	499
-	-	1	2	3	5	6	8	6	19	19	8	500
2	1	2	4	7	9	11	18	10	28	27	14	501
-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	2	2	502
-	1	-	-	-	-	-	2	3	8	4	7	503
-	1	-	-	1	1	1	3	4	11	6	9	504
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	505
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	507
-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	3	1	508
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	509
-	-	-	1	1	2	1	-	-	4	4	3	510
2	7	16	23	37	26	22	22	10	12	8	1	511
-	3	3	8	8	5	10	11	4	11	9	4	512
2	10	19	31	45	31	32	33	14	23	17	5	513

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
Klasse VIII												
Krankheiten des Atmungssystems (460 - 519)												
514	461	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
515	Akute Sinusitis, inkl. Nasenhöhlen-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
516	abszeß	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
517	462	Männl.	1	-	-	1	-	-	-	-		
518	Akute Pharyngitis	Weibl.	1	-	-	-	1	-	-	-		
519		Insges.	2	-	-	1	1	-	-	-		
520	463	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
521	Akute Tonsillitis	Weibl.	3	-	1	-	-	-	-	-		
522		Insges.	3	-	1	-	-	-	-	-		
523	464	Männl.	10	-	2	-	1	-	-	-		
524	Akute Laryngitis und Tracheitis	Weibl.	3	-	1	-	-	-	-	-		
525		Insges.	13	-	3	-	1	-	-	-		
526	460,465	Männl.	13	3	4	-	-	-	-	-		
527	Akute Rhinopharyngitis und sonstige	Weibl.	8	-	2	-	-	-	-	-		
528	akute Infektionen der oberen Atem-	Insges.	21	3	6	-	-	-	-	-		
	wege mehrerer oder nicht näher											
	bezeichnete Lokalisation											
529	466	Männl.	42	1	3	-	-	1	-	-		
530	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	Weibl.	47	2	2	1	-	-	1	-		
531		Insges.	89	3	5	1	-	1	1	-		
532	470	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
533	Septumdeviation	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
534		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
535	472,473	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
536	Chronische Pharyngitis, Rhinopha-	Weibl.	2	-	-	1	-	-	-	-		
537	ryngitis und Sinusitis	Insges.	3	-	-	1	-	-	-	-		
538	474 (EXKL.474.2)	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
539	Chronische Krankheit der Gaumen-	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
540	und Rachenmandeln	Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	521
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	522
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	1	1	523
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	524
-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	2	2	525
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	526
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	2	527
-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	3	2	2	528
-	-	-	1	3	1	3	3	4	8	12	2	2	529
-	1	-	-	-	2	-	1	5	13	8	11	11	530
-	1	-	1	3	3	3	4	9	21	20	13	13	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	537
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	538
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	539
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	540

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
541	475	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
542	Paratonsillarabszeß, inkl. peritonsil-	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
543	läre Phlegmose	Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-		
544	476-478	Männl.	8	1	-	-	-	-	-	-		
545	Chronische Laryngitis und Laryngo-	Weibl.	8	-	-	-	-	-	-	-		
546	tracheitis, allergische Rhinitis und sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	Insges.	16	1	-	-	-	-	-	-		
547	480	Männl.	19	1	-	-	-	-	2	1		
548	Viruspneumonie	Weibl.	18	-	-	-	-	-	1	-		
549		Insges.	37	1	-	-	-	-	3	1		
550	481-484	Männl.	213	2	1	2	-	1	1	2		
551	Sonstige Pneumonien durch näher	Weibl.	151	-	2	1	1	1	-	1		
552	bezeichneten Erreger	Insges.	364	2	3	3	1	2	1	3		
553	485	Männl.	2887	8	6	3	2	6	1	3		
554	Bronchopneumonie, Erreger nicht	Weibl.	3003	5	11	3	3	3	7	7		
555	näher bezeichnet	Insges.	5890	13	17	6	5	9	8	10		
556	486	Männl.	415	2	1	1	2	-	-	2		
557	Pneumonie, Erreger nicht näher be-	Weibl.	429	2	-	1	1	-	1	1		
558	zeichnet	Insges.	844	4	1	2	3	-	1	3		
559	487	Männl.	26	2	-	-	-	1	-	-		
560	Grippe	Weibl.	11	-	-	-	-	1	-	-		
561		Insges.	37	2	-	-	-	2	-	-		
562	490,491	Männl.	276	-	2	-	-	-	-	-		
563	Chronische und nicht näher be-	Weibl.	96	-	-	-	-	-	-	-		
564	zeichnete Bronchitis	Insges.	372	-	2	-	-	-	-	-		
565	492	Männl.	71	-	-	-	-	-	-	-		
566	Emphysem	Weibl.	32	-	-	-	-	-	1	-		
567		Insges.	103	-	-	-	-	-	1	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	541
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	542
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	543
-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	1	544
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	545
1	-	-	1	1	1	-	-	3	2	2	4	546
-	1	-	1	-	4	2	1	3	2	1	-	547
1	1	-	-	1	1	3	1	1	2	4	2	548
1	2	-	1	1	5	5	2	4	4	5	2	549
4	4	7	7	16	19	18	22	21	35	32	19	550
2	2	-	4	-	2	11	12	18	45	31	18	551
6	6	7	11	16	21	29	34	39	80	63	37	552
15	27	36	63	127	188	222	265	280	639	613	383	553
7	12	9	25	47	71	119	270	289	747	776	592	554
22	39	45	88	174	259	341	535	569	1386	1389	975	555
2	6	8	13	21	42	34	41	32	96	69	43	556
3	2	4	3	4	12	22	39	48	98	106	82	557
5	8	12	16	25	54	56	80	80	194	175	125	558
-	1	-	1	2	1	1	1	2	3	9	2	559
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	560
-	1	-	1	2	1	1	1	4	5	10	7	561
-	-	-	3	5	23	28	38	35	72	37	33	562
-	1	-	-	4	7	9	12	14	22	13	14	563
-	1	-	3	9	30	37	50	49	94	50	47	564
-	-	-	-	1	11	8	10	9	16	13	3	565
-	-	-	2	1	-	2	3	6	5	6	6	566
-	-	-	2	2	11	10	13	15	21	19	9	567

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
568	493	Männl.	41	-	-	-	-	-	-	3
569	Asthma bronchiale	Weibl.	39	-	-	-	-	2	-	3
570		Insges.	80	-	-	-	-	2	-	6
571	494-496	Männl.	19	-	-	-	-	-	-	-
572	Bronchiektasie, exogene allergische	Weibl.	19	-	-	-	-	-	-	-
573	Alveolitis und chronische Atemwegs- obstruktion, nicht andernorts klassi- fizierbar	Insges.	38	-	-	-	-	-	-	-
574	500-508	Männl.	84	-	2	-	-	-	-	1
575	Pneumokoniosen und sonstige	Weibl.	37	1	-	-	-	-	3	1
576	Lungenkrankheiten durch äußere Agenzien	Insges.	121	1	2	-	-	-	3	2
577	511	Männl.	17	-	-	-	-	-	-	1
578	Pleuritis	Weibl.	21	-	-	-	-	-	-	-
579		Insges.	38	-	-	-	-	-	-	1
580	512	Männl.	18	1	-	-	-	-	-	1
581	Pneumothorax	Weibl.	7	1	-	-	-	-	-	-
582		Insges.	25	2	-	-	-	-	-	1
583	510,513	Männl.	37	-	-	-	-	-	-	-
584	Empyem und Abszeß der Lunge und des Mediastinums	Weibl.	20	-	-	-	-	-	1	-
585		Insges.	57	-	-	-	-	-	1	-
586	514-519	Männl.	1165	2	1	1	1	2	4	2
587	Sonstige Krankheiten der Lunge und des Atmungssystems	Weibl.	1981	-	1	-	1	1	3	1
588		Insges.	3146	2	2	1	2	3	7	3
Klasse IX										
Krankheiten des Verdauungssystems (520 - 579)										
589	520-526	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
590	Krankheiten der Zähne, des Zahn- halteapparates und der Kiefer	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
591		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-
592	527-529	Männl.	3	-	-	-	-	-	1	-
593	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle und der Speicheldrüsen	Weibl.	16	-	-	-	-	-	-	-
594		Insges.	19	-	-	-	-	-	1	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	1	1	-	4	5	8	3	3	8	3	2	568
-	1	1	3	1	1	5	2	6	5	4	5	569
-	2	2	3	5	6	13	5	9	13	7	7	570
-	-	-	-	3	1	2	1	2	6	3	1	571
-	-	-	2	-	1	1	2	3	4	4	2	572
-	-	-	2	3	2	3	3	5	10	7	3	573
5	3	3	4	7	7	8	4	9	12	13	6	574
-	1	1	1	3	5	2	2	1	8	3	5	575
5	4	4	5	10	12	10	6	10	20	16	11	576
-	-	-	-	2	1	2	2	3	3	3	-	577
-	-	1	1	1	-	4	2	1	4	6	1	578
-	-	1	1	3	1	6	4	4	7	9	1	579
2	1	-	2	1	1	1	1	1	1	4	1	580
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	581
2	1	-	3	1	1	2	2	2	2	4	2	582
2	1	1	3	6	5	3	6	2	4	2	2	583
-	1	1	-	1	1	3	1	4	5	2	-	584
2	2	2	3	7	6	6	7	6	9	4	2	585
5	6	5	23	47	62	69	107	105	264	268	191	586
5	6	5	7	25	45	67	156	171	468	531	488	587
10	12	10	30	72	107	136	263	276	732	799	679	588
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	589
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	590
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	591
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	592
-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	7	593
-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	8	594

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
595	530	Männl.	38	-	-	-	-	-	-	1		
596	Krankheiten des Ösophagus	Weibl.	17	-	-	-	-	-	-	-		
597		Insges.	55	-	-	-	-	-	-	1		
598	531	Männl.	210	-	-	-	-	1	-	-		
599	Ulcus ventriculi	Weibl.	189	-	-	-	1	-	-	-		
600		Insges.	399	-	-	-	1	1	-	-		
601	532	Männl.	136	-	-	-	-	-	-	2		
602	Ulcus duodeni	Weibl.	110	-	-	-	-	-	1	-		
603		Insges.	246	-	-	-	-	-	1	2		
604	533,534	Männl.	16	-	-	-	-	-	-	-		
605	Ulcus pepticum jejuni und nicht näher bezeichnete Lokalisation	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-		
606		Insges.	26	-	-	-	-	-	-	-		
607	535	Männl.	19	-	-	-	-	1	-	1		
608	Gastritis und Duodentitis	Weibl.	11	-	1	-	-	-	-	-		
609		Insges.	30	-	1	-	-	1	-	1		
610	536,537	Männl.	12	1	-	-	-	-	-	-		
611	Störungen der Magenfunktion sowie sonstige Krankheiten des Magens des Duodenum	Weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-		
612		Insges.	27	1	-	-	-	-	-	-		
613	540	Männl.	63	-	-	2	-	1	-	1		
614	Akute Appendizitis	Weibl.	64	-	-	-	1	1	-	2		
615		Insges.	127	-	-	2	1	2	-	3		
616	541	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
617	Unge- nau bezeichnete Appendizitis	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-		
618		Insges.	7	-	-	-	-	-	-	-		
619	542,543	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
620	Sonstige Formen der Appendizitis und Krankheiten des Appendix	Weibl.	13	-	-	-	-	1	-	-		
621		Insges.	14	-	-	-	-	1	-	-		
622	550	Männl.	66	3	1	-	1	-	-	-		
623	Hernia inguinalis	Weibl.	25	-	-	-	-	-	1	-		
624		Insges.	91	3	1	-	1	-	1	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	1	3	2	5	9	2	4	2	4	2	3	595
-	2	1	2	-	-	1	1	3	2	4	1	596
-	3	4	4	5	9	3	5	5	6	6	4	597
2	4	6	13	22	15	16	28	17	39	28	19	598
1	-	-	2	3	6	16	24	15	48	41	32	599
3	4	6	15	25	21	32	52	32	87	69	51	600
2	4	4	7	25	9	9	12	7	17	28	10	601
1	-	1	1	1	6	7	12	6	33	28	13	602
3	4	5	8	26	15	16	24	13	50	56	23	603
1	-	1	1	-	1	1	-	1	6	4	-	604
-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	4	-	605
1	-	1	1	2	1	1	-	1	10	8	-	606
-	1	-	1	4	1	1	2	1	-	5	1	607
-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	1	608
-	1	-	1	5	1	1	3	4	1	8	2	609
1	-	-	-	3	1	3	1	-	1	1	-	610
-	-	1	1	-	-	-	4	2	5	2	-	611
1	-	1	1	3	1	3	5	2	6	3	-	612
-	1	3	1	5	2	5	10	6	10	13	3	613
-	-	-	-	1	2	1	5	9	15	14	13	614
-	1	3	1	6	4	6	15	15	25	27	16	615
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	617
-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	619
-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	1	2	620
-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	1	3	621
-	-	-	-	1	2	3	4	6	19	11	15	622
-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	10	5	623
-	-	-	-	1	3	5	6	7	22	21	20	624

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren							25	30
				1	5	10	15	20	25	30		
625	551	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	-		
626	Sonstige Hernien der Bauchhöhle mit	Weibl.	32	-	-	-	-	-	-	-		
627	Gangrän	Insges.	39	-	-	-	-	-	-	-		
628	552,553	Männl.	22	3	-	-	-	-	-	-		
629	Sonstige Hernien der Bauchhöhle	Weibl.	74	-	-	-	-	-	-	-		
630	ohne Anzeichen von Gangrän	Insges.	96	3	-	-	-	-	-	-		
631	557	Männl.	154	-	-	-	-	-	1	-		
632	Gefäßinsuffizienz des Darmes	Weibl.	328	-	-	-	-	-	-	-		
633		Insges.	482	-	-	-	-	-	1	-		
634	555,556,558	Männl.	26	-	2	-	-	1	-	1		
635	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und	Weibl.	36	-	-	1	-	1	-	-		
636	Kolitis	Insges.	62	-	2	1	-	2	-	1		
637	560	Männl.	192	2	1	2	1	-	-	2		
638	Ileus, ohne Angabe einer Hernie	Weibl.	408	2	-	-	-	1	-	1		
639		Insges.	600	4	1	2	1	1	-	3		
640	564	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	1		
641	Funktionelle Darmstörungen, nicht	Weibl.	22	-	-	-	-	-	-	-		
642	andernorts klassifizierbar	Insges.	31	-	-	-	-	-	-	1		
643	565	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
644	Analfissur und Analfistel	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	1		
645		Insges.	5	-	-	-	-	-	-	1		
646	566	Männl.	5	-	-	-	-	-	-	-		
647	Abszeß der Anal- und Rektalregion	Weibl.	12	-	-	-	-	-	-	-		
648		Insges.	17	-	-	-	-	-	-	-		
649	567,568	Männl.	253	1	2	-	-	2	1	2		
650	Krankheiten des Peritoneums	Weibl.	289	-	-	-	-	-	-	1		
651		Insges.	542	1	2	-	-	2	1	3		
652	562,569	Männl.	28	-	-	-	-	-	-	-		
653	Darmdivertikel und sonstige Krank-	Weibl.	35	-	1	-	-	-	-	-		
654	heiten des Darmes	Insges.	63	-	1	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	625
-	-	-	1	-	2	-	2	2	7	11	7	626
-	-	-	1	-	2	2	3	4	8	11	8	627
-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	4	6	628
1	-	-	1	2	2	3	3	7	14	19	22	629
1	-	-	1	3	3	4	4	9	17	23	28	630
-	-	-	2	2	6	10	17	18	39	40	19	631
-	-	-	2	4	4	14	29	28	83	84	80	632
-	-	-	4	6	10	24	46	46	122	124	99	633
-	-	2	4	2	3	-	2	4	1	3	1	634
-	1	-	1	2	2	1	3	3	7	11	3	635
-	1	2	5	4	5	1	5	7	8	14	4	636
-	1	1	3	16	12	20	20	22	39	29	21	637
4	2	1	8	10	17	26	45	40	83	83	85	638
4	3	2	11	26	29	46	65	62	122	112	106	639
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	640
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	6	641
-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	8	9	642
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	643
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	644
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	645
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	646
-	-	-	-	-	2	-	4	-	3	2	1	647
-	1	-	-	-	3	-	4	1	3	4	1	648
6	5	2	11	22	28	40	26	25	27	30	23	649
2	-	1	3	18	17	19	40	35	62	46	45	650
8	5	3	14	40	45	59	66	60	89	76	68	651
-	-	-	1	4	1	5	6	1	4	4	2	652
-	-	-	-	1	2	4	8	3	5	5	6	653
-	-	-	1	5	3	9	14	4	9	9	8	654

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
655	570	Männl.	55	-	-	-	-	-	-	1		
656	Akute und subakute Lebernekrose	Weibl.	25	-	-	-	-	-	1	1		
657		Insges.	80	-	-	-	-	-	1	2		
658	571	Männl.	816	-	-	-	-	-	1	13		
659	Chronische Leberkrankheit und Leberzirrhose	Weibl.	463	1	-	-	-	-	-	4		
660		Insges.	1279	1	-	-	-	-	1	17		
661	572,573	Männl.	380	1	-	-	-	-	3	5		
662	Leberabszeß und sonstige Krank- heiten der Leber	Weibl.	220	-	-	-	1	-	1	2		
663		Insges.	600	1	-	-	1	-	4	7		
664	574	Männl.	154	-	-	-	-	-	-	-		
665	Cholelithiasis	Weibl.	278	-	-	-	-	-	1	1		
666		Insges.	432	-	-	-	-	-	1	1		
667	575	Männl.	42	-	-	-	-	-	-	-		
668	Sonstige Krankheiten der Gallenblase	Weibl.	74	-	-	-	-	-	-	-		
669		Insges.	116	-	-	-	-	-	-	-		
670	576	Männl.	33	-	-	-	-	-	1	-		
671	Sonstige Krankheiten der Gallengänge	Weibl.	52	-	-	-	-	-	-	1		
672		Insges.	85	-	-	-	-	-	1	1		
673	577	Männl.	289	-	-	-	-	-	4	12		
674	Krankheiten des Pankreas	Weibl.	223	-	-	1	-	-	1	2		
675		Insges.	512	-	-	1	-	-	5	14		
676	578,579	Männl.	172	1	-	-	-	1	2	-		
677	Gastrointestinale Blutung und in- testinale Malabsorption	Weibl.	176	-	-	-	-	2	1	1		
678		Insges.	348	1	-	-	-	3	3	1		
Klasse X												
Krankheiten des Urogenitalsystems (580 - 629)												
679	580,581	Männl.	16	1	-	-	-	-	-	-		
680	Akute Glomerulonephritis und nephrotisches Syndrom	Weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-		
681		Insges.	25	1	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1	4	3	12	8	8	10	3	2	1	-	2	655
-	-	1	2	2	-	7	3	3	2	1	2	656
1	4	4	14	10	8	17	6	5	3	1	4	657
23	40	42	95	143	137	105	103	33	54	21	6	658
3	12	12	45	58	60	64	63	43	52	39	7	659
26	52	54	140	201	197	169	166	76	106	60	13	660
13	26	18	49	65	54	55	41	16	18	13	3	661
3	6	12	18	23	26	27	34	17	28	17	5	662
16	32	30	67	88	80	82	75	33	46	30	8	663
1	-	2	4	6	9	15	27	18	34	24	14	664
1	-	1	4	10	15	16	39	25	61	54	50	665
2	-	3	8	16	24	31	66	43	95	78	64	666
-	-	-	-	2	2	4	3	4	11	9	7	667
1	-	1	1	1	3	3	3	6	18	20	17	668
1	-	1	1	3	5	7	6	10	29	29	24	669
1	-	2	1	1	3	3	3	2	7	6	3	670
-	-	-	2	1	-	6	4	7	11	11	9	671
1	-	2	3	2	3	9	7	9	18	17	12	672
17	24	19	41	28	29	18	23	11	30	19	14	673
3	7	3	11	14	23	23	22	17	42	40	14	674
20	31	22	52	42	52	41	45	28	72	59	28	675
3	5	9	13	19	17	9	21	17	20	17	18	676
-	-	3	6	6	12	14	14	15	30	44	28	677
3	5	12	19	25	29	23	35	32	50	61	46	678
-	-	-	1	4	2	4	1	1	2	-	-	679
-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	1	680
-	-	-	2	4	2	4	4	2	4	1	1	681

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
682	582	Männl.	16	-	-	-	-	1	1	1
683	Chronische Glomerulonephritis	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
684		Insges.	20	-	-	-	-	1	1	1
685	584-586	Männl.	429	-	1	-	-	2	-	3
686	Nierenversagen	Weibl.	542	2	1	1	-	-	-	5
687		Insges.	971	2	2	1	-	2	-	8
688	583,587-589	Männl.	15	-	-	-	-	-	-	1
689	Sonstige Nephropatien	Weibl.	24	-	-	-	-	-	-	-
690		Insges.	39	-	-	-	-	-	-	1
691	590	Männl.	221	-	-	-	-	1	1	-
692	Infektiöse Krankheiten der Niere	Weibl.	295	-	-	-	-	1	-	-
693		Insges.	516	-	-	-	-	2	1	-
694	591,593	Männl.	23	-	-	-	-	-	-	-
695	Hydronephrose und sonstige Krank- heiten der Niere und des Ureters	Weibl.	23	-	-	-	-	-	-	-
696		Insges.	46	-	-	-	-	-	-	-
697	592,594	Männl.	27	-	-	-	-	-	-	-
698	Steine in Niere und Harnwegen	Weibl.	28	-	-	-	-	-	-	-
699		Insges.	55	-	-	-	-	-	-	-
700	595	Männl.	14	-	-	-	-	-	-	-
701	Zystitis	Weibl.	12	-	-	-	-	-	-	-
702		Insges.	26	-	-	-	-	-	-	-
703	596-599	Männl.	33	-	-	-	1	-	-	-
704	Sonstige Krankheiten der Harnblase, der Harnröhre und der Harnwege	Weibl.	19	-	-	-	-	-	-	-
705		Insges.	52	-	-	-	1	-	-	-
706	600	Männl.	119	1	-	-	-	-	1	1
707	Hyperplasie der Prostata	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
708		Insges.	119	1	-	-	-	-	1	1
709	603	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-
710	Hydrozele von Funiculus spermati- cus, Testitis oder Tunica vaginalis testis	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
711		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	1	-	-	4	3	1	1	-	1	2	-	682
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	683
-	1	-	-	4	3	1	1	2	2	3	-	684
1	7	6	25	27	30	43	63	39	78	74	30	685
3	8	1	13	18	34	68	100	68	111	71	38	686
4	15	7	38	45	64	111	163	107	189	145	68	687
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	3	688
-	-	-	1	-	3	2	5	3	6	3	1	689
-	-	-	1	-	4	3	6	4	10	6	4	690
-	2	2	3	9	7	14	28	25	53	47	29	691
-	3	-	6	7	14	25	43	39	69	55	33	692
-	5	2	9	16	21	39	71	64	122	102	62	693
-	1	-	-	4	3	3	2	2	7	1	-	694
-	1	1	-	1	2	2	7	1	6	1	1	695
-	2	1	-	5	5	5	9	3	13	2	1	696
-	-	1	-	-	2	1	6	2	6	4	5	697
-	-	-	1	1	3	4	5	4	4	2	4	698
-	-	1	1	1	5	5	11	6	10	6	9	699
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	7	700
-	-	-	-	-	2	-	1	5	3	-	1	701
-	-	-	-	1	2	-	2	6	5	2	8	702
-	-	-	-	1	1	-	4	-	9	11	6	703
-	-	-	-	-	2	1	-	1	8	3	4	704
-	-	-	-	1	3	1	4	1	17	14	10	705
-	-	-	-	1	2	5	9	10	30	35	24	706
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707
-	-	-	-	1	2	5	9	10	30	35	24	708
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	709
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	711

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
712	604	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	1
713	Orchitis und Epididymitis	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
714		Insges.	9	-	-	-	-	-	-	1
715	605	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
716	Überhängende Vorhaut und Phimose	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
717		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
718	601, 602, 606-608	Männl.	12	-	-	-	-	-	1	-
719	Alle sonstigen Krankheiten der männlichen Genitalorgane	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
720		Insges.	12	-	-	-	-	-	1	-
721	610, 611	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
722	Krankheiten der Mamma	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
723		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-
724	614	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Entzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina, des Beckenbinde- gewebes und des Peritoneums	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
726		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-
727	615	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Entzündliche Krankheiten des Uterus, exkl. Cervix uteri	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
729		Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
730	616	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Entzündliche Krankheiten der Cervix uteri, der Vagina und der Vulva	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
732		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
733	618	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
734	Genitalprolaps	Weibl.	22	-	-	-	-	-	-	-
735		Insges.	22	-	-	-	-	-	-	-
736	619-621	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
737	Fisteln des Genitaltrakts, nichtent- zündliche und sonstige Krankheiten des Uterus und der Anhangsgebilde	Weibl.	18	-	-	-	-	-	-	-
738		Insges.	18	-	-	-	-	-	-	-
739	622	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
740	Nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
741		Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	älter	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	717
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	1	718
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	1	720
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	721
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	722
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	726
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	728
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	731
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733
-	2	2	-	2	1	1	4	2	4	-	4	734
-	2	2	-	2	1	1	4	2	4	-	4	735
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
-	-	-	5	2	1	-	1	1	3	4	1	737
-	-	-	5	2	1	-	1	1	3	4	1	738
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	740
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	741

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
742	626	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
743	Menstruationsstörungen und andere	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-
744	abnorme Blutungen aus dem weib- lichen Genitaltrakt	Insges.	10	-	-	-	-	-	-	-
745	628	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Sterilität bei der Frau	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	2
747		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	2
748	625,627,629	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Alle sonstigen Krankheiten der	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-
750	weiblichen Genitalorgane	Insges.	10	-	-	-	-	-	-	-
Klasse XI										
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (630 - 676)										
751	634	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Spontanabort	Weibl.	2	-	-	-	-	-	1	1
753		Insges.	2	-	-	-	-	-	1	1
754	635	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
755	Legal eingeleiteter Abort	Weibl.	5	-	-	-	-	-	3	-
756		Insges.	5	-	-	-	-	-	3	-
757	630-632,638,639	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Sonstige Komplikationen der	Weibl.	2	-	-	-	1	-	-	1
759	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	Insges.	2	-	-	-	1	-	-	1
760	640,641	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Blutung in der Schwangerschaft,	Weibl.	3	-	-	-	-	1	1	-
762	vorzeitige Lösung der Plazenta und Placenta praevia	Insges.	3	-	-	-	-	1	1	-
763	642	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
764	Hochdruck als Komplikation von	Weibl.	5	-	-	-	-	-	1	1
765	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	Insges.	5	-	-	-	-	-	1	1
766	Alle sonstigen Komplikationen der	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Schwangerschaft	Weibl.	3	-	-	-	-	-	1	2
768		Insges.	3	-	-	-	-	-	1	2

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
2	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	1	743
2	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	1	744
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	1	3	1	1	-	2	-	2	-	749
-	-	-	1	3	1	1	-	2	-	2	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768

1 Stationäre

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren							25	30
				1	5	10	15	20	25	30		
769	647,648	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
770	Krankheiten der Mutter, die	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	1		
771	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	Insges.	2	-	-	-	-	-	-	1		
772	650	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
773	Völlig normale Geburt	Weibl.	13	-	-	-	-	1	5	6		
774		Insges.	13	-	-	-	-	1	5	6		
775	653,654	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
776	Mißverhältnis und Anomalie der	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	1		
777	Organe und Weichteile des Beckens	Insges.	2	-	-	-	-	-	-	1		
778	655,656	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
779	Fetale Anomalie und Zustände, die	Weibl.	3	-	-	-	-	-	2	-		
780	sich auf die Behandlung der Mutter auswirken	Insges.	3	-	-	-	-	-	2	-		
781	664	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
782	Verletzung des Perineums und der	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	1		
783	Vulva unter der Geburt	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	1		
784	660-663,665-669	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
785	Sonstige Komplikationen, die vor-	Weibl.	14	-	-	-	-	-	4	5		
786	wiegend während des Geburtsablaufs auftreten	Insges.	14	-	-	-	-	-	4	5		
787	670-676	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
788	Komplikationen des Wochenbettes	Weibl.	4	-	-	-	-	-	2	1		
789		Insges.	4	-	-	-	-	-	2	1		
Klasse XII												
Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes (680 - 709)												
790	680	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
791	Karbunkel und Furunkel	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-		
792		Insges.	4	-	-	-	-	-	-	-		
793	681,682	Männl.	36	-	-	-	-	-	-	-		
794	Zellgewebsentzündungen und	Weibl.	66	-	-	-	-	-	-	-		
795	Abszesse	Insges.	102	-	-	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	790
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	791
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	792
-	-	1	2	1	3	5	7	6	3	6	2	793
-	-	1	-	3	4	7	16	7	14	6	8	794
-	-	2	2	4	7	12	23	13	17	12	10	795

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
796	684-686	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
797	Sonstige Infektionen der Haut und	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
798	des Unterhautgewebes	Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
799	692	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
800	Kontaktdermatitis und sonstige	Weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
801	Formen des Ekzems	Insges.	5	-	-	-	-	-	-	-
802	696	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	1
803	Psoriasis und ähnliche Krankheiten	Weibl.	7	-	-	-	-	-	1	-
804		Insges.	14	-	-	-	-	-	1	1
805	690,693-695,697,	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	-
806	Sonstige entzündliche Krankheiten	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
807	der Haut und des Unterhautgewebes	Insges.	13	-	-	-	-	-	-	-
808	700-707,709	Männl.	16	-	-	-	-	-	-	-
809	Sonstige Krankheiten der Haut und	Weibl.	90	1	-	-	-	-	-	-
810	des Unterhautgewebes	Insges.	106	1	-	-	-	-	-	-
Klasse XIII										
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (710 - 739)										
811	714	Männl.	10	-	-	-	-	1	-	-
812	Rheumatoid-Arthritis und sonstige	Weibl.	21	-	-	-	-	-	-	-
813	Polyarthritiden	Insges.	31	-	-	-	-	1	-	-
814	715	Männl.	28	-	-	-	-	-	-	-
815	Osteoarthrose und verwandte	Weibl.	33	-	-	-	-	-	-	-
816	Krankheiten	Insges.	61	-	-	-	-	-	-	-
817	711-713,716	Männl.	3	1	-	-	-	-	-	-
818	Arthropatien	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
819		Insges.	5	1	-	-	-	-	-	-
820	710,718,719	Männl.	10	-	-	-	-	-	1	1
821	Diffuse Krankheiten des Bindegewe-	Weibl.	24	-	-	-	-	-	-	-
822	bes sowie sonstige Gelenkkrankhei-	Insges.	34	-	-	-	-	-	1	1
	ten									

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	796
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	797
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	798
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	799
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	800
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	801
1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	802
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	803
1	-	1	-	-	1	-	2	1	4	1	1	804
-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	2	805
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	806
-	-	1	-	1	1	2	-	1	3	2	2	807
-	-	1	2	2	-	1	3	1	4	2	-	808
-	-	-	2	-	-	5	12	6	23	19	22	809
-	-	1	4	2	-	6	15	7	27	21	22	810
-	-	2	-	-	1	4	2	-	-	-	-	811
-	1	-	2	1	1	3	5	2	4	2	-	812
-	1	2	2	1	2	7	7	2	4	2	-	813
-	-	-	1	1	4	1	3	4	6	4	4	814
-	-	-	-	1	-	5	2	7	9	5	4	815
-	-	-	1	2	4	6	5	11	15	9	8	816
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	817
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	818
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	819
1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	820
-	1	2	4	-	5	3	2	1	4	2	-	821
1	1	2	4	1	6	4	5	1	4	3	-	822

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
823	720,721	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	-
824	Spondylitis und Spondylose sowie	Weibl.	8	-	-	-	-	-	-	-
825	verwandte Krankheiten	Insges.	15	-	-	-	-	-	-	-
826	722	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	-
827	Bandscheibenkrankheiten	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
828		Insges.	9	-	-	-	-	-	-	-
829	723	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
830	Sonstige Krankheiten der Zervikal-	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
831	region	Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
832	724	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
833	Sonstige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
834	Krankheiten des Rückens	Insges.	8	-	-	-	-	-	-	-
835	725-729	Männl.	10	-	1	-	-	-	-	-
836	Weichteilrheumatismus, øykl. im	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
837	Rückenbereich	Insges.	15	-	1	-	-	-	-	-
838	730	Männl.	10	-	-	-	-	-	-	-
839	Osteomyelitis, Periostitis und	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
840	sonstige den Knochen betreffende	Insges.	15	-	-	-	-	-	-	-
	Infektionen									
841	731-733	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
842	Alle sonstigen Krankheiten des	Weibl.	17	1	-	-	-	-	-	-
843	Knochens und des Knorpels	Insges.	20	1	-	-	-	-	-	-
844	734-736	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
845	Erworbene Deformitäten der Extre-	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
846	mitäten	Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-
847	737	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
848	Wirbelsäulenverkrümmung	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
849		Insges.	8	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	-	823
-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	1	-	824
-	-	-	-	1	1	1	4	-	4	3	1	-	825
-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	826
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	827
-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	1	-	-	828
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	830
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	831
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	832
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	833
-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	-	-	834
1	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	1	-	835
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	836
1	-	-	-	2	1	-	1	2	3	2	2	-	837
-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	1	-	-	838
-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	839
-	-	-	-	1	3	-	3	2	4	1	1	-	840
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	841
1	-	-	-	1	-	1	1	-	2	6	4	-	842
1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	8	4	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	848
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	849

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
850	738,739	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
851	Sonstige erworbene Deformitäten	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
852	sowie Funktionsstörungen mit segmentaler Reaktion, nicht andernorts klassifizierbar	Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-		
Klasse XIV												
Angeborene Anomalien (740 - 759)												
853	740-742	Männl.	17	15	1	-	-	-	-	-		
854	Angeborene Anomalien des Nervensystems	Weibl.	17	14	1	1	-	-	-	-		
855		Insges.	34	29	2	1	-	-	-	-		
856	743,744	Männl.	1	-	1	-	-	-	-	-		
857	Angeborene Anomalien des Auges,	Weibl.	2	1	-	-	-	-	-	-		
858	des Ohres, des Gesichts und des Halses	Insges.	3	1	1	-	-	-	-	-		
859	745-747	Männl.	141	117	12	1	2	2	-	2		
860	Angeborene Anomalien des Kreislaufsystems	Weibl.	94	69	11	3	1	1	1	2		
861		Insges.	235	186	23	4	3	3	1	4		
862	749	Männl.	1	1	-	-	-	-	-	-		
863	Gaumenspalte und Lippenspalte	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
864		Insges.	1	1	-	-	-	-	-	-		
865	750,751	Männl.	18	13	-	-	-	-	-	-		
866	Sonstige angeborene Anomalien	Weibl.	7	7	-	-	-	-	-	-		
867	des Verdauungssystems	Insges.	25	20	-	-	-	-	-	-		
868	752.5	Männl.	1	-	-	1	-	-	-	-		
869	Ausgebliebener Descensus testicularum	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
870		Insges.	1	-	-	1	-	-	-	-		
871	753	Männl.	10	6	-	-	-	-	-	1		
872	Angeborene Anomalien des Harnsystems	Weibl.	6	3	-	-	-	-	1	-		
873		Insges.	16	9	-	-	-	-	1	1		
874	754-756 (EXKL.754)	Männl.	23	22	-	-	-	-	-	-		
875	Angeborene Anomalien des Muskel-Skelett-Systems	Weibl.	12	9	1	1	-	-	1	-		
876		Insges.	35	31	1	1	-	-	1	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	älter	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	850
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	851
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	852
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	854
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	857
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	858
1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	859
1	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	860
2	-	2	-	1	2	2	1	1	-	-	-	861
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	867
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	872
-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	873
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	874
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	876

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
877	754.3	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
878	Angeborene Hüftluxation	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
879		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
880	748,757-759	Männl.	21	18	2	1	-	-	-	-		
881	Alle sonstigen angeborenen Ano-	Weibl.	27	20	4	-	1	-	-	-		
882	malien	Insges.	48	38	6	1	1	-	-	-		
Klasse XV												
Bestimmte in der Perinatalperiode entstandene Zustände (760 - 779)												
883	761-763	Männl.	14	14	-	-	-	-	-	-		
884	Schädigung des Feten oder Neuge-	Weibl.	4	4	-	-	-	-	-	-		
885	borenen durch Komplikationen der Schwangerschaft und Geburt	Insges.	18	18	-	-	-	-	-	-		
886	764,765	Männl.	259	259	-	-	-	-	-	-		
887	Fetale Wachstumsretardierung,	Weibl.	153	153	-	-	-	-	-	-		
888	Mangelernährung und Unreife	Insges.	412	412	-	-	-	-	-	-		
889	767	Männl.	5	5	-	-	-	-	-	-		
890	Geburtstrauma	Weibl.	3	3	-	-	-	-	-	-		
891		Insges.	8	8	-	-	-	-	-	-		
892	768-770	Männl.	81	81	-	-	-	-	-	-		
893	Hypoxie, Asphyxie und sonstige re-	Weibl.	51	51	-	-	-	-	-	-		
894	spiratorische Krankheitszustände des Feten und Neugeborenen	Insges.	132	132	-	-	-	-	-	-		
895	773,774	Männl.	1	1	-	-	-	-	-	-		
896	Hämolytische Krankheiten des Feten	Weibl.	3	3	-	-	-	-	-	-		
897	und Neugeborenen	Insges.	4	4	-	-	-	-	-	-		
898	776	Männl.	3	3	-	-	-	-	-	-		
899	Hämatologische Krankheiten des	Weibl.	7	7	-	-	-	-	-	-		
900	Feten und Neugeborenen	Insges.	10	10	-	-	-	-	-	-		
901	REST 760-779	Männl.	44	43	1	-	-	-	-	-		
902	Alle sonstigen Zustände, die in der	Weibl.	36	35	1	-	-	-	-	-		
903	Perinatalperiode entstanden sind	Insges.	80	78	2	-	-	-	-	-		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	877
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	878
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	899
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
Klasse XVI												
Symptome, unspezifische abnorme Befunde und ungenau bezeichnete Zustände (780 - 799)												
904	780	Männl.	22	2	2	-	-	-	1	1		
905	Allgemeine Symptome	Weibl.	28	1	1	-	-	-	-	-		
906		Insges.	50	3	3	-	-	-	1	1		
907	784	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
908	Symptome, die Kopf und Hals be-	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
909	treffen	Insges.	6	-	-	-	-	-	-	-		
910	787	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-		
911	Symptome, die das Verdauungs-	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
912	system betreffen	Insges.	5	-	-	-	-	-	-	-		
913	788	Männl.	7	-	-	-	-	-	-	-		
914	Symptome, die das Harnsystem	Weibl.	19	-	-	-	-	-	-	-		
915	betreffen	Insges.	26	-	-	-	-	-	-	-		
916	REST 780-789	Männl.	265	2	-	1	2	2	2	6		
917	Symptome sonstiger und nicht näher	Weibl.	235	-	-	1	-	1	3	2		
918	bezeichneter Organe	Insges.	500	2	-	2	2	3	5	8		
919	790-796	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-		
920	Unspezifische abnorme Befunde	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-		
921		Insges.	6	-	-	-	-	-	-	-		
922	797-799	Männl.	154	6	1	1	2	-	4	1		
923	Ungenau bezeichnete und unbekannte	Weibl.	182	1	1	-	1	1	1	2		
924	Ursachen von Morbidität und Morta-	Insges.	336	7	2	1	3	1	5	3		
	lität											
Klasse XVII												
Verletzungen und Vergiftungen (800 - 999)												
925	801	Männl.	114	-	-	2	1	7	11	8		
926	Schädelbasisfraktur	Weibl.	59	1	1	1	-	3	-	-		
927		Insges.	173	1	1	3	1	10	11	8		
928	802	Männl.	13	-	-	-	1	-	1	1		
929	Gesichtsknochenfraktur	Weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-		
930		Insges.	22	-	-	-	1	-	1	1		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1	1	1	1	2	2	-	1	2	1	4	-	904
3	-	-	-	2	2	4	3	3	4	4	1	905
4	1	1	1	4	4	4	4	5	5	8	1	906
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	907
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	908
-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	909
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	911
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	912
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	1	913
1	-	-	2	2	2	1	5	1	3	1	1	914
1	-	-	2	3	3	1	5	2	3	4	2	915
7	10	6	13	19	31	28	42	15	32	33	14	916
1	4	10	6	16	16	22	36	16	42	36	23	917
8	14	16	19	35	47	50	78	31	74	69	37	918
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	919
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	920
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	921
2	2	4	9	17	15	12	15	12	22	16	13	922
2	6	4	2	7	11	13	14	21	30	39	26	923
4	8	8	11	24	26	25	29	33	52	55	39	924
7	9	4	11	13	14	7	1	5	6	6	2	925
-	3	-	2	2	2	4	3	4	7	13	13	926
7	12	4	13	15	16	11	4	9	13	19	15	927
-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	2	1	928
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	929
-	1	-	2	2	-	-	1	2	2	4	5	930

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
931	800,803,804	Männl.	160	-	4	4	2	10	14	14
932	Sonstige Frakturen des Schädels	Weibl.	66	-	2	1	2	1	3	1
933		Insges.	226	-	6	5	4	11	17	15
934	805,806	Männl.	37	-	-	1	-	2	2	1
935	Fraktur der Wirbelsäule	Weibl.	24	-	-	-	-	-	1	1
936		Insges.	61	-	-	1	-	2	3	2
937	807-809	Männl.	80	-	-	-	-	-	1	4
938	Sonstige Frakturen von Hals und Rumpf	Weibl.	89	-	-	-	-	2	-	1
939		Insges.	169	-	-	-	-	2	1	5
940	810,811	Männl.	4	-	-	-	-	-	-	-
941	Klavikula- und Skapulafraktur	Weibl.	8	-	-	-	-	1	-	-
942		Insges.	12	-	-	-	-	1	-	-
943	812	Männl.	23	-	-	-	-	-	1	-
944	Humerusfraktur	Weibl.	108	-	1	-	-	-	1	-
945		Insges.	131	-	1	-	-	-	2	-
946	813	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
947	Radius- und Ulnafraktur	Weibl.	29	-	-	-	-	-	-	-
948		Insges.	32	-	-	-	-	-	-	-
949	814-819	Männl.	4	-	-	-	-	1	-	-
950	Sonstige Frakturen der oberen Extremitäten	Weibl.	7	-	-	-	-	-	-	1
951		Insges.	11	-	-	-	-	1	-	1
952	820	Männl.	449	-	-	-	-	-	-	1
953	Schenkelhalsfraktur	Weibl.	1692	-	1	1	-	-	-	-
954		Insges.	2141	-	1	1	-	-	-	1
955	821	Männl.	76	1	-	-	-	3	1	2
956	Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneten Teile des Femurs	Weibl.	223	-	-	-	-	-	-	-
957		Insges.	299	1	-	-	-	3	1	2
958	822	Männl.	6	-	-	-	-	-	-	-
959	Patellafraktur	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-
960		Insges.	16	-	-	-	-	-	-	-

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
13	7	4	14	23	12	8	8	2	8	4	9	931
3	4	-	2	-	3	7	6	7	8	7	9	932
16	11	4	16	23	15	15	14	9	16	11	18	933
1	3	2	2	3	5	2	-	4	1	7	1	934
-	1	-	-	-	1	-	1	3	5	3	8	935
1	4	2	2	3	6	2	1	7	6	10	9	936
1	2	2	4	2	8	6	9	4	10	17	10	937
1	-	1	-	3	1	3	6	7	18	14	32	938
2	2	3	4	5	9	9	15	11	28	31	42	939
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	940
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	941
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	3	942
-	-	-	-	-	1	1	3	-	6	6	5	943
-	-	-	-	3	-	2	4	5	26	31	35	944
-	-	-	-	3	1	3	7	5	32	37	40	945
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	946
-	-	-	-	1	1	1	1	-	5	8	12	947
-	-	-	-	1	1	1	1	-	5	10	13	948
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	949
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	950
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	2	2	951
-	4	2	1	6	12	13	20	31	84	122	153	952
1	2	-	4	1	7	18	63	85	296	524	689	953
1	6	2	5	7	19	31	83	116	380	646	842	954
1	1	-	-	4	3	4	5	1	15	11	24	955
-	-	1	-	1	3	7	4	19	34	77	77	956
1	1	1	-	5	6	11	9	20	49	88	101	957
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	958
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	959
1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	4	960

1 Stationäre
1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach
1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
961	823	Männl.	19	-	-	-	-	-	-	1
962	Tibia- und Fibulafraktur	Weibl.	46	-	-	-	-	-	-	-
963		Insges.	65	-	-	-	-	-	-	1
964	824	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	-
965	Knöchelfraktur	Weibl.	34	-	-	-	-	-	-	-
966		Insges.	43	-	-	-	-	-	-	-
967	825-829	Männl.	21	-	-	-	-	1	-	3
968	Sonstige Frakturen der unteren	Weibl.	15	-	-	-	-	1	-	1
969	Extremitäten	Insges.	36	-	-	-	-	2	-	4
970	831	Männl.	2	-	-	-	-	-	1	-
971	Schultergelenkluxation, inkl. Skapula	Weibl.	6	-	-	-	-	-	-	-
972		Insges.	8	-	-	-	-	-	1	-
973	836	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
974	Kniegelenkluxation	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
975		Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
976	830,832-835,837-	Männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
977	Sonstige Luxationen	Weibl.	6	-	-	-	-	-	-	-
978		Insges.	11	-	-	-	-	-	-	-
979	844,845	Männl.	4	-	-	-	-	-	1	-
980	Verstauchung und Zerrung des Knies,	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
981	Unterschenkels, Knöchels und Fußes	Insges.	9	-	-	-	-	-	1	-
982	840-843,846-848	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
983	Verstauchung und Zerrung sonstiger	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
984	Gelenke und angrenzender Muskeln	Insges.	7	-	-	-	-	-	-	-
985	850	Männl.	90	1	-	-	1	6	4	3
986	Gehirnerschütterung	Weibl.	77	-	-	-	-	1	1	-
987		Insges.	167	1	-	-	1	7	5	3
988	851-854	Männl.	300	-	3	9	6	21	21	23
989	Sonstige intrakranielle Verletzung,	Weibl.	122	1	2	5	1	8	4	1
990	exkl. mit Schädelfraktur	Insges.	422	1	5	14	7	29	25	24

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	1	4	2	1	3	2	4	1	-	961
-	-	1	1	1	2	3	6	1	7	11	13	962
-	-	1	2	5	4	4	9	3	11	12	13	963
1	1	-	1	1	2	-	-	-	2	1	-	964
-	-	-	-	1	-	3	2	7	6	6	9	965
1	1	-	1	2	2	3	2	7	8	7	9	966
3	1	-	-	4	3	3	-	-	-	2	1	967
1	1	-	-	3	-	2	-	1	-	3	2	968
4	2	-	-	7	3	5	-	1	-	5	3	969
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	971
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	975
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	976
-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	-	977
-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	5	-	978
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	979
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	980
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	3	981
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	982
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	983
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	984
1	3	3	6	2	8	5	7	5	10	12	13	985
-	-	1	1	3	-	1	3	8	18	17	23	986
1	3	4	7	5	8	6	10	13	28	29	36	987
21	19	22	26	32	21	14	13	9	19	15	6	988
8	5	4	5	9	7	6	11	8	16	19	2	989
29	24	26	31	41	28	20	24	17	35	34	8	990

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
991	860-869	Männl.	102	-	2	2	1	13	7	6
992	Innere Verletzung des Thorax, Ab-	Weibl.	27	-	1	1	2	1	-	-
993	domens und Beckens	Insges.	129	-	3	3	3	14	7	6
994	870,871	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
995	Offene Wunde der Augenanhangs-	Weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
996	gebilde und des Augapfels	Insges.	5	-	-	-	-	-	-	-
997	872,873	Männl.	5	-	-	-	-	-	-	1
998	Offene Wunde des Ohres und	Weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-
999	sonstige offene Wunden des Kopfes	Insges.	20	-	-	-	-	-	-	1
1000	874-879	Männl.	5	1	-	-	-	-	1	-
1001	Offene Wunde des Halses und	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	und Rumpfes	Insges.	5	1	-	-	-	-	1	-
1003	880-887	Männl.	10	-	-	-	-	1	-	-
1004	Offene Wunde der oberen Extremi-	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
1005	täten	Insges.	15	-	-	-	-	1	-	-
1006	890-897	Männl.	5	-	-	1	-	-	-	-
1007	Offene Wunde der unteren Extremitä-	Weibl.	14	-	-	-	-	-	-	-
1008	ten	Insges.	19	-	-	1	-	-	-	-
1009	900-904	Männl.	14	-	-	-	-	-	1	-
1010	Verletzung der Blutgefäße	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
1011		Insges.	19	-	-	-	-	-	1	-
1012	905-909	Männl.	8	-	-	-	-	-	1	-
1013	Spätfolgen von Verletzungen,	Weibl.	12	-	-	1	-	-	-	-
1014	Vergiftungen, toxischen Wirkungen und sonstigen äußeren Ursachen	Insges.	20	-	-	1	-	-	1	-
1015	910-919	Männl.	4	1	-	-	-	-	-	-
1016	Oberflächliche Verletzung	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
1017		Insges.	8	1	-	-	-	-	-	-
1018	920,922-924	Männl.	33	-	-	-	-	1	1	1
1019	Sonstige Kontusion ohne Hautver-	Weibl.	61	-	-	-	-	-	-	-
1020	letzung	Insges.	94	-	-	-	-	1	1	1

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
8	7	3	12	5	7	8	5	4	5	4	3	991
3	1	1	3	2	4	-	1	-	3	2	2	992
11	8	4	15	7	11	8	6	4	8	6	5	993
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	994
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	995
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	996
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	997
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	6	998
1	-	-	-	-	1	-	-	3	3	5	6	999
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1001
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1002
-	1	-	1	1	-	2	-	-	4	-	-	1003
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1004
-	1	-	2	1	-	3	-	-	5	2	-	1005
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1006
-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	3	2	1007
-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	4	2	1008
1	-	-	1	2	4	1	1	-	2	1	-	1009
1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1010
2	-	-	2	3	4	1	1	1	3	1	-	1011
1	1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1012
-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	3	1013
1	1	-	-	1	4	-	3	3	-	1	4	1014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1017
1	1	-	1	1	1	-	-	3	4	5	13	1018
-	-	-	1	1	-	-	2	7	9	19	22	1019
1	1	-	2	2	1	-	2	10	13	24	35	1020

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1021	925-929	Männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
1022	Quetschwunde	Weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-
1023		Insges.	15	-	-	-	-	-	-	-
1024	930-939	Männl.	15	-	3	-	-	-	-	-
1025	Folgen des Eindringens eines Fremd-	Weibl.	12	1	2	-	-	-	-	-
1026	körpers in eine Körperöffnung	Insges.	27	1	5	-	-	-	-	-
1027	940	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
1028	Verbrennung oder Verätzung, be-	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
1029	grenzt auf das Auge und die Augen-	Insges.	3	-	-	-	-	-	-	-
	anhangsgebilde									
1030	941-949	Männl.	61	1	4	-	-	2	4	5
1031	Verbrennungen oder Verätzungen	Weibl.	44	-	3	3	-	1	2	1
1032	sonstiger Körperteile oder Organe	Insges.	105	1	7	3	-	3	6	6
1033	950-957	Männl.	13	-	-	-	-	-	-	-
1034	Verletzung der Nerven und des	Weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-
1035	Rückenmarks	Insges.	22	-	-	-	-	-	-	-
1036	958,959	Männl.	60	-	2	2	-	6	8	3
1037	Bestimmte traumatische Komplika-	Weibl.	38	-	-	-	-	1	2	1
1038	tionen und nicht näher bezeichne-	Insges.	98	-	2	2	-	7	10	4
	te Verletzungen									
1039	965	Männl.	3	-	-	-	-	-	1	1
1040	Vergiftung durch Analgetika, Anti-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	pyretika und Antirheumatika	Insges.	3	-	-	-	-	-	1	1
1042	967 (EXKL.967.0)	Männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
1043	Vergiftung durch Sedativa und Hyp-	Weibl.	14	-	-	-	-	-	1	-
1044	notika	Insges.	16	-	-	-	-	-	1	-
1045	967.0	Männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
1046	Vergiftung durch Babilurate	Weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
1047		Insges.	7	-	-	-	-	-	-	-
1048	969	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	-
1049	Vergiftung durch Psychopharmaka	Weibl.	24	-	1	-	-	-	2	2
1050		Insges.	33	-	1	-	-	-	2	2

Morbidität

Altersgruppen und Diagnosen

hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1021
-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	1	1022
-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	5	1	1023
-	2	-	1	2	-	1	2	1	2	-	1	1024
-	-	-	-	1	-	-	4	2	-	1	1	1025
-	2	-	1	3	-	1	6	3	2	1	2	1026
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1028
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1029
3	3	2	6	8	3	1	2	1	5	8	3	1030
-	1	-	2	2	1	3	-	4	7	6	8	1031
3	4	2	8	10	4	4	2	5	12	14	11	1032
2	-	1	-	2	3	1	1	1	1	1	-	1033
-	1	-	1	1	-	-	3	1	-	2	-	1034
2	1	1	1	3	3	1	4	2	1	3	-	1035
2	1	2	3	1	9	2	7	1	7	3	1	1036
1	2	3	3	2	1	1	4	4	3	7	3	1037
3	3	5	6	3	10	3	11	5	10	10	4	1038
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1039
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1042
-	-	-	2	-	-	2	2	3	3	1	-	1043
-	-	-	2	-	-	2	2	3	3	3	-	1044
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1045
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1046
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	-	1047
-	1	-	1	1	1	1	2	-	1	1	-	1048
-	-	1	3	2	2	2	4	-	4	-	1	1049
-	1	1	4	3	3	3	6	-	5	1	1	1050

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
1051	960-964,966,968,	Männl.	18	-	-	-	-	-	1	1		
1052	Vergiftung durch sonstige Drogen,	Weibl.	25	-	-	-	-	1	1	1		
1053	Arzneimittel und biologisch aktive Stoffe	Insges.	43	-	-	-	-	1	2	2		
1054	980	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
1056	Toxische Wirkung von Alkohol	Weibl.	3	-	-	-	-	-	1	-		
1056		Insges.	4	-	-	-	-	-	1	-		
1057	986	Männl.	9	-	-	-	-	-	-	1		
1058	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	Weibl.	15	-	-	-	-	-	-	1		
1059		Insges.	24	-	-	-	-	-	-	2		
1060	981-985,987-989	Männl.	11	-	-	-	-	-	-	2		
1061	Toxische Wirkung von sonstigen	Weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-		
1062	vorwiegend medizinisch nichtge- bräuchlichen Substanzen	Insges.	20	-	-	-	-	-	-	2		
1063	990-995	Männl.	34	-	2	3	-	3	-	1		
1064	Sonstige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	17	-	2	-	-	-	-	-		
1065	Folgen äußerer Ursachen	Insges.	51	-	4	3	-	3	-	1		
1066	996-999	Männl.	116	1	3	1	1	-	2	3		
1067	Nicht anderenorts klassifizierte	Weibl.	112	4	1	-	-	-	2	1		
1068	Komplikationen bei der chirurgischen und medizinischen Behandlung	Insges.	228	5	4	1	1	-	4	4		
V-Klassifikation												
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (V01 - V82)												
1069	V01-V07	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
1070	Potentielle Gesundheitsgefährdung	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
1071	hinsichtlich übertragbarer Krankheiten	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-		
1072	V22,V23,V28	Männl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
1073	Schwangerenbetreuung und -beo- achtung	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-		
1074		Insges.	2	-	-	-	-	-	-	-		
1076	REST V10-V49	Männl.	8	-	-	-	-	-	-	-		
1076	Sonstige potentielle Gesundheitsge- fährdungen sowie Gesundheitsbe- einträchtigungen	Weibl.	7	1	-	-	-	1	-	1		
1077		Insges.	15	1	-	-	-	1	-	1		

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	2	-	4	2	-	1	-	2	3	1	1	1051
1	3	1	2	4	1	1	2	2	2	3	-	1052
1	5	1	6	6	1	2	2	4	5	4	1	1053
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1054
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1055
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1056
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1057
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	2	1058
-	-	1	-	-	1	1	1	2	5	8	3	1059
2	-	1	3	-	-	1	1	-	1	-	-	1060
1	-	3	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1061
3	-	4	3	1	-	1	1	-	3	1	1	1062
-	-	2	-	3	1	3	6	2	-	5	3	1063
-	1	1	-	3	1	1	2	1	2	2	1	1064
-	1	3	-	6	2	4	8	3	2	7	4	1065
1	-	4	4	11	14	17	25	9	12	7	1	1066
2	3	2	1	16	7	11	21	4	20	15	2	1067
3	3	6	5	27	21	28	46	13	32	22	3	1068
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1069
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1071
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1072
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1073
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1074
1	-	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1075
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1076
1	1	2	1	1	2	-	2	1	-	1	-	1077

1.1 Krankenhausabgänge 1989 absolut nach

1.1.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1078	V56	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	Nachbehandlung durch intermittie-	Weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
1080	rende Dialyse	Insges.	1	-	-	-	-	-	-	-
1081	V50-V55,V57-V59	Männl.	10	-	-	-	-	-	1	-
1082	Nachsorge, Prothetik, plastische	Weibl.	25	-	-	-	-	-	-	-
1083	Chirurgie sowie Spender	Insges.	35	-	-	-	-	-	1	-
1084	V60-V68	Männl.	25	1	-	-	-	-	-	-
1085	Sonstige Inanspruchnahmedes Ge-	Weibl.	86	-	-	-	-	-	-	-
1086	sundheitswesens	Insges.	111	1	-	-	-	-	-	-
1087	V70-V72	Männl.	3	-	-	1	-	-	-	-
1088	Allgemeine und spezielle ärztliche	Weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
1089	Untersuchungen und Beobachtungen	Insges.	8	-	-	1	-	-	-	-
	ohne angegebene Diagnose									

Morbidität
Altersgruppen und Diagnosen
hausabgänge durch Tod

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1078
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1079
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1080
-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	-	1	1	1081
-	-	1	1	1	1	3	1	5	4	4	4	4	1082
-	-	1	3	3	1	4	2	6	5	4	5	5	1083
-	-	-	-	2	2	-	1	4	1	7	7	7	1084
-	-	-	-	-	-	2	4	4	11	34	31	31	1085
-	-	-	-	2	2	2	5	8	12	41	38	38	1086
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1087
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1088
-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1089

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
1	KLASSE I (001-139)	1987	25 033	2 970	6 672	2 859	868	1 272	1 722	1 409	1 018
2		1988	23 500	2 966	5 345	2 394	912	1 235	1 745	1 472	1 157
3		1989	20 166	2 817	4 113	1 535	792	941	1 422	1 360	992
Weiblich											
4		1987	21 515	2 501	4 367	1 893	748	1 736	1 896	1 270	810
5		1988	21 185	2 547	3 880	1 712	761	1 521	1 945	1 373	938
6		1989	18 513	2 314	3 051	1 233	760	1 267	1 650	1 274	813
Insgesamt											
7		1987	46 548	5 471	11 039	4 752	1 616	3 008	3 618	2 679	1 828
8		1988	44 685	5 513	9 225	4 106	1 673	2 756	3 690	2 845	2 095
9		1989	38 679	5 131	7 164	2 768	1 552	2 208	3 072	2 634	1 805
Männlich											
10	KLASSE II A (140-208)	1987	63 091	72	379	370	274	762	1 590	1 732	1 703
11		1988	65 576	77	362	432	273	828	1 315	1 800	1 792
12		1989	67 507	70	386	442	297	726	1 304	1 790	1 734
Weiblich											
13		1987	86 867	75	301	295	221	721	1 075	1 261	2 097
14		1988	89 520	85	356	273	204	497	963	1 411	2 262
15		1989	91 665	70	300	288	279	505	989	1 707	2 409
Insgesamt											
16		1987	149 958	147	680	665	495	1 483	2 665	2 993	3 800
17		1988	155 096	162	718	705	477	1 325	2 278	3 211	4 054
18		1989	159 172	140	686	730	576	1 231	2 293	3 497	4 143
Männlich											
19	KLASSE II B (210-239)	1987	14 144	152	408	473	442	619	689	681	757
20		1988	14 485	145	420	490	493	576	698	600	707
21		1989	14 612	152	378	535	528	576	632	735	668
Weiblich											
22		1987	47 527	187	366	464	433	993	2 063	3 247	3 914
23		1988	49 008	178	372	464	487	1 024	2 164	3 334	4 002
24		1989	48 282	182	429	506	498	966	1 933	3 238	3 960
Insgesamt											
25		1987	61 671	339	774	937	875	1 612	2 752	3 928	4 671
26		1988	63 493	323	792	954	980	1 600	2 862	3 934	4 709
27		1989	62 894	334	807	1 041	1 026	1 542	2 565	3 973	4 628

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
797	649	983	894	883	601	421	345	371	219	80	1
876	611	960	892	847	646	510	294	363	194	81	2
871	585	878	957	902	667	469	235	343	201	86	3
611	532	893	759	628	612	515	546	621	392	185	4
636	541	815	851	758	581	635	466	673	400	152	5
673	502	750	844	629	573	620	380	620	397	163	6
1 408	1 181	1 876	1 653	1 511	1 213	936	891	992	611	265	7
1 512	1 152	1 775	1 743	1 605	1 227	1 145	760	1 036	594	233	8
1 544	1 087	1 628	1 801	1 531	1 240	1 089	615	963	598	249	9
1 650	2 129	4 970	6 824	8 933	7 775	7 297	6 471	6 304	2 990	866	10
1 891	1 983	5 124	7 177	9 442	8 608	8 211	5 778	6 388	3 228	867	11
2 009	1 850	5 054	7 831	9 293	9 787	8 989	5 060	6 647	3 146	1 092	12
3 029	3 957	8 034	9 391	10 060	10 837	10 318	9 443	9 406	4 624	1 722	13
3 127	3 976	8 580	9 900	10 017	10 824	12 250	8 329	9 703	4 971	1 792	14
3 460	3 863	8 474	10 397	10 000	11 216	13 517	7 378	9 821	5 132	1 860	15
4 679	6 086	13 004	16 215	18 993	18 612	17 615	15 914	15 710	7 614	2 588	16
5 018	5 959	13 704	17 077	19 459	19 432	20 461	14 107	16 091	8 199	2 659	17
5 469	5 713	13 528	18 228	19 293	21 003	22 506	12 438	16 468	8 278	2 952	18
679	762	1 329	1 444	1 593	1 209	965	750	725	351	116	19
747	748	1 416	1 584	1 603	1 343	985	662	766	370	132	20
831	707	1 307	1 595	1 577	1 507	1 062	589	713	401	119	21
4 536	6 453	9 490	5 550	2 600	2 016	1 785	1 421	1 201	593	215	22
5 021	6 143	9 709	5 870	2 683	2 015	2 031	1 247	1 338	644	282	23
5 186	5 688	9 436	6 045	2 601	2 120	2 225	1 023	1 334	632	280	24
5 215	7 215	10 819	6 994	4 193	3 225	2 750	2 171	1 926	944	331	25
5 768	6 891	11 125	7 454	4 286	3 358	3 016	1 909	2 104	1 014	414	26
6 017	6 395	10 743	7 640	4 178	3 627	3 287	1 612	2 047	1 033	399	27

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
28	KLASSE III (240-279)	1987	25 660	428	461	644	820	832	893	1 073	1 351
29		1988	26 276	387	473	665	863	790	929	1 098	1 489
30		1989	26 344	370	428	654	958	826	886	1 110	1 321
Weiblich											
31		1987	53 450	326	442	637	825	1 270	2 180	2 603	2 748
32		1988	53 339	294	453	629	886	1 264	1 970	2 466	2 767
33		1989	51 432	328	426	632	993	1 127	1 931	2 604	2 534
Insgesamt											
34		1987	79 110	754	903	1 281	1 645	2 102	3 073	3 676	4 099
35		1988	79 615	681	926	1 294	1 749	2 054	2 899	3 564	4 256
36		1989	77 776	698	854	1 286	1 951	1 953	2 817	3 714	3 855
Männlich											
37	KLASSE IV (280-289)	1987	8 824	349	933	2 043	790	424	330	418	173
38		1988	8 791	324	971	1 879	864	486	341	332	242
39		1989	8 728	338	861	1 641	925	442	282	329	279
Weiblich											
40		1987	10 172	218	509	994	616	462	396	316	314
41		1988	10 169	254	538	998	656	450	353	299	321
42		1989	10 345	235	550	1 021	699	445	351	331	322
Insgesamt											
43		1987	18 996	567	1 442	3 037	1 406	886	726	734	487
44		1988	18 960	578	1 509	2 877	1 520	936	694	631	563
45		1989	19 073	573	1 411	2 662	1 624	887	633	660	601
Männlich											
46	KLASSE V (290-319)	1987	51 623	123	904	2 627	1 209	1 925	4 029	5 889	7 502
47		1988	53 342	135	919	2 499	1 340	1 813	3 854	6 223	7 617
48		1989	53 651	156	799	2 474	1 374	1 549	3 585	6 157	7 645
Weiblich											
49		1987	41 715	97	700	1 396	763	1 823	2 868	3 706	4 207
50		1988	41 636	94	641	1 372	773	1 778	2 742	3 795	4 267
51		1989	42 218	96	620	1 315	813	1 645	2 639	3 845	4 533
Insgesamt											
52		1987	93 338	220	1 604	4 023	1 972	3 748	6 897	9 595	11 709
53		1988	94 978	229	1 560	3 871	2 113	3 591	6 596	10 018	11 884
54		1989	95 869	252	1 419	3 789	2 187	3 194	6 224	10 002	12 178

Morbidität

nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1 677	1 533	2 664	3 013	2 773	2 122	1 697	1 437	1 399	681	162	28
1 719	1 524	2 614	3 242	2 975	2 116	1 861	1 240	1 412	692	187	29
1 777	1 536	2 444	3 377	3 058	2 416	1 913	1 110	1 295	665	200	30
2 794	2 606	4 277	4 871	4 844	4 939	5 442	5 094	4 831	2 035	686	31
3 033	2 587	4 297	4 980	4 573	4 927	5 812	4 452	4 843	2 406	700	32
2 982	2 358	3 868	4 903	4 505	4 569	6 198	3 741	4 694	2 340	699	33
4 471	4 139	6 941	7 884	7 617	7 061	7 139	6 531	6 230	2 716	848	34
4 752	4 111	6 911	8 222	7 548	7 043	7 673	5 692	6 255	3 098	887	35
4 759	3 894	6 312	8 280	7 563	6 985	8 111	4 851	5 989	3 005	899	36
170	160	368	327	419	324	337	335	498	310	116	37
206	120	307	363	395	375	405	285	424	342	130	38
212	147	303	346	454	409	490	298	440	370	162	39
274	350	597	540	389	528	663	869	1 088	692	357	40
319	305	558	448	415	482	780	692	1 096	814	391	41
350	270	567	561	431	542	689	578	1 127	858	418	42
444	510	965	867	808	852	1 000	1 204	1 586	1 002	473	43
525	425	865	811	810	857	1 185	977	1 520	1 156	521	44
562	417	870	907	885	951	1 179	876	1 567	1 228	580	45
6 305	4 863	6 232	4 460	2 809	1 200	577	384	327	181	77	46
7 233	4 842	6 153	4 915	2 896	1 295	691	302	324	202	89	47
7 903	4 675	6 151	5 109	3 044	1 479	679	279	295	201	97	48
3 942	3 855	5 104	3 846	2 771	2 022	1 585	1 257	1 004	516	253	49
4 312	3 577	5 017	3 942	2 737	1 885	1 783	1 027	1 072	569	253	50
4 820	3 408	5 000	4 208	2 738	1 995	1 822	874	1 052	537	258	51
10 247	8 718	11 336	8 306	5 580	3 222	2 162	1 641	1 331	697	330	52
11 545	8 419	11 170	8 857	5 633	3 180	2 474	1 329	1 396	771	342	53
12 723	8 083	11 151	9 317	5 782	3 474	2 501	1 153	1 347	738	355	54

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
55	KLASSE VI (320-389)	1987	47 022	2 518	6 012	3 748	1 732	1 743	2 210	2 228	2 302
56		1988	48 701	2 668	6 389	4 154	1 885	1 698	2 145	2 278	2 437
57		1989	48 833	2 438	6 031	4 070	1 983	1 527	1 882	2 446	2 391
Weiblich											
58		1987	49 271	2 030	4 684	3 038	1 381	1 605	1 867	1 911	1 985
59		1988	50 803	2 081	5 132	3 260	1 524	1 481	1 683	1 995	2 110
60		1989	51 200	1 915	4 773	3 323	1 557	1 529	1 542	1 985	2 209
Insgesamt											
61		1987	96 293	4 548	10 696	6 786	3 113	3 348	4 077	4 139	4 287
62		1988	99 504	4 749	11 521	7 414	3 409	3 179	3 828	4 273	4 547
63		1989	100 033	4 353	10 804	7 393	3 540	3 056	3 424	4 431	4 600
Männlich											
64	KLASSE VII (390-459)	1987	135 038	209	174	256	799	1 298	1 494	2 006	2 921
65		1988	136 617	208	211	300	969	1 308	1 628	2 243	2 904
66		1989	139 039	218	258	350	1 072	1 323	1 529	2 186	2 894
Weiblich											
67		1987	135 377	159	152	230	335	760	1 100	1 865	2 835
68		1988	134 751	166	151	298	401	712	1 143	1 931	2 839
69		1989	133 402	130	142	277	385	682	1 074	1 962	2 989
Insgesamt											
70		1987	270 415	368	326	486	1 134	2 058	2 594	3 871	5 756
71		1988	271 368	374	362	598	1 370	2 020	2 771	4 174	5 743
72		1989	272 441	348	400	627	1 457	2 005	2 603	4 148	5 883
Männlich											
73	KLASSE VIII (710-739)	1987	118 270	11 987	36 197	14 155	3 202	3 611	3 957	3 790	3 325
74		1988	120 901	12 155	37 501	14 347	3 240	3 353	3 707	3 971	3 369
75		1989	114 632	10 407	34 534	14 630	3 674	3 111	3 367	3 796	3 428
Weiblich											
76		1987	89 602	8 256	25 609	11 216	3 086	4 375	3 577	3 118	2 681
77		1988	92 621	8 165	27 407	11 429	3 355	4 095	3 408	3 281	2 706
78		1989	87 633	6 988	25 030	11 763	3 698	3 557	3 093	3 356	2 664
Insgesamt											
79		1987	207 872	20 243	61 806	25 371	6 288	7 986	7 534	6 908	6 006
80		1988	213 522	20 320	64 908	25 776	6 595	7 448	7 115	7 252	6 075
81		1989	202 265	17 395	59 564	26 393	7 372	6 668	6 460	7 152	6 092

Morbidität

nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2 114	2 190	3 381	3 272	3 306	2 477	2 115	1 860	2 154	1 182	478	55
2 348	2 020	3 405	3 423	3 299	2 701	2 406	1 745	2 071	1 179	450	56
2 511	1 871	3 351	3 659	3 538	3 030	2 686	1 549	2 062	1 302	506	57
1 972	2 021	3 204	3 044	2 914	3 067	3 326	3 696	4 126	2 482	918	58
2 099	1 873	3 233	3 134	2 950	3 010	3 862	3 317	4 392	2 609	1 058	59
2 232	1 793	3 201	3 514	2 938	3 099	4 221	2 885	4 521	2 806	1 157	60
4 086	4 211	6 585	6 316	6 220	5 544	5 441	5 556	6 280	3 664	1 396	61
4 447	3 893	6 638	6 557	6 249	5 711	6 268	5 062	6 463	3 788	1 508	62
4 743	3 664	6 552	7 173	6 476	6 129	6 907	4 434	6 583	4 108	1 663	63
3 872	5 662	12 245	16 092	20 160	16 448	11 902	12 340	14 304	8 930	3 926	64
4 286	5 390	12 127	16 815	20 234	17 168	13 138	10 370	14 211	9 060	4 047	65
4 583	5 137	11 578	17 706	20 800	19 381	14 328	8 833	13 564	9 057	4 242	66
3 661	4 704	8 220	9 519	10 485	10 479	12 466	17 383	23 621	17 259	10 144	67
3 904	4 417	8 636	9 921	10 147	10 246	14 053	14 734	23 457	17 210	10 385	68
4 166	4 182	8 257	10 395	10 012	10 483	14 912	12 346	22 773	17 543	10 692	69
7 533	10 366	20 465	25 611	30 645	26 927	24 368	29 723	37 925	26 189	14 070	70
8 190	9 807	20 763	26 736	30 381	27 414	27 191	25 104	37 668	26 270	14 432	71
8 749	9 319	19 835	28 101	30 812	29 864	29 240	21 179	36 337	26 600	14 934	72
2 708	2 533	4 345	4 895	5 735	4 254	3 154	3 189	3 717	2 365	1 151	73
2 896	2 459	4 365	5 043	5 827	4 763	3 566	2 783	3 865	2 504	1 187	74
3 200	2 269	4 123	5 024	5 560	4 902	3 421	2 169	3 404	2 411	1 202	75
2 191	2 152	3 046	2 675	2 498	2 323	2 282	2 727	3 568	2 542	1 680	76
2 271	2 032	3 135	2 900	2 672	2 369	2 535	2 422	3 676	2 884	1 879	77
2 530	1 748	2 982	2 963	2 608	2 231	2 603	1 925	3 421	2 704	1 769	78
4 899	4 685	7 391	7 570	8 233	6 577	5 436	5 916	7 285	4 907	2 831	79
5 167	4 491	7 500	7 943	8 499	7 132	6 101	5 205	7 541	5 388	3 066	80
5 730	4 017	7 105	7 987	8 168	7 133	6 024	4 094	6 825	5 115	2 971	81

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
82	KLASSE IX (520-579)	1987	159 302	7 285	9 994	8 899	5 864	6 020	7 698	8 511	9 733
83		1988	159 162	7 215	10 197	9 339	6 405	5 585	7 164	8 654	9 565
84		1989	153 563	6 742	10 367	9 029	6 468	5 177	6 419	8 086	8 840
Weiblich											
85		1987	158 171	4 013	6 357	7 653	6 075	8 924	8 874	8 535	8 504
86		1988	155 965	4 129	6 485	7 960	5 898	8 015	8 595	8 333	8 389
87		1989	149 385	3 725	6 553	7 431	6 081	7 446	7 836	8 184	8 006
Insgesamt											
88		1987	317 473	11 298	16 351	16 552	11 939	14 944	16 572	17 046	18 237
89		1988	315 127	11 344	16 682	17 299	12 303	13 600	15 759	16 987	17 954
90		1989	302 948	10 467	16 920	16 460	12 549	12 623	14 255	16 270	16 846
Männlich											
91	KLASSE X (580-629)	1987	54 755	1 042	5 505	4 486	2 019	1 844	2 222	2 065	1 962
92		1988	54 879	1 150	5 171	4 606	2 142	1 776	2 044	2 084	2 058
93		1989	53 042	1 185	5 322	4 425	2 106	1 637	1 798	1 896	1 832
Weiblich											
94		1987	175 165	956	2 587	3 307	1 494	6 342	16 175	18 836	15 800
95		1988	176 936	875	2 422	3 083	1 480	6 045	15 359	19 712	15 635
96		1989	172 525	907	2 439	2 676	1 540	5 390	13 940	19 244	15 751
Insgesamt											
97		1987	229 920	1 998	8 092	7 793	3 513	8 186	18 397	20 901	17 762
98		1988	231 815	2 025	7 593	7 689	3 622	7 821	17 403	21 796	17 693
99		1989	225 567	2 092	7 761	7 101	3 646	7 027	15 738	21 140	17 583
Männlich											
100	KLASSE XI (630-679)	1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101		1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102		1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiblich											
103		1987	400 426	-	-	-	184	39 601	*****	52 638	
104		1988	384 419	-	-	-	181	35 724	*****	50 885	
105		1989	355 065	-	-	-	164	30 601	*****	47 505	
Insgesamt											
106		1987	400 426	-	-	-	184	39 601	*****	52 638	
107		1988	384 419	-	-	-	181	35 724	*****	50 885	
108		1989	355 065	-	-	-	164	30 601	*****	47 505	

Morbidität

nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
9 296	8 995	14 702	14 348	13 389	10 167	7 367	6 427	6 089	3 332	1 186	82
9 854	8 513	14 014	14 882	13 383	10 543	8 046	5 277	6 006	3 277	1 243	83
9 883	7 638	12 780	14 913	12 882	11 137	8 563	4 373	5 919	3 140	1 207	84
7 596	7 466	11 915	12 291	12 119	10 703	10 244	9 083	9 596	5 596	2 627	85
8 290	6 661	11 715	12 531	11 685	10 520	10 966	7 684	9 549	5 837	2 723	86
8 091	6 136	10 739	12 650	11 067	10 308	11 186	6 406	8 970	5 808	2 762	87
16 892	16 461	26 617	26 639	25 508	20 870	17 611	15 510	15 685	8 928	3 813	88
18 144	15 174	25 729	27 413	25 068	21 063	19 012	12 961	15 555	9 114	3 966	89
17 974	13 774	23 519	27 563	23 949	21 445	19 749	10 779	14 889	8 948	3 969	90
1 901	1 854	3 508	3 635	4 514	4 375	3 958	3 687	3 750	1 779	649	91
1 907	1 841	3 321	3 944	4 366	4 519	4 416	3 266	3 707	1 877	684	92
2 009	1 568	3 121	3 897	4 291	4 657	4 541	2 642	3 535	1 903	677	93
13 665	14 079	26 786	24 934	10 334	6 017	4 838	3 856	3 221	1 433	505	94
14 389	13 456	26 659	27 016	10 463	6 128	5 452	3 356	3 333	1 509	564	95
14 895	12 183	25 006	27 833	10 718	6 053	5 706	2 787	3 312	1 554	591	96
15 566	15 933	30 294	28 569	14 848	10 392	8 796	7 543	6 971	3 212	1 154	97
16 296	15 297	29 980	30 960	14 829	10 647	9 868	6 622	7 040	3 386	1 248	98
16 904	13 751	28 127	31 730	15 009	10 710	10 247	5 429	6 847	3 457	1 268	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
23 802	6 588	1 178	190	-	-	-	-	-	-	-	103
23 992	5 928	1 073	194	-	-	-	-	-	-	-	104
23 706	5 685	890	174	-	-	-	-	-	-	-	105
23 802	6 588	1 178	190	-	-	-	-	-	-	-	106
23 992	5 928	1 073	194	-	-	-	-	-	-	-	107
23 706	5 685	890	174	-	-	-	-	-	-	-	108

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
109	KLASSE XII (680-709)	1987	25 376	1 174	1 897	1 162	883	1 762	2 352	2 315	2 114
110		1988	26 488	1 169	2 040	1 279	1 001	1 639	2 345	2 379	2 250
111		1989	25 544	975	1 975	1 218	947	1 533	2 080	2 308	2 146
Weiblich											
112		1987	21 908	888	1 415	917	752	1 690	1 740	1 537	1 280
113		1988	22 343	834	1 566	1 069	783	1 566	1 700	1 513	1 367
114		1989	21 392	761	1 434	1 018	870	1 433	1 454	1 473	1 233
Insgesamt											
115		1987	47 284	2 062	3 312	2 079	1 635	3 452	4 092	3 852	3 394
116		1988	48 831	2 003	3 606	2 348	1 784	3 205	4 045	3 892	3 617
117		1989	46 936	1 736	3 409	2 236	1 817	2 966	3 534	3 781	3 379
Männlich											
118	KLASSE XIII (710-739)	1987	49 229	135	763	1 275	1 312	1 981	2 599	2 988	3 752
119		1988	49 774	107	734	1 347	1 388	2 053	2 649	3 161	3 665
120		1989	49 552	108	782	1 327	1 371	1 842	2 481	3 101	3 527
Weiblich											
121		1987	52 954	85	545	905	1 758	2 172	1 732	1 971	2 552
122		1988	54 755	80	527	993	1 764	2 056	1 797	2 018	2 748
123		1989	55 742	105	550	967	1 734	2 051	1 698	2 092	2 597
Insgesamt											
124		1987	102 183	220	1 308	2 180	3 070	4 153	4 331	4 959	6 304
125		1988	104 529	187	1 261	2 340	3 152	4 109	4 446	5 179	6 413
126		1989	105 294	213	1 332	2 294	3 105	3 893	4 179	5 193	6 124
Männlich											
127	KLASSE XIV (740-759)	1987	19 649	3 997	4 944	5 955	2 154	941	404	228	206
128		1988	20 018	3 898	5 079	6 160	2 346	850	395	290	202
129		1989	19 854	3 848	5 083	6 038	2 326	802	359	278	203
Weiblich											
130		1987	12 331	3 352	2 293	2 515	1 128	744	499	352	284
131		1988	12 850	3 395	2 481	2 658	1 106	740	498	364	307
132		1989	12 720	3 270	2 403	2 718	1 284	694	450	368	278
Insgesamt											
133		1987	31 980	7 349	7 237	8 470	3 282	1 685	903	580	490
134		1988	32 868	7 293	7 560	8 818	3 452	1 590	893	654	509
135		1989	32 574	7 118	7 486	8 756	3 610	1 496	809	646	481

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1 695	1 319	1 925	1 735	1 461	1 040	721	616	712	363	130	109
1 924	1 298	2 050	1 924	1 516	1 149	848	506	648	391	132	110
2 018	1 197	1 820	2 020	1 569	1 119	944	504	622	390	159	111
1 163	964	1 564	1 440	1 212	1 073	985	994	1 214	737	343	112
1 210	921	1 472	1 546	1 327	1 141	1 158	866	1 227	766	311	113
1 245	880	1 416	1 547	1 234	1 109	1 253	744	1 140	781	367	114
2 858	2 283	3 489	3 175	2 673	2 113	1 706	1 610	1 926	1 100	473	115
3 134	2 219	3 522	3 470	2 843	2 290	2 006	1 372	1 875	1 157	443	116
3 263	2 077	3 236	3 567	2 803	2 228	2 197	1 248	1 762	1 171	526	117
3 768	4 064	6 406	5 644	5 501	3 764	2 095	1 507	1 222	361	92	118
4 086	3 788	6 262	5 827	5 630	3 837	2 318	1 270	1 148	398	106	119
4 324	3 560	6 019	6 125	5 632	4 163	2 384	1 129	1 159	418	100	120
3 062	3 815	6 498	6 626	6 083	4 034	3 734	3 271	2 703	1 045	363	121
3 355	3 710	6 613	7 346	6 030	4 072	4 262	2 911	2 928	1 163	382	122
3 495	3 373	6 726	7 812	6 266	4 407	4 688	2 576	3 002	1 244	359	123
6 830	7 879	12 904	12 270	11 584	7 798	5 829	4 778	3 925	1 406	455	124
7 441	7 498	12 875	13 173	11 660	7 909	6 580	4 181	4 076	1 561	488	125
7 819	6 933	12 745	13 937	11 898	8 570	7 072	3 705	4 161	1 662	459	126
146	117	172	113	106	56	46	25	18	16	5	127
153	102	149	121	108	67	49	23	14	8	4	128
219	108	146	172	106	61	41	20	21	16	7	129
201	158	253	191	98	92	65	39	43	17	7	130
254	166	231	224	148	72	71	45	58	23	9	131
260	149	245	185	125	94	97	33	38	18	11	132
347	275	425	304	204	148	111	64	61	33	12	133
407	268	380	345	256	139	120	68	72	31	13	134
479	257	391	357	231	155	138	53	59	34	18	135

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
136	KLASSE XV (760-779)	1987	17 556	17 354	202	-	-	-	-	-	-
137		1988	16 680	16 469	211	-	-	-	-	-	-
138		1989	15 812	15 584	228	-	-	-	-	-	-
Weiblich											
139		1987	14 950	14 907	43	-	-	-	-	-	-
140		1988	14 260	14 199	61	-	-	-	-	-	-
141		1989	13 616	13 539	77	-	-	-	-	-	-
Insgesamt											
142		1987	32 506	32 261	245	-	-	-	-	-	-
143		1988	30 940	30 668	272	-	-	-	-	-	-
144		1989	29 428	29 123	305	-	-	-	-	-	-
Männlich											
145	KLASSE XVI (780-799)	1987	12 427	1 058	1 788	1 301	843	529	532	530	560
146		1988	13 165	1 122	2 008	1 524	953	509	557	569	508
147		1989	13 158	1 124	2 016	1 506	1 032	542	538	545	510
Weiblich											
148		1987	13 093	920	1 578	1 375	968	718	650	535	528
149		1988	14 178	1 027	1 765	1 542	1 084	786	680	614	599
150		1989	13 958	937	1 713	1 480	1 136	708	672	569	605
Insgesamt											
151		1987	25 520	1 978	3 366	2 676	1 811	1 247	1 182	1 065	1 088
152		1988	27 343	2 149	3 773	3 066	2 037	1 295	1 237	1 183	1 107
153		1989	27 116	2 061	3 729	2 986	2 168	1 250	1 210	1 114	1 115
Männlich											
154	KLASSE XVII (800-999)	1987	135 889	1 289	8 054	10 126	7 395	15 809	16 682	13 822	11 569
155		1988	134 463	1 257	7 875	10 410	7 901	15 227	16 502	14 010	11 380
156		1989	130 342	1 185	7 762	10 946	8 266	14 192	14 484	13 443	10 763
Weiblich											
157		1987	94 662	938	5 865	6 316	4 189	6 859	4 995	4 265	4 328
158		1988	91 423	927	5 949	6 187	4 360	6 588	4 724	4 191	4 065
159		1989	89 378	847	5 582	6 469	4 427	6 007	4 423	3 969	3 986
Insgesamt											
160		1987	230 551	2 227	13 919	16 442	11 584	22 668	21 677	18 087	15 897
161		1988	225 886	2 184	13 824	16 597	12 261	21 815	21 226	18 201	15 445
162		1989	219 720	2 032	13 344	17 415	12 693	20 199	18 907	17 412	14 749

Morbidität

nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
476	450	736	740	782	591	370	382	409	240	110	145
508	431	735	850	759	582	450	338	388	265	109	146
520	410	674	858	784	592	482	277	373	255	120	147
485	494	762	657	590	536	526	509	644	390	228	148
545	500	714	689	701	526	633	487	625	435	226	149
601	492	812	717	605	577	625	409	627	444	229	150
961	944	1 498	1 397	1 372	1 127	896	891	1 053	630	338	151
1 053	931	1 449	1 539	1 460	1 108	1 083	825	1 013	700	335	152
1 121	902	1 486	1 575	1 389	1 169	1 107	686	1 000	699	349	153
8 835	6 969	9 382	7 425	5 597	3 583	2 407	1 982	2 334	1 630	999	154
9 360	6 337	8 805	7 421	5 468	3 626	2 512	1 500	2 273	1 596	1 003	155
9 283	5 751	8 153	7 791	5 650	3 707	2 747	1 371	2 158	1 648	1 042	156
4 189	3 750	5 419	5 155	5 194	4 878	4 733	5 446	7 358	6 171	4 614	157
4 064	3 403	5 042	5 199	4 724	4 503	4 928	4 432	7 129	6 251	4 757	158
4 153	3 056	4 941	5 060	4 507	4 500	5 414	3 745	6 997	6 347	4 948	159
13 024	10 719	14 801	12 580	10 791	8 461	7 140	7 428	9 692	7 801	5 613	160
13 424	9 740	13 847	12 620	10 192	8 129	7 440	5 932	9 402	7 847	5 760	161
13 436	8 807	13 094	12 851	10 157	8 207	8 161	5 116	9 155	7 995	5 990	162

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
				Männlich							
163	V-KLASSI-	1987	26 171	2 858	2 901	2 016	1 331	1 261	1 414	1 402	1 425
164	FIKATION	1988	26 706	2 904	3 006	1 980	1 347	1 243	1 484	1 463	1 377
165		1989	27 298	3 154	3 161	2 094	1 570	1 062	1 282	1 388	1 331
				Weiblich							
166		1987	36 667	2 498	2 867	2 018	1 307	1 652	3 459	3 517	3 049
167		1988	36 217	2 448	2 743	2 052	1 311	1 501	2 973	3 395	2 809
168		1989	38 153	2 880	2 816	2 032	1 447	1 330	3 089	3 498	2 994
				Insgesamt							
169		1987	62 838	5 356	5 768	4 034	2 638	2 913	4 873	4 919	4 474
170		1988	62 923	5 352	5 749	4 032	2 658	2 744	4 457	4 858	4 186
171		1989	65 451	6 034	5 977	4 126	3 017	2 392	4 371	4 886	4 325
				Männlich							
172	Krankenhausabgänge	1987	989 059	55 000	88 188	62 395	31 937	42 633	50 817	51 087	52 373
173	insgesamt	1988	999 524	54 356	88 912	63 805	34 322	40 969	49 502	52 627	52 719
174		1989	981 677	50 871	84 484	62 914	35 689	37 808	44 330	50 954	50 504
				Weiblich							
175		1987	1 515 823	42 406	60 680	45 169	26 263	82 447	216 207	174 029	110 554
176		1988	1 506 378	41 778	62 929	45 979	27 014	75 843	203 264	175 900	109 016
177		1989	1 456 624	39 229	58 888	45 149	28 365	67 383	184 144	170 659	105 388
				Insgesamt							
178		1987	2 504 882	97 406	148 868	107 564	58 200	125 080	267 024	225 116	162 927
179		1988	2 505 902	96 134	151 841	109 784	61 336	116 812	252 766	228 527	161 736
180		1989	2 438 301	80 100	143 372	108 063	64 054	105 191	228 474	221 613	155 892

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
1 239	1 187	1 873	1 779	1 893	1 271	709	548	571	343	150	163
1 399	1 068	1 888	1 863	1 895	1 342	827	474	631	328	187	164
1 487	1 048	1 741	1 864	1 947	1 506	922	464	682	364	231	165
Weiblich											
2 528	1 915	2 109	2 006	1 846	1 328	1 183	927	1 007	727	724	166
2 873	1 866	2 177	2 214	1 785	1 309	1 389	877	975	793	727	167
3 193	1 781	2 188	2 309	1 725	1 460	1 647	840	1 178	976	770	168
Insgesamt											
3 767	3 102	3 982	3 785	3 739	2 599	1 892	1 475	1 578	1 070	874	169
4 272	2 934	4 065	4 077	3 680	2 651	2 216	1 351	1 606	1 121	914	170
4 680	2 829	3 929	4 173	3 672	2 966	2 569	1 304	1 860	1 340	1 001	171
Männlich											
47 328	46 436	76 221	76 640	79 864	61 267	46 138	42 286	44 804	26 273	10 293	172
51 393	43 076	73 696	80 286	80 643	64 680	51 239	36 113	44 639	26 911	10 638	173
53 640	40 067	69 643	83 244	81 087	70 520	54 661	30 902	43 232	26 888	11 249	174
Weiblich											
79 701	66 869	99 349	93 686	74 666	66 484	64 690	66 661	76 262	47 261	26 671	175
83 694	62 082	99 676	98 906	73 816	64 610	72 600	67 344	76 074	49 284	26 691	176
86 038	67 647	96 498	102 117	72 709	66 336	77 423	48 670	74 627	60 121	27 333	177
Insgesamt											
127 029	111 296	174 670	170 326	164 619	126 741	110 828	108 846	120 166	72 624	36 864	178
136 087	106 137	173 371	179 191	164 468	129 290	123 839	93 467	120 713	76 196	37 229	179
139 678	97 604	166 141	186 361	163 796	136 866	132 084	79 672	117 869	76 009	38 682	180

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
1	KLASSE I (001-139)	1987	290	18	9	4	2	2	5	7	5
2		1988	323	12	16	6	1	5	4	7	7
3		1989	291	12	9	3	2	3	4	7	9
Weiblich											
4		1987	279	12	7	2	4	4	4	4	2
5		1988	288	4	11	6	2	1	7	3	9
6		1989	266	11	10	1	3	5	4	4	5
Insgesamt											
7		1987	569	30	16	6	6	6	9	11	7
8		1988	611	16	27	12	3	6	11	10	16
9		1989	557	23	19	4	5	8	8	11	14
Männlich											
10	KLASSE II A (140-208)	1987	7 504	3	19	20	13	26	43	74	59
11		1988	7 299	5	20	17	9	16	45	47	67
12		1989	7 297	5	14	22	11	31	50	69	74
Weiblich											
13		1987	8 262	7	8	14	7	27	38	42	86
14		1988	8 323	8	12	12	9	21	27	44	82
15		1989	8 217	8	12	12	7	20	28	50	90
Insgesamt											
16		1987	15 766	10	27	34	20	53	81	116	145
17		1988	15 622	13	32	29	18	37	72	91	149
18		1989	15 514	13	26	34	18	51	78	119	164
Männlich											
19	KLASSE II B (210-239)	1987	141	-	-	4	1	-	5	4	1
20		1988	161	1	1	1	-	1	2	4	3
21		1989	135	2	2	2	1	1	-	4	-
Weiblich											
22		1987	241	1	1	1	1	-	3	3	-
23		1988	225	1	-	3	-	-	3	5	1
24		1989	216	-	-	-	-	1	2	1	5
Insgesamt											
25		1987	382	1	1	5	2	-	8	7	1
26		1988	386	2	1	4	-	1	5	9	4
27		1989	351	2	2	2	1	2	2	5	5

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
6	9	21	18	29	25	36	32	29	25	8	1
6	9	16	29	44	24	33	25	38	29	12	2
11	10	17	26	40	29	26	19	31	24	9	3
Weiblich											
6	5	10	10	19	23	30	31	42	43	21	4
5	4	8	11	18	33	26	34	51	39	16	5
6	6	8	16	19	20	34	22	39	42	11	6
Insgesamt											
12	14	31	28	48	48	66	63	71	68	29	7
11	13	24	40	62	57	59	59	89	68	28	8
17	16	25	42	59	49	60	41	70	66	20	9
Männlich											
104	169	462	710	967	811	906	972	1 176	723	247	10
97	144	438	721	993	921	960	798	1 087	677	237	11
105	138	420	744	891	988	1 020	684	1 097	661	273	12
Weiblich											
94	180	384	524	731	888	1 033	1 215	1 509	992	483	13
122	179	429	610	691	912	1 147	1 034	1 501	1 021	462	14
127	139	386	569	626	911	1 253	932	1 526	1 025	496	15
Insgesamt											
198	349	846	1 234	1 698	1 699	1 939	2 187	2 685	1 715	730	16
219	323	867	1 331	1 684	1 833	2 107	1 832	2 588	1 698	699	17
232	277	806	1 313	1 517	1 899	2 273	1 616	2 623	1 686	769	18
Männlich											
4	3	12	11	21	19	12	9	18	12	5	19
4	3	13	15	13	15	21	10	30	17	7	20
4	3	6	19	12	18	14	10	20	12	5	21
Weiblich											
5	10	23	18	22	18	30	30	30	26	19	22
9	5	13	11	20	27	40	14	36	23	14	23
5	7	20	15	16	19	39	14	38	21	13	24
Insgesamt											
9	13	35	29	43	37	42	39	48	38	24	25
13	8	26	26	33	42	61	24	66	40	21	26
9	10	26	34	28	37	53	24	58	33	18	27

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
28	KLASSE III	1987	573	8	2	5	1	2	3	-	4
29	(240-279)	1988	583	7	2	5	2	1	3	5	4
30		1989	522	6	2	3	5	3	2	4	3
Weiblich											
31		1987	1 157	3	2	1	2	3	4	2	7
32		1988	1 124	4	2	3	1	5	3	1	2
33		1989	1 146	7	3	1	1	1	2	3	4
Insgesamt											
34		1987	1 730	11	4	6	3	5	7	2	11
35		1988	1 707	11	4	8	3	6	6	6	6
36		1989	1 668	13	5	4	6	4	4	7	7
Männlich											
37	KLASSE IV	1987	149	1	1	1	4	1	2	2	2
38	(280-289)	1988	131	-	2	-	3	1	2	1	1
39		1989	130	3	2	3	1	-	2	-	3
Weiblich											
40		1987	171	3	3	1	-	5	2	2	3
41		1988	217	2	2	1	-	4	1	1	3
42		1989	198	-	1	1	1	1	-	1	1
Insgesamt											
43		1987	320	4	4	2	4	6	4	4	5
44		1988	348	2	4	1	3	5	3	2	4
45		1989	328	3	3	4	2	1	2	1	4
Männlich											
46	KLASSE V	1987	516	2	1	1	-	3	11	15	24
47	(290-319)	1988	607	1	1	3	5	7	7	15	20
48		1989	552	-	3	3	4	5	14	17	23
Weiblich											
49		1987	760	-	2	2	2	5	6	9	9
50		1988	752	-	1	2	1	6	7	6	11
51		1989	713	1	2	2	-	4	7	5	11
Insgesamt											
52		1987	1 276	2	3	3	2	8	17	24	33
53		1988	1 359	1	2	5	6	13	14	21	31
54		1989	1 265	1	5	5	4	9	21	22	34

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
8	8	22	24	41	42	72	94	114	91	32	28
3	8	15	40	36	53	76	73	128	95	27	29
5	6	21	30	34	41	71	72	97	88	29	30
Weiblich											
4	7	20	18	51	83	154	207	302	192	95	31
4	6	25	31	34	83	163	172	274	221	90	32
5	10	18	22	32	69	176	152	301	216	123	33
Insgesamt											
12	15	42	42	92	125	226	301	416	283	127	34
7	14	40	71	70	136	239	245	402	316	117	35
10	16	39	52	66	110	247	224	398	304	152	36
Männlich											
3	3	7	8	14	8	18	17	27	23	7	37
3	3	9	8	5	16	16	9	28	10	14	38
2	2	4	9	11	9	11	17	20	20	11	39
Weiblich											
4	1	2	6	16	10	14	19	39	28	13	40
2	4	5	2	12	17	25	29	46	27	34	41
1	-	3	8	6	15	31	21	46	34	27	42
Insgesamt											
7	4	9	14	30	18	32	36	66	51	20	43
5	7	14	10	17	33	41	38	74	37	48	44
3	2	7	17	17	24	42	38	66	54	38	45
Männlich											
29	25	53	49	53	35	29	43	68	50	25	46
44	39	66	73	78	42	33	39	55	55	24	47
29	23	53	73	80	50	35	36	40	37	27	48
Weiblich											
10	20	37	43	39	63	75	98	133	126	81	49
13	22	44	43	35	60	82	87	135	118	79	50
10	11	30	37	49	47	78	89	145	110	75	51
Insgesamt											
39	45	90	92	92	98	104	141	201	176	106	52
57	61	110	116	113	102	115	126	190	173	103	53
39	34	83	110	129	97	113	125	185	147	102	54

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
55	KLASSE VI (320-389)	1987	345	31	14	8	11	10	18	5	10
56		1988	319	30	12	9	5	10	12	11	11
57		1989	331	17	11	10	9	10	15	8	11
Weiblich											
58		1987	371	13	13	9	7	7	5	15	14
59		1988	366	17	11	6	7	6	7	6	6
60		1989	349	16	7	8	2	8	6	6	5
Insgesamt											
61		1987	716	44	27	17	18	17	23	20	24
62		1988	685	47	23	15	12	16	19	17	17
63		1989	680	33	18	18	11	18	21	14	16
Männlich											
64	KLASSE VII (390-459)	1987	19 204	14	15	2	7	27	29	47	99
65		1988	19 298	17	14	7	8	21	27	61	83
66		1989	18 861	16	10	7	3	21	41	47	79
Weiblich											
67		1987	26 985	20	10	4	10	10	31	31	62
68		1988	26 360	15	8	10	5	16	27	32	53
69		1989	25 596	8	9	4	4	19	21	32	66
Insgesamt											
70		1987	46 189	34	25	6	17	37	60	78	161
71		1988	45 658	32	22	17	13	37	54	93	136
72		1989	44 457	24	19	11	7	40	62	79	145
Männlich											
73	KLASSE VIII (710-739)	1987	5 301	18	23	16	6	10	17	17	42
74		1988	5 657	26	25	12	9	20	18	26	40
75		1989	5 367	23	22	8	6	11	8	16	35
Weiblich											
76		1987	5 870	22	16	7	8	8	10	10	24
77		1988	6 113	19	26	12	8	13	15	16	13
78		1989	5 939	11	20	7	7	8	18	14	19
Insgesamt											
79		1987	11 171	40	39	23	14	18	27	27	66
80		1988	11 770	45	51	24	17	33	33	42	53
81		1989	11 306	34	42	15	13	19	26	30	54

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
13	20	24	17	30	18	33	24	33	15	11	55
11	17	28	23	29	30	21	19	22	12	7	56
13	15	20	38	28	21	30	25	28	12	10	57
Weiblich											
8	13	23	19	35	33	38	40	42	18	19	58
6	10	19	25	33	36	45	41	41	24	20	59
10	10	14	30	27	30	32	36	41	36	25	60
Insgesamt											
21	33	47	36	65	51	71	64	75	33	30	61
17	27	47	48	62	66	66	60	63	36	27	62
23	25	34	68	55	51	62	61	69	48	35	63
Männlich											
135	160	522	824	1 331	1 509	2 024	2 851	4 258	3 492	1 858	64
114	177	513	908	1 341	1 616	2 210	2 517	4 293	3 483	1 888	65
134	179	446	897	1 356	1 771	2 403	1 999	4 009	3 474	1 969	66
Weiblich											
67	105	256	405	683	1 339	2 153	4 106	6 883	6 305	4 505	67
88	101	270	430	680	1 254	2 474	3 516	6 726	6 200	4 455	68
93	95	244	439	670	1 228	2 576	2 812	6 455	6 258	4 563	69
Insgesamt											
202	265	778	1 229	2 014	2 848	4 177	6 957	11 141	9 797	6 363	70
202	278	783	1 338	2 021	2 870	4 684	6 033	11 019	9 683	6 343	71
227	274	690	1 336	2 026	2 999	4 979	4 811	10 464	9 732	6 532	72
Männlich											
41	44	142	183	346	321	435	691	1 191	1 095	663	73
42	58	156	252	381	398	520	631	1 276	1 120	647	74
52	61	123	247	374	410	507	514	1 173	1 087	690	75
Weiblich											
17	29	71	82	137	249	423	801	1 458	1 381	1 117	76
27	25	56	88	149	278	476	670	1 453	1 530	1 239	77
28	22	51	88	149	249	505	572	1 432	1 499	1 240	78
Insgesamt											
58	73	213	265	483	570	858	1 492	2 649	2 476	1 780	79
69	83	212	340	530	676	996	1 301	2 729	2 650	1 886	80
80	83	174	335	523	659	1 012	1 086	2 605	2 586	1 930	81

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
82	KLASSE IX (520-579)	1987	3 118	12	2	-	4	7	10	23	60
83		1988	3 349	14	8	3	3	5	20	34	63
84		1989	3 207	12	6	4	2	7	14	42	71
Weiblich											
85		1987	3 278	5	1	1	1	3	13	16	13
86		1988	3 391	11	6	7	1	3	16	17	21
87		1989	3 227	3	2	2	3	6	7	17	20
Insgesamt											
88		1987	6 396	17	3	1	5	10	23	39	73
89		1988	6 740	25	14	10	4	8	36	51	84
90		1989	6 434	15	8	6	5	13	21	59	91
Männlich											
91	KLASSE X (580-629)	1987	985	3	2	2	-	2	9	5	10
92		1988	1 027	5	5	-	-	2	3	5	6
93		1989	941	2	1	-	1	4	4	7	1
Weiblich											
94		1987	1 105	4	2	-	1	4	3	7	9
95		1988	1 072	2	-	-	2	1	6	3	6
96		1989	1 035	2	1	1	-	1	-	7	5
Insgesamt											
97		1987	2 090	7	4	2	1	6	12	12	19
98		1988	2 099	7	5	-	2	3	9	8	12
99		1989	1 976	4	2	1	1	5	4	14	6
Männlich											
100	KLASSE XI (630-679)	1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101		1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102		1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiblich											
103		1987	71	-	-	-	-	7	22	21	15
104		1988	93	-	-	-	-	5	31	26	15
105		1989	59	-	-	-	1	2	20	20	9
Insgesamt											
106		1987	71	-	-	-	-	7	22	21	15
107		1988	93	-	-	-	-	5	31	26	15
108		1989	59	-	-	-	1	2	20	20	9

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
84	113	249	317	360	299	304	327	431	337	179	82
110	113	257	365	431	327	347	299	441	335	174	83
117	117	261	384	354	337	359	220	390	314	196	84
Weiblich											
36	36	98	140	176	234	317	425	689	656	418	85
49	42	125	160	204	248	337	381	646	637	480	86
30	38	113	160	202	254	372	298	633	604	463	87
Insgesamt											
120	149	347	457	536	533	621	752	1 120	993	597	88
159	155	382	525	635	575	684	680	1 087	972	654	89
147	155	374	544	556	591	731	518	1 023	918	659	90
Männlich											
10	13	29	39	63	75	98	137	229	172	87	91
8	15	29	37	65	69	112	132	221	207	106	92
11	9	30	51	51	74	118	85	201	185	106	93
Weiblich											
11	10	32	44	66	111	138	188	253	161	61	94
8	15	31	57	62	100	176	144	222	166	71	95
15	4	31	38	67	104	170	132	220	147	90	96
Insgesamt											
21	23	61	83	129	186	236	325	482	333	148	97
16	30	60	94	127	169	288	276	443	373	177	98
26	13	61	89	118	178	288	217	421	332	196	99
Männlich											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
Weiblich											
2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	103
12	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	104
6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
Insgesamt											
2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	106
12	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	107
6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108

1 Stationäre
1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
109	KLASSE XII	1987	97	-	-	-	-	-	-	-	1
110	(680-709)	1988	93	2	1	-	-	-	2	2	1
111		1989	73	-	-	-	-	-	-	1	1
Weiblich											
112		1987	178	2	-	-	-	1	-	1	-
113		1988	167	-	-	-	1	-	1	1	1
114		1989	174	1	-	-	-	-	1	-	-
Insgesamt											
115		1987	275	2	-	-	-	1	-	1	1
116		1988	260	2	1	-	1	-	3	3	2
117		1989	247	1	-	-	-	-	1	1	1
Männlich											
118	KLASSE XIII	1987	97	1	1	-	-	-	1	-	1
119	(710-739)	1988	87	2	-	1	-	-	2	3	-
120		1989	98	1	1	-	-	1	1	1	2
Weiblich											
121		1987	161	-	-	-	-	1	1	-	3
122		1988	153	3	-	-	-	1	-	1	-
123		1989	131	1	-	-	-	-	-	-	1
Insgesamt											
124		1987	258	1	1	-	-	1	2	-	4
125		1988	240	5	-	1	-	1	2	4	-
126		1989	229	2	1	-	-	1	1	1	3
Männlich											
127	KLASSE XIV	1987	237	196	18	3	1	3	1	1	1
128	(740-759)	1988	248	196	25	11	2	2	1	1	1
129		1989	233	192	16	3	2	2	-	3	2
Weiblich											
130		1987	213	157	24	2	5	3	2	2	-
131		1988	208	142	21	4	1	5	4	5	2
132		1989	166	123	17	5	2	1	3	2	1
Insgesamt											
133		1987	450	353	42	5	6	6	3	3	1
134		1988	456	338	46	15	3	7	5	6	3
135		1989	399	315	33	8	4	3	3	5	3

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
4	1	4	5	4	10	9	5	24	20	10	109
2	2	8	7	11	8	10	8	16	8	5	110
-	2	4	3	5	8	13	8	13	9	6	111
Weiblich											
-	2	3	2	8	9	15	22	41	38	34	112
-	2	1	2	7	9	22	14	48	39	19	113
-	3	2	4	4	12	31	15	41	29	31	114
Insgesamt											
4	3	7	7	12	19	24	27	65	58	44	115
2	4	9	9	18	17	32	22	64	47	24	116
-	5	6	7	9	20	44	23	54	38	37	117
Männlich											
-	3	5	6	9	15	11	16	17	8	3	118
-	3	4	4	12	14	8	7	14	7	6	119
-	3	3	7	11	9	18	7	15	12	6	120
Weiblich											
3	4	4	10	13	20	16	19	31	26	10	121
3	4	2	10	10	14	17	18	27	26	17	122
2	2	6	3	8	15	16	15	27	22	13	123
Insgesamt											
3	7	9	16	22	35	27	35	48	34	13	124
3	7	6	14	22	28	25	25	41	33	23	125
2	5	9	10	19	24	34	22	42	34	19	126
Männlich											
1	-	2	2	2	2	1	1	-	2	-	127
1	1	2	1	1	1	-	-	-	2	-	128
2	-	1	3	1	2	1	1	1	1	-	129
Weiblich											
2	-	3	3	2	3	2	-	1	2	-	130
-	1	2	4	4	2	2	2	4	2	1	131
-	2	2	-	3	1	2	1	-	1	-	132
Insgesamt											
3	-	5	5	4	5	3	1	1	4	-	133
1	2	4	5	5	3	2	2	4	4	1	134
2	2	3	3	4	3	3	2	1	2	-	135

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
136	KLASSE XV (760-779)	1987	529	529	-	-	-	-	-	-	-
137		1988	476	476	-	-	-	-	-	-	-
138		1989	407	406	1	-	-	-	-	-	-
Weiblich											
139		1987	377	377	-	-	-	-	-	-	-
140		1988	333	332	1	-	-	-	-	-	-
141		1989	257	256	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt											
142		1987	906	906	-	-	-	-	-	-	-
143		1988	809	808	1	-	-	-	-	-	-
144		1989	664	662	2	-	-	-	-	-	-
Männlich											
145	KLASSE XVI (780-799)	1987	437	8	4	1	1	5	2	5	6
146		1988	461	16	5	1	2	4	3	7	9
147		1989	459	10	3	2	4	2	7	8	10
Weiblich											
148		1987	437	9	5	1	-	3	5	5	-
149		1988	457	6	8	2	1	-	1	6	6
150		1989	470	2	2	1	1	2	4	4	7
Insgesamt											
151		1987	874	17	9	2	1	8	7	10	6
152		1988	918	22	13	3	3	4	4	13	15
153		1989	929	12	5	3	5	4	11	12	17
Männlich											
154	KLASSE XVII (800-999)	1987	1 942	11	14	13	8	84	109	74	76
155		1988	2 019	12	16	20	14	89	99	99	82
156		1989	1 973	6	23	25	13	77	85	86	73
Weiblich											
157		1987	3 364	4	19	11	7	26	11	19	17
158		1988	3 262	8	8	19	6	20	16	12	27
159		1989	3 122	7	17	13	5	21	21	13	23
Insgesamt											
160		1987	5 306	15	33	24	15	110	120	93	93
161		1988	5 281	20	24	39	20	109	115	111	109
162		1989	5 095	13	40	38	18	98	106	99	96

**Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod**

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
Weiblich											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
Insgesamt											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
Männlich											
7	11	24	39	48	48	40	52	65	45	26	145
15	10	36	34	40	41	43	45	55	67	28	146
15	11	24	40	49	41	59	30	57	58	29	147
Weiblich											
10	5	21	14	28	41	38	63	86	56	47	148
7	7	14	21	28	31	41	57	89	81	51	149
10	14	10	27	31	40	60	41	80	82	52	150
Insgesamt											
17	16	45	53	76	89	78	115	151	101	73	151
22	17	50	55	68	72	84	102	144	148	79	152
25	25	34	67	80	81	119	71	137	140	81	153
Männlich											
59	68	100	97	97	80	99	143	224	302	284	154
94	49	110	125	124	96	100	96	245	315	234	155
70	56	107	138	142	108	127	94	216	266	261	156
Weiblich											
27	12	38	40	70	83	126	268	650	878	1 058	157
29	21	53	55	46	88	135	228	603	893	995	158
30	21	36	68	48	82	161	199	532	830	995	159
Insgesamt											
86	80	138	137	167	163	225	411	874	1 180	1 342	160
123	70	163	180	170	184	235	324	848	1 208	1 229	161
100	77	143	206	190	190	288	293	748	1 096	1 256	162

1 Stationäre

1.2 Krankenhausabgänge absolut 1987 bis 1989

1.2.1 Darunter Kranken

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
163	V-KLASSI-	1987	53	-	-	-	-	-	2	-	2
164	FIKATION	1988	75	1	1	-	-	-	1	1	2
165		1989	47	1	-	1	-	-	1	-	1
Weiblich											
166		1987	98	1	3	-	-	1	-	-	-
167		1988	117	-	-	-	-	-	-	1	-
168		1989	126	1	-	-	-	1	-	1	-
Insgesamt											
169		1987	151	1	3	-	-	1	2	-	2
170		1988	192	1	1	-	-	-	1	2	2
171		1989	173	2	-	1	-	1	1	1	1
Männlich											
172	Krankenhausab-	1987	41 518	863	137	88	65	202	290	325	492
173	gänge durch Tod	1988	42 213	822	153	95	63	183	249	325	397
174	insgesamt	1989	40 924	712	124	94	63	177	248	316	398
Weiblich											
175		1987	53 378	678	111	57	51	116	159	187	264
176		1988	53 021	629	122	95	45	103	172	185	257
177		1989	51 407	526	104	56	37	103	141	183	275
Insgesamt											
178		1987	94 896	1 298	222	133	113	297	425	467	664
179		1988	95 234	1 197	245	171	106	289	418	509	656
180		1989	92 331	979	213	151	99	276	391	495	665

Morbidität
nach Altersgruppen und Diagnoseklassen
hausabgänge durch Tod

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
1	1	1	2	5	3	2	4	10	14	6	163
2	-	5	3	7	3	3	4	15	14	13	164
1	2	3	5	4	2	3	6	2	7	8	165
Weiblich											
-	2	1	1	4	1	4	3	15	25	37	166
2	-	1	4	-	6	8	6	16	32	41	167
1	1	1	1	2	7	7	9	17	42	35	168
Insgesamt											
1	3	2	3	9	4	6	7	25	39	43	169
4	-	6	7	7	9	11	10	31	46	54	170
2	3	4	6	6	9	10	15	19	49	43	171
Männlich											
632	787	2 053	2 909	4 025	4 212	5 370	6 341	9 422	7 439	3 942	172
552	648	1 692	2 630	3 598	3 659	4 492	4 702	7 934	6 436	3 422	173
567	634	1 537	2 695	3 431	3 900	4 801	3 817	7 390	6 255	3 630	174
Weiblich											
306	440	1 028	1 379	2 092	3 203	4 594	7 516	12 172	10 917	7 987	175
386	448	1 107	1 563	2 036	3 196	5 193	6 428	11 869	11 029	8 058	176
379	384	973	1 531	1 961	3 094	5 526	5 345	11 534	10 968	8 220	177
Insgesamt											
810	1 089	2 695	3 719	5 505	6 501	8 714	12 931	20 077	17 349	11 456	178
939	1 094	2 789	4 200	5 620	6 849	9 711	11 144	19 852	17 515	11 502	179
948	1 018	2 510	4 226	5 385	7 002	10 326	9 171	18 954	17 243	11 875	180

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
Klasse I												
Infektiöse und Parasitäre Krankheiten (001-139)												
1	002 (EXKL.002.0)	Männl.	0,0	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,0	-		
2	Paratyphus	Weibl.	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	-	0,0		
3		Insges.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	002.0	Männl.	0,0	-	0,1	-	0,0	0,0	-	0,0		
5	Typhus abdominalis	Weibl.	0,0	0,1	0,1	0,0	-	0,0	-	0,1		
6		Insges.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0		
7	003,005	Männl.	1,2	15,5	7,7	2,3	0,9	0,9	0,5	0,6		
8	Salmonelleninfektionen und	Weibl.	1,0	16,6	6,7	1,6	0,7	0,9	0,6	0,4		
9	sonstige bakterielle Lebens- mittelvergiftungen	Insges.	1,1	16,1	7,2	1,9	0,8	0,9	0,6	0,5		
10	004	Männl.	1,3	1,4	3,7	3,2	2,3	1,4	2,0	1,4		
11	Shigellose	Weibl.	1,2	0,5	3,3	2,9	2,5	2,2	2,5	1,7		
12		Insges.	1,2	1,0	3,5	3,1	2,4	1,8	2,3	1,5		
13	001, 006-009	Männl.	5,1	127,9	38,5	5,2	3,4	1,2	1,3	1,2		
14	Alle sonstige Darminfektionen	Weibl.	3,7	112,2	30,1	3,9	2,5	1,2	1,2	0,8		
15		Insges.	4,4	120,3	34,4	4,6	3,0	1,2	1,2	1,0		
16	011	Männl.	2,3	-	0,1	0,0	0,0	0,6	1,2	1,8		
17	Lungentuberkulose	Weibl.	1,0	-	0,1	0,0	0,2	0,4	1,3	0,9		
18		Insges.	1,6	-	0,1	0,0	0,1	0,5	1,3	1,4		
19	010, 012	Männl.	0,2	0,2	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,2		
20	Sonstige Tuberkulose der Atmungs- organe	Weibl.	0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2		
21		Insges.	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,2		
22	013	Männl.	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-		
23	Tuberkulose der Meningen und des Zentralnervensystems	Weibl.	0,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-		
24		Insges.	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-		
25	015	Männl.	0,1	-	-	-	-	0,0	0,1	0,0		
26	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	Weibl.	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,0		
27		Insges.	0,1	0,0	-	-	-	0,0	0,1	0,0		

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,1	-	1
-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,1	-	-	2
-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	3
0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,0	-	0,0	-	-	-	-	4
-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	-	5
0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,0	-	6
0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,7	0,7	1,0	7
0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	0,7	8
0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8	9
0,9	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	-	0,2	0,2	0,3	-	10
0,9	0,7	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	11
0,9	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	-	12
0,9	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	1,0	13
0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6	0,3	0,3	0,2	0,5	0,4	0,7	14
0,7	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,8	15
1,9	2,1	2,1	2,6	3,7	5,1	5,8	5,5	5,6	7,1	7,0	6,2	16
1,0	0,7	0,9	0,8	0,9	1,0	1,6	2,1	2,4	2,8	2,7	1,8	17
1,5	1,4	1,5	1,7	2,3	3,0	3,3	3,3	3,5	4,2	4,0	2,9	18
0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	-	19
0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	20
0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	21
0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	22
-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-	23
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	-	0,1	24
0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-	25
0,0	-	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	26
0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	27

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
28	016	Männl.	0,2	-	-	-	-	-	0,0	0,1		
29	Tuberkulose des Urogenitalsystems	Weibl.	0,2	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1		
30		Insges.	0,2	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1		
31	014, 017	Männl.	0,2	-	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3		
32	Tuberkulose sonstiger Organe	Weibl.	0,2	0,3	0,0	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2		
33		Insges.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2		
34	018	Männl.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-		
35	Miliartuberkulose	Weibl.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-		
36		Insges.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-		
37	023	Männl.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-		
38	Brucellose	Weibl.	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-		
39		Insges.	0,0	-	-	-	0,0	0,0	-	-		
40	034	Männl.	0,9	4,2	8,5	2,7	0,7	0,4	0,4	0,2		
41	Streptokokkenangina und	Weibl.	0,7	3,5	6,7	2,9	0,9	0,7	0,3	0,2		
42		Scharlach	Insges.	0,8	3,8	7,6	2,8	0,8	0,6	0,4	0,2	
43	035	Männl.	1,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7		
44	Erysipel	Weibl.	1,7	0,1	0,7	0,3	0,7	0,4	0,4	0,7		
45		Insges.	1,6	0,3	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7		
46	036	Männl.	0,3	6,1	1,8	0,5	0,3	0,5	0,1	0,1		
47	Meningokokkeninfektion	Weibl.	0,2	4,7	1,8	0,3	0,1	0,5	0,1	0,0		
48		Insges.	0,3	5,4	1,8	0,4	0,2	0,5	0,1	0,0		
49	037	Männl.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0		
50	Tetanus	Weibl.	0,0	0,1	-	-	-	0,0	-	-		
51		Insges.	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0		
52	038	Männl.	0,5	5,8	0,7	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2		
53	Sepsis	Weibl.	0,4	4,9	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1		
54		Insges.	0,4	5,3	0,5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1		
55	REST 020-041	Männl.	0,3	4,2	0,5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1		
56	Sonstige bakterielle Krankheiten	Weibl.	0,3	4,2	0,6	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1		
57		Insges.	0,3	4,2	0,6	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1		

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,0	0,2	0,3	0,3	0,4	1,0	0,8	0,7	0,2	0,4	-	-	28
0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	-	29
0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,3	0,1	-	30
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	0,2	0,4	31
0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,5	0,6	0,4	32
0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5	0,4	33
0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-	-	0,1	0,2	-	0,2	34
0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	35
0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	36
-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	38
-	-	-	-	0,0	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	39
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	0,1	-	-	-	40
0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	41
0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	-	42
1,1	1,2	1,9	2,4	2,5	3,3	2,8	3,4	2,5	2,9	2,5	1,8	43
0,8	1,1	1,2	2,2	3,4	3,0	2,9	2,7	3,3	4,0	4,6	4,1	44
1,0	1,1	1,6	2,3	3,0	3,1	2,8	3,0	3,0	3,6	4,0	3,5	45
0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-	-	-	0,2	46
0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,1	0,0	-	-	47
0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,1	48
-	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,1	-	-	0,2	49
0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	50
0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,1	51
0,2	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	0,7	1,0	1,4	0,5	0,9	0,6	52
0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	0,9	0,1	53
0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,6	0,9	0,3	54
0,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	-	55
0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	56
0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	57

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
58	047	Männl.	0,4	1,6	2,0	1,3	0,4	0,3	0,2	0,3
59	Meningitis durch Enteroviren	Weibl.	0,2	0,6	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4
60		Insges.	0,3	1,1	1,4	0,9	0,5	0,3	0,3	0,3
61	053	Männl.	0,4	-	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2
62	Zoster	Weibl.	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
63		Insges.	0,5	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
64	055	Männl.	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
65	Masern	Weibl.	0,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
66		Insges.	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
67	056	Männl.	0,1	2,1	0,9	0,2	0,1	0,4	0,2	0,1
68	Röteln	Weibl.	0,2	1,5	0,9	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
69		Insges.	0,2	1,8	0,9	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
70	062-064	Männl.	0,0	0,1	0,0	-	0,1	-	0,0	-
71	Virusenzephalitis, durch Arthropoden übertragen	Weibl.	0,0	0,1	-	0,1	-	0,1	0,2	0,1
72		Insges.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
73	070	Männl.	1,0	2,2	0,5	0,7	0,5	0,9	1,5	1,4
74	Virushepatitis	Weibl.	0,9	1,5	0,4	0,6	0,6	1,3	1,7	1,3
75		Insges.	0,9	1,9	0,4	0,6	0,6	1,1	1,6	1,4
76	072	Männl.	0,3	0,7	1,9	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1
77	Mumps	Weibl.	0,1	0,1	0,7	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
78		Insges.	0,2	0,4	1,3	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1
79	075	Männl.	0,9	0,5	3,9	2,1	1,1	3,2	1,6	0,4
80	Infektiöse Mononukleose	Weibl.	0,7	0,2	2,0	1,8	1,9	4,3	0,8	0,2
81		Insges.	0,8	0,3	3,0	1,9	1,5	3,7	1,2	0,3
82	REST 045-088	Männl.	3,4	48,5	15,8	4,4	2,8	2,6	3,8	2,5
83	Sonstige Viruskrankheiten und sonstige durch Arthropoden übertragene Infektionskrankheiten	Weibl.	3,2	38,3	11,9	3,6	2,3	5,2	6,7	3,6
84		Insges.	3,3	43,5	13,9	4,0	2,6	3,9	5,2	3,0
85	090-097	Männl.	0,7	0,7	0,2	0,0	-	0,4	1,6	1,9
86	Syphilis	Weibl.	0,4	0,6	0,1	0,0	0,1	0,7	1,1	0,8
87		Insges.	0,5	0,6	0,1	0,0	0,0	0,5	1,3	1,4

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	58
0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	59
0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	60
0,2	0,1	0,1	0,3	0,3	0,8	0,9	1,5	1,5	2,8	2,5	2,9	-	61
0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,7	1,0	1,5	1,6	2,8	2,3	2,0	-	62
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8	1,0	1,5	1,6	2,8	2,4	2,2	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	65
0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	66
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	68
0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	69
0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	70
0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	71
0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	72
1,1	1,0	0,7	1,2	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	-	73
1,2	1,1	1,4	0,9	1,1	1,0	0,5	0,5	0,5	0,6	0,2	-	-	74
1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	0,7	0,6	0,5	0,5	0,2	0,1	-	75
0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	0,0	-	0,1	-	-	-	76
0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	-	77
0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	-	78
0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,1	-	-	-	79
0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,1	-	80
0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,1	-	81
1,6	1,0	1,1	1,3	1,5	1,0	1,0	0,9	0,7	0,8	1,4	1,0	-	82
1,9	1,5	1,3	1,4	0,9	0,8	0,5	0,7	1,3	1,0	1,1	0,7	-	83
1,7	1,2	1,2	1,3	1,2	0,9	0,7	0,8	1,1	0,9	1,2	0,8	-	84
1,1	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,2	-	85
0,6	0,5	0,5	0,3	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	-	86
0,9	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	-	87

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
88	098	Männl.	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3	0,7
89	Gonokokkeninfektionen	Weibl.	0,4	-	0,1	-	0,0	2,7	1,7	0,7
90		Insges.	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,5	0,7
91	099	Männl.	0,1	-	-	0,0	-	0,1	0,3	0,1
92	Sonstige Geschlechtskrankheiten	Weibl.	0,0	-	-	0,0	-	0,1	0,1	0,0
93		Insges.	0,0	-	-	0,0	-	0,1	0,2	0,1
94	100-104	Männl.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4
95	Sonstige Spirochätenkrankheiten	Weibl.	0,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
96		Insges.	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3
97	110	Männl.	0,6	-	0,1	0,0	0,2	0,6	0,5	0,6
98	Dermatophytie	Weibl.	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
99		Insges.	0,4	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4
100	112	Männl.	0,6	34,6	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
101	Candidosis	Weibl.	0,6	31,6	0,6	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2
102		Insges.	0,6	33,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
103	111,114-118	Männl.	0,2	1,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
104	Sonstige Mykosen	Weibl.	0,1	1,5	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1
105		Insges.	0,1	1,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
106	122,123	Männl.	0,2	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
107	Echinokokkose und sonstige	Weibl.	0,2	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1
108	Zestodeninfektionen	Insges.	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
109	120,121,124-129	Männl.	0,3	-	0,4	0,5	0,3	0,6	0,8	0,5
110	Sonstige Helminthosen	Weibl.	0,3	0,1	0,7	0,8	0,4	0,2	0,3	0,3
111		Insges.	0,3	0,0	0,6	0,6	0,3	0,4	0,6	0,4
112	130	Männl.	0,2	2,7	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1
113	Toxoplasmose	Weibl.	0,7	3,7	0,2	0,3	0,3	1,6	3,5	2,0
114		Insges.	0,4	3,2	0,2	0,2	0,3	1,0	1,8	1,0
115	135	Männl.	1,0	0,2	-	-	-	0,2	0,7	1,9
116	Sarkoidose	Weibl.	1,2	-	-	-	-	0,1	0,8	2,0
117		Insges.	1,1	0,1	-	-	-	0,1	0,8	2,0

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,1	-	88
0,3	0,1	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	89
0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	90
0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	91
-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	92
0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	93
0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	-	-	94
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-	0,0	-	95
0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	96
0,6	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,5	0,2	0,5	0,6	0,9	0,4	97
0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	98
0,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	99
0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,7	0,6	0,3	-	100
0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	101
0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	102
0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,4	103
0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,1	104
0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	105
0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	106
0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	-	-	107
0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	-	-	108
0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	-	-	109
0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	-	110
0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-	111
0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	-	-	0,1	-	-	112
0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	-	113
0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114
2,1	2,0	2,6	1,2	0,9	1,0	0,6	0,4	0,1	-	0,1	-	115
2,0	2,3	2,3	2,0	2,3	1,7	1,4	0,9	0,3	0,2	0,0	-	116
2,0	2,2	2,4	1,6	1,6	1,4	1,1	0,7	0,2	0,1	0,1	-	117

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren							25	30
				1	5	10	15	20	25	30		
118	137	Männl.	0,2	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
119	Spätfolgen der Tuberkulose	Weibl.	0,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1		
120		Insges.	0,2	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1		
121	138	Männl.	0,1	-	-	-	-	-	-	0,0		
122	Spätfolgen der akuten Poliomyelitis	Weibl.	0,1	-	-	0,0	-	-	0,0	0,0		
123		Insges.	0,1	-	-	0,0	-	-	0,0	0,0		
124	131-134,136,139	Männl.	0,3	1,8	1,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2		
125	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten und deren Spätfolgen	Weibl.	0,3	1,5	0,8	0,2	0,2	0,7	0,5	0,3		
126		Insges.	0,3	1,6	0,9	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3		
Klasse II												
Neubildungen (140 - 239)												
127	140-149	Männl.	3,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2		
128	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	Weibl.	0,9	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1		
129		Insges.	1,9	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1		
130	150	Männl.	1,4	-	-	-	-	0,0	-	0,1		
131	Bösartige Neubildungen des Ösophagus	Weibl.	0,4	-	0,0	-	-	-	-	0,0		
132		Insges.	0,9	-	0,0	-	-	0,0	-	0,1		
133	151	Männl.	5,0	0,2	-	-	-	0,0	0,1	0,2		
134	Bösartige Neubildungen des Magens	Weibl.	4,2	-	-	-	-	-	0,1	0,5		
135		Insges.	4,6	0,1	-	-	-	0,0	0,1	0,3		
136	152,153	Männl.	4,0	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1		
137	Bösartige Neubildungen des Dünndarms, inkl. Duodenum und des Kolons, exkl. Rektum	Weibl.	5,6	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3		
138		Insges.	4,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2		
139	154	Männl.	5,2	0,1	-	-	-	0,0	0,1	0,1		
140	Bösartige Neubildungen des Rektums, des Rektum-Sigma-Übergangs und des Anus	Weibl.	5,4	0,1	-	-	-	0,1	0,0	0,2		
141		Insges.	5,3	0,1	-	-	-	0,0	0,0	0,2		
142	156	Männl.	0,6	-	-	-	-	-	0,0	0,0		
143	Bösartige Neubildungen der Gallenblase und der extrahepatischen Gallengänge	Weibl.	1,6	-	0,0	-	-	-	0,0	-		
144		Insges.	1,1	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0		

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,9	0,8	0,4	0,5	0,8	0,4		118
0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,3	0,3	0,2	-	0,2	0,1	0,1		119
0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,1	0,3	0,3	0,2		120
0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,4	-	-	-		121
0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	-		122
0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	-		123
0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2		124
0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1		125
0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1		126
0,4	0,8	2,2	6,4	8,3	9,4	8,2	9,1	8,9	8,7	7,1	5,5		127
0,2	0,5	0,5	1,2	1,3	1,8	1,9	2,1	2,3	2,8	2,2	1,8		128
0,3	0,6	1,4	3,8	4,7	5,5	4,5	4,6	4,5	4,6	3,6	2,8		129
0,0	0,1	0,7	1,5	3,6	4,5	5,5	5,2	5,2	6,7	4,7	2,5		130
0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,6	1,6	1,0	1,4	1,5	1,4		131
0,0	0,1	0,4	0,8	2,0	2,5	2,6	2,9	2,4	3,1	2,4	1,7		132
0,6	0,8	1,7	3,2	6,9	11,3	17,8	27,6	31,2	38,1	26,5	19,7		133
0,5	1,0	1,8	2,7	4,0	4,9	8,3	12,6	17,0	19,7	18,9	12,4		134
0,6	0,9	1,7	2,9	5,4	8,0	12,3	17,8	21,6	25,4	21,2	14,3		135
0,4	1,1	2,1	4,1	6,4	10,2	14,0	19,0	20,9	24,1	18,7	13,6		136
0,4	0,9	1,9	3,7	5,5	8,8	12,2	19,3	22,6	25,2	19,6	11,8		137
0,4	1,0	2,0	3,9	5,9	9,4	12,9	19,2	22,0	24,8	19,3	12,3		138
0,4	0,8	2,8	4,8	8,8	12,3	18,5	24,6	28,7	31,9	32,4	20,5		139
0,2	0,9	3,5	3,4	6,4	8,9	11,7	18,3	20,9	21,6	19,2	11,6		140
0,3	0,9	3,2	4,1	7,6	10,6	14,6	20,5	23,4	24,8	23,1	13,9		141
0,0	0,1	0,1	0,6	1,0	1,4	1,8	2,5	3,7	5,5	5,2	3,5		142
0,0	0,0	0,3	0,8	1,7	2,4	3,6	5,2	6,4	7,3	7,3	4,0		143
0,0	0,1	0,2	0,7	1,3	1,9	2,8	4,3	5,5	6,7	6,7	3,9		144

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
145	157	Männl.	1,4	-	-	-	-	0,0	-	0,0
146	Bösartige Neubildungen des	Weibl.	1,3	-	-	-	-	0,0	-	0,1
147	Pankreas	Insges.	1,4	-	-	-	-	0,0	-	0,0
148	155,158,159	Männl.	1,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3
149	Sonstige bösartige Neubildungen der	Weibl.	1,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
150	Verdauungsorgane und des Peri- toneums	Insges.	1,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2
151	161	Männl.	1,7	-	-	0,0	-	0,0	-	0,1
152	Bösartige Neubildungen des Larynx	Weibl.	0,2	-	-	-	-	0,0	-	-
153		Insges.	0,9	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0
154	162	Männl.	15,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
155	Bösartige Neubildungen der Trachea,	Weibl.	2,5	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2
156	des Bronchus und der Lunge	Insges.	8,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
157	160,163-165	Männl.	0,9	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,2
158	Sonstige bösartige Neubildungen der	Weibl.	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4
159	Atmungs- und der intrathorakalen Organe	Insges.	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
160	170	Männl.	0,7	0,2	0,1	0,2	0,3	1,7	1,2	0,5
161	Bösartige Neubildungen des	Weibl.	0,5	0,4	0,1	0,1	0,6	0,7	1,1	0,4
162	Knochens und des Gelenkknorpels	Insges.	0,6	0,3	0,1	0,1	0,5	1,2	1,1	0,4
163	171	Männl.	0,8	0,7	0,4	0,3	0,3	0,7	0,3	0,6
164	Bösartige Neubildungen des Binde-	Weibl.	0,8	0,1	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	0,3
165	gewebes und sonstiger Weichteilge- webe	Insges.	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	0,7	0,4	0,5
166	172	Männl.	1,6	0,1	-	-	0,0	0,1	0,2	0,2
167	Bösartiges Melanom der Haut	Weibl.	1,8	-	-	-	0,0	0,0	0,3	0,6
168		Insges.	1,7	0,0	-	-	0,0	0,0	0,3	0,4
169	173	Männl.	2,0	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
170	Sonstige bösartige Neubildungen	Weibl.	2,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
171	der Haut	Insges.	2,0	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
172	174,175	Männl.	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,0
173	Bösartige Neubildungen der Brust- drüse	Weibl.	27,4	0,6	0,1	0,1	0,0	0,2	0,6	2,7
174		Insges.	14,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,3

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,1	0,2	0,8	2,1	2,7	3,0	4,8	7,0	5,7	9,2	6,0	5,3	145
0,0	0,1	0,4	1,2	1,1	1,8	2,9	4,2	5,5	5,8	5,1	4,0	146
0,1	0,1	0,6	1,6	1,9	2,4	3,7	5,2	5,6	6,9	5,4	4,4	147
0,5	0,4	0,7	1,2	1,6	2,4	3,1	3,8	5,4	5,1	3,4	3,9	148
0,3	0,5	0,9	0,9	2,0	2,4	2,4	4,0	3,8	3,9	3,1	2,6	149
0,4	0,5	0,8	1,0	1,8	2,4	2,7	3,9	4,3	4,2	3,2	3,0	150
0,2	0,4	1,0	2,8	4,5	5,3	7,1	6,8	5,5	7,1	2,4	2,9	151
0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,4	0,7	0,4	0,7	0,3	0,1	0,1	152
0,2	0,3	0,5	1,5	2,4	2,7	3,4	2,6	2,2	2,4	0,8	0,9	153
0,7	1,9	5,1	14,4	30,0	57,4	73,8	75,9	61,5	51,1	31,0	16,6	154
0,3	0,4	0,7	2,4	3,5	6,4	8,2	9,7	8,3	6,4	3,4	1,9	155
0,5	1,2	2,9	8,4	16,6	31,1	35,6	32,8	25,6	20,2	11,6	5,8	156
0,4	0,3	0,4	1,1	1,3	2,6	3,1	2,5	3,5	3,8	3,2	2,1	157
0,1	0,2	0,6	0,4	0,7	0,6	0,9	1,7	1,0	1,4	0,8	0,7	158
0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	1,6	1,8	2,0	1,8	2,1	1,5	1,0	159
0,4	0,7	0,5	0,7	0,8	1,4	1,3	1,1	1,3	1,3	0,3	0,2	160
0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,7	0,8	0,9	0,4	0,6	0,5	0,2	161
0,3	0,5	0,4	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	0,5	0,2	162
0,6	0,6	0,8	0,4	1,0	1,5	1,4	1,8	2,2	2,6	2,7	3,9	163
0,5	0,5	0,5	1,1	1,0	0,9	1,2	1,4	1,0	2,0	1,8	1,5	164
0,6	0,5	0,7	0,7	1,0	1,2	1,3	1,5	1,4	2,2	2,0	2,1	165
0,7	1,1	2,0	3,5	3,4	3,6	4,7	5,9	3,5	3,4	4,0	2,1	166
1,1	1,9	2,4	3,2	4,0	3,2	3,3	4,7	2,9	2,8	2,3	1,3	167
0,9	1,5	2,2	3,4	3,7	3,4	3,9	5,1	3,1	3,0	2,8	1,5	168
0,1	0,4	0,6	1,2	1,9	3,4	4,9	7,8	12,1	18,8	20,1	29,8	169
0,1	0,2	0,7	1,5	1,2	1,7	2,9	4,7	6,2	10,2	12,9	17,0	170
0,1	0,3	0,6	1,3	1,6	2,5	3,7	5,8	8,1	12,8	15,0	20,4	171
0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	0,7	0,8	0,3	1,0	172
8,0	19,3	38,2	55,4	59,9	62,0	63,5	66,2	55,2	46,4	32,9	20,8	173
4,0	9,5	19,0	27,9	30,4	32,2	37,3	43,4	37,5	32,3	23,3	15,6	174

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
175	180	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Bösartige Neubildungen der Cervix uteri	Weibl.	8,1	-	-	0,0	-	0,1	1,4	8,0
177		Insges.	4,2	-	-	0,0	-	0,0	0,7	3,9
178	179,182	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Bösartige Neubildungen des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	Weibl.	6,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
180		Insges.	3,2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
181	183	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Bösartige Neubildungen der Ovarien und sonstiger uteriner Adnexe	Weibl.	11,0	0,1	-	0,0	0,1	0,7	1,7	2,2
183		Insges.	5,7	0,0	-	0,0	0,1	0,3	0,8	1,1
184	181,184	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Bösartige Neubildungen der Plazenta und sonstiger nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	Weibl.	1,6	-	0,1	0,0	-	0,1	0,3	0,2
186		Insges.	0,8	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,1
187	185	Männl.	5,4	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1
188	Bösartige Neubildungen der Prostata	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
189		Insges.	2,6	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,1
190	186,187	Männl.	4,6	-	0,4	0,1	0,3	2,9	6,6	12,6
191	Bösartige Neubildungen des Hodens, des Penis und sonstiger männlicher Genitalorgane	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
192		Insges.	2,2	-	0,2	0,1	0,1	1,5	3,4	6,5
193	188	Männl.	7,8	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
194	Bösartige Neubildungen der Harnblase	Weibl.	2,2	-	0,0	0,1	-	-	0,0	0,0
195		Insges.	4,9	-	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
196	189	Männl.	3,3	0,1	1,1	0,7	0,0	0,1	0,1	0,1
197	Bösartige Neubildungen der Niere sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	Weibl.	2,3	1,3	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
198		Insges.	2,8	0,7	0,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1
199	190	Männl.	0,2	1,5	0,8	0,3	0,0	-	-	0,0
200	Bösartige Neubildungen des Auges	Weibl.	0,2	0,5	1,0	0,2	0,0	0,1	-	0,0
201		Insges.	0,2	1,0	0,9	0,3	0,0	0,0	-	0,0
202	191,192	Männl.	2,2	1,2	1,5	2,0	1,3	0,9	0,8	1,2
203	Bösartige Neubildungen des Gehirns und sonstiger Teile des Nervensystems	Weibl.	1,7	1,5	1,0	1,0	1,7	1,1	1,0	0,7
204		Insges.	1,9	1,3	1,3	1,5	1,5	1,0	0,9	0,9

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
13,7	13,9	12,3	12,8	10,8	12,2	11,5	14,0	13,2	9,5	7,2	4,5	176
6,7	6,8	6,1	6,4	5,5	6,3	6,7	9,1	8,9	6,5	5,0	3,3	177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
0,4	1,0	2,4	4,7	9,6	14,1	19,5	22,1	19,5	17,6	12,6	6,8	179
0,2	0,5	1,2	2,4	4,9	7,2	11,4	14,4	13,1	12,2	8,8	5,0	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
3,4	4,1	9,9	19,9	28,9	30,0	28,0	29,7	17,4	13,5	8,4	5,1	182
1,7	2,0	4,9	10,0	14,6	15,5	16,3	19,4	11,8	9,3	5,9	3,8	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
0,5	0,4	0,5	1,7	1,6	2,3	3,6	4,4	6,4	6,4	5,7	4,3	185
0,3	0,2	0,3	0,8	0,8	1,2	2,1	2,9	4,3	4,4	4,0	3,1	186
0,0	0,1	0,2	1,3	2,7	8,0	18,8	33,9	49,8	53,4	44,5	33,5	187
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
0,0	0,0	0,1	0,6	1,3	3,9	7,9	11,8	16,2	16,5	13,2	8,8	189
10,7	8,2	5,3	3,6	3,0	1,8	2,2	1,9	2,4	2,2	2,6	2,7	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191
5,5	4,2	2,7	1,8	1,5	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	192
0,2	0,4	1,3	4,0	8,3	18,0	31,6	48,4	57,9	56,8	44,2	24,4	193
0,0	0,2	0,3	0,9	1,8	3,3	4,9	7,9	8,7	12,1	9,4	5,3	194
0,1	0,3	0,8	2,5	5,0	10,4	16,0	22,0	24,7	25,9	19,7	10,3	195
0,3	1,1	1,9	4,1	7,6	10,7	13,2	11,1	14,9	11,3	7,4	3,5	196
0,3	0,3	1,4	1,9	4,4	6,0	6,3	7,6	6,2	6,2	2,0	1,8	197
0,3	0,7	1,7	3,0	6,0	8,3	9,2	8,8	9,0	7,8	3,6	2,3	198
0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,5	0,8	0,7	0,4	0,7	0,6	199
0,1	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,5	0,4	0,7	0,3	0,1	200
0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,2	201
1,2	2,5	2,7	3,1	3,9	4,4	5,2	3,7	1,5	1,1	0,2	0,4	202
1,6	1,6	1,8	2,0	3,6	3,7	3,1	2,0	1,4	0,4	0,1	-	203
1,4	2,1	2,2	2,5	3,8	4,0	4,0	2,6	1,4	0,6	0,1	0,1	204

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
205	193,194	Männl.	0,8	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3
206	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	Weibl.	1,9	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,9	1,1
207		Insges.	1,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7
208	195-199	Männl.	2,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5
209	Sekundäre bösartige Neubildungen, wie sonstige bösartige Neubildungen und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	Weibl.	2,9	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
210		Insges.	2,6	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,4
211	201	Männl.	2,8	0,1	0,1	0,1	0,3	2,6	5,8	3,8
212	Hodgkin' Krankheit	Weibl.	2,1	0,1	0,0	0,2	0,3	3,6	4,5	4,0
213		Insges.	2,4	0,1	0,1	0,2	0,3	3,1	5,2	3,9
214	200,202	Männl.	4,3	0,3	0,7	0,2	0,5	1,1	1,5	1,2
215	Lymphosarkom u. Retikulosarkom, sowie sonstige bösartige Neubildungen des lymphoiden und histiozytären Gewebes	Weibl.	3,6	0,6	0,5	0,2	0,1	0,6	0,6	0,9
216		Insges.	3,9	0,4	0,6	0,2	0,3	0,9	1,1	1,1
217	203	Männl.	2,3	-	-	0,0	-	0,1	0,0	-
218	Mutiples Myelom und immunoproliferative Neubildungen	Weibl.	2,5	0,1	-	0,0	-	0,0	0,1	0,1
219		Insges.	2,4	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,1
220	204	Männl.	2,1	0,5	1,9	2,2	1,7	1,2	0,7	0,4
221	Lymphatische Leukämie	Weibl.	1,5	0,2	1,3	1,6	1,0	0,4	0,6	0,2
222		Insges.	1,8	0,3	1,6	1,9	1,4	0,8	0,6	0,3
223	205	Männl.	1,4	-	0,4	0,3	0,2	0,8	0,6	1,1
224	Myeloische Leukämie	Weibl.	1,3	0,1	0,4	0,2	0,5	0,5	0,4	1,0
225		Insges.	1,4	0,0	0,4	0,2	0,3	0,7	0,5	1,1
226	206-208	Männl.	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
227	Sonstige Formen der Leukämie	Weibl.	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
228		Insges.	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
229	210,211	Männl.	2,9	0,7	0,6	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0
230	Gutartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx und sonstiger Teile des Verdauungssystems	Weibl.	3,0	1,4	0,6	0,9	0,5	0,7	1,0	1,3
231		Insges.	2,9	1,1	0,6	0,6	0,5	0,6	1,0	1,2
232	213	Männl.	1,1	0,2	0,4	1,8	3,0	2,5	1,0	0,8
233	Gutartige Neubildungen des Knochens und des Gelenknorpels	Weibl.	0,8	0,3	0,4	1,0	2,1	2,1	1,0	0,8
234		Insges.	0,9	0,2	0,4	1,4	2,6	2,3	1,0	0,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,5	0,8	0,6	1,0	1,7	1,6	2,0	3,1	1,8	1,0	1,9	0,2	205
1,5	2,3	2,5	3,3	2,4	3,9	3,4	4,2	2,9	2,5	1,8	1,0	206
1,0	1,5	1,5	2,2	2,0	2,8	2,8	3,8	2,5	2,0	1,8	0,8	207
0,7	1,0	1,4	2,5	4,7	6,3	7,0	9,4	11,0	9,8	9,0	8,0	208
0,7	1,4	1,7	4,3	3,8	7,1	7,0	8,0	7,5	7,9	7,4	5,1	209
0,7	1,2	1,6	3,4	4,3	6,7	7,0	8,5	8,6	8,4	7,9	5,8	210
3,7	3,9	2,7	3,3	2,7	2,4	3,6	3,8	3,1	3,1	0,8	0,8	211
2,1	1,3	2,8	1,1	1,9	1,8	3,3	2,8	2,6	1,2	1,2	0,3	212
2,9	2,6	2,8	2,2	2,3	2,1	3,4	3,2	2,7	1,8	1,1	0,4	213
1,6	2,0	3,8	7,0	7,6	9,7	13,0	16,8	16,8	12,5	6,0	3,1	214
1,0	1,7	2,2	4,5	3,8	7,9	8,3	12,8	11,7	8,8	5,7	2,3	215
1,3	1,8	3,0	5,8	5,7	8,8	10,3	14,2	13,3	10,0	5,8	2,5	216
0,1	0,7	0,7	1,9	3,9	6,4	12,7	10,3	12,7	10,8	5,8	2,1	217
-	0,0	0,9	2,1	3,4	4,2	6,5	8,9	12,2	9,0	8,0	2,3	218
0,0	0,4	0,8	2,0	3,6	5,3	9,1	9,4	12,4	9,5	7,4	2,3	219
0,3	0,3	0,7	2,2	2,1	3,5	3,7	8,4	10,2	9,4	6,0	5,3	220
0,1	0,6	0,8	0,9	1,1	1,6	3,2	4,1	4,0	5,1	2,7	3,0	221
0,2	0,5	0,8	1,5	1,6	2,5	3,4	5,6	6,1	6,4	3,7	3,6	222
1,0	1,1	0,9	1,9	1,6	2,4	3,1	4,1	4,2	6,4	3,3	4,9	223
0,8	1,5	1,4	1,4	1,8	1,9	2,4	2,9	3,0	2,7	2,0	0,9	224
0,9	1,3	1,2	1,7	1,7	2,1	2,7	3,3	3,4	3,8	2,4	1,9	225
0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	1,2	3,1	2,5	2,3	1,9	1,6	226
0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	1,3	0,8	1,1	1,6	1,9	1,3	0,5	227
0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	1,0	1,0	1,8	1,9	2,0	1,5	0,8	228
1,3	1,9	2,5	3,6	5,1	7,1	10,6	9,6	9,2	7,0	6,8	3,9	229
1,8	2,1	2,8	3,6	4,7	5,8	5,9	7,2	6,3	6,2	3,4	2,4	230
1,5	2,0	2,7	3,6	4,9	6,5	7,9	8,0	7,2	6,4	4,4	2,8	231
0,7	0,8	0,9	1,0	0,8	0,5	0,6	0,4	0,5	0,2	0,2	-	232
0,7	0,9	0,6	1,1	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	233
0,7	0,9	0,8	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	234

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren							25	30
				1	5	10	15	20	25	30		
235	214	Männl.	1,4	0,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,9		
236	Lipom	Weibl.	2,0	0,1	0,3	0,3	0,2	0,7	1,1	1,1		
237		Insges.	1,7	0,1	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0		
238	216	Männl.	2,6	3,8	2,4	2,5	2,1	1,4	1,5	1,8		
239	Gutartige Neubildungen der Haut	Weibl.	3,0	4,6	2,7	3,0	2,9	2,4	1,9	2,0		
240		Insges.	2,8	4,2	2,6	2,7	2,5	1,9	1,7	1,9		
241	217	Männl.	0,9	-	-	0,0	0,6	1,6	1,0	0,7		
242	Gutartige Neubildungen der Brustdrüse	Weibl.	4,5	-	0,0	0,0	0,1	2,4	4,1	4,8		
243		Insges.	2,8	-	0,0	0,0	0,4	2,0	2,5	2,7		
244	218	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
245	Leiomyom des Uterus	Weibl.	17,4	0,2	-	0,0	0,0	0,1	0,7	2,8		
246		Insges.	9,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3		
247	219	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
248	Sonstige gutartige Neubildungen des	Weibl.	2,8	-	-	-	0,1	0,1	0,8	1,7		
249	Uterus	Insges.	1,4	-	-	-	0,0	0,1	0,4	0,8		
250	220	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-		
251	Gutartige Neubildungen des Ovars	Weibl.	5,9	0,3	0,1	0,1	0,7	5,9	9,6	9,6		
252		Insges.	3,1	0,1	0,1	0,0	0,3	2,9	4,6	4,6		
253	223	Männl.	0,7	-	0,0	0,0	-	0,1	0,2	0,1		
254	Gutartige Neubildungen der Niere und	Weibl.	0,6	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1		
255	sonstiger Harnorgane	Insges.	0,6	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1		
256	225	Männl.	1,0	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8		
257	Gutartige Neubildungen des Gehirns	Weibl.	1,4	0,1	0,8	0,5	0,8	0,6	0,5	0,8		
258	und sonstiger Teile des Nerven- systems	Insges.	1,2	0,2	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,8		
259	REST 210-229	Männl.	3,5	7,0	3,1	2,3	1,9	2,6	2,6	2,3		
260	Sonstige gutartige Neubildungen	Weibl.	4,0	8,7	4,1	2,5	2,0	2,8	3,6	3,5		
261		Insges.	3,8	7,8	3,6	2,4	1,9	2,7	3,1	2,9		
262	230-234 (EXKL.233.1)	Männl.	0,2	-	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,0		
263	Carcinoma in situ	Weibl.	0,6	-	-	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5		
264		Insges.	0,4	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,3	1,6	2,4	2,7	2,9	2,9	2,7	3,0	1,8	1,1	1,4	0,2	235
1,6	2,4	3,4	4,2	4,5	3,9	3,1	3,2	2,0	1,1	0,5	0,2	236
1,5	2,0	2,9	3,5	3,7	3,4	3,0	3,1	2,0	1,1	0,8	0,2	237
1,5	1,9	2,0	2,4	3,2	3,5	4,4	5,9	5,6	7,3	7,7	6,0	238
2,4	2,3	2,8	3,5	3,3	3,5	3,4	3,6	4,1	4,5	4,8	5,2	239
1,9	2,1	2,4	2,9	3,2	3,5	3,8	4,4	4,6	5,4	5,7	5,4	240
0,6	0,5	0,7	0,8	0,9	1,3	2,0	2,0	2,8	2,5	1,7	0,2	241
5,9	7,5	10,9	11,8	7,8	4,5	4,7	3,6	2,4	2,1	1,2	0,8	242
3,2	3,9	5,8	6,3	4,4	2,9	3,6	3,0	2,5	2,2	1,3	0,6	243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
11,1	35,8	78,3	91,8	42,6	7,7	2,9	2,1	1,2	0,8	0,5	0,3	245
5,4	17,5	38,9	46,1	21,5	4,0	1,7	1,4	0,8	0,5	0,3	0,2	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247
2,3	3,7	7,8	9,7	8,6	3,9	1,7	1,8	0,9	1,0	0,4	0,4	248
1,1	1,8	3,9	4,9	4,3	2,0	1,0	1,2	0,6	0,7	0,3	0,3	249
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
9,3	8,5	10,2	8,8	6,0	5,4	4,4	5,1	4,8	4,3	3,1	2,7	251
4,5	4,2	5,0	4,4	3,0	2,8	2,6	3,3	3,3	3,0	2,2	2,0	252
0,2	0,1	0,3	0,4	0,7	1,6	3,2	2,6	3,7	5,4	3,5	3,7	253
0,2	0,3	0,3	0,4	0,7	1,1	1,5	1,5	2,0	2,0	1,6	0,8	254
0,2	0,2	0,3	0,4	0,7	1,3	2,2	1,9	2,5	3,0	2,2	1,6	255
0,9	1,0	1,0	1,9	2,1	1,5	1,7	1,0	1,1	0,3	-	-	256
0,8	1,4	1,3	2,9	3,5	2,8	2,7	2,7	0,9	0,5	0,2	0,1	257
0,9	1,2	1,2	2,4	2,8	2,2	2,3	2,1	0,9	0,4	0,1	0,1	258
2,4	2,9	3,9	4,2	4,3	5,8	6,8	6,0	6,2	5,5	4,4	3,3	259
3,9	4,2	5,7	6,1	5,9	4,9	4,7	4,8	3,0	1,9	1,6	1,0	260
3,1	3,6	4,8	5,2	5,1	5,3	5,5	5,2	4,0	3,0	2,4	1,6	261
0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0	1,0	0,9	0,6	262
0,9	0,7	0,8	1,0	1,1	0,9	0,7	0,9	0,9	1,3	0,8	0,4	263
0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,2	0,8	0,4	264

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
265	233.1	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
266	Carcinoma in situ der Cervix uteri	Weibl.	5,1	-	0,0	-	-	0,1	4,6	15,6
267		Insges.	2,7	-	0,0	-	-	0,1	2,2	7,5
268	235-239	Männl.	4,0	2,0	0,9	1,3	1,1	1,2	1,2	1,7
269	Neubildungen ungewissen Verhaltens	Weibl.	4,6	2,4	0,8	0,7	0,9	1,2	1,8	2,7
270	und nicht näher bezeichneter Natur	Insges.	4,3	2,2	0,9	1,0	1,0	1,2	1,5	2,2
Klasse III										
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen sowie Immunitätsstörungen (240 - 279)										
271	240	Männl.	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6
272	Blande diffuse und nicht näher be-	Weibl.	3,1	1,1	0,2	0,2	0,5	1,4	2,1	3,8
273	zeichnete Struma	Insges.	2,0	0,8	0,2	0,2	0,4	0,8	1,2	2,1
274	241	Männl.	1,8	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,4
275	Blande knotige Struma	Weibl.	9,4	-	0,1	0,0	0,7	3,0	6,3	11,4
276		Insges.	5,8	-	0,0	0,0	0,4	1,7	3,5	6,2
277	242	Männl.	1,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5
278	Hyperthyreose mit oder ohne Struma	Weibl.	6,2	-	0,1	0,1	0,4	1,3	2,0	3,9
279		Insges.	3,7	0,0	0,1	0,1	0,3	0,8	1,2	2,1
280	243-246	Männl.	0,2	2,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
281	Hyperthyreose, Thyreoiditis und	Weibl.	0,7	3,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,7
282	sonstige Krankheiten der Schilddrüse	Insges.	0,5	2,6	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4
283	250	Männl.	22,0	0,6	1,6	4,6	8,8	9,3	8,1	9,0
284	Diabetes mellitus	Weibl.	32,0	0,6	1,6	4,8	10,0	10,8	15,5	12,4
285		Insges.	27,2	0,6	1,6	4,7	9,4	10,1	11,7	10,6
286	251-259	Männl.	2,3	3,6	2,0	2,4	3,9	2,8	1,4	1,3
287	Sonstige Krankheiten endokriner	Weibl.	2,7	4,7	1,9	2,4	2,9	2,3	2,0	2,0
288	Drüsen	Insges.	2,5	4,1	2,0	2,4	3,4	2,6	1,7	1,6
289	260-269	Männl.	0,4	9,9	1,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
290	Alimentäre Mangelzustände	Weibl.	0,5	9,5	1,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3
291		Insges.	0,4	9,7	1,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
19,9	12,9	9,0	5,3	2,4	1,7	1,0	1,1	0,6	0,3	0,0	0,1	266
9,7	6,3	4,5	2,7	1,2	0,9	0,6	0,7	0,4	0,2	0,0	0,1	267
1,3	2,4	2,9	4,7	6,7	10,3	11,8	11,3	13,5	12,6	11,9	6,6	268
3,1	3,7	4,3	6,1	8,7	7,5	7,7	9,8	8,7	9,7	7,3	5,9	269
2,2	3,1	3,6	5,4	7,7	8,9	9,4	10,3	10,3	10,6	8,7	6,1	270
0,8	1,2	1,7	1,1	1,4	1,3	1,3	0,9	1,2	0,6	0,8	0,2	271
4,7	5,5	6,5	5,2	4,9	5,1	3,4	3,6	1,9	1,0	0,7	0,3	272
2,7	3,3	4,1	3,2	3,2	3,2	2,5	2,7	1,7	0,9	0,7	0,3	273
1,8	3,1	4,1	3,7	3,5	3,7	3,5	2,2	1,3	0,8	0,1	0,2	274
13,7	16,8	19,6	17,3	17,6	15,8	11,0	9,9	5,2	3,4	1,3	0,4	275
7,6	9,8	11,8	10,5	10,6	9,9	7,8	7,2	3,9	2,6	0,9	0,4	276
0,7	1,2	1,1	1,5	2,2	2,5	3,3	2,8	2,5	1,6	0,5	0,2	277
5,2	6,3	7,2	9,6	11,7	12,6	10,7	15,5	11,8	8,6	3,9	0,7	278
2,9	3,7	4,2	5,6	7,0	7,7	7,6	11,1	8,8	6,4	2,9	0,6	279
0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,1	-	0,1	-	280
0,5	0,8	0,8	1,2	1,1	1,0	0,7	0,7	0,7	0,6	0,3	0,1	281
0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1	282
12,1	16,0	20,4	24,7	39,6	50,2	54,0	63,8	74,8	69,0	56,7	33,9	283
9,8	11,5	12,0	19,3	34,1	49,7	63,5	96,9	112,7	105,4	82,9	44,8	284
11,0	13,8	16,3	22,0	36,8	49,9	59,5	85,4	100,4	94,2	75,2	41,9	285
1,4	1,6	2,1	2,8	3,2	2,8	2,6	2,4	2,5	2,9	2,2	2,3	286
2,7	1,9	2,9	2,9	2,9	3,3	3,0	3,1	3,6	3,7	3,2	1,8	287
2,1	1,8	2,5	2,8	3,1	3,0	2,8	2,9	3,2	3,5	2,9	1,9	288
0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	1,0	1,8	289
0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	0,5	1,8	290
0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,7	1,8	291

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
292	274	Männl.	0,5	-	-	0,0	-	-	0,1	0,2
293	Gicht	Weibl.	0,2	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1
294		Insges.	0,3	-	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1
295	278	Männl.	1,5	0,2	0,3	0,9	2,6	1,0	0,7	1,0
296	Fettsucht und sonstige Überernäh-	Weibl.	2,9	0,1	0,2	1,3	2,9	1,9	1,7	2,5
297	rung	Insges.	2,2	0,1	0,2	1,1	2,8	1,4	1,2	1,7
298	270-273,275-277,	Männl.	2,5	17,5	3,7	2,7	2,7	1,3	1,2	1,2
299	Sonstige Stoffwechselkrankheiten	Weibl.	1,8	13,4	4,0	2,0	2,4	1,3	0,8	1,1
300	und Immunitätsstörungen	Insges.	2,1	15,5	3,9	2,3	2,6	1,3	1,0	1,1
Klasse IV										
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (280 - 289)										
301	280	Männl.	1,0	9,6	0,6	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2
302	Eisenmangelanämien	Weibl.	2,4	6,9	0,7	0,1	0,4	1,6	0,9	1,0
303		Insges.	1,7	8,3	0,7	0,1	0,3	1,0	0,6	0,6
304	281	Männl.	0,9	3,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
305	Sonstige Mangelanämien	Weibl.	1,5	2,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2
306		Insges.	1,2	2,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
307	282-285	Männl.	2,4	11,1	2,0	0,8	1,2	1,2	0,8	0,6
308	Sonstige Anämien	Weibl.	3,3	8,7	1,8	1,7	0,6	1,1	0,8	0,7
309		Insges.	2,9	10,0	1,9	1,2	0,9	1,2	0,8	0,7
310	286,287	Männl.	3,3	4,5	9,9	14,2	6,3	2,8	1,3	2,4
311	Blutgerinnungsstörungen und	Weibl.	1,3	2,4	5,8	4,2	1,3	0,4	0,9	0,7
312	sonstige hämorrhagen Zustände	Insges.	2,3	3,5	7,9	9,3	3,8	1,6	1,1	1,6
313	288,289	Männl.	3,4	3,0	6,2	12,7	10,3	3,9	1,9	1,1
314	Krankheiten der Leukozyten und	Weibl.	3,4	2,9	4,2	12,1	12,1	5,7	2,8	2,2
315	sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	Insges.	3,4	2,9	5,2	12,4	11,2	4,8	2,3	1,6
Klasse V										
Psychische Krankheiten (290 - 319)										
316	291	Männl.	4,1	-	-	-	-	0,2	1,4	4,3
317	Alkoholpsychosen	Weibl.	0,7	-	0,0	-	0,0	0,1	0,3	0,6
318		Insges.	2,3	-	0,0	-	0,0	0,1	0,9	2,5

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,3	0,7	0,9	1,1	1,4	1,1	1,1	1,1	0,7	1,0	1,3	1,2	292
0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	0,7	0,8	0,6	293
0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,4	0,8	0,9	0,8	294
1,5	2,1	2,5	2,6	2,6	2,8	1,5	0,7	0,4	0,3	0,1	0,4	295
3,4	5,4	6,4	5,6	5,9	4,5	2,0	1,0	0,6	0,4	0,2	0,3	296
2,4	3,7	4,4	4,1	4,3	3,7	1,8	0,9	0,5	0,4	0,2	0,3	297
1,2	2,2	3,4	3,1	2,8	3,2	3,5	2,1	1,6	1,0	1,1	0,8	298
0,8	1,2	1,4	2,5	2,8	1,6	1,7	1,3	1,5	1,2	0,7	0,5	299
1,0	1,7	2,4	2,8	2,8	2,4	2,5	1,6	1,5	1,2	0,8	0,6	300
0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,7	2,5	3,5	5,7	7,7	6,0	301
1,4	1,8	2,5	3,4	2,9	1,8	1,9	3,4	5,2	8,1	8,4	8,7	302
0,8	1,1	1,5	2,1	1,9	1,5	1,8	3,1	4,7	7,4	8,2	8,0	303
0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,4	1,9	3,0	5,9	6,2	5,9	8,8	304
0,7	0,6	0,5	1,0	1,1	1,4	1,8	2,8	5,3	7,0	8,0	7,6	305
0,4	0,4	0,5	0,8	0,9	1,4	1,9	2,9	5,5	6,7	7,4	7,9	306
0,9	0,8	0,9	1,3	1,4	4,3	4,5	9,5	8,4	11,0	18,6	15,0	307
1,0	1,4	1,2	2,8	2,8	3,1	5,2	5,6	8,2	12,5	15,5	12,9	308
1,0	1,1	1,0	2,0	2,1	3,7	4,9	6,9	8,3	12,1	16,4	13,5	309
2,1	1,1	0,9	1,2	1,5	1,2	1,2	2,1	1,9	0,4	0,4	0,4	310
0,5	0,4	0,6	0,6	0,9	0,9	0,7	1,4	0,8	0,8	1,0	0,6	311
1,3	0,8	0,8	0,9	1,2	1,0	0,9	1,6	1,2	0,6	0,8	0,5	312
0,9	0,8	0,7	1,2	1,4	2,1	2,8	2,5	3,2	3,1	3,0	3,1	313
1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,9	1,8	1,8	0,9	314
1,2	1,1	1,2	1,4	1,5	1,9	2,2	2,0	2,3	2,2	2,2	1,5	315
8,1	9,1	7,8	8,1	7,8	6,3	3,3	1,8	0,4	0,7	0,4	0,2	316
1,1	1,2	1,9	2,0	1,4	1,5	0,8	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	317
4,7	5,2	4,9	5,0	4,6	3,8	1,9	0,9	0,2	0,4	0,1	0,1	318

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
319	290,292-294	Männl.	1,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	0,4
320	Sonstige organische psychotische	Weibl.	2,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6
321	Zustände	Insges.	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	0,5
322	295	Männl.	6,0	0,2	0,0	-	0,1	2,7	9,2	10,6
323	Schizophrene Psychosen	Weibl.	6,3	0,2	0,0	-	0,0	2,5	6,7	9,8
324		Insges.	6,1	0,2	0,0	-	0,1	2,6	8,0	10,2
325	296	Männl.	2,5	-	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,1
326	Affektive Psychosen	Weibl.	5,5	-	0,0	0,0	0,1	0,7	2,3	3,8
327		Insges.	4,0	-	0,0	0,0	0,1	0,5	1,9	2,9
328	297-299	Männl.	1,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	1,2	1,4
329	Sonstige Formen der Psychosen	Weibl.	2,3	-	0,1	0,1	0,3	1,1	1,7	1,8
330		Insges.	1,8	0,0	0,1	0,2	0,3	0,9	1,4	1,6
331	300	Männl.	5,0	2,4	0,0	0,5	1,5	2,3	6,2	8,4
332	Neurosen	Weibl.	9,0	1,5	0,0	0,3	0,9	4,5	10,2	13,5
333		Insges.	7,0	2,0	0,0	0,4	1,2	3,4	8,1	10,9
334	301	Männl.	1,1	-	0,0	0,1	0,3	1,2	1,8	2,3
335	Persönlichkeitsstörungen	Weibl.	1,0	-	0,0	0,1	0,2	1,8	1,8	1,9
336		Insges.	1,0	-	0,0	0,1	0,3	1,5	1,8	2,1
337	303	Männl.	25,7	0,3	0,1	0,1	0,1	2,3	11,7	32,1
338	Alkoholismus	Weibl.	5,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,8	2,3	6,7
339		Insges.	15,1	0,2	0,0	0,0	0,1	1,6	7,1	19,8
340	304	Männl.	0,2	-	-	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
341	Arzneimittel- oder Rauschgiftab-	Weibl.	0,3	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3
342	hängigkeit	Insges.	0,2	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3
343	306	Männl.	3,9	0,8	0,5	0,7	1,3	2,0	3,5	4,4
344	Psychosomatische Funktions-	Weibl.	5,1	0,5	0,5	0,9	2,2	4,7	4,8	5,8
345	störungen	Insges.	4,5	0,7	0,5	0,8	1,8	3,3	4,1	5,1
346	307	Männl.	2,2	1,1	4,4	18,6	6,6	0,8	0,2	0,3
347	Spezielle Symptome und Syndrome,	Weibl.	2,1	1,0	5,5	14,2	6,4	3,6	1,6	0,8
348	nicht andernorts klassifizierbar	Insges.	2,2	1,1	4,9	16,4	6,5	2,1	0,9	0,6

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
0,6	0,8	0,8	1,3	1,9	2,3	3,8	3,9	6,5	7,1	11,6	11,7		319
0,6	0,8	0,8	1,6	2,4	3,3	3,5	5,3	8,2	11,5	12,2	12,7		320
0,6	0,8	0,8	1,4	2,2	2,8	3,6	4,8	7,7	10,1	12,1	12,4		321
12,1	12,4	10,5	8,5	6,3	4,4	2,7	1,3	1,2	0,9	0,5	1,0		322
11,0	11,7	11,0	10,9	11,1	8,0	5,7	4,9	2,4	1,9	0,8	0,9		323
11,6	12,1	10,7	9,7	8,7	6,3	4,4	3,6	2,0	1,6	0,7	0,9		324
2,6	4,0	4,0	5,2	5,4	5,0	3,6	3,4	1,7	1,4	0,9	0,2		325
4,6	6,5	7,6	9,7	10,9	11,2	11,2	10,8	8,6	5,1	2,3	0,3		326
3,6	5,2	5,8	7,5	8,2	8,2	8,0	8,2	6,3	3,9	1,9	0,3		327
1,7	2,2	1,9	2,1	1,5	1,9	1,7	1,6	2,0	1,3	0,7	0,8		328
2,6	2,4	2,5	3,2	3,6	3,9	4,0	4,1	3,6	3,4	1,9	1,9		329
2,2	2,3	2,2	2,6	2,6	2,9	3,1	3,2	3,1	2,7	1,5	1,6		330
9,8	10,2	9,6	7,1	4,8	3,5	2,0	0,8	0,8	0,5	0,4	0,2		331
19,9	21,1	20,8	18,8	11,5	7,1	3,3	2,9	1,6	0,8	0,4	0,4		332
14,7	15,6	15,2	13,0	8,2	5,4	2,7	2,2	1,4	0,7	0,4	0,4		333
2,0	2,1	1,6	1,1	0,8	0,8	0,4	0,0	0,2	0,1	-	-		334
1,6	1,6	1,4	1,5	1,0	0,7	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1		335
1,8	1,9	1,5	1,3	0,9	0,7	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1		336
57,0	62,3	53,3	50,1	39,5	27,6	14,0	6,6	2,7	2,2	1,2	2,1		337
11,6	13,3	12,9	13,2	9,8	6,2	3,0	1,7	0,7	0,3	0,1	0,1		338
35,0	38,4	33,3	31,6	24,5	16,6	7,6	3,4	1,3	0,9	0,5	0,6		339
0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	-	-	0,2		340
0,4	0,6	0,8	0,7	0,5	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	-		341
0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		342
5,7	7,4	7,2	7,3	5,9	4,3	3,1	1,7	0,9	0,6	0,6	0,2		343
7,4	9,5	11,1	10,1	8,2	6,7	4,0	2,6	1,4	0,7	0,8	0,1		344
6,6	8,4	9,1	8,7	7,1	5,5	3,6	2,3	1,3	0,7	0,7	0,2		345
0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-	-		346
0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-	0,1		347
0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1		348

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
349	308,309	Männl.	2,7	0,4	0,1	0,9	2,0	3,1	4,3	4,7
350	Akute Streßreaktion und Anpas-	Weibl.	3,2	0,1	0,2	0,2	1,0	4,2	4,7	4,5
351	sungsstörung	Insges.	3,0	0,2	0,1	0,6	1,6	3,7	4,5	4,6
352	310	Männl.	0,8	0,1	0,3	0,9	0,5	0,2	0,3	0,4
353	Spezifische nichtpsychotische psy-	Weibl.	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
354	chische Störungen nach organischer Hirnschädigung	Insges.	0,6	0,1	0,2	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3
355	313-315	Männl.	1,4	7,5	6,7	8,4	3,4	0,5	0,0	0,1
356	Emotionelle Störungen, hyperkineti-	Weibl.	0,6	5,0	3,5	2,8	1,5	0,5	0,0	0,1
357	schies Syndrom des Kindesalters und spezifische Entwicklungsverzöge- rungen	Insges.	1,0	6,3	5,1	5,7	2,5	0,5	0,0	0,1
358	REST 300-316	Männl.	6,5	0,1	0,8	5,3	6,6	7,7	8,3	9,2
359	Sonstige psychische Störungen	Weibl.	3,0	-	0,5	1,0	1,6	4,6	3,1	3,7
360		Insges.	4,7	0,0	0,6	3,2	4,1	6,2	5,8	6,5
361	317	Männl.	0,9	0,2	1,3	2,3	1,5	2,2	1,0	1,2
362	Leichte geistige Retardierung	Weibl.	0,5	0,3	1,0	1,4	0,7	1,1	0,6	0,9
363		Insges.	0,7	0,2	1,2	1,9	1,1	1,7	0,8	1,1
364	318,319	Männl.	1,7	1,2	3,0	3,9	2,4	2,7	2,7	2,2
365	Sonstige geistige Retardierung	Weibl.	1,0	0,5	2,8	1,9	1,4	1,9	1,4	1,2
366		Insges.	1,3	0,9	2,9	2,9	1,9	2,3	2,1	1,7
Klasse VI										
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (320 - 389)										
367	320-322	Männl.	1,3	13,9	5,9	2,8	1,2	0,9	0,5	0,6
368	Meningitis	Weibl.	0,8	12,4	4,1	1,6	0,7	0,6	0,4	0,3
369		Insges.	1,0	13,2	5,0	2,2	1,0	0,7	0,4	0,5
370	323-326	Männl.	0,8	1,3	1,0	0,6	0,7	0,9	0,7	0,7
371	Sonstige entzündliche Krankheiten	Weibl.	0,7	1,4	1,3	0,6	0,5	0,8	0,8	0,6
372	des Zentralen Nervensystems	Insges.	0,7	1,3	1,2	0,6	0,6	0,9	0,7	0,7
373	332	Männl.	1,3	-	0,0	-	-	0,1	0,0	0,0
374	Parkinson' Krankheit	Weibl.	1,1	-	-	-	-	-	0,0	0,0
375		Insges.	1,2	-	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
376	330,331,333-337	Männl.	2,0	12,1	2,9	1,5	1,5	0,9	1,0	0,9
377	Sonstige hereditäre und degenerative	Weibl.	1,6	10,9	2,0	1,5	1,2	0,9	0,4	1,0
378	Krankheiten des Zentralen Nerven-	Insges.	1,8	11,5	2,5	1,5	1,3	0,9	0,7	1,0

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
4,1	4,1	3,6	2,9	2,7	2,0	1,4	1,4	1,2	0,9	1,0	0,6	349
5,2	5,7	5,7	5,3	3,9	2,7	2,0	2,3	2,0	1,2	0,8	0,6	350
4,6	4,9	4,7	4,1	3,3	2,3	1,7	2,0	1,7	1,1	0,9	0,6	351
0,4	0,5	1,0	0,9	1,9	2,8	3,0	0,3	0,9	0,4	0,4	0,6	352
0,1	0,3	0,4	0,6	1,2	1,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	353
0,3	0,4	0,7	0,7	1,5	2,2	1,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	354
0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	355
0,1	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-	-	0,1	-	-	356
0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	357
9,4	8,8	8,1	6,6	6,5	5,6	4,0	3,6	2,8	1,3	1,7	1,6	358
4,5	4,1	4,4	4,1	3,2	3,2	2,8	2,7	2,6	1,8	1,4	0,8	359
7,0	6,5	6,3	5,3	4,9	4,4	3,3	3,0	2,7	1,7	1,5	1,0	360
1,0	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	-	0,1	-	0,2	361
0,7	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	-	-	-	0,1	362
0,9	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	-	0,0	-	0,1	363
1,8	1,1	1,3	0,6	0,9	0,5	0,5	0,3	-	0,2	-	0,2	364
1,1	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	365
1,5	0,8	1,0	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	366
0,4	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,9	0,5	0,2	367
0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	368
0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4	0,3	369
0,9	0,7	0,7	0,9	0,7	1,0	1,2	0,3	0,2	-	-	-	370
0,8	0,6	1,1	0,9	0,7	0,6	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	371
0,8	0,7	0,9	0,9	0,7	0,8	0,6	0,3	0,3	0,0	0,2	0,1	372
0,1	0,2	0,5	1,6	2,6	4,4	5,3	7,0	6,8	4,4	2,0	0,6	373
-	0,1	0,5	1,0	1,5	2,5	4,1	4,0	4,3	2,2	1,4	0,3	374
0,1	0,2	0,5	1,3	2,1	3,4	4,6	5,0	5,1	2,9	1,6	0,4	375
1,2	1,3	1,8	2,3	2,5	3,9	3,8	3,4	1,7	2,0	1,2	1,2	376
1,0	1,3	1,5	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,0	1,4	1,5	1,0	377
1,1	1,3	1,7	2,2	2,3	3,0	2,9	2,6	1,9	1,6	1,4	1,1	378

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
379	340	Männl.	1,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,9	1,1
380	Multiple Sklerose	Weibl.	1,8	0,1	-	0,1	0,1	0,5	1,3	2,3
381		Insges.	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,6
382	341-344	Männl.	1,6	6,5	5,1	3,9	1,8	1,8	0,7	0,6
383	Sonstige Lähmungserscheinungen als Krankheiten des Zentralen Nerven-	Weibl.	1,3	4,9	4,6	3,1	2,0	1,7	0,8	0,6
384		Insges.	1,4	5,7	4,8	3,5	1,9	1,8	0,7	0,6
385	345	Männl.	9,1	17,8	23,9	13,6	9,9	8,1	8,3	10,0
386	Epilepsien	Weibl.	6,1	15,7	18,6	13,1	9,3	9,8	6,4	7,0
387		Insges.	7,6	16,8	21,3	13,3	9,6	8,9	7,4	8,6
388	346-349	Männl.	1,4	3,9	1,7	2,5	2,1	1,1	0,9	1,1
389	Migräne und sonstige Krankheiten des Zentralen Nervensystems	Weibl.	1,9	2,2	1,6	1,5	1,9	1,3	1,2	1,4
390		Insges.	1,6	3,1	1,6	2,0	2,0	1,2	1,0	1,2
391	350-352	Männl.	1,0	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6
392	Krankheiten der Hirnnerven	Weibl.	1,3	0,4	0,5	0,5	0,8	0,8	0,5	0,6
393		Insges.	1,1	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6
394	353-359	Männl.	2,7	2,5	1,0	0,7	1,4	1,4	1,6	1,8
395	Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	Weibl.	2,6	1,3	0,6	0,5	0,7	1,4	1,5	1,7
396		Insges.	2,6	1,9	0,8	0,6	1,1	1,4	1,6	1,7
397	361	Männl.	1,4	0,3	0,2	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5
398	Netzhautablösung und Netzhaut- defekte	Weibl.	1,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
399		Insges.	1,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4
400	362	Männl.	1,2	1,3	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4
401	Sonstige Krankheiten der Netzhaut	Weibl.	1,2	1,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
402		Insges.	1,2	1,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3
403	364	Männl.	1,0	0,2	0,2	0,6	0,5	0,4	0,7	1,0
404	Krankheiten der Iris und des Ziliar- körpers	Weibl.	0,9	0,1	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
405		Insges.	0,9	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8
406	365	Männl.	3,4	0,7	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,8
407	Glaukom	Weibl.	4,2	0,7	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
408		Insges.	3,8	0,7	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
1,4	2,2	2,2	2,4	1,5	1,5	1,2	0,4	0,2	-	0,1	0,2	0,2	379
3,1	3,9	4,8	3,9	4,0	2,3	1,2	0,5	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	380
2,2	3,1	3,5	3,2	2,8	1,9	1,2	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	381
0,8	0,6	1,1	1,1	0,9	1,3	1,4	1,7	1,5	1,1	0,6	0,4	0,4	382
0,8	0,6	0,9	1,0	1,0	0,8	0,8	0,9	0,7	0,9	0,3	0,4	0,4	383
0,8	0,6	1,0	1,0	0,9	1,1	1,0	1,2	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	384
10,0	8,8	7,2	7,3	6,7	6,3	4,4	3,4	2,8	2,5	0,7	1,0	1,0	385
6,5	5,4	4,5	4,3	3,3	3,1	2,0	2,4	0,8	0,9	0,6	0,3	0,3	386
8,3	7,2	5,8	5,8	5,0	4,7	3,0	2,8	1,5	1,4	0,7	0,5	0,5	387
1,2	1,4	1,2	1,3	1,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	388
2,9	2,7	3,8	4,2	3,3	1,7	0,8	0,7	0,4	0,3	0,2	0,6	0,6	389
2,0	2,1	2,5	2,8	2,4	1,5	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	390
0,7	0,7	1,0	1,2	1,6	2,0	1,5	2,2	2,0	1,9	1,3	1,0	1,0	391
1,3	1,2	1,3	1,6	1,8	1,8	1,5	2,1	2,7	2,8	1,6	1,0	1,0	392
1,0	1,0	1,1	1,4	1,7	1,9	1,5	2,2	2,5	2,5	1,5	1,0	1,0	393
2,2	2,7	3,2	4,6	5,0	5,5	5,6	4,2	2,5	2,0	1,3	0,8	0,8	394
2,2	2,9	4,1	4,9	6,2	4,5	3,6	2,8	2,8	1,8	0,9	0,4	0,4	395
2,2	2,8	3,6	4,7	5,6	5,0	4,4	3,3	2,7	1,9	1,1	0,5	0,5	396
0,7	0,9	0,8	1,3	2,2	3,1	4,1	6,2	6,0	3,5	2,8	2,1	2,1	397
0,5	0,2	0,6	1,1	1,5	2,6	3,4	4,1	3,9	2,9	1,8	0,6	0,6	398
0,6	0,6	0,7	1,2	1,9	2,9	3,7	4,8	4,6	3,1	2,1	1,0	1,0	399
0,4	0,9	1,2	1,2	1,8	2,7	3,3	4,3	5,5	4,3	4,7	3,5	3,5	400
0,5	0,4	0,5	0,9	1,6	2,1	2,5	3,7	3,9	4,1	3,7	1,9	1,9	401
0,4	0,7	0,9	1,0	1,7	2,4	2,8	3,9	4,5	4,1	4,0	2,3	2,3	402
0,9	1,3	1,3	1,3	1,4	1,7	1,7	1,5	1,0	1,4	1,2	1,4	1,4	403
0,9	0,9	0,6	1,4	1,2	1,2	1,1	1,5	1,2	1,8	1,1	0,9	0,9	404
0,9	1,1	1,0	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,1	1,7	1,2	1,0	1,0	405
1,1	1,9	3,0	4,2	5,5	8,2	9,5	12,8	15,9	14,6	12,2	9,4	9,4	406
0,7	1,0	1,8	3,8	6,6	7,8	8,9	11,9	13,4	16,1	11,1	9,8	9,8	407
0,9	1,5	2,4	4,0	6,0	8,0	9,1	12,2	14,2	15,6	11,4	9,7	9,7	408

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
409	366	Männl.	7,8	1,0	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,8
410	Katarakt	Weibl.	11,9	0,9	0,5	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3
411		Insges.	9,9	1,0	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,6
412	368	Männl.	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
413	Sehstörungen	Weibl.	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
414		Insges.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
415	370	Männl.	0,7	0,2	0,2	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4
416	Keratitis	Weibl.	0,5	0,7	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
417		Insges.	0,6	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4
418	372	Männl.	0,7	6,4	1,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,3
419	Krankheiten der Konjunktiva	Weibl.	0,5	5,3	1,3	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4
420		Insges.	0,6	5,9	1,4	0,5	0,2	0,2	0,4	0,4
421	375	Männl.	0,5	10,9	2,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1
422	Krankheiten des Tränensystems	Weibl.	0,7	8,8	2,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
423		Insges.	0,6	9,9	2,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1
424	377	Männl.	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,4
425	Krankheiten des Nervus opticus und der Sehbahn	Weibl.	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5	0,7
426		Insges.	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5
427	378	Männl.	2,2	0,4	8,1	13,8	3,1	1,7	1,1	1,0
428	Strabismus und sonstige Störungen der Bewegungen beider Augen	Weibl.	2,3	0,4	9,1	14,0	2,9	2,1	1,5	1,4
429		Insges.	2,3	0,4	8,6	13,9	3,0	1,9	1,3	1,2
430	REST 360-379	Männl.	3,4	4,1	4,3	2,6	1,9	1,7	2,0	2,1
431	Sonstige Augenkrankheiten	Weibl.	3,4	3,2	3,6	2,1	1,8	1,7	1,9	1,8
432		Insges.	3,4	3,7	3,9	2,4	1,8	1,7	1,9	2,0
433	380	Männl.	1,0	1,2	1,0	1,6	1,0	0,9	0,8	0,9
434	Krankheiten des äußeren Ohres	Weibl.	0,6	1,1	0,6	2,0	1,1	0,7	0,7	0,5
435		Insges.	0,8	1,2	0,8	1,8	1,1	0,8	0,7	0,7
436	381	Männl.	4,6	83,4	33,9	8,9	2,8	1,1	1,0	1,2
437	Nichteitrige Otitis media und Krank- heiten der Tuba auditiva	Weibl.	3,3	65,9	26,8	6,9	2,3	0,9	0,7	1,0
438		Insges.	3,9	74,9	30,4	7,9	2,6	1,0	0,9	1,1

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,8	1,1	1,8	4,5	7,1	13,5	21,4	37,8	50,2	63,5	74,7	67,1	409
0,6	0,9	1,6	3,0	4,8	10,0	17,9	37,0	53,1	68,1	71,4	55,0	410
0,7	1,0	1,7	3,7	5,9	11,7	19,4	37,3	52,1	66,7	72,4	58,2	411
0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	-	412
0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	413
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	-	414
0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	1,1	1,4	1,5	1,6	2,2	3,1	1,8	415
0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	1,3	1,4	1,7	2,0	1,5	416
0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,9	1,4	1,5	1,8	2,3	1,6	417
0,4	0,6	0,5	0,8	0,9	1,1	0,7	0,8	0,8	0,9	0,3	-	418
0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4	0,6	0,3	0,2	0,1	419
0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	0,2	0,1	420
0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,6	0,3	0,9	0,4	0,3	1,2	421
0,1	0,3	0,4	0,6	0,5	0,7	0,9	1,1	1,1	1,4	1,5	1,3	422
0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,8	1,0	1,1	1,1	1,3	423
0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6	0,9	0,4	0,7	0,6	0,2	424
0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,7	0,3	0,6	0,5	0,6	0,3	0,2	425
0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,4	0,7	0,5	0,6	0,4	0,2	426
0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	427
1,7	1,1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	428
1,1	0,7	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	429
2,2	2,7	3,1	3,3	3,2	4,2	5,8	6,5	9,8	11,0	12,2	8,2	430
2,1	2,2	2,4	3,1	3,1	3,5	3,7	5,3	7,0	9,1	9,7	7,6	431
2,1	2,4	2,7	3,2	3,1	3,9	4,6	5,7	7,9	9,6	10,4	7,8	432
0,9	1,0	0,9	1,2	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,5	0,7	0,6	433
0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	434
0,7	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	435
1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,2	0,4	0,6	-	436
0,9	1,0	0,8	1,0	0,9	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	437
1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	438

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
439	382	Männl.	3,5	49,6	23,1	4,2	3,1	1,4	1,0	1,2		
440	Eitrige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	2,5	43,2	18,4	3,5	1,8	1,1	0,8	1,2		
441	Otitis media	Insges.	3,0	46,5	20,8	3,9	2,5	1,2	0,9	1,2		
442	383-385	Männl.	2,3	7,1	10,6	4,9	2,9	1,6	1,2	1,5		
443	Mastoiditis und sonstige Krankheiten	Weibl.	1,7	6,9	10,0	3,4	1,9	1,5	1,0	1,2		
444	des Trommelfells, des Mittelohrs und des Warzenfortsatzes	Insges.	2,0	7,0	10,3	4,2	2,4	1,5	1,1	1,4		
445	386	Männl.	1,9	-	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,9		
446	Schwindelsyndrome und sonstige	Weibl.	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,7		
447	Störungen des Vestibularapparates	Insges.	1,8	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8		
448	387,388	Männl.	2,3	0,5	0,2	0,4	0,4	1,0	1,3	1,6		
449	Otosklerose und sonstige Krank-	Weibl.	2,0	0,1	0,2	0,4	0,3	0,9	0,8	1,6		
450	heiten des Ohres	Insges.	2,1	0,3	0,2	0,4	0,4	1,0	1,1	1,6		
451	389	Männl.	0,9	1,3	3,8	2,4	0,7	0,4	0,2	0,6		
452	Schwerhörigkeit und Taubheit	Weibl.	0,6	0,9	2,8	1,9	0,6	0,5	0,2	0,4		
453		Insges.	0,7	1,1	3,3	2,1	0,6	0,4	0,2	0,5		
	Klasse VII											
	Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 459)											
454	390-392	Männl.	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2		
455	Akutes rheumatisches Fieber	Weibl.	0,2	-	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2		
456		Insges.	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2		
457	394	Männl.	0,7	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1		
458	Krankheiten der Mitralklappe	Weibl.	1,5	-	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1		
459		Insges.	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1		
460	393,395-398	Männl.	1,8	0,5	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	0,5		
461	Sonstige chronische rheumatische	Weibl.	1,1	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3		
462	Herzkrankheit	Insges.	1,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4		
463	401	Männl.	11,3	0,6	0,1	0,4	1,0	3,1	2,8	4,0		
464	Essentieller Hochdruck	Weibl.	12,8	0,2	0,0	0,2	1,1	1,4	1,1	1,7		
465		Insges.	12,1	0,4	0,1	0,3	1,0	2,2	2,0	2,9		

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,8	1,2	1,5	1,7	1,2	1,3	1,0	0,9	0,6	0,9	0,5	0,8	439
1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5	-	440
1,5	1,2	1,4	1,4	1,2	1,2	0,8	0,6	0,4	0,5	0,5	0,2	441
1,6	1,3	1,4	1,7	1,2	1,1	1,1	0,8	0,8	0,2	0,1	0,2	442
1,4	1,3	1,1	1,4	1,4	0,7	0,6	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4	443
1,5	1,3	1,2	1,5	1,3	0,9	0,8	0,5	0,5	0,3	0,1	0,3	444
1,3	2,4	2,7	3,6	4,4	4,8	5,0	3,4	2,7	1,9	1,1	0,2	445
1,5	2,4	2,9	3,1	4,0	4,1	3,4	2,7	2,3	1,6	1,1	0,1	446
1,4	2,4	2,8	3,4	4,2	4,4	4,0	2,9	2,4	1,7	1,1	0,2	447
2,1	2,7	3,4	4,4	4,8	4,3	4,5	3,4	1,8	1,6	1,0	0,4	451
2,1	2,8	3,5	4,3	4,0	3,7	2,9	2,4	1,5	0,9	0,4	0,1	452
2,1	2,8	3,5	4,3	4,4	4,0	3,6	2,7	1,6	1,1	0,6	0,2	453
0,5	0,4	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4	451
0,6	0,4	0,3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	452
0,6	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	453
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	454
0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	455
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	456
0,1	0,4	1,0	1,4	2,3	2,4	2,2	0,9	0,4	0,4	0,4	0,2	457
0,4	0,6	1,7	3,4	4,2	4,5	4,9	3,4	1,7	1,3	0,9	0,2	458
0,3	0,5	1,4	2,4	3,3	3,5	3,7	2,5	1,3	1,0	0,8	0,2	459
0,9	1,5	2,4	3,0	4,2	6,2	6,5	3,5	1,7	0,8	0,7	0,4	460
0,1	0,6	0,9	2,1	2,8	2,8	3,1	2,3	1,3	1,2	0,8	0,2	461
0,5	1,1	1,6	2,6	3,5	4,4	4,5	2,7	1,4	1,0	0,8	0,3	462
5,5	9,8	13,3	18,4	25,6	34,2	35,5	20,4	20,9	19,0	19,0	13,6	463
3,7	6,9	14,7	21,3	28,7	31,5	21,3	24,5	29,1	29,3	27,1	24,4	464
4,6	8,4	14,0	19,8	27,2	32,8	27,2	23,1	26,4	26,2	24,7	21,5	465

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
466	402	Männl.	2,5	-	-	-	-	0,0	0,2	0,3
467	Hochdruck-Herzkrankheit	Weibl.	4,7	-	0,0	-	-	0,0	0,0	0,1
468		Insges.	3,6	-	0,0	-	-	0,0	0,1	0,2
469	403	Männl.	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,1	0,2
470	Hochdruck-Nierenkrankheit	Weibl.	0,3	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,0
471		Insges.	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1
472	404,405	Männl.	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
473	Hochdruck-Herz-und Nierenkrankheit	Weibl.	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
474	und sekundärer Hochdruck	Insges.	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
475	410	Männl.	20,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7
476	Akuter Myokardinfarkt	Weibl.	9,3	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
477		Insges.	14,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4
478	411	Männl.	1,4	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
479	Sonstige akute und subakute Formen	Weibl.	0,8	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0
480	der ischämischen Herzkrankheit	Insges.	1,1	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
481	413	Männl.	9,5	-	0,1	-	0,0	0,2	0,2	0,7
482	Angina pectoris	Weibl.	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
483		Insges.	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5
484	412,414	Männl.	28,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,8
485	Alter Myokardinfarkt und sonstige	Weibl.	20,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
486	Formen der chronischen ischämi- schen Herzkrankheit	Insges.	24,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6
487	415-417(EXKL.415.1)	Männl.	3,4	0,6	0,1	0,0	-	0,1	0,2	0,1
488	Krankheiten des Lungenkreislaufs	Weibl.	1,5	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
489		Insges.	2,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
490	415.1	Männl.	2,0	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,3
491	Lungenembolie	Weibl.	2,6	-	-	-	-	0,2	0,3	0,4
492		Insges.	2,3	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4
493	420-422	Männl.	1,1	0,8	0,2	0,1	0,2	0,6	1,0	1,2
494	Akute Perikarditis und Myokarditis	Weibl.	0,9	0,8	0,2	0,2	0,1	0,4	0,8	0,9
495	sowie akute und subakute Endo-	Insges.	1,0	0,8	0,2	0,2	0,1	0,5	0,9	1,1

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,3	0,7	1,8	2,9	4,9	8,5	10,2	7,4	9,5	10,6	12,1	9,0	466
0,4	0,8	1,9	3,3	7,1	8,8	7,5	11,7	15,8	20,6	20,6	16,0	467
0,3	0,8	1,8	3,1	6,0	8,6	8,6	10,2	13,8	17,5	18,1	14,2	468
0,1	0,2	0,6	0,7	0,6	0,9	1,0	0,8	0,5	0,7	0,6	0,4	469
0,2	0,2	0,4	0,6	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	470
0,2	0,2	0,5	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,2	471
0,0	0,2	0,6	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,4	0,2	0,1	0,4	472
0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5	0,7	0,5	0,3	0,7	473
0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6	0,5	0,6	0,4	0,2	0,6	474
1,9	5,6	11,1	21,0	36,7	60,4	77,5	88,5	100,1	106,4	86,1	59,9	475
0,5	0,9	1,9	3,0	7,1	13,3	18,0	29,0	42,3	50,5	41,8	30,2	476
1,2	3,3	6,5	12,0	21,8	36,1	42,9	49,7	61,1	67,7	54,9	38,1	477
0,1	0,3	0,8	1,6	2,7	4,3	5,3	5,4	6,1	8,0	6,2	7,6	478
0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	0,9	1,4	1,9	3,3	4,4	4,6	6,5	479
0,1	0,2	0,5	0,9	1,7	2,5	3,0	3,1	4,2	5,5	5,1	6,8	480
1,7	4,3	10,4	15,1	25,5	34,0	36,8	26,6	22,5	20,9	15,1	7,4	481
0,3	1,0	2,3	4,5	7,1	8,9	8,9	10,4	11,4	9,6	7,8	4,3	482
1,1	2,7	6,4	9,7	16,2	21,1	20,5	16,1	15,0	13,1	9,9	5,1	483
2,0	5,6	12,6	28,0	56,1	96,3	115,3	96,3	115,1	143,0	152,7	155,4	484
0,4	1,2	3,7	7,6	16,1	27,4	29,8	48,6	76,3	104,9	124,5	126,6	485
1,2	3,5	8,2	17,8	35,9	60,8	65,5	65,2	88,9	116,7	132,8	134,2	486
0,2	0,4	0,5	1,9	3,8	7,8	14,6	18,2	22,0	23,3	20,6	12,7	487
0,2	0,2	0,6	0,8	1,4	2,3	2,8	5,0	6,1	6,1	5,5	4,9	488
0,2	0,3	0,5	1,3	2,6	5,0	7,7	9,6	11,3	11,4	10,0	7,0	489
0,4	0,5	1,0	1,7	2,6	4,5	6,7	8,8	10,8	12,4	13,6	14,4	490
0,8	1,2	1,5	2,0	2,3	3,1	4,8	6,6	8,5	10,4	11,5	12,0	491
0,6	0,9	1,2	1,9	2,5	3,8	5,6	7,3	9,2	11,0	12,1	12,6	492
1,3	1,4	1,3	1,7	1,9	2,2	1,6	1,3	1,4	1,4	0,6	0,6	493
1,2	1,2	1,7	1,4	1,3	1,1	0,6	1,1	0,9	0,6	0,7	0,4	494
1,2	1,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,0	1,1	1,1	0,9	0,7	0,5	495

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
496	423,424	Männl.	1,3	0,7	0,3	0,2	0,1	0,4	0,5	0,5
497	Sonstige Krankheiten des Perikards	Weibl.	1,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
498	und des Endokards	Insges.	1,2	0,5	0,3	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4
499	426	Männl.	2,8	0,4	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4
500	Erregungsleitungsstörungen	Weibl.	2,8	0,7	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3
501		Insges.	2,8	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
502	427	Männl.	12,7	7,4	0,9	1,0	1,0	2,3	2,8	2,5
503	Kardiale Rhythmusstörungen	Weibl.	10,7	5,2	0,6	1,2	0,8	1,3	2,1	3,1
504		Insges.	11,6	6,3	0,7	1,1	0,9	1,8	2,5	2,8
505	428	Männl.	8,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
506	Herzversagen	Weibl.	9,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2
507		Insges.	8,8	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
508	425,429	Männl.	2,8	2,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,6	0,9
509	Kardiomyopathie, unzureichend be-	Weibl.	2,1	1,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5
510	schriebene Herzkrankheiten und	Insges.	2,4	1,8	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,7
	Komplikationen einer Herzkrankheit									
511	430	Männl.	0,9	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,8
512	Subarachnoidalblutung	Weibl.	0,8	-	0,0	-	0,1	0,1	0,4	0,6
513		Insges.	0,8	-	0,0	-	0,1	0,1	0,4	0,7
514	431,432	Männl.	1,5	1,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,2	0,3
515	Intrazerebrale und sonstige und nicht	Weibl.	1,2	1,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1
516	näher bezeichnete intrakranielle	Insges.	1,3	1,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
	Blutungen									
517	433,434	Männl.	2,5	-	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3
518	Verschuß und Stenose präzerebraler	Weibl.	2,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,4
519	und zerebraler Arterien	Insges.	2,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3
520	435	Männl.	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
521	Transistorische zerebrale Ischämie	Weibl.	3,0	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
522		Insges.	3,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3
523	436	Männl.	10,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
524	Akute, aber ungenau bezeichnete	Weibl.	12,9	0,2	0,1	0,0	-	0,2	0,3	0,6
525	zerebrovaskuläre Krankheit	Insges.	11,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,8	1,0	1,5	1,9	2,7	4,6	4,0	2,4	2,3	1,2	1,6	1,0	496
0,3	0,4	0,9	1,3	2,2	2,2	2,8	2,6	2,4	2,1	1,6	0,7	497
0,5	0,7	1,2	1,6	2,5	3,4	3,3	2,6	2,4	1,8	1,6	0,8	498
0,4	0,4	0,9	1,1	1,8	3,7	7,3	12,5	18,4	25,7	30,3	28,5	499
0,4	0,5	0,4	0,8	1,0	2,1	4,1	7,4	11,7	15,8	17,9	15,0	500
0,4	0,5	0,7	1,0	1,4	2,9	5,4	9,2	13,9	18,9	21,6	18,6	501
4,0	6,8	11,4	16,6	22,7	31,5	42,1	41,2	46,0	46,8	39,8	41,1	502
3,9	5,7	7,8	10,8	13,7	17,1	21,2	26,2	30,1	35,8	31,5	24,1	503
3,9	6,3	9,6	13,7	18,2	24,0	29,9	31,4	35,3	39,2	34,0	28,6	504
0,5	1,1	1,6	3,0	7,0	13,0	20,3	32,9	52,8	76,5	100,6	122,6	505
0,5	0,7	0,8	2,1	3,2	5,8	10,1	20,7	32,8	53,5	71,5	95,3	506
0,5	0,9	1,2	2,6	5,1	9,3	14,4	24,9	39,3	60,6	80,1	102,5	507
1,8	2,4	3,6	5,0	5,3	6,4	5,8	5,3	6,6	8,0	9,7	13,3	508
0,6	1,0	1,5	1,9	2,2	2,2	2,6	4,2	6,1	7,6	10,1	12,8	509
1,2	1,7	2,6	3,4	3,7	4,2	3,9	4,6	6,2	7,7	10,0	12,9	510
0,7	0,8	1,3	1,5	2,4	2,0	2,2	0,9	1,1	0,8	0,6	0,4	511
1,2	1,0	1,2	1,5	1,7	1,4	1,7	1,0	0,8	0,5	0,4	0,8	512
0,9	0,9	1,2	1,5	2,0	1,7	1,9	1,0	0,9	0,6	0,5	0,7	513
0,7	1,1	1,8	2,2	3,0	3,8	4,7	4,1	3,8	3,8	4,4	3,9	514
0,5	0,6	1,4	1,5	1,7	2,2	1,9	2,5	2,6	4,3	3,4	2,9	515
0,6	0,8	1,6	1,8	2,4	3,0	3,1	3,1	3,0	4,1	3,7	3,2	516
0,8	1,0	2,1	3,2	4,7	7,4	9,1	8,0	7,5	8,8	10,1	8,2	517
0,7	0,9	1,5	2,5	3,0	3,5	3,5	5,7	6,5	9,1	11,5	9,2	518
0,8	1,0	1,8	2,8	3,8	5,4	5,8	6,5	6,8	9,0	11,1	9,0	519
0,4	0,8	1,5	2,8	4,3	8,4	10,1	10,7	17,4	19,1	20,3	14,8	520
0,3	0,7	0,8	1,9	2,3	3,0	4,9	7,2	12,2	15,6	17,1	13,7	521
0,4	0,8	1,1	2,3	3,3	5,6	7,1	8,4	13,9	16,7	18,0	14,0	522
0,6	1,9	2,9	6,1	11,8	20,8	30,3	48,1	66,7	84,8	101,5	88,7	523
0,8	1,3	2,0	3,4	5,5	9,3	16,7	30,8	52,5	75,3	90,4	90,2	524
0,7	1,6	2,4	4,8	8,6	14,9	22,4	36,8	57,2	78,2	93,7	89,8	525

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
526	437	Männl.	8,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4
527	Sonstige und ungenau bezeichnete	Weibl.	12,7	0,4	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4
528	zerebrovaskuläre Krankheiten	Insges.	10,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4
529	438	Männl.	0,3	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,0	-
530	Spätfolgen einer zerebrovaskulären	Weibl.	0,3	-	-	-	-	-	0,0	0,0
531	Krankheit	Insges.	0,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
532	440	Männl.	12,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
533	Atherosklerose	Weibl.	8,6	0,1	0,0	0,0	-	0,2	0,3	0,2
534		Insges.	10,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
535	443	Männl.	1,5	-	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,2
536	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	Weibl.	0,7	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3
537		Insges.	1,0	-	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3
538	444	Männl.	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
539	Arterielle Embolie und Thrombose	Weibl.	2,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3
540		Insges.	1,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3
541	441,442,446-448	Männl.	1,5	1,1	0,6	0,6	0,2	0,2	0,4	0,3
542	Sonstige Krankheiten der Arterien,	Weibl.	0,8	0,8	0,4	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4
543	Arteriolen und Kapillaren	Insges.	1,1	1,0	0,5	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4
544	451-453	Männl.	4,2	0,7	0,2	0,1	0,3	0,6	1,7	1,7
545	Phlebitis, Thrombophlebitis, venöse	Weibl.	4,7	0,1	0,0	0,1	0,4	1,8	2,3	2,6
546	Embolien und Thrombosen	Insges.	4,5	0,4	0,1	0,1	0,3	1,2	2,0	2,2
547	454	Männl.	5,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	3,2
548	Varizen der unteren Extremitäten	Weibl.	12,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	2,0	9,1
549		Insges.	8,9	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6	6,1
550	455	Männl.	3,6	0,1	0,4	0,1	0,1	0,5	1,2	2,6
551	Hämorrhoiden	Weibl.	2,3	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,7	1,1
552		Insges.	2,9	0,0	0,2	0,1	0,1	0,4	0,9	1,8
553	458	Männl.	1,6	0,1	0,2	1,1	2,5	1,4	1,2	1,1
554	Hypotension	Weibl.	2,4	0,4	0,2	1,2	3,0	3,7	2,8	2,4
555		Insges.	2,0	0,2	0,2	1,1	2,8	2,6	2,0	1,7

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,3	1,3	2,1	4,8	8,1	16,9	26,6	29,7	44,0	69,5	99,1	128,5	526
1,0	1,2	2,1	3,5	6,2	9,8	11,7	21,7	41,7	67,7	100,5	147,2	527
0,7	1,3	2,1	4,2	7,2	13,2	17,9	24,5	42,5	68,2	100,1	142,3	528
0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,2	1,5	1,4	1,5	1,0	1,1	1,0	529
0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,3	0,7	1,2	1,8	1,3	1,5	530
0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,8	0,8	0,9	1,3	1,5	1,2	1,4	531
0,8	2,0	5,6	11,7	19,7	36,6	48,0	48,9	50,7	71,2	78,9	100,6	532
0,5	1,1	1,7	2,3	4,3	6,8	10,1	15,4	27,6	40,2	64,1	108,4	533
0,7	1,6	3,6	7,0	11,9	21,3	25,9	27,1	35,1	49,8	68,5	106,3	534
0,5	0,4	1,0	1,6	2,4	4,2	5,6	5,2	6,5	7,1	4,5	3,1	535
0,4	0,3	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6	1,6	2,1	2,5	2,4	2,1	536
0,5	0,4	0,8	1,2	1,5	2,5	2,7	2,9	3,5	3,9	3,0	2,3	537
0,4	0,6	1,1	1,5	2,4	3,8	4,9	6,8	6,8	9,1	10,7	11,9	538
0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,6	2,7	4,8	6,2	10,2	12,2	13,9	539
0,4	0,6	0,9	1,1	1,6	2,7	3,6	5,5	6,4	9,9	11,8	13,4	540
0,4	0,4	0,4	1,1	1,4	3,5	5,0	8,8	8,4	7,5	5,6	4,5	541
0,5	0,5	0,5	1,1	0,7	1,0	0,7	1,7	1,6	2,2	2,0	1,5	542
0,5	0,4	0,5	1,1	1,0	2,2	2,5	4,2	3,8	3,9	3,0	2,3	543
2,7	3,3	3,7	5,5	8,3	9,5	11,3	13,4	12,6	13,9	10,5	6,2	544
4,1	5,2	6,8	8,2	7,8	7,2	7,0	8,0	8,2	9,0	7,2	4,5	545
3,4	4,3	5,2	6,9	8,0	8,3	8,8	9,9	9,6	10,5	8,2	4,9	546
5,1	7,0	10,8	12,9	11,8	10,8	7,8	5,4	5,4	4,5	4,9	4,3	547
17,0	24,3	29,5	30,9	25,0	18,2	8,5	7,2	8,6	11,9	12,6	11,3	548
10,9	15,5	20,1	21,9	18,4	14,6	8,2	6,6	7,5	9,6	10,4	9,5	549
4,5	5,7	7,0	7,3	6,7	5,8	6,0	4,6	4,8	2,8	2,9	1,2	550
2,3	3,3	4,7	6,0	5,3	4,1	2,7	1,8	2,7	1,8	1,3	1,0	551
3,4	4,6	5,9	6,7	6,0	5,0	4,1	2,8	3,4	2,1	1,7	1,1	552
1,2	1,5	1,8	2,0	2,1	2,4	2,1	1,9	2,2	1,9	2,6	3,3	553
3,2	3,1	3,2	3,0	3,0	2,6	2,1	1,6	1,3	1,7	1,9	0,7	554
2,2	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	1,7	1,6	1,8	2,1	1,4	555

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
556	456,457,459	Männl.	4,2	1,1	0,6	1,1	14,1	11,1	5,1	3,9
557	Varizen sonstiger Lokalisationen,	Weibl.	1,1	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7
558	Krankheiten der Lymphwege und sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	Insges.	2,6	0,7	0,4	0,7	7,5	5,9	2,8	2,3
Klasse VIII										
Krankheiten des Atmungssystems (460 - 519)										
559	461	Männl.	2,1	1,7	6,8	4,0	3,0	2,2	1,9	2,1
560	Akute Sinusitis, inkl. Nasenhöhlenabszeß	Weibl.	1,4	1,9	5,0	3,8	2,5	0,8	1,3	1,3
561		Insges.	1,7	1,8	5,9	3,9	2,8	1,5	1,6	1,7
562	462	Männl.	1,0	17,4	6,9	2,5	1,1	0,1	0,1	0,1
563	Akute Pharyngitis	Weibl.	0,8	15,8	6,1	2,4	0,8	0,3	0,1	0,2
564		Insges.	0,9	16,6	6,5	2,4	1,0	0,2	0,1	0,1
565	463	Männl.	5,3	49,8	54,9	10,1	4,1	2,2	1,3	0,9
566	Akute Tonsillitis	Weibl.	4,0	39,7	43,5	10,0	3,7	2,6	1,2	1,1
567		Insges.	4,6	44,9	49,3	10,0	3,9	2,4	1,3	1,0
568	464	Männl.	4,6	54,5	51,8	6,5	1,3	0,2	0,2	0,4
569	Akute Laryngitis und Tracheitis	Weibl.	2,4	32,4	28,9	3,1	0,9	0,4	0,4	0,2
570		Insges.	3,5	43,7	40,6	4,9	1,1	0,3	0,3	0,3
571	460,465	Männl.	15,3	324,8	121,0	25,0	10,5	3,3	2,2	1,8
572	Akute Rhinopharyngitis und sonstige	Weibl.	11,7	278,6	102,2	22,1	9,0	3,5	2,5	2,0
573	akute Infektionen der oberen Atemwege mehrerer oder nicht näher bezeichnete Lokalisation	Insges.	13,4	302,3	111,9	23,6	9,8	3,4	2,4	1,9
574	466	Männl.	10,5	267,7	93,0	8,9	2,3	0,6	0,4	0,5
575	Akute Bronchitis und Bronchiolitis	Weibl.	6,2	145,9	61,8	6,0	2,1	0,8	0,8	0,6
576		Insges.	8,3	208,5	77,7	7,5	2,2	0,7	0,6	0,6
577	470	Männl.	5,2	0,3	0,4	0,3	1,3	8,5	9,6	10,2
578	Septumdeviation	Weibl.	1,6	-	0,0	0,2	0,6	3,2	3,1	3,8
579		Insges.	3,3	0,1	0,2	0,3	1,0	5,9	6,4	7,1
580	471	Männl.	1,9	0,4	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7
581	Nasenpolypen	Weibl.	1,0	0,3	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,7
582		Insges.	1,5	0,3	0,5	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
2,7	2,2	3,1	3,1	3,9	3,8	2,8	3,1	3,2	2,8	2,1	1,6		556
0,9	1,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,5	1,6	0,6		557
1,8	1,6	2,5	2,5	2,8	2,7	2,2	2,2	2,2	1,9	1,7	0,9		558
1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,2	0,4	-	-		559
1,1	1,1	0,8	0,9	1,0	0,8	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2		560
1,5	1,4	1,1	1,2	1,2	1,0	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2		561
0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2		562
0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-		563
0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		564
0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,2		565
0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2		566
0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2		567
0,5	0,4	0,3	0,5	0,9	0,7	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6		568
0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4		569
0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4		570
1,9	1,5	1,5	1,9	1,5	1,8	1,6	1,2	1,8	1,5	1,9	1,4		571
1,6	1,3	1,2	1,8	1,4	1,5	1,3	1,2	1,2	1,6	1,5	1,5		572
1,8	1,4	1,3	1,8	1,5	1,7	1,4	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5		573
0,4	0,5	0,6	1,0	0,9	1,5	1,9	1,8	1,7	3,0	4,3	4,1		574
0,8	0,4	0,8	0,9	1,1	1,2	1,2	1,4	2,0	2,5	3,0	3,3		575
0,6	0,5	0,7	1,0	1,0	1,3	1,5	1,5	1,9	2,6	3,4	3,5		576
9,5	8,2	6,7	5,9	4,0	3,0	1,8	0,7	0,4	0,3	0,2	0,4		577
3,5	3,1	2,3	1,7	1,1	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1		578
6,6	5,7	4,5	3,8	2,5	1,8	1,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2		579
1,4	1,7	2,0	3,6	4,1	4,0	4,3	4,8	2,8	2,5	1,4	1,2		580
1,0	1,0	1,1	1,6	1,8	1,8	1,8	1,6	1,1	0,9	0,8	0,1		581
1,2	1,4	1,6	2,6	3,0	2,9	2,8	2,7	1,6	1,4	1,0	0,4		582

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
583	472,473	Männl.	2,7	0,5	5,0	2,5	1,3	1,4	1,9	2,3
584	Chronische Pharyngitis, Rhinopharyngitis und Sinusitis	Weibl.	2,0	0,9	4,0	2,0	1,5	1,2	1,9	2,3
585		Insges.	2,4	0,7	4,5	2,2	1,4	1,3	1,9	2,3
586	474 (EXKL.474.2)	Männl.	13,8	0,7	57,7	56,4	17,8	18,4	12,8	10,9
587	Chronische Krankheit der Gaumen- und Rachenmandeln	Weibl.	14,5	0,4	44,6	55,5	28,4	38,3	21,2	16,6
588		Insges.	14,2	0,6	51,3	56,0	23,0	28,1	16,9	13,6
589	474.2	Männl.	20,7	2,1	227,5	94,7	8,0	1,0	0,6	0,2
590	Adenoide Vegetationen	Weibl.	14,5	1,6	176,2	77,5	8,5	1,5	0,4	0,3
591		Insges.	17,5	1,8	202,5	86,3	8,2	1,2	0,5	0,2
592	475	Männl.	1,7	0,4	1,7	1,6	1,1	3,6	2,8	2,2
593	Paratonsillarabszeß, inkl. peritonsilläre Phlegmone	Weibl.	1,2	0,1	1,2	1,8	2,2	3,5	1,6	1,8
594		Insges.	1,4	0,2	1,4	1,7	1,7	3,5	2,2	2,0
595	476-478	Männl.	3,4	2,2	1,4	1,5	1,4	2,1	2,1	2,5
596	Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis, allergische Rhinitis und sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	Weibl.	2,3	2,0	1,2	1,1	0,8	1,4	2,1	2,4
597		Insges.	2,8	2,1	1,3	1,3	1,1	1,7	2,1	2,5
598	480	Männl.	0,4	2,2	1,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
599	Viruspneumonie	Weibl.	0,3	1,2	1,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4
600		Insges.	0,3	1,7	1,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
601	481-484	Männl.	1,6	5,0	4,8	1,1	0,6	0,3	0,4	0,3
602	Sonstige Pneumonien durch näher bezeichneten Erreger	Weibl.	1,0	3,7	4,0	0,9	0,5	0,3	0,4	0,6
603		Insges.	1,3	4,3	4,4	1,0	0,6	0,3	0,4	0,5
604	485	Männl.	16,4	154,7	73,8	6,0	1,9	1,6	1,3	2,5
605	Bronchopneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	Weibl.	11,9	109,4	64,3	5,0	1,4	1,1	1,5	2,0
606		Insges.	14,1	132,7	69,2	5,5	1,7	1,3	1,4	2,3
607	486	Männl.	4,4	16,9	14,8	3,3	1,2	0,9	0,6	1,2
608	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	Weibl.	2,8	14,5	12,4	2,1	1,3	0,3	0,8	1,0
609		Insges.	3,6	15,7	13,7	2,7	1,2	0,6	0,7	1,1
610	487	Männl.	2,1	23,4	9,1	3,6	2,3	1,5	1,2	1,2
611	Grippe	Weibl.	1,7	19,8	7,0	4,1	2,7	1,7	1,3	1,0
612		Insges.	1,9	21,6	8,1	3,8	2,5	1,6	1,3	1,1

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2,3	3,2	3,4	3,8	3,9	4,4	2,8	2,1	0,8	1,5	1,3	0,2	583
2,4	2,3	2,5	3,0	2,5	2,6	1,7	1,3	1,3	0,7	0,4	0,4	584
2,3	2,8	3,0	3,4	3,2	3,5	2,2	1,6	1,1	0,9	0,7	0,3	585
8,9	5,5	4,2	2,7	2,0	0,7	0,6	0,5	-	0,5	0,6	0,2	586
11,0	7,4	4,5	3,6	1,9	1,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	587
9,9	6,4	4,3	3,1	2,0	1,1	0,6	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	588
0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5	0,2	-	0,2	589
0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	590
0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	591
2,1	1,6	1,2	1,3	1,7	1,1	0,8	0,7	0,5	0,2	0,4	-	592
1,1	0,8	0,6	1,1	0,9	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	593
1,6	1,2	0,9	1,2	1,3	0,8	0,7	0,5	0,3	0,3	0,4	0,1	594
2,9	4,1	4,6	5,4	5,6	6,7	6,6	3,9	3,8	2,3	1,7	0,8	595
3,5	4,0	3,7	3,7	3,2	3,1	2,3	2,3	1,4	0,9	0,8	0,7	596
3,2	4,0	4,2	4,5	4,4	4,8	4,1	2,8	2,2	1,3	1,1	0,7	597
0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,5	0,7	0,9	0,2	598
0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	599
0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3	600
0,8	1,0	1,0	1,2	1,8	2,2	2,4	2,6	4,8	4,9	6,3	7,8	601
0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	1,4	1,7	2,5	3,2	2,4	602
0,6	0,7	0,7	0,8	1,2	1,5	1,5	1,9	2,7	3,2	4,2	3,8	603
3,5	3,7	5,5	7,4	11,3	16,7	21,5	27,5	45,0	70,2	94,8	117,0	604
2,1	1,7	2,1	3,1	4,0	6,3	7,3	12,6	22,4	33,8	46,4	58,6	605
2,8	2,7	3,8	5,3	7,7	11,3	13,2	17,8	29,8	45,1	60,7	74,0	606
1,8	2,5	2,6	3,7	4,6	6,4	6,9	8,6	10,9	16,1	15,0	17,9	607
0,9	0,7	0,8	1,2	1,3	2,0	2,5	3,5	5,3	7,8	8,4	9,5	608
1,4	1,6	1,7	2,4	2,9	4,1	4,4	5,3	7,1	10,4	10,4	11,7	609
1,1	0,9	0,8	1,1	1,0	1,2	1,0	0,7	0,9	1,6	2,7	1,6	610
0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,9	0,8	1,0	611
1,0	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	0,8	0,6	0,9	1,1	1,4	1,1	612

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
613	490,491	Männl.	14,0	36,7	19,3	4,3	1,8	1,4	1,5	2,1
614	Chronische und nicht näher be- zeichnete Bronchitis	Weibl.	7,2	16,5	11,3	2,7	1,5	1,7	1,8	2,1
615		Insges.	10,4	26,9	15,4	3,5	1,7	1,6	1,6	2,1
616	492	Männl.	1,1	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
617	Emphysem	Weibl.	0,4	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
618		Insges.	0,7	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
619	493	Männl.	6,6	3,7	7,4	13,8	8,9	4,2	3,6	4,3
620	Asthma bronchiale	Weibl.	6,6	1,4	3,8	7,5	5,9	5,5	4,6	5,4
621		Insges.	6,6	2,6	5,6	10,7	7,4	4,8	4,1	4,8
622	494-496	Männl.	0,7	0,6	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2
623	Bronchiektasie, exogene allergische Alveolitis und chronische Atemwegs- obstruktion, nicht andernorts klassi- fifizierbar	Weibl.	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6
624		Insges.	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
625	500-508	Männl.	1,7	3,6	0,8	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
626	Pneumokoniosen und sonstige Lungenkrankheiten durch äußere Agenzien	Weibl.	0,3	4,2	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
627		Insges.	0,9	3,9	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
628	511	Männl.	1,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,8
629	Pleuritis	Weibl.	0,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5
630		Insges.	0,9	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,7
631	512	Männl.	2,2	1,1	0,0	-	0,2	2,7	3,5	2,9
632	Pneumothorax	Weibl.	0,5	0,6	-	0,0	0,1	1,0	0,7	0,9
633		Insges.	1,3	0,9	0,0	0,0	0,1	1,9	2,2	1,9
634	510,513	Männl.	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,2
635	Empyem und Abszeß der Lunge und des Mediastinums	Weibl.	0,2	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
636		Insges.	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2
637	514-519	Männl.	3,0	3,1	0,4	0,5	0,3	1,2	0,7	0,8
638	Sonstige Krankheiten der Lunge und des Atmungssystems	Weibl.	3,3	0,9	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,8
639		Insges.	3,2	2,0	0,4	0,4	0,3	0,9	0,5	0,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2,9	3,9	5,9	11,0	18,8	38,6	51,0	44,0	50,2	51,5	45,8	34,7	613
3,1	4,3	6,0	9,2	10,7	14,0	11,2	12,6	15,4	14,4	11,4	7,9	614
3,0	4,1	5,9	10,1	14,7	25,9	27,8	23,5	26,7	25,9	21,6	15,0	615
0,2	0,2	0,2	0,7	1,3	3,6	4,9	4,3	6,3	6,8	7,3	4,5	616
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,9	1,2	1,7	1,9	1,5	617
0,1	0,2	0,2	0,4	0,8	2,0	2,4	2,1	2,9	3,2	3,5	2,3	618
3,8	4,8	5,6	7,4	7,9	9,3	9,8	7,4	4,4	5,2	3,4	1,8	619
5,6	8,7	10,1	10,6	10,0	9,6	7,0	6,0	3,9	3,0	2,1	0,9	620
4,7	6,7	7,8	9,0	9,0	9,4	8,2	6,5	4,0	3,7	2,4	1,1	621
0,4	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,5	1,6	2,3	1,4	1,9	1,0	622
0,5	0,5	0,7	0,9	0,9	0,8	0,5	0,7	0,6	0,5	0,8	0,5	623
0,5	0,4	0,7	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,2	0,8	1,1	0,6	624
0,2	0,4	0,3	0,8	1,6	6,8	9,2	6,1	6,9	4,9	3,8	2,7	625
0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,7	0,4	0,7	626
0,2	0,3	0,2	0,6	0,9	3,4	4,0	2,4	2,5	2,0	1,4	1,2	627
0,6	0,8	1,2	1,4	1,8	2,4	2,4	2,6	4,8	3,0	3,3	3,3	628
0,3	0,3	0,4	0,8	0,8	0,9	1,2	1,3	1,7	2,3	1,9	1,2	629
0,5	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,7	1,7	2,7	2,5	2,3	1,7	630
2,3	1,6	1,7	1,7	2,2	2,8	3,7	4,4	4,1	5,5	4,0	1,4	631
0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,7	0,7	0,5	0,3	0,4	632
1,6	1,1	1,1	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	1,8	2,0	1,4	0,7	633
0,6	0,8	0,7	0,8	1,6	1,4	1,4	1,8	0,8	0,9	1,4	1,0	634
0,2	0,0	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	0,1	635
0,4	0,4	0,5	0,5	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,3	636
0,9	1,2	1,6	2,5	3,3	4,9	5,8	7,4	11,6	18,4	28,0	42,1	637
0,7	1,1	1,4	1,6	2,0	2,8	3,2	5,0	7,9	14,2	23,1	37,3	638
0,8	1,2	1,5	2,1	2,6	3,8	4,3	5,9	9,1	15,5	24,6	38,6	639

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
Klasse IX										
Krankheiten des Verdauungsystems (520 - 579)										
640	520-526	Männl.	2,0	0,6	0,7	1,1	3,0	2,8	2,4	2,5
641	Krankheiten der Zähne, des Zahn-	Weibl.	1,6	0,4	0,6	0,7	2,0	2,9	2,8	2,1
642	halteapparates und der Kiefer	Insges.	1,8	0,5	0,6	0,9	2,5	2,8	2,5	2,3
643	527-529	Männl.	2,5	4,6	7,6	1,8	1,2	1,5	2,7	2,5
644	Sonstige Krankheiten der Mundhöhle	Weibl.	2,0	3,9	7,3	1,7	1,2	1,7	2,1	2,0
645	und der Speicheldrüsen	Insges.	2,2	4,2	7,4	1,7	1,2	1,6	2,4	2,3
646	530	Männl.	1,8	2,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,5	0,9
647	Krankheiten des Ösophagus	Weibl.	0,9	1,9	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4
648		Insges.	1,3	2,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7
649	531	Männl.	8,3	-	0,1	0,1	0,2	1,0	2,6	4,3
650	Ulcus ventriculi	Weibl.	4,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,5	0,7
651		Insges.	6,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	1,6	2,6
652	532	Männl.	9,2	-	0,0	0,1	0,3	2,1	5,6	9,6
653	Ulcus duodeni	Weibl.	3,3	-	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,7
654		Insges.	6,1	-	0,0	0,0	0,3	1,3	3,3	5,8
655	533,534	Männl.	0,6	0,2	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,2
656	Ulcus pepticum jejuni und nicht näher	Weibl.	0,2	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
657	bezeichnete Lokalisation	Insges.	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
658	535	Männl.	5,2	0,2	0,5	1,2	1,4	3,8	5,6	6,0
659	Gastritis und Duodentitis	Weibl.	3,3	0,3	0,6	1,4	1,8	3,9	4,1	2,7
660		Insges.	4,2	0,2	0,5	1,3	1,6	3,8	4,9	4,4
661	536,537	Männl.	2,6	27,9	2,9	2,2	1,4	1,3	1,2	1,9
662	Störungen der Magenfunktion sowie	Weibl.	2,3	21,2	2,3	2,5	1,6	1,7	1,7	1,4
663	sonstige Krankheiten des Magens	Insges.	2,4	24,6	2,6	2,4	1,5	1,5	1,4	1,7
	des Duodenums									
664	540	Männl.	21,6	2,4	10,6	40,8	60,1	41,8	26,9	20,7
665	Akute Appendizitis	Weibl.	19,8	0,8	7,9	33,8	52,0	57,3	31,7	21,8
666		Insges.	20,7	1,6	9,3	37,4	56,2	49,3	29,2	21,2

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2,0	1,8	2,0	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	1,3	1,0	1,3	0,4	640
1,9	2,0	1,5	1,4	1,5	1,6	1,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	641
2,0	1,9	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,1	1,0	0,7	0,5	642
2,3	2,4	2,4	2,1	2,4	2,2	1,8	2,4	2,5	1,3	1,9	1,2	643
1,9	2,0	1,2	1,5	2,0	1,6	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	2,0	644
2,1	2,2	1,8	1,8	2,2	1,9	1,8	2,1	2,1	1,4	1,6	1,8	645
1,3	1,9	1,9	2,7	2,9	3,8	3,5	4,0	6,4	5,1	5,2	3,3	646
0,4	0,5	0,6	1,1	1,2	1,5	1,8	1,5	2,0	2,5	2,1	1,8	647
0,9	1,2	1,3	1,9	2,0	2,6	2,5	2,4	3,4	3,3	3,0	2,2	648
6,8	7,9	9,8	12,5	15,8	18,8	18,7	19,7	22,3	27,8	23,4	16,2	649
2,0	2,6	2,9	5,1	6,7	8,5	8,5	12,1	16,7	17,1	17,1	13,1	650
4,5	5,3	6,4	8,8	11,2	13,5	12,8	14,7	18,6	20,4	19,0	13,9	651
12,9	12,3	12,3	13,7	15,1	16,2	14,2	13,9	12,9	17,8	18,5	10,3	652
2,8	3,5	3,6	4,7	5,3	5,8	5,0	5,3	6,9	8,8	9,1	5,8	653
8,0	8,0	8,0	9,2	10,1	10,8	8,9	8,3	8,8	11,6	11,9	7,0	654
0,4	0,7	0,9	1,1	1,5	1,3	1,2	1,0	0,7	1,7	1,2	0,2	655
0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4	0,5	0,3	656
0,3	0,4	0,6	0,6	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	0,7	0,3	657
6,8	6,8	6,6	7,1	6,2	7,1	7,0	6,1	7,6	6,3	6,8	4,9	658
3,0	2,9	3,8	4,2	3,9	4,2	3,5	4,5	4,9	5,2	5,1	3,1	659
5,0	4,9	5,2	5,6	5,0	5,6	5,0	5,1	5,8	5,5	5,6	3,6	660
1,5	2,0	2,6	2,5	2,9	2,8	3,4	4,0	2,4	3,3	3,4	4,5	661
1,5	2,0	1,7	2,5	2,4	2,2	2,5	3,0	2,7	2,7	2,6	1,5	662
1,5	2,0	2,2	2,5	2,7	2,5	2,9	3,4	2,6	2,9	2,8	2,3	663
16,4	13,3	13,2	12,3	12,3	12,1	11,9	13,8	11,5	12,2	11,1	7,4	664
16,4	13,0	10,4	12,2	10,9	11,0	9,8	9,8	8,6	9,8	10,2	7,5	665
16,4	13,2	11,8	12,3	11,6	11,5	10,7	11,2	9,5	10,5	10,5	7,5	666

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
667	541	Männl.	2,8	0,1	2,0	7,9	9,6	6,0	3,6	2,1
668	Ungenau bezeichnete Appendizitis	Weibl.	3,6	0,1	1,9	7,2	12,0	12,2	6,6	3,6
669		Insges.	3,2	0,1	2,0	7,5	10,8	9,0	5,1	2,8
670	542,543	Männl.	4,6	0,2	2,2	10,0	13,8	9,4	6,0	4,4
671	Sonstige Formen der Appendizitis und	Weibl.	7,4	0,1	2,3	11,0	20,3	26,6	13,6	7,8
672	Krankheiten des Appendix	Insges.	6,1	0,1	2,2	10,5	17,0	17,8	9,7	6,0
673	550	Männl.	37,7	297,8	90,3	44,8	8,5	4,8	9,8	12,1
674	Hernia inguinalis	Weibl.	8,2	83,7	32,9	36,1	5,0	1,1	1,4	1,8
675		Insges.	22,3	193,8	62,3	40,5	6,8	3,0	5,8	7,1
676	551	Männl.	0,2	0,1	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
677	Sonstige Hernien der Bauchhöhle mit	Weibl.	0,3	-	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0
678	Gangrän	Insges.	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
679	552,553	Männl.	6,8	8,0	16,8	11,6	2,2	0,8	1,4	2,1
680	Sonstige Hernien der Bauchhöhle	Weibl.	6,9	6,5	19,2	11,2	1,6	0,8	1,2	2,1
681	ohne Anzeichen von Gangrän	Insges.	6,8	7,3	18,0	11,4	1,9	0,8	1,3	2,1
682	557	Männl.	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
683	Gefäßinsuffizienz des Darmes	Weibl.	0,7	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
684		Insges.	0,6	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
685	555,556,558	Männl.	14,8	227,5	69,5	12,5	10,1	9,7	8,2	7,2
686	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und	Weibl.	13,4	210,8	55,7	11,0	10,0	12,1	11,3	9,3
687	Kolitis	Insges.	14,1	219,4	62,7	11,7	10,0	10,9	9,7	8,2
688	560	Männl.	3,3	22,8	3,1	2,5	2,4	1,5	1,5	1,3
689	Ileus, ohne Angabe einer Hernie	Weibl.	4,3	12,6	1,9	1,2	2,1	1,9	2,4	1,9
690		Insges.	3,9	17,8	2,5	1,8	2,3	1,7	1,9	1,5
691	564	Männl.	5,7	7,2	8,4	10,7	7,9	3,8	3,6	3,5
692	Funktionelle Darmstörungen, nicht	Weibl.	7,2	6,2	7,3	9,1	8,8	6,8	4,7	4,1
693	andernorts klassifizierbar	Insges.	6,5	6,7	7,8	9,9	8,3	5,3	4,1	3,8
694	565	Männl.	3,2	3,4	0,9	0,3	0,4	0,9	1,6	2,5
695	Analfissur und Analfistel	Weibl.	1,7	1,5	0,7	0,1	0,3	0,8	1,3	1,2
696		Insges.	2,4	2,5	0,8	0,2	0,3	0,8	1,5	1,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,6	1,2	1,2	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	1,3	1,0	1,6	667
2,4	1,8	1,3	1,6	1,5	1,2	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	668
2,0	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1	669
3,6	2,7	2,2	2,3	1,8	2,0	2,2	1,8	2,7	1,9	2,1	2,5	670
6,7	5,0	5,2	4,1	3,7	2,8	2,5	2,8	2,5	2,3	2,3	1,3	671
5,1	3,8	3,7	3,2	2,8	2,4	2,4	2,4	2,5	2,2	2,2	1,6	672
15,3	19,3	26,6	32,8	42,0	53,3	73,7	85,2	79,7	77,3	51,0	38,4	673
2,2	2,3	3,6	4,2	4,1	4,4	4,0	6,5	8,2	7,2	5,8	5,9	674
8,9	11,0	15,2	18,5	22,9	28,1	33,1	33,9	31,5	28,9	19,2	14,4	675
0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0	0,3	0,8	1,0	676
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	1,0	1,4	1,5	1,4	677
0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	1,0	1,1	1,3	1,3	678
3,2	4,9	6,7	7,6	10,6	11,0	13,0	11,3	9,7	8,2	7,5	11,3	679
2,4	3,3	4,0	6,5	8,2	10,5	10,7	11,3	9,9	11,7	11,3	12,9	680
2,8	4,1	5,3	7,1	9,4	10,7	11,7	11,3	9,8	10,6	10,2	12,5	681
0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	1,8	2,3	3,5	5,5	5,5	682
0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	1,3	1,8	3,7	4,5	7,6	683
0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	1,5	2,0	3,6	4,8	7,0	684
8,2	6,8	7,0	7,8	7,6	8,6	9,5	8,4	7,1	6,8	5,8	5,7	685
9,4	8,6	8,1	7,6	8,1	7,8	6,5	7,8	6,7	6,5	6,1	5,4	686
8,8	7,7	7,5	7,7	7,8	8,2	7,7	8,0	6,8	6,6	6,0	5,5	687
1,2	1,4	1,4	1,8	3,7	3,7	6,0	8,5	11,5	13,4	15,3	15,6	688
2,2	1,7	2,5	3,2	3,1	4,0	5,6	8,2	10,9	13,2	16,1	19,0	689
1,7	1,6	1,9	2,5	3,4	3,9	5,8	8,3	11,1	13,3	15,8	18,1	690
3,2	3,3	3,9	4,9	6,1	5,8	6,1	7,9	7,8	11,0	11,7	13,3	691
4,8	5,3	6,9	7,6	8,8	7,8	7,2	8,4	8,6	8,9	11,6	11,9	692
4,0	4,3	5,4	6,3	7,5	6,9	6,7	8,2	8,3	9,6	11,7	12,3	693
3,7	5,7	5,8	5,8	5,9	4,9	4,4	3,8	2,8	1,4	1,2	0,6	694
1,8	3,1	4,1	4,1	3,3	2,0	1,5	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	695
2,8	4,4	5,0	5,0	4,6	3,4	2,7	2,1	1,5	0,8	0,6	0,4	696

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
697	566	Männl.	3,2	5,9	0,9	0,6	0,4	1,3	2,6	3,7
698	Abszeß der Anal- und Rektalregion	Weibl.	1,0	1,1	0,8	0,2	0,1	1,4	1,2	1,1
699		Insges.	2,1	3,6	0,9	0,4	0,3	1,4	1,9	2,4
700	567,568	Männl.	0,9	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
701	Krankheiten des Peritoneums	Weibl.	1,2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6
702		Insges.	1,1	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
703	562,569	Männl.	4,5	1,6	2,2	0,7	0,5	0,5	0,7	1,4
704	Darmdivertikel und sonstige Krank- heiten des Darmes	Weibl.	4,6	1,4	2,1	0,7	0,6	0,7	0,7	0,9
705		Insges.	4,5	1,5	2,2	0,7	0,5	0,6	0,7	1,2
706	570	Männl.	0,2	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
707	Akute und subakute Lebernekrose	Weibl.	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
708		Insges.	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
709	571	Männl.	9,5	0,7	0,2	0,4	0,3	1,1	1,7	4,5
710	Chronische Leberkrankheit und Leberzirrhose	Weibl.	4,7	0,8	0,2	0,3	0,6	0,6	1,2	1,6
711		Insges.	7,0	0,7	0,2	0,3	0,4	0,9	1,5	3,1
712	572,573	Männl.	1,9	2,3	0,7	0,9	0,5	0,9	0,8	1,7
713	Leberabszeß und sonstige Krank- heiten der Leber	Weibl.	1,7	2,0	0,5	0,8	0,6	1,5	1,2	1,3
714		Insges.	1,8	2,2	0,6	0,8	0,5	1,2	1,0	1,5
715	574	Männl.	23,5	1,0	0,2	0,1	0,4	1,1	2,7	6,0
716	Cholelithiasis	Weibl.	53,4	0,5	0,1	0,2	1,7	9,9	29,9	42,9
717		Insges.	39,1	0,8	0,2	0,2	1,0	5,4	15,8	23,9
718	575	Männl.	3,0	-	-	0,1	0,2	0,3	0,8	1,0
719	Sonstige Krankheiten der Gallenblase	Weibl.	4,5	0,1	0,1	0,2	0,2	1,6	2,2	3,0
720		Insges.	3,8	0,0	0,0	0,1	0,2	1,0	1,5	1,9
721	576	Männl.	1,3	0,3	0,0	-	0,0	0,1	0,2	0,2
722	Sonstige Krankheiten der Gallengänge	Weibl.	2,4	0,8	0,1	0,1	-	0,2	0,4	0,5
723		Insges.	1,9	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4
724	577	Männl.	8,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	2,8	6,8
725	Krankheiten des Pankreas	Weibl.	4,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,9	1,5	2,4
726		Insges.	6,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,8	2,1	4,7

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
4,6	4,9	5,0	4,3	5,0	3,7	4,2	3,3	3,1	2,1	1,2	0,6	697
1,6	1,4	1,3	1,5	0,9	1,5	1,0	0,9	1,0	0,8	0,5	0,4	698
3,1	3,2	3,2	2,9	2,9	2,6	2,3	1,7	1,7	1,2	0,7	0,5	699
0,5	0,5	0,8	1,1	1,2	1,9	2,6	2,9	3,4	3,4	4,2	5,7	700
0,8	0,7	1,1	1,0	1,7	1,5	1,8	2,0	3,2	3,5	3,5	5,0	701
0,6	0,6	1,0	1,0	1,4	1,7	2,1	2,3	3,2	3,5	3,7	5,2	702
1,6	3,1	4,1	5,8	8,2	12,2	14,0	14,6	15,3	12,2	9,3	7,6	703
1,2	1,8	3,1	4,2	7,9	9,2	9,9	13,0	11,1	12,0	10,4	6,9	704
1,4	2,5	3,6	5,0	8,0	10,7	11,7	13,5	12,5	12,1	10,1	7,1	705
0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,5	0,1	0,3	0,2	-	0,4	706
0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	707
0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	708
6,9	11,7	15,1	18,6	22,7	25,1	21,5	18,0	12,7	11,8	6,7	3,7	709
2,8	3,6	6,0	8,5	9,6	11,2	9,3	8,5	9,3	6,9	5,1	2,3	710
4,9	7,8	10,6	13,6	16,1	17,9	14,4	11,8	10,4	8,4	5,5	2,6	711
1,7	2,2	2,3	2,5	2,8	3,6	4,0	3,2	2,8	2,3	2,1	1,8	712
1,4	1,6	2,4	2,3	2,8	2,9	2,4	2,0	1,8	1,8	1,7	1,1	713
1,5	1,9	2,4	2,4	2,8	3,2	3,1	2,4	2,1	1,9	1,8	1,3	714
12,9	20,6	26,2	36,1	48,2	55,2	70,5	72,9	71,9	76,9	60,9	44,6	715
50,0	54,7	61,1	72,6	93,8	105,9	97,8	100,4	86,5	77,8	68,7	51,4	716
30,9	37,3	43,5	54,4	71,2	81,4	86,4	90,8	81,8	77,5	66,3	49,6	717
1,8	2,2	2,6	3,5	4,7	6,1	8,3	9,2	10,6	15,2	16,2	15,6	718
3,2	4,3	4,2	4,6	5,8	7,0	6,0	7,8	9,6	11,7	13,5	13,0	719
2,5	3,2	3,4	4,0	5,2	6,6	7,0	8,3	9,9	12,8	14,3	13,7	720
0,4	0,9	0,9	1,4	2,1	3,2	4,7	4,7	6,2	6,5	6,2	4,1	721
1,3	1,7	2,0	3,6	4,2	4,5	5,1	5,7	6,0	6,1	4,7	2,8	722
0,9	1,3	1,4	2,5	3,1	3,9	4,9	5,4	6,1	6,2	5,2	3,1	723
12,4	14,4	15,7	14,7	13,2	12,9	10,9	10,5	9,1	12,8	9,7	8,4	724
3,7	3,7	4,1	5,6	6,0	7,0	6,4	7,5	7,6	7,9	8,6	6,7	725
8,2	9,2	9,9	10,1	9,5	9,8	8,3	8,5	8,1	9,4	9,0	7,1	726

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
727	578,579	Männl.	3,4	12,8	7,6	2,0	0,8	0,4	0,8	1,1
728	Gastrointestinale Blutung und in-	Weibl.	2,6	10,8	6,1	1,7	0,9	0,6	0,6	0,6
729	testinale Malabsorption	Insges.	3,0	11,8	6,9	1,9	0,8	0,5	0,7	0,9
Klasse X										
Krankheiten des Urogenitalsystems (580 - 629)										
730	580,581	Männl.	0,9	0,6	2,4	2,5	1,7	0,6	0,6	0,5
731	Akute Glomerulonephritis und	Weibl.	0,6	0,4	1,5	1,0	1,3	0,4	0,5	0,6
732	nephrotisches Syndrom	Insges.	0,7	0,5	1,9	1,8	1,5	0,5	0,5	0,5
733	582	Männl.	1,0	-	0,1	0,3	0,4	1,3	1,0	0,9
734	Chronische Glomerulonephritis	Weibl.	0,6	0,1	0,2	0,3	0,2	0,8	0,8	0,7
735		Insges.	0,8	0,0	0,2	0,3	0,4	1,1	0,9	0,8
736	584-586	Männl.	4,3	1,4	1,3	0,6	0,8	1,3	2,0	2,3
737	Nierenversagen	Weibl.	4,3	2,4	1,5	0,5	0,8	0,7	1,2	1,7
738		Insges.	4,3	1,9	1,4	0,5	0,8	1,0	1,6	2,0
739	583,587-589	Männl.	0,6	1,3	0,6	0,8	0,7	0,5	0,2	0,5
740	Sonstige Nephropatien	Weibl.	0,6	1,2	1,0	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3
741		Insges.	0,6	1,3	0,8	0,8	0,7	0,4	0,3	0,4
742	590	Männl.	4,2	40,0	4,5	1,7	1,8	1,7	1,5	1,4
743	Infektiöse Krankheiten der Niere	Weibl.	11,4	46,5	27,7	23,0	8,7	7,1	6,7	4,9
744		Insges.	7,9	43,1	15,8	12,1	5,2	4,3	4,0	3,1
745	591,593	Männl.	2,7	25,7	5,0	3,8	1,8	1,6	1,2	1,1
746	Hydronephrose und sonstige Krank-	Weibl.	3,6	11,8	8,8	7,5	4,9	1,9	1,9	2,5
747	heiten der Niere und des Ureters	Insges.	3,2	19,0	6,8	5,6	3,3	1,8	1,6	1,8
748	592,594	Männl.	11,1	1,3	1,2	1,4	2,1	2,1	3,9	5,2
749	Steine in Niere und Harnwegen	Weibl.	7,4	0,5	0,6	1,3	1,4	2,8	5,3	6,7
750		Insges.	9,1	0,9	0,9	1,4	1,7	2,5	4,6	5,9
751	595	Männl.	0,9	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
752	Zystitis	Weibl.	1,6	1,0	0,9	1,3	1,0	2,0	1,4	1,0
753		Insges.	1,2	0,7	0,6	0,8	0,7	1,2	0,9	0,6

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,5	1,9	3,1	4,4	4,6	5,1	6,2	6,4	8,1	10,2	10,2	11,1	727
1,0	1,1	1,7	1,7	2,3	2,3	3,4	3,6	4,9	6,2	8,8	11,0	728
1,3	1,5	2,4	3,0	3,4	3,7	4,6	4,6	6,0	7,4	9,2	11,0	729
0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,2	730
0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	731
0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	732
1,3	1,3	1,1	1,4	1,6	1,6	1,2	1,4	1,0	0,6	0,5	-	733
0,8	0,8	0,9	0,6	0,7	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,1	734
1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,2	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,1	735
2,6	3,6	4,1	5,9	7,2	9,4	9,8	11,9	9,0	12,4	14,7	10,7	736
2,3	2,7	2,3	5,4	7,5	10,1	10,5	9,2	8,4	8,5	6,1	4,7	737
2,4	3,2	3,2	5,7	7,3	9,8	10,2	10,2	8,6	9,7	8,6	6,3	738
0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	0,7	1,1	1,3	0,6	0,9	1,1	1,0	739
0,3	0,5	0,6	1,0	0,9	0,8	0,7	1,0	1,0	0,7	0,6	0,5	740
0,4	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,9	1,1	0,9	0,7	0,8	0,6	741
1,9	1,8	2,1	3,0	4,6	6,0	7,3	9,9	12,4	16,2	17,7	17,2	742
5,1	5,1	6,1	8,4	8,8	11,1	11,1	15,3	17,3	18,0	15,4	11,7	743
3,5	3,4	4,1	5,7	6,7	8,6	9,5	13,4	15,7	17,4	16,1	13,2	744
1,3	1,1	1,6	1,9	2,5	3,2	4,0	4,8	4,6	4,3	2,6	1,8	745
2,6	2,9	2,1	3,4	3,3	4,0	3,4	3,5	3,5	2,6	1,5	0,9	746
2,0	2,0	1,8	2,6	2,9	3,6	3,6	4,0	3,8	3,1	1,8	1,1	747
8,0	10,2	13,2	18,6	21,8	28,0	28,2	28,6	20,7	19,9	11,5	7,8	748
7,6	8,3	8,5	9,8	13,9	14,9	12,5	12,2	8,7	6,9	4,8	3,0	749
7,8	9,3	10,8	14,2	17,8	21,2	19,1	17,9	12,6	10,9	6,8	4,3	750
0,2	0,4	0,4	0,7	0,8	1,3	2,2	3,2	4,7	4,9	6,0	4,7	751
0,8	1,2	1,2	1,4	1,2	1,8	1,9	2,7	3,4	2,8	2,9	2,7	752
0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	1,6	2,0	2,9	3,8	3,4	3,8	3,2	753

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
754	596-599	Männl.	5,4	17,7	4,9	5,1	4,0	2,0	2,1	2,2
755	Sonstige Krankheiten der Harnblase,	Weibl.	3,7	18,9	11,9	9,8	5,1	2,8	2,1	1,5
756	der Harnröhre und der Harnwege	Insges.	4,5	18,3	8,3	7,4	4,6	2,4	2,1	1,8
757	600	Männl.	11,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2
758	Hyperplasie der Prostata	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
759		Insges.	5,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
760	603	Männl.	4,5	11,2	12,2	6,5	2,3	3,1	1,6	1,4
761	Hydrozele von Funiculus spermati-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
762	cus, Testitis oder Tunica vaginalis	Insges.	2,1	5,8	6,2	3,3	1,2	1,6	0,8	0,7
	testis									
763	604	Männl.	2,4	0,7	0,4	0,5	1,4	2,3	3,1	1,9
764	Orchitis und Epididymitis	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
765		Insges.	1,1	0,4	0,2	0,3	0,7	1,2	1,6	1,0
766	605	Männl.	12,0	3,1	76,2	45,8	13,6	5,6	4,7	3,5
767	Überhängende Vorhaut und Phimose	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
768		Insges.	5,7	1,6	39,1	23,5	7,0	2,9	2,4	1,8
769	601, 602, 606-608	Männl.	4,8	6,9	7,9	5,6	10,0	8,0	4,5	4,5
770	Alle sonstigen Krankheiten der	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
771	männlichen Genitalorgane	Insges.	2,3	3,6	4,1	2,9	5,1	4,1	2,3	2,3
772	610, 611	Männl.	0,3	0,4	0,1	0,0	0,1	0,5	0,3	0,2
773	Krankheiten der Mamma	Weibl.	7,1	0,8	-	0,1	0,7	3,9	6,2	8,7
774		Insges.	3,8	0,6	0,0	0,1	0,4	2,2	3,2	4,3
775	614	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
776	Entzündliche Krankheiten des Ovars,	Weibl.	14,0	-	-	0,1	0,5	37,0	44,9	33,9
777	der Tuba uterina, des Beckenbinde-	Insges.	7,3	-	-	0,0	0,3	18,0	21,8	16,4
	gewebes und des Peritoneums									
778	615	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
779	Entzündliche Krankheiten des Uterus,	Weibl.	1,7	-	-	-	-	1,5	4,0	3,3
780	exkl. Cervix uteri	Insges.	0,9	-	-	-	-	0,7	1,9	1,6
781	616	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
782	Entzündliche Krankheiten der Cervix	Weibl.	5,2	0,6	1,4	0,6	0,6	5,7	9,9	9,2
783	uteri, der Vagina und der Vulva	Insges.	2,7	0,3	0,7	0,3	0,3	2,8	4,8	4,5

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
2,2	2,4	2,8	3,5	4,3	6,4	10,9	17,4	22,9	22,6	21,4	15,6	754
1,3	1,8	1,4	2,1	2,5	2,7	2,4	3,2	3,7	4,4	4,3	3,5	755
1,8	2,1	2,1	2,8	3,4	4,5	5,9	8,1	10,0	10,1	9,4	6,7	756
0,1	0,2	0,5	1,8	5,3	18,1	48,7	79,6	100,0	107,4	86,8	65,3	757
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
0,1	0,1	0,2	0,9	2,6	8,8	20,4	27,7	32,5	33,2	25,7	17,2	759
1,5	1,9	2,7	4,1	5,9	7,4	8,7	8,2	10,2	5,2	2,5	1,0	760
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
0,8	1,0	1,3	2,0	2,9	3,6	3,6	2,9	3,3	1,6	0,7	0,3	762
1,8	1,9	1,6	2,6	2,8	3,5	4,3	5,0	6,2	6,1	4,4	3,5	763
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764
0,9	1,0	0,8	1,3	1,4	1,7	1,8	1,7	2,0	1,9	1,3	0,9	765
2,5	3,0	3,0	3,6	4,0	4,5	5,8	5,8	6,4	7,3	9,6	5,7	766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767
1,3	1,6	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,0	2,1	2,3	2,8	1,5	768
3,4	2,8	3,2	3,4	3,7	4,2	3,7	3,3	3,6	2,9	3,2	3,9	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770
1,7	1,4	1,6	1,7	1,8	2,0	1,6	1,2	1,2	0,9	0,9	1,0	771
0,2	0,2	0,5	0,3	0,4	0,2	0,6	0,8	0,7	0,8	0,3	0,4	772
10,6	12,3	16,0	19,7	12,8	6,3	4,7	4,0	3,2	2,5	1,2	0,8	773
5,3	6,1	8,2	10,0	6,7	3,3	3,0	2,9	2,4	1,9	0,9	0,7	774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775
27,6	22,8	17,4	11,4	5,7	2,8	1,4	0,8	0,9	0,6	0,6	0,3	776
13,4	11,1	8,6	5,7	2,9	1,5	0,8	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778
3,6	3,8	3,4	2,6	1,2	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,1	779
1,8	1,9	1,7	1,3	0,6	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781
9,1	9,1	8,0	8,5	6,1	2,9	2,1	1,8	2,3	1,8	1,3	1,1	782
4,4	4,4	4,0	4,2	3,1	1,5	1,2	1,2	1,5	1,3	0,9	0,8	783

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
784	617	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
785	Endometriose	Weibl.	1,1	-	-	0,0	0,0	0,2	1,0	2,0
786		Insges.	0,6	-	-	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0
787	618	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
788	Genitalprolaps	Weibl.	7,7	-	0,1	0,0	-	0,1	0,6	1,1
789		Insges.	4,0	-	0,1	0,0	-	0,0	0,3	0,5
790	619-621	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
791	Fisteln des Genitaltrakts, nichtentzündliche und sonstige Krankheiten des Uterus und der Anhangsgebilde	Weibl.	12,1	4,1	0,4	0,2	1,0	6,7	12,3	13,1
792		Insges.	6,3	2,0	0,2	0,1	0,5	3,2	5,9	6,3
793	622	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
794	Nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	Weibl.	20,8	-	-	0,0	0,0	3,2	23,0	46,9
795		Insges.	10,8	-	-	0,0	0,0	1,5	11,1	22,7
796	623,624	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Nichtentzündliche Krankheiten der Vagina, der Vulva und des Perineums	Weibl.	1,9	1,0	0,4	0,7	0,6	3,1	2,5	2,0
798		Insges.	1,0	0,5	0,2	0,3	0,3	1,5	1,2	1,0
799	626	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Menstruationsstörungen und andere abnorme Blutungen aus dem weiblichen Genitaltrakt	Weibl.	46,7	0,4	0,1	0,0	2,3	17,9	43,1	57,3
801		Insges.	24,4	0,2	0,1	0,0	1,1	8,7	20,9	27,7
802	628	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Sterilität bei der Frau	Weibl.	11,6	-	-	0,0	0,0	1,3	43,6	72,7
804		Insges.	6,0	-	-	0,0	0,0	0,7	21,1	35,1
805	625,627,629	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Alle sonstigen Krankheiten der weiblichen Genitalorgane	Weibl.	35,5	0,2	0,1	0,4	1,8	8,4	12,0	11,1
807		Insges.	18,5	0,1	0,1	0,2	0,9	4,1	5,8	5,4
Klasse XI										
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbetts (630 - 676)										
808	633	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Ektopische Gravidität	Weibl.	3,6	-	-	-	0,0	2,0	11,7	16,1
810		Insges.	1,9	-	-	-	0,0	1,0	5,7	7,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
2,3	2,9	3,5	2,5	1,3	0,4	0,0	0,1	0,1	0,2	-	0,1	785
1,1	1,4	1,7	1,3	0,7	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787
2,6	6,5	10,7	15,3	20,0	20,8	16,2	16,4	13,9	8,6	5,8	4,0	788
1,3	3,2	5,3	7,7	10,1	10,7	9,4	10,7	9,4	5,9	4,1	3,0	789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790
13,3	14,5	19,5	32,1	37,5	13,6	6,5	6,6	5,6	4,4	3,0	1,4	791
6,4	7,1	9,7	16,1	18,9	7,0	3,8	4,3	3,8	3,1	2,1	1,0	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793
51,1	42,7	40,8	39,1	30,6	15,7	7,1	5,8	3,5	2,8	1,1	0,7	794
24,8	20,9	20,2	19,6	15,5	8,1	4,1	3,8	2,3	1,9	0,8	0,5	795
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796
2,1	2,2	2,2	2,8	3,1	2,4	1,8	1,8	1,3	1,4	1,1	0,7	797
1,0	1,1	1,1	1,4	1,6	1,2	1,1	1,2	0,9	1,0	0,7	0,5	798
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799
70,4	91,3	128,4	159,2	108,8	20,2	5,4	4,2	2,6	2,1	1,9	0,7	800
34,2	44,6	63,7	79,8	54,9	10,4	3,1	2,7	1,7	1,5	1,3	0,5	801
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802
29,9	5,5	0,9	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	803
14,5	2,7	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	804
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805
10,4	10,7	22,1	88,3	196,4	91,3	39,0	32,6	23,1	19,4	10,4	5,7	806
5,1	5,2	11,0	44,3	99,2	47,1	22,7	21,2	15,6	13,4	7,3	4,2	807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808
11,7	5,7	1,8	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	809
5,7	2,8	0,9	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	810

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
811	634	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Spontanabort	Weibl.	21,1	-	-	-	0,2	31,3	99,5	79,1
813		Insges.	11,0	-	-	-	0,1	15,2	48,2	38,3
814	635	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
815	Legal eingeleiteter Abort	Weibl.	85,7	-	-	-	2,3	115,9	259,4	285,5
816		Insges.	44,7	-	-	-	1,1	56,5	125,7	138,1
817	636,637	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
818	Illegal eingeleiteter und nicht näher	Weibl.	1,0	-	-	-	-	1,4	4,5	3,8
819	bezeichneter Abort	Insges.	0,5	-	-	-	-	0,7	2,2	1,8
820	630-632,638,639	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Sonstige Komplikationen der	Weibl.	6,0	-	-	-	0,0	7,1	27,7	24,6
822	Schwangerschaft mit abortivem	Insges.	3,1	-	-	-	0,0	3,5	13,4	11,9
	Ausgang									
823	640,641	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
824	Blutung in der Schwangerschaft,	Weibl.	13,0	-	-	-	0,0	18,3	72,7	57,6
825	vorzeitige Lösung der Plazenta und	Insges.	6,8	-	-	-	0,0	8,9	35,3	27,9
	Placenta praevia									
826	642	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
827	Hochdruck als Komplikation von	Weibl.	5,9	-	-	-	0,0	10,1	34,5	21,6
828	Schwangerschaft, Geburt und	Insges.	3,1	-	-	-	0,0	4,9	16,7	10,4
	Wochenbett									
829	643	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
830	Übermäßiges Erbrechen während	Weibl.	2,6	-	-	-	0,1	8,4	16,4	8,4
831	der Schwangerschaft	Insges.	1,4	-	-	-	0,0	4,1	8,0	4,0
832	644-646	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
833	Alle sonstigen Komplikationen der	Weibl.	27,6	-	-	-	0,1	64,8	166,4	99,3
834	Schwangerschaft	Insges.	14,4	-	-	-	0,1	31,6	80,7	48,0
835	647,648	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
836	Krankheiten der Mutter, die	Weibl.	4,2	-	-	-	0,0	6,2	23,0	15,4
837	Schwangerschaft, Geburt und	Insges.	2,2	-	-	-	0,0	3,0	11,2	7,5
	Wochenbett komplizieren									
838	650	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
839	Völlig normale Geburt	Weibl.	161,4	-	-	-	0,4	223,5	970,6	700,4
840		Insges.	84,1	-	-	-	0,2	108,9	470,4	338,7

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.	
Im Alter von...bis unter...Jahren														
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
42,3	26,2	15,1	3,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812
20,6	12,8	7,5	1,8	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814
255,8	208,2	92,7	8,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815
124,3	101,8	46,0	4,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
2,0	1,4	0,8	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818
0,9	0,7	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820
12,5	7,7	3,6	0,7	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821
6,1	3,8	1,8	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823
22,4	7,2	1,5	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824
10,9	3,5	0,7	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826
10,7	4,4	0,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827
5,2	2,1	0,5	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829
2,9	0,9	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
1,4	0,4	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832
39,2	15,7	2,4	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
19,0	7,7	1,2	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
9,3	4,0	1,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836
4,5	2,0	0,5	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
248,4	71,9	10,6	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
120,7	35,1	5,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
841	652	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
842	Lage-, Haltungs- und Einstellungs-	Weibl.	4,9	-	-	-	0,0	6,0	29,6	20,7
843	anomalien des Feten	Insges.	2,6	-	-	-	0,0	2,9	14,3	10,0
844	653,654	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
845	Mißverhältnis und Anomalie der	Weibl.	7,5	-	-	-	0,0	11,8	42,8	32,5
846	Organe und Weichteile des Beckens	Insges.	3,9	-	-	-	0,0	5,8	20,8	15,7
847	655,656	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
848	Fetale Anomalie und Zustände, die	Weibl.	9,2	-	-	-	-	14,9	55,1	33,7
849	sich auf die Behandlung der Mutter	Insges.	4,8	-	-	-	-	7,3	26,7	16,3
	auswirken									
850	651,657-659	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Mehrlingsschwangerschaft und	Weibl.	6,6	-	-	-	0,0	8,9	38,2	27,3
852	sonstige besondere Zustände bei	Insges.	3,5	-	-	-	0,0	4,3	18,5	13,2
	der Geburt									
853	664	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Verletzung des Perineums und der	Weibl.	17,4	-	-	-	0,1	29,7	111,8	72,3
855	Vulva unter der Geburt	Insges.	9,1	-	-	-	0,0	14,5	54,2	35,0
856	660-663,665-669	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
857	Sonstige Komplikationen, die vor-	Weibl.	29,3	-	-	-	0,1	47,7	189,9	113,2
858	wiegend während des Geburtsablaufs	Insges.	15,3	-	-	-	0,0	23,3	92,0	54,7
	auftreten									
859	670-676	Männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
860	Komplikationen des Wochenbettes	Weibl.	2,5	-	-	-	-	3,4	15,5	9,9
861		Insges.	1,3	-	-	-	-	1,6	7,5	4,8
	Klasse XII									
	Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes (680 - 709)									
862	680	Männl.	2,1	2,3	1,7	1,2	1,4	2,4	2,5	2,4
863	Karbunkel und Furunkel	Weibl.	1,1	2,8	1,5	1,0	1,1	1,7	1,3	1,0
864		Insges.	1,6	2,5	1,6	1,1	1,2	2,1	1,9	1,7
865	681,682	Männl.	11,7	21,3	11,1	6,4	6,0	9,7	11,5	12,0
866	Zellgewebsentzündungen und	Weibl.	7,5	23,4	8,3	4,7	4,3	6,1	5,8	5,7
867	Abszesse	Insges.	9,5	22,3	9,7	5,5	5,1	8,0	8,7	8,9

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841
8,9	2,4	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	842
4,3	1,2	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
12,2	4,4	0,6	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	845
5,9	2,1	0,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
12,5	9,5	3,0	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	848
6,1	4,6	1,5	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	849
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850
12,2	4,3	0,9	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	851
5,9	2,1	0,4	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
21,5	5,7	0,6	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	854
10,4	2,8	0,3	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
39,6	14,2	2,1	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	857
19,2	6,9	1,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859
3,2	1,2	0,5	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	860
1,6	0,6	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	861
2,4	2,1	1,9	1,8	2,2	2,2	2,2	2,5	2,0	1,6	2,0	2,5	862
0,8	1,0	1,1	0,9	1,2	1,4	1,0	1,3	1,0	0,9	0,9	0,3	863
1,6	1,6	1,5	1,3	1,7	1,8	1,5	1,7	1,3	1,1	1,3	0,9	864
12,3	12,2	11,4	11,6	13,8	13,9	14,2	16,4	15,5	14,8	12,9	11,5	865
5,6	5,5	5,8	7,3	8,4	9,4	9,1	11,9	11,5	10,9	10,8	9,1	866
9,1	8,9	8,6	9,4	11,1	11,6	11,2	13,4	12,8	12,1	11,4	9,7	867

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
868	683	Männl.	0,9	4,1	5,2	2,2	1,1	0,9	0,5	0,4
869	Akute Lymphadenitis	Weibl.	0,6	3,1	3,8	1,4	1,2	0,5	0,5	0,2
870		Insges.	0,7	3,6	4,5	1,8	1,1	0,7	0,5	0,3
871	684-686	Männl.	1,9	16,0	6,4	1,8	0,7	2,0	2,9	2,5
872	Sonstige Infektionen der Haut und	Weibl.	1,1	10,6	5,7	1,6	0,8	2,1	1,3	0,6
873	des Unterhautgewebes	Insges.	1,5	13,4	6,1	1,7	0,8	2,0	2,1	1,6
874	691	Männl.	2,4	16,4	11,2	3,5	2,4	3,7	2,6	1,4
875	Dermatitis atopica und verwandte	Weibl.	2,1	10,8	7,3	3,7	2,7	4,8	3,2	2,0
876	Krankheiten	Insges.	2,3	13,7	9,3	3,6	2,6	4,2	2,9	1,7
877	692	Männl.	2,4	2,5	1,1	0,3	0,5	1,3	1,8	2,0
878	Kontaktdermatitis und sonstige	Weibl.	2,0	2,4	0,6	0,4	0,6	2,5	1,9	2,1
879	Formen des Ekzems	Insges.	2,2	2,5	0,9	0,4	0,6	1,9	1,9	2,0
880	696	Männl.	4,2	0,2	0,3	0,7	1,0	2,3	3,5	5,2
881	Psoriasis und ähnliche Krankheiten	Weibl.	2,9	0,1	0,3	1,0	1,7	4,2	3,5	3,6
882		Insges.	3,5	0,1	0,3	0,9	1,4	3,2	3,5	4,4
883	690,693-695,697,	Männl.	1,6	21,3	1,9	0,9	0,7	0,6	0,8	1,0
884	Sonstige entzündliche Krankheiten	Weibl.	2,0	18,2	1,6	0,9	0,8	1,5	1,8	1,9
885	der Haut und des Unterhautgewebes	Insges.	1,8	19,8	1,8	0,9	0,7	1,0	1,3	1,4
886	708	Männl.	1,0	2,3	2,5	1,5	1,0	0,7	0,9	0,9
887	Urtikaria	Weibl.	1,2	1,3	1,9	1,0	0,9	1,5	1,3	1,3
888		Insges.	1,1	1,8	2,2	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1
889	700-707,709	Männl.	3,9	4,7	2,1	2,1	3,7	5,5	4,2	3,7
890	Sonstige Krankheiten der Haut und	Weibl.	4,2	2,8	2,2	2,4	3,7	3,7	2,7	3,1
891	des Unterhautgewebes	Insges.	4,1	3,8	2,1	2,3	3,7	4,6	3,5	3,4
Klasse XIII										
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (710 - 739)										
892	714	Männl.	2,8	-	1,6	2,0	2,1	1,0	1,0	1,1
893	Rheumatoid-Arthritis und sonstige	Weibl.	6,9	0,3	1,8	2,4	2,3	1,9	1,9	2,9
894	Polyarthritiden	Insges.	4,9	0,1	1,7	2,2	2,2	1,4	1,4	2,0

Morbidität

gleichen Alters und Geschlechts nach Altersgruppen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,5	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,1	0,4	0,1	0,1	-	868
0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	869
0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	870
1,9	1,4	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,7	0,7	0,3	0,3	-	871
0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	872
1,2	0,9	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	873
1,5	1,2	0,9	1,1	1,0	1,1	0,8	1,0	0,8	0,4	0,7	0,2	874
1,4	1,3	0,9	1,2	1,1	0,7	0,4	0,5	0,8	0,5	0,7	0,2	875
1,5	1,3	0,9	1,1	1,1	0,9	0,6	0,7	0,8	0,4	0,7	0,2	876
2,1	2,5	2,6	3,0	3,6	4,3	4,3	3,6	5,4	5,4	5,8	5,3	877
1,8	2,0	2,1	2,5	2,4	2,8	1,9	2,2	2,4	3,5	3,8	2,9	878
1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,5	2,9	2,7	3,4	4,1	4,4	3,6	879
6,2	6,9	5,9	6,2	5,8	5,6	4,5	4,9	4,7	4,3	4,8	3,1	880
3,2	2,8	3,2	3,2	3,9	2,8	3,1	2,8	2,9	3,1	3,1	2,6	881
4,7	4,9	4,5	4,7	4,9	4,2	3,7	3,5	3,5	3,5	3,6	2,7	882
1,3	1,3	1,1	1,2	1,6	1,9	1,4	2,2	3,0	3,5	3,4	4,9	883
1,5	2,3	2,6	2,1	2,2	2,4	1,6	1,5	2,0	2,1	2,0	2,1	884
1,4	1,8	1,9	1,6	1,9	2,2	1,6	1,8	2,3	2,6	2,4	2,9	885
1,0	1,0	0,6	0,8	0,7	0,9	0,6	0,4	0,5	0,2	0,1	-	886
1,5	1,7	1,6	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	887
1,2	1,4	1,1	1,1	0,9	1,0	0,7	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	888
3,7	3,3	2,9	3,7	4,3	4,1	4,2	6,2	5,8	6,8	7,5	5,1	889
3,3	3,3	3,6	4,2	4,6	4,7	5,1	5,5	6,2	8,8	9,7	9,0	890
3,5	3,3	3,2	4,0	4,5	4,4	4,7	5,8	6,1	8,2	9,1	7,9	891
1,2	1,9	2,4	4,0	4,6	7,3	7,7	5,8	4,8	3,6	2,1	1,4	892
4,4	5,8	6,4	11,2	14,5	15,7	12,8	14,1	11,3	8,6	4,2	2,4	893
2,8	3,8	4,4	7,6	9,6	11,7	10,7	11,2	9,2	7,0	3,6	2,2	894

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
895	715	Männl.	8,6	0,3	0,1	0,1	0,2	0,6	0,9	1,3
896	Osteoarthrose und verwandte	Weibl.	13,7	0,3	0,2	0,1	0,3	0,5	1,2	1,5
897	Krankheiten	Insges.	11,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,5	1,0	1,4
898	711-713,716	Männl.	1,4	1,8	3,8	2,8	1,5	0,7	0,8	0,7
899	Arthropatien	Weibl.	1,2	1,2	2,5	1,9	1,1	0,8	0,6	0,7
900		Insges.	1,3	1,5	3,1	2,3	1,3	0,8	0,7	0,7
901	717	Männl.	8,4	0,1	0,2	0,3	1,9	10,6	13,4	14,4
902	Innere Kniegelenkschädigung	Weibl.	3,1	-	0,1	0,4	2,4	10,3	5,5	3,6
903		Insges.	5,6	0,0	0,1	0,3	2,2	10,5	9,5	9,1
904	710,718,719	Männl.	3,7	0,7	1,0	1,6	2,8	6,6	5,7	4,5
905	Diffuse Krankheiten des Bindegewe-	Weibl.	3,6	0,3	1,1	1,5	4,0	7,2	3,8	4,0
906	bes sowie sonstige Gelenkkrankhei- ten	Insges.	3,7	0,5	1,1	1,5	3,4	6,9	4,8	4,3
907	720,721	Männl.	3,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,8	1,2
908	Spondylitis und Spondylose sowie	Weibl.	2,9	-	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,8
909	verwandte Krankheiten	Insges.	3,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0
910	722	Männl.	6,8	0,2	0,1	0,2	0,2	0,8	2,2	3,3
911	Bandscheibenkrankheiten	Weibl.	5,0	0,8	0,1	0,0	0,2	0,7	1,3	2,6
912		Insges.	5,8	0,5	0,1	0,1	0,2	0,7	1,7	3,0
913	723	Männl.	1,6	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6
914	Sonstige Krankheiten der Zervikal-	Weibl.	2,0	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,5	0,9
915	region	Insges.	1,8	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,7
916	724	Männl.	7,5	-	0,1	0,3	0,5	1,0	2,3	4,3
917	Sonstige und nicht näher bezeichnete	Weibl.	6,5	0,5	0,2	0,3	0,7	1,4	1,9	3,2
918	Krankheiten des Rückens	Insges.	7,0	0,2	0,1	0,3	0,6	1,2	2,1	3,8
919	725-729	Männl.	11,8	2,2	4,4	6,2	4,4	4,6	5,5	6,6
920	Weichteilrheumatismus, exkl. im	Weibl.	7,0	1,9	2,9	4,0	4,6	5,4	4,7	4,4
921	Rückenbereich	Insges.	9,3	2,0	3,7	5,1	4,5	5,0	5,1	5,6
922	730	Männl.	1,7	3,1	1,6	1,0	1,2	1,0	1,2	1,2
923	Osteomyelitis, Periostitis und	Weibl.	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9	0,4	0,4	0,3
924	sonstige den Knochen betreffende Infektionen	Insges.	1,2	2,4	1,5	1,0	1,0	0,7	0,8	0,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
2,2	3,1	5,2	7,9	14,0	29,7	35,0	38,6	41,9	32,7	14,5	7,2		895
2,4	3,3	6,1	12,1	24,2	36,4	35,2	45,9	46,4	38,6	21,2	9,8		896
2,3	3,2	5,6	10,0	19,1	33,1	35,1	43,3	44,9	36,8	19,2	9,1		897
0,8	0,9	0,9	1,3	1,0	1,7	1,8	1,2	1,4	1,2	1,2	0,8		898
0,7	0,6	0,7	1,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,5	2,1	2,2	1,0		899
0,7	0,8	0,8	1,2	1,1	1,6	1,4	1,2	1,5	1,8	1,9	0,9		900
14,7	13,7	12,7	12,1	9,1	6,1	4,0	1,1	0,6	0,4	0,3	0,2		901
4,0	3,8	4,7	4,6	3,9	3,2	1,2	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4		902
9,5	8,8	8,7	8,4	6,5	4,6	2,4	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4		903
3,5	3,9	3,6	4,0	4,4	4,6	3,3	3,2	2,8	2,6	2,2	0,2		904
2,9	3,6	3,8	5,1	5,3	4,9	3,2	3,2	2,5	2,5	1,9	1,2		905
3,2	3,7	3,7	4,5	4,8	4,8	3,3	3,2	2,6	2,5	2,0	0,9		906
2,0	2,6	4,2	6,3	6,7	8,8	9,1	4,4	3,2	3,8	3,1	1,2		907
1,5	2,2	3,9	6,2	7,8	7,9	4,8	4,2	4,9	4,2	3,2	2,1		908
1,8	2,4	4,0	6,2	7,3	8,4	6,6	4,3	4,4	4,1	3,2	1,9		909
7,2	12,3	17,1	16,3	14,3	12,2	11,5	4,8	4,2	1,7	1,6	0,6		910
5,4	10,7	14,7	14,7	11,3	8,2	3,4	2,7	2,5	2,0	0,6	0,4		911
6,3	11,5	15,9	15,5	12,8	10,1	6,8	3,5	3,1	1,9	0,9	0,4		912
1,0	1,6	2,5	3,6	3,9	4,2	4,1	2,0	1,1	1,1	0,4	0,2		913
1,4	2,3	3,7	5,6	5,4	4,9	1,9	1,6	1,3	1,2	0,8	0,4		914
1,2	2,0	3,1	4,6	4,7	4,5	2,8	1,7	1,2	1,2	0,7	0,3		915
8,0	11,3	14,1	16,3	15,8	16,0	14,0	7,9	8,2	6,4	4,6	1,8		916
5,9	9,2	14,2	15,4	15,4	12,2	6,8	6,5	7,1	5,8	5,0	2,1		917
7,0	10,3	14,1	15,9	15,6	14,0	9,8	7,0	7,4	6,0	4,9	2,0		918
9,1	12,9	17,4	22,2	22,4	25,1	23,7	17,8	12,0	8,0	5,4	3,3		919
6,5	7,7	10,0	14,3	14,2	11,3	7,7	6,7	5,5	4,1	1,9	1,4		920
7,8	10,4	13,7	18,2	18,3	18,0	14,4	10,6	7,6	5,3	3,0	1,9		921
1,4	1,3	1,5	1,7	2,0	2,9	2,5	3,3	2,8	3,6	1,9	1,0		922
0,3	0,4	0,5	0,8	0,8	1,3	1,0	1,1	0,9	0,8	0,9	1,2		923
0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	2,1	1,7	1,8	1,5	1,6	1,2	1,2		924

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25		
				Im Alter von...bis unter...Jahren								
				1	5	10	15	20	25	30		
925	731-733	Männl.	2,5	0,5	2,8	4,9	6,3	4,2	1,9	1,5		
926	Alle sonstigen Krankheiten des	Weibl.	2,7	1,9	1,2	1,6	4,6	2,1	0,7	0,6		
927	Knochens und des Knorpels	Insges.	2,6	1,2	2,0	3,3	5,5	3,2	1,3	1,1		
928	734-736	Männl.	1,4	0,6	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
929	Erworbene Deformitäten der Extre-	Weibl.	7,1	0,9	0,4	0,8	3,0	4,0	3,9	4,4		
930	mitäten	Insges.	4,3	0,7	0,4	0,9	2,1	2,5	2,4	2,7		
931	737	Männl.	0,5	0,4	0,2	1,4	3,3	1,4	0,1	0,1		
932	Wirbelsäulenverkrümmung	Weibl.	1,1	0,4	0,3	2,3	9,9	3,9	0,2	0,1		
933		Insges.	0,8	0,4	0,2	1,9	6,5	2,6	0,1	0,1		
934	738,739	Männl.	0,7	0,1	0,3	0,3	0,7	0,9	0,3	0,5		
935	Sonstige erworbene Deformitäten	Weibl.	0,8	0,1	0,3	0,3	1,0	1,3	0,3	0,5		
936	sowie Funktionsstörungen mit seg- mentaler Reaktion, nicht andernorts klassifizierbar	Insges.	0,8	0,1	0,3	0,3	0,8	1,1	0,3	0,5		
	Klasse XIV											
	Angeborene Anomalien (740 - 759)											
937	740-742	Männl.	0,9	22,6	3,8	2,5	1,5	1,0	0,2	0,1		
938	Angeborene Anomalien des Ner-	Weibl.	0,8	27,7	3,2	2,4	1,3	0,8	0,4	0,2		
939	vensystems	Insges.	0,9	25,1	3,5	2,4	1,4	0,9	0,3	0,2		
940	743,744	Männl.	3,5	9,5	5,2	22,5	9,2	4,1	1,8	1,1		
941	Angeborene Anomalien des Auges,	Weibl.	3,3	6,8	5,0	25,0	10,2	2,8	2,3	1,5		
942	des Ohres, des Gesichts und des Halses	Insges.	3,4	8,2	5,1	23,8	9,7	3,5	2,0	1,3		
943	745-747	Männl.	3,1	101,3	11,9	5,5	3,7	2,0	0,6	0,5		
944	Angeborene Anomalien des Kreis-	Weibl.	2,6	82,3	9,8	6,5	3,3	1,5	1,0	0,8		
945	laufsystems	Insges.	2,8	92,1	10,9	6,0	3,5	1,7	0,8	0,6		
946	749	Männl.	1,5	36,2	7,4	3,7	0,8	2,1	0,5	0,3		
947	Gaumenspalte und Lippenspalte	Weibl.	0,9	22,4	6,1	2,8	0,8	1,2	0,3	0,3		
948		Insges.	1,2	29,5	6,8	3,3	0,8	1,6	0,4	0,3		
949	750,751	Männl.	1,4	69,1	3,4	1,0	0,4	0,2	0,1	0,1		
950	Sonstige angeborene Anomalien	Weibl.	0,8	34,6	3,3	0,8	0,3	0,1	0,1	0,1		
951	des Verdauungssystems	Insges.	1,1	52,3	3,4	0,9	0,4	0,2	0,1	0,1		

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,1	1,3	1,3	1,9	2,3	2,5	2,6	2,0	2,5	2,3	1,6	1,2	925
0,7	1,0	1,3	2,2	3,9	4,2	3,7	5,4	6,1	6,8	5,3	3,2	926
0,9	1,2	1,3	2,1	3,1	3,4	3,2	4,2	4,9	5,4	4,2	2,6	927
0,8	1,1	1,4	1,9	2,3	2,8	2,6	2,0	0,8	1,0	0,6	0,6	928
5,3	6,3	10,7	15,9	20,1	17,8	9,4	6,5	3,7	2,5	1,6	0,5	929
3,0	3,7	6,0	8,9	11,3	10,5	6,5	4,9	2,7	2,1	1,3	0,5	930
0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,4	931
0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2	0,3	0,4	932
0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	933
0,8	0,7	0,9	0,9	1,2	1,1	0,9	1,2	0,5	0,8	0,5	0,2	934
0,3	1,0	1,1	1,8	1,5	1,1	0,5	0,7	1,1	0,6	0,6	-	935
0,6	0,9	1,0	1,3	1,3	1,1	0,7	0,9	0,9	0,7	0,5	0,1	936
0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,2	-	-	937
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	938
0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	939
0,9	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	940
1,3	0,8	0,9	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	-	941
1,1	0,8	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	942
0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,0	-	-	-	0,4	943
0,6	0,7	0,9	0,7	0,7	0,5	0,3	0,2	0,0	0,1	-	0,1	944
0,4	0,6	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	-	0,2	945
0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	-	0,0	-	-	-	0,1	-	946
0,0	0,1	0,0	0,1	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	947
0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	948
0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,8	-	949
0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	950
0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	951

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
952	752 (EXKL.752.5)	Männl.	1,7	4,9	10,1	9,8	4,0	0,6	0,1	0,1
953	Angeborene Anomalien der Genital-	Weibl.	0,4	3,3	1,2	0,9	0,7	1,0	0,4	0,5
954	organe	Insges.	1,0	4,1	5,8	5,5	2,4	0,8	0,2	0,3
955	752.5	Männl.	8,0	5,8	50,3	47,9	19,9	1,5	0,4	0,4
956	Ausgebliebener Descensus testi-	Weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
957	culorum	Insges.	3,8	3,0	25,8	24,5	10,2	0,8	0,2	0,2
958	753	Männl.	1,0	23,0	3,0	2,1	1,0	0,3	0,2	0,2
959	Angeborene Anomalien des Harn-	Weibl.	0,7	13,3	2,0	1,5	1,1	0,2	0,3	0,2
960	systems	Insges.	0,8	18,3	2,5	1,8	1,0	0,3	0,3	0,2
961	754-756 (EXKL.754)	Männl.	2,4	51,6	10,5	5,4	3,4	2,5	0,8	0,6
962	Angeborene Anomalien des Muskel-	Weibl.	2,0	40,2	9,8	4,2	4,8	3,5	0,9	0,4
963	Skelett-Systems	Insges.	2,2	46,0	10,1	4,8	4,1	3,0	0,9	0,5
964	754.3	Männl.	0,5	11,6	3,2	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0
965	Angeborene Hüftluxation	Weibl.	1,9	70,5	12,7	1,9	0,9	0,6	0,2	0,3
966		Insges.	1,2	40,2	7,9	1,3	0,5	0,4	0,1	0,2
967	748,757-759	Männl.	1,0	24,3	3,2	1,3	1,2	0,9	0,6	0,5
968	Alle sonstigen angeborenen Ano-	Weibl.	1,3	22,8	2,5	2,4	3,0	2,0	1,2	1,2
969	malien	Insges.	1,2	23,6	2,9	1,8	2,1	1,4	0,9	0,8
Klasse XV										
Bestimmte in der Perinatalperiode entstandene Zustände (760 - 779)										
970	760	Männl.	0,0	1,1	0,1	-	-	-	-	-
971	Schädigung des Feten oder Neuge-	Weibl.	0,0	1,1	-	-	-	-	-	-
972	borenen durch Zustände der Mutter, die zur vorliegenden Schwangerschaft keine Beziehung haben müssen	Insges.	0,0	1,1	0,1	-	-	-	-	-
973	761-763	Männl.	1,4	103,0	0,1	-	-	-	-	-
974	Schädigung des Feten oder Neuge-	Weibl.	1,1	96,3	0,0	-	-	-	-	-
975	borenen durch Komplikationen der Schwangerschaft und Geburt	Insges.	1,3	99,8	0,1	-	-	-	-	-
976	764,765	Männl.	8,3	615,1	0,6	-	-	-	-	-
977	Fetale Wachstumsretardierung,	Weibl.	7,6	649,6	0,6	-	-	-	-	-
978	Mangelernährung und Unreife	Insges.	7,9	631,8	0,6	-	-	-	-	-

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	0,1	-	-	-	952
0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	953
0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	954
0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,4	955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956
0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,0	-	-	0,1	957
0,2	0,4	0,4	0,5	0,7	0,6	0,3	0,4	0,3	0,1	0,3	-	958
0,2	0,4	0,3	0,7	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	959
0,2	0,4	0,3	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	960
0,3	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	-	-	0,1	0,2	961
0,6	0,8	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	962
0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	963
0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	-	964
0,5	0,5	0,3	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	965
0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	966
0,5	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	-	0,2	967
0,9	0,7	0,6	0,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	968
0,7	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1	0,0	0,1	969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	974
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
979	767	Männl.	0,3	22,1	-	-	-	-	-	-
980	Geburtstrauma	Weibl.	0,2	17,4	0,1	-	-	-	-	-
981		Insges.	0,3	19,8	0,0	-	-	-	-	-
982	768-770	Männl.	2,9	217,4	0,4	-	-	-	-	-
983	Hypoxie, Asphyxie und sonstige respiratorische Krankheitszustände des Feten und Neugeborenen	Weibl.	1,9	159,6	0,2	-	-	-	-	-
984		Insges.	2,4	189,3	0,3	-	-	-	-	-
985	773,774	Männl.	3,8	280,3	0,2	-	-	-	-	-
986	Hämolytische Krankheiten des Feten und Neugeborenen	Weibl.	2,8	242,9	0,1	-	-	-	-	-
987		Insges.	3,3	262,1	0,1	-	-	-	-	-
988	776	Männl.	0,2	13,8	-	-	-	-	-	-
989	Hämatologische Krankheiten des Feten und Neugeborenen	Weibl.	0,2	16,9	0,0	-	-	-	-	-
990		Insges.	0,2	15,3	0,0	-	-	-	-	-
991	331 REST 760-779	Männl.	3,0	205,2	3,6	-	-	-	-	-
992	Alle sonstigen Zustände, die in der Perinatalperiode entstanden sind	Weibl.	1,9	156,6	0,7	-	-	-	-	-
993		Insges.	2,4	181,6	2,2	-	-	-	-	-
Klasse XVI										
Symptome, unspezifische abnorme Befunde und ungenau bezeichnete Zustände (780 - 799)										
994	780	Männl.	4,1	26,0	25,0	4,6	4,0	1,9	1,7	1,8
995	Allgemeine Symptome	Weibl.	3,3	22,0	21,1	4,8	3,4	2,2	1,5	1,2
996		Insges.	3,7	24,1	23,1	4,7	3,7	2,1	1,6	1,5
997	784	Männl.	1,9	0,6	0,9	2,5	2,8	0,8	1,1	0,8
998	Symptome, die Kopf und Hals betreffen	Weibl.	1,7	0,8	0,5	2,2	2,5	1,3	1,1	0,9
999		Insges.	1,8	0,7	0,7	2,4	2,6	1,0	1,1	0,9
1000	787	Männl.	1,7	16,2	7,5	5,3	2,0	0,4	0,4	0,4
1001	Symptome, die das Verdauungssystem betreffen	Weibl.	1,8	14,9	7,3	5,0	2,2	0,9	0,7	0,6
1002		Insges.	1,7	15,5	7,4	5,2	2,1	0,7	0,6	0,5
1003	788	Männl.	0,7	0,4	0,6	0,9	0,4	0,3	0,3	0,4
1004	Symptome, die das Harnsystem betreffen	Weibl.	0,6	0,3	0,5	1,0	0,6	0,4	0,4	0,4
1005		Insges.	0,7	0,3	0,5	1,0	0,5	0,4	0,3	0,4

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993
1,7	2,0	2,2	2,3	2,8	3,0	3,3	3,2	2,4	2,3	2,7	1,8	994
1,4	1,7	2,0	2,6	2,2	2,3	2,1	1,8	2,2	1,7	1,6	1,2	995
1,6	1,9	2,1	2,4	2,5	2,6	2,6	2,3	2,3	1,9	1,9	1,4	996
1,3	1,3	1,8	1,8	2,7	3,6	3,0	3,0	3,8	3,3	4,2	5,1	997
1,4	1,3	1,8	2,0	1,7	2,0	1,5	2,4	1,9	2,7	3,9	2,2	998
1,3	1,3	1,8	1,9	2,2	2,8	2,2	2,6	2,5	2,9	4,0	3,0	999
0,5	0,7	0,6	0,9	0,8	1,0	1,4	1,2	0,8	1,2	1,1	0,4	1000
0,8	0,8	0,9	1,1	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5	1001
0,7	0,7	0,7	1,0	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,2	1002
0,6	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,1	1,5	1,4	1,4	1,5	1,8	1003
0,5	0,5	0,7	1,1	1,0	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,5	0,5	1004
0,6	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	1005

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1006	REST 780-789	Männl.	6,8	55,9	8,3	10,6	10,3	5,7	4,0	3,7
1007	Symptome sonstiger und nicht näher	Weibl.	7,4	50,5	7,8	11,5	13,5	8,6	6,1	4,3
1008	bezeichneter Organe	Insges.	7,1	53,3	8,1	11,1	11,8	7,1	5,0	4,0
1009	790-796	Männl.	0,9	3,5	2,0	1,4	0,7	1,0	0,5	0,4
1010	Unspezifische abnorme Befunde	Weibl.	0,9	2,9	2,3	1,8	1,1	0,7	0,8	0,8
1011		Insges.	0,9	3,2	2,2	1,6	0,9	0,9	0,6	0,6
1012	797-799	Männl.	0,3	2,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
1013	Ungenau bezeichnete und unbekannte	Weibl.	0,4	1,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1014	Ursachen von Morbidität und Morta- lität	Insges.	0,4	2,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
	Klasse XVII									
	Verletzungen und Vergiftungen (800 - 999)									
1015	801	Männl.	1,7	0,3	0,6	1,3	0,5	2,6	2,4	1,8
1016	Schädelbasisfraktur	Weibl.	0,5	0,3	0,5	0,5	0,2	0,8	0,7	0,3
1017		Insges.	1,1	0,3	0,6	0,9	0,4	1,7	1,6	1,1
1018	802	Männl.	5,4	0,3	0,7	1,9	2,5	12,8	12,7	9,6
1019	Gesichtsknochenfraktur	Weibl.	1,5	0,3	0,8	1,5	1,4	2,2	1,9	2,2
1020		Insges.	3,3	0,3	0,8	1,7	2,0	7,6	7,5	6,0
1021	800,803,804	Männl.	2,8	19,1	5,3	2,9	1,7	3,0	2,8	2,4
1022	Sonstige Frakturen des Schädels	Weibl.	1,0	13,6	3,3	1,9	0,5	0,9	0,5	0,5
1023		Insges.	1,9	16,4	4,3	2,4	1,1	1,9	1,7	1,5
1024	805,806	Männl.	2,8	-	0,2	0,3	0,9	3,7	4,1	3,3
1025	Fraktur der Wirbelsäule	Weibl.	1,5	0,2	0,1	0,2	0,5	1,6	1,3	1,2
1026		Insges.	2,1	0,1	0,1	0,3	0,7	2,7	2,7	2,3
1027	807-809	Männl.	3,6	-	0,1	0,4	0,7	2,2	2,4	2,7
1028	Sonstige Frakturen von Hals und	Weibl.	2,1	0,2	0,1	0,2	0,3	1,4	1,0	0,9
1029	Rumpf	Insges.	2,8	0,1	0,1	0,3	0,5	1,8	1,7	1,8
1030	810,811	Männl.	1,5	0,6	0,4	0,4	0,9	4,8	2,7	1,7
1031	Klavikula- und Skapulafraktur	Weibl.	0,5	-	0,5	0,6	0,4	1,2	0,8	0,4
1032		Insges.	1,0	0,3	0,4	0,5	0,7	3,1	1,7	1,1

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren													
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
3,2	3,1	3,9	4,6	6,0	7,3	6,9	8,7	10,3	11,8	12,4	10,5		1006
4,6	4,8	5,4	5,8	5,3	5,3	5,9	6,5	7,6	8,8	8,1	7,9		1007
3,9	4,0	4,7	5,2	5,6	6,2	6,3	7,3	8,5	9,7	9,4	8,5		1008
0,4	0,5	0,5	0,6	1,0	1,1	1,1	0,9	1,4	0,7	0,4	0,4		1009
0,9	0,7	0,9	0,8	0,6	0,9	0,6	0,5	0,6	0,3	0,1	0,1		1010
0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	0,8	0,6	0,8	0,4	0,2	0,2		1011
0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,2	1,8	2,2	4,5		1012
0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,4	1,2	1,3	2,3	3,4		1013
0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	1,2	1,4	2,2	3,7		1014
2,3	1,9	1,8	1,8	1,7	2,2	1,5	0,8	1,0	1,0	1,8	0,6		1015
0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	1,0	1,8		1016
1,5	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3	0,9	0,7	0,8	0,7	1,3	1,5		1017
7,6	5,8	5,3	3,3	3,4	2,9	2,2	1,8	1,0	1,3	2,3	2,3		1018
1,6	1,8	1,3	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,2	1,6	1,9	1,5		1019
4,7	3,8	3,3	2,3	2,3	1,8	1,4	1,3	1,1	1,5	2,0	1,7		1020
2,5	2,4	1,8	2,6	2,7	2,3	2,1	1,7	2,0	2,4	2,0	3,3		1021
0,7	0,5	0,8	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9	0,8	2,1		1022
1,6	1,4	1,3	1,6	1,6	1,5	1,2	1,0	1,1	1,4	1,2	2,4		1023
3,2	2,7	3,1	3,4	3,8	3,9	3,2	3,2	3,1	2,3	4,0	2,7		1024
1,3	1,0	1,0	1,4	2,3	2,6	2,3	2,3	2,8	2,6	2,9	3,3		1025
2,3	1,9	2,1	2,4	3,0	3,2	2,7	2,6	2,9	2,5	3,3	3,1		1026
2,7	3,4	4,3	5,2	6,3	6,3	6,4	6,9	7,8	10,3	8,9	10,9		1027
0,9	1,1	1,6	1,8	2,2	2,4	1,9	2,8	4,8	6,6	10,8	14,0		1028
1,8	2,3	2,9	3,5	4,3	4,3	3,8	4,2	5,8	7,7	10,2	13,2		1029
1,8	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	1,1	0,5	0,5	0,8	0,7	1,2		1030
0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,6	0,3	0,4	0,7	0,5	1,0	1,3		1031
1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6	0,4	0,6	0,6	0,9	1,3		1032

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Insges- amt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1033	812	Männl.	3,6	2,6	3,9	13,7	8,9	4,9	1,5	1,4
1034	Humerusfraktur	Weibl.	4,2	1,7	3,4	10,2	6,4	1,2	0,7	0,5
1035		Insges.	3,9	2,2	3,6	12,0	7,7	3,1	1,1	0,9
1036	813	Männl.	6,8	0,5	4,6	24,1	25,0	9,7	5,3	4,4
1037	Radius- und Ulnafraktur	Weibl.	6,4	0,3	3,4	17,2	12,5	3,2	1,7	1,2
1038		Insges.	6,6	0,4	4,0	20,7	18,9	6,5	3,5	2,9
1039	814-819	Männl.	2,5	0,2	0,7	1,2	2,3	5,9	4,9	4,0
1040	Sonstige Frakturen der oberen Extremitäten	Weibl.	0,5	0,1	0,4	0,9	0,9	0,8	0,8	0,3
1041		Insges.	1,4	0,1	0,5	1,1	1,6	3,4	2,9	2,2
1042	820	Männl.	3,9	0,2	0,2	0,4	0,4	1,0	0,9	1,0
1043	Schenkelhalsfraktur	Weibl.	12,6	0,1	0,3	0,2	0,6	0,2	0,3	0,2
1044		Insges.	8,4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
1045	821	Männl.	3,8	3,6	5,3	3,9	3,7	11,4	5,8	3,6
1046	Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneten Teile des Femurs	Weibl.	2,7	3,3	2,6	1,9	2,2	4,4	1,6	0,6
1047		Insges.	3,2	3,5	4,0	2,9	3,0	8,0	3,8	2,2
1048	822	Männl.	1,6	-	0,1	0,1	1,1	3,4	1,9	1,5
1049	Patellafraktur	Weibl.	1,2	-	-	0,1	0,3	1,4	0,6	0,6
1050		Insges.	1,4	-	0,0	0,1	0,7	2,5	1,3	1,1
1051	823	Männl.	8,8	0,4	3,8	6,2	8,5	19,5	12,6	10,2
1052	Tibia- und Fibulafraktur	Weibl.	4,1	0,2	2,6	3,6	5,1	5,5	2,8	1,8
1053		Insges.	6,4	0,3	3,2	5,0	6,8	12,7	7,8	6,1
1054	824	Männl.	6,6	0,2	0,2	0,7	3,1	9,6	8,6	9,0
1055	Knöchelfraktur	Weibl.	6,5	0,2	0,3	0,6	3,3	4,4	3,8	4,0
1056		Insges.	6,5	0,2	0,2	0,7	3,2	7,1	6,3	6,6
1057	825-829	Männl.	2,8	-	0,4	0,8	1,4	4,5	4,0	3,5
1058	Sonstige Frakturen der unteren Extremitäten	Weibl.	1,0	0,2	0,3	0,6	1,1	1,3	0,9	0,7
1059		Insges.	1,9	0,1	0,3	0,7	1,2	3,0	2,5	2,2
1060	831	Männl.	1,4	0,2	0,0	-	0,1	1,6	2,6	2,4
1061	Schultergelenkluxation, inkl. Skapula	Weibl.	0,6	-	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3
1062		Insges.	1,0	0,1	0,0	0,0	0,1	1,0	1,6	1,4

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,4	1,6	1,9	1,6	2,2	2,5	2,5	2,6	3,2	4,2	5,4	8,4	1033
0,7	1,0	0,9	1,3	2,3	3,7	4,4	6,5	8,5	12,0	16,1	21,9	1034
1,0	1,3	1,4	1,5	2,2	3,1	3,6	5,2	6,8	9,6	12,9	18,4	1035
3,6	3,6	3,0	2,9	2,8	3,0	2,5	1,6	1,4	2,5	2,6	3,7	1036
1,5	1,8	2,6	3,4	5,1	8,3	9,4	11,1	10,2	13,3	14,3	15,9	1037
2,6	2,7	2,8	3,2	3,9	5,8	6,5	7,8	7,3	9,9	10,8	12,7	1038
3,0	2,1	1,7	2,4	2,0	1,4	1,3	0,8	0,5	0,4	0,8	0,2	1039
0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,9	0,8	1040
1,7	1,2	1,0	1,4	1,2	0,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,9	0,6	1041
1,3	1,8	2,3	2,9	3,2	5,6	7,0	12,9	15,1	25,6	41,9	73,3	1042
0,4	0,5	0,9	1,6	3,3	7,3	12,7	22,6	37,6	63,0	106,7	175,7	1043
0,8	1,2	1,6	2,2	3,2	6,5	10,3	19,2	30,3	51,5	87,5	148,7	1044
2,3	1,9	1,5	2,7	2,3	2,2	2,5	3,0	2,6	3,2	5,5	9,6	1045
0,7	0,7	0,8	0,8	1,2	1,7	2,9	3,9	4,8	7,9	11,6	18,8	1046
1,5	1,3	1,1	1,8	1,8	2,0	2,7	3,6	4,1	6,5	9,8	16,4	1047
1,7	1,8	1,4	2,0	2,0	1,7	1,7	1,8	2,4	2,8	1,9	3,1	1048
0,5	0,7	0,7	0,8	1,2	1,8	2,4	2,4	3,2	3,1	2,5	2,7	1049
1,1	1,2	1,0	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2	2,9	3,0	2,4	2,8	1050
10,3	9,5	9,6	9,5	8,3	6,5	5,6	3,9	3,5	4,0	2,9	2,9	1051
2,6	3,7	3,2	4,4	4,2	5,7	6,0	6,5	5,0	5,8	5,3	4,7	1052
6,6	6,7	6,4	6,9	6,2	6,1	5,8	5,6	4,5	5,3	4,6	4,2	1053
9,5	9,8	8,5	8,0	7,3	7,2	5,3	5,0	3,5	3,3	3,4	2,9	1054
5,7	5,8	7,7	9,1	11,3	12,8	11,9	11,7	8,2	7,2	5,2	5,0	1055
7,6	7,8	8,1	8,6	9,3	10,1	9,2	9,3	6,7	6,0	4,7	4,4	1056
4,1	3,5	3,3	3,4	3,6	3,4	2,2	1,6	0,7	0,8	1,2	0,6	1057
0,5	0,8	1,2	1,0	1,3	1,0	1,1	1,5	1,5	1,0	1,1	1,3	1058
2,3	2,2	2,3	2,2	2,4	2,2	1,6	1,6	1,3	1,0	1,1	1,1	1059
1,6	1,5	1,8	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	0,9	1,0	1,4	1060
0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	0,5	0,8	1,1	1,6	2,0	2,4	2,5	1061
1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,6	1,7	2,0	2,2	1062

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1063	836	Männl.	2,6	0,2	0,0	0,1	1,2	6,1	5,6	4,5
1064	Kniegelenkluxation	Weibl.	0,9	-	0,1	0,2	2,2	4,3	2,0	0,9
1065		Insges.	1,7	0,1	0,0	0,1	1,7	5,2	3,8	2,8
1066	830,832-835,837-	Männl.	1,3	-	0,5	1,7	2,0	2,2	1,9	1,8
1067	Sonstige Luxationen	Weibl.	0,7	0,2	0,4	1,0	1,5	0,7	0,3	0,6
1068		Insges.	1,0	0,1	0,4	1,4	1,7	1,5	1,2	1,2
1069	844,845	Männl.	9,8	0,4	0,6	2,1	6,3	25,6	21,0	18,0
1070	Verstauchung und Zerrung des Kni Unterschenkels, Knöchels und Fuß	Weibl.	3,8	0,3	0,5	1,5	8,2	16,0	6,8	4,1
1071		Insges.	6,7	0,3	0,5	1,8	7,2	20,9	14,1	11,3
1072	840-843,846-848	Männl.	2,3	0,2	0,5	1,0	1,6	2,9	3,4	2,9
1073	Verstauchung und Zerrung sonstig Gelenke und angrenzender Muskel	Weibl.	0,9	0,4	0,4	0,6	1,1	1,4	0,7	0,5
1074		Insges.	1,5	0,3	0,4	0,8	1,4	2,2	2,1	1,7
1075	850	Männl.	25,6	27,5	39,7	52,5	33,5	43,6	32,0	23,8
1076	Gehirnerschütterung	Weibl.	13,9	21,8	33,9	32,2	16,3	21,7	11,5	9,6
1077		Insges.	19,5	24,7	36,9	42,6	25,1	32,9	22,1	16,9
1078	851-854	Männl.	2,2	2,2	1,1	1,6	1,1	3,3	2,4	2,3
1079	Sonstige intrakranielle Verletzung, exkl. mit Schädelfraktur	Weibl.	0,7	1,2	0,8	1,1	0,4	1,4	0,5	0,2
1080		Insges.	1,4	1,7	0,9	1,4	0,8	2,4	1,4	1,3
1081	860-869	Männl.	2,2	0,5	1,7	2,6	2,2	4,5	3,5	1,9
1082	Innere Verletzung des Thorax, Ab- domens und Beckens	Weibl.	0,6	0,3	1,1	1,2	0,7	1,0	0,6	0,6
1083		Insges.	1,4	0,4	1,4	1,9	1,5	2,8	2,1	1,3
1084	870,871	Männl.	1,6	0,2	1,5	2,1	2,1	2,1	2,5	2,1
1085	Offene Wunde der Augenanhangs- gebilde und des Augapfels	Weibl.	0,4	0,1	0,9	0,8	0,3	0,4	0,3	0,3
1086		Insges.	1,0	0,1	1,2	1,5	1,3	1,3	1,4	1,2
1087	872,873	Männl.	4,1	1,5	6,4	5,0	3,1	3,9	4,5	4,5
1088	Offene Wunde des Ohres und sonstige offene Wunden des Kopf	Weibl.	1,7	0,6	3,9	2,1	1,5	1,6	1,2	1,2
1089		Insges.	2,8	1,1	5,2	3,6	2,3	2,8	2,9	2,9
1090	874-879	Männl.	1,0	0,2	0,7	1,6	1,1	1,4	1,3	1,4
1091	Offene Wunde des Halses und und Rumpfes	Weibl.	0,3	0,1	0,6	1,0	0,5	0,5	0,3	0,2
1092		Insges.	0,6	0,1	0,7	1,3	0,8	1,0	0,8	0,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
4,0	3,4	3,2	2,8	2,0	0,7	0,4	0,2	0,2	-	0,1	-	1063
0,8	0,8	1,0	0,8	0,7	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-	1064
2,4	2,1	2,1	1,8	1,3	0,7	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	-	1065
1,8	1,1	1,2	1,1	1,0	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,4	0,2	1066
0,6	0,4	0,5	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	1067
1,2	0,7	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	1068
15,2	12,5	10,1	6,4	4,8	3,8	3,1	2,2	1,9	1,3	0,8	2,3	1069
3,6	3,2	2,9	3,2	2,8	2,7	1,3	1,3	1,1	1,3	1,4	1,9	1070
9,5	8,0	6,5	4,8	3,8	3,2	2,1	1,6	1,4	1,3	1,2	2,0	1071
2,6	2,6	2,6	3,0	2,8	2,7	1,9	1,3	1,2	0,7	1,5	0,6	1072
0,9	0,8	0,8	1,3	1,1	0,9	0,6	0,5	1,1	0,7	1,3	2,1	1073
1,7	1,7	1,7	2,2	2,0	1,8	1,1	0,8	1,1	0,7	1,4	1,7	1074
20,9	17,6	16,8	17,1	15,9	14,6	11,7	13,1	11,5	17,4	20,2	28,1	1075
8,5	8,3	9,0	9,9	8,6	7,9	6,8	8,0	11,1	15,0	21,6	26,3	1076
14,9	13,1	13,0	13,5	12,2	11,1	8,9	9,8	11,2	15,7	21,2	26,8	1077
2,4	1,7	2,4	2,5	2,3	3,0	2,2	2,4	2,5	2,3	1,9	1,6	1078
0,6	0,6	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	1,0	0,9	0,4	1079
1,5	1,2	1,6	1,6	1,6	1,9	1,4	1,5	1,3	1,4	1,2	0,7	1080
2,1	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	1,6	1,3	1,7	1,2	1,5	1,2	1081
0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,8	0,9	1082
1,3	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8	0,6	1,1	1,0	1083
1,9	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	0,7	0,8	0,5	0,4	1,2	1084
0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,5	0,7	1085
1,1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,8	1086
4,4	4,2	4,0	3,9	3,9	3,1	3,1	2,4	2,6	3,1	4,5	5,7	1087
1,0	1,0	1,3	1,2	1,2	0,9	0,7	1,4	1,7	2,9	3,9	7,3	1088
2,8	2,6	2,6	2,5	2,6	2,0	1,7	1,8	2,0	2,9	4,1	6,9	1089
1,0	1,0	1,1	0,7	0,8	0,6	0,3	0,4	0,7	0,8	0,6	0,4	1090
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	1091
0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	1092

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1093	880-887	Männl.	5,8	0,9	2,5	3,4	3,7	9,6	10,0	8,5
1094	Offene Wunde der oberen Extremitäten	Weibl.	1,4	0,8	1,5	1,4	1,6	2,0	1,7	1,6
1095		Insges.	3,5	0,9	2,0	2,4	2,7	5,9	5,9	5,1
1096	890-897	Männl.	3,4	0,5	1,5	4,0	5,8	8,8	5,6	4,0
1097	Offene Wunde der unteren Extremitäten	Weibl.	1,7	0,4	1,1	2,3	1,8	3,9	1,5	1,0
1098		Insges.	2,5	0,4	1,3	3,2	3,8	6,4	3,6	2,5
1099	900-904	Männl.	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2
1100	Verletzung der Blutgefäße	Weibl.	0,1	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
1101		Insges.	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2
1102	905-909	Männl.	3,3	0,3	0,6	1,4	1,9	5,0	6,5	5,1
1103	Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen, toxischen Wirkungen und sonstigen äußeren Ursachen	Weibl.	1,7	0,1	0,6	0,8	1,3	2,4	1,9	1,4
1104		Insges.	2,4	0,2	0,6	1,1	1,6	3,7	4,2	3,3
1105	910-919	Männl.	1,5	1,5	2,0	2,4	1,8	2,8	2,3	1,9
1106	Oberflächliche Verletzung	Weibl.	0,7	0,9	1,7	1,2	0,7	1,1	0,4	0,4
1107		Insges.	1,1	1,2	1,9	1,8	1,3	2,0	1,4	1,2
1108	921	Männl.	1,4	0,2	0,5	2,2	3,1	2,9	2,2	1,8
1109	Kontusion des Auges und der Augenanhangsgebilde	Weibl.	0,3	-	0,2	0,5	0,6	0,7	0,2	0,2
1110		Insges.	0,8	0,1	0,4	1,3	1,9	1,9	1,2	1,0
1111	920,922-924	Männl.	13,0	9,1	15,7	23,2	15,7	23,5	16,0	14,7
1112	Sonstige Kontusion ohne Hautverletzung	Weibl.	7,0	8,4	11,9	13,3	8,3	11,7	5,4	4,0
1113		Insges.	9,8	8,8	13,8	18,4	12,1	17,7	10,8	9,5
1114	925-929	Männl.	0,6	0,2	1,2	0,6	0,6	1,0	0,8	0,7
1115	Quetschwunde	Weibl.	0,3	0,2	0,8	0,3	0,2	0,6	0,2	0,3
1116		Insges.	0,4	0,2	1,0	0,4	0,4	0,8	0,5	0,5
1117	930-939	Männl.	1,6	4,0	4,8	3,2	2,0	1,2	1,0	0,9
1118	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers in eine Körperöffnung	Weibl.	1,2	3,4	4,4	2,0	0,8	0,7	0,5	0,7
1119		Insges.	1,4	3,7	4,6	2,6	1,4	1,0	0,8	0,8
1120	940	Männl.	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4	1,0	0,9	0,8
1121	Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und die Augenanhangsgebilde	Weibl.	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
1122		Insges.	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,6	0,5	0,5

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
7,5	6,7	5,2	5,3	5,0	5,2	4,3	2,7	2,2	2,7	2,1	2,5	1093
1,6	1,9	1,4	1,7	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	1,7	1094
4,6	4,4	3,3	3,5	3,1	3,1	2,3	1,5	1,1	1,4	1,2	1,9	1095
3,2	2,9	2,1	1,9	2,1	2,0	2,0	2,1	1,5	1,4	1,3	1,4	1096
1,2	1,0	1,0	1,0	1,5	1,4	1,7	2,4	2,3	2,8	3,5	2,5	1097
2,2	2,0	1,5	1,5	1,8	1,7	1,8	2,3	2,1	2,4	2,8	2,2	1098
0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,5	0,4	0,4	1099
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3	0,4	1100
0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	1101
4,4	3,6	3,5	3,9	3,2	2,4	2,1	1,2	1,2	1,0	0,6	0,6	1102
1,6	1,9	1,7	2,0	2,2	1,9	1,9	2,1	1,9	1,8	1,1	1,7	1103
3,0	2,7	2,6	2,9	2,7	2,1	2,0	1,8	1,7	1,5	0,9	1,4	1104
1,1	1,2	1,0	0,8	1,2	0,9	0,6	0,7	1,0	0,4	1,1	4,1	1105
0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	1,0	0,7	1,5	1106
0,8	0,9	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	2,2	1107
1,3	1,1	1,1	0,8	0,7	0,8	0,6	0,8	0,5	0,2	0,4	0,2	1108
0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	1109
0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	1110
11,3	9,8	8,4	8,8	8,9	8,0	6,5	6,6	6,2	10,1	11,4	18,5	1111
4,2	4,2	3,6	4,0	4,0	4,8	4,3	4,5	7,0	11,0	16,2	25,2	1112
7,8	7,1	6,0	6,4	6,5	6,4	5,2	5,2	6,7	10,7	14,8	23,5	1113
0,8	0,5	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	1114
0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	1115
0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	1116
1,0	1,1	1,2	1,0	1,5	1,1	1,4	1,6	1,6	1,7	1,4	2,1	1117
0,5	0,7	0,8	0,9	1,4	0,8	1,1	1,4	1,4	1,6	1,3	1,0	1118
0,8	0,9	1,0	0,9	1,4	1,0	1,2	1,5	1,5	1,6	1,4	1,3	1119
0,7	0,9	0,7	0,6	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,1	0,5	-	1120
0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	1121
0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	1122

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1123	941-949	Männl.	4,0	15,2	20,5	4,8	2,8	4,0	3,5	3,4
1124	Verbrennungen oder Verätzungen	Weibl.	2,0	10,3	13,9	2,7	1,2	2,0	1,3	0,9
1125	sonstiger Körperteile oder Organe	Insges.	3,0	12,8	17,2	3,8	2,0	3,0	2,4	2,2
1126	950-957	Männl.	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,9	1,0	0,7
1127	Verletzung der Nerven und des	Weibl.	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4
1128	Rückenmarks	Insges.	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	0,7	0,5
1129	958,959	Männl.	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	0,7	0,7
1130	Bestimmte traumatische Kompl-	Weibl.	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2
1131	kationen und nicht näher bezeich- nete Verletzungen	Insges.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,4
1132	965	Männl.	0,3	0,7	0,9	0,1	0,1	0,7	0,6	0,6
1133	Vergiftung durch Analgetika, Anti-	Weibl.	0,4	0,6	0,8	0,1	0,2	1,2	0,6	0,6
1134	pyretika und Antirheumatika	Insges.	0,4	0,6	0,9	0,1	0,2	0,9	0,6	0,6
1135	967 (EXKL.967.0)	Männl.	0,6	0,2	1,0	0,1	0,0	0,6	0,7	0,8
1136	Vergiftung durch Sedativa und	Weibl.	1,4	0,2	0,7	0,2	0,2	1,3	1,2	1,5
1137	Hypnotika	Insges.	1,0	0,2	0,9	0,1	0,1	0,9	0,9	1,1
1138	967.0	Männl.	0,2	0,2	0,3	0,1	-	0,1	0,2	0,2
1139	Vergiftung durch Baborate	Weibl.	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0	0,5	0,5	0,5
1140		Insges.	0,3	0,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,4
1141	969	Männl.	1,0	-	2,2	0,4	0,2	0,6	1,2	1,3
1142	Vergiftung durch Psychopharma-	Weibl.	1,8	0,1	1,5	0,3	0,3	1,8	2,0	2,1
1143	ka	Insges.	1,5	0,0	1,9	0,3	0,2	1,2	1,6	1,7
1144	960-964,966,968,	Männl.	2,1	3,5	15,1	1,4	0,3	1,3	1,9	1,5
1145	Vergiftung durch sonstige Drogen,	Weibl.	2,2	2,2	12,7	1,4	0,6	2,9	1,5	1,5
1146	Arzneimittel und biologisch aktive Stoffe	Insges.	2,1	2,8	14,0	1,4	0,5	2,1	1,7	1,5
1147	980	Männl.	0,5	-	0,4	0,1	0,4	1,0	0,8	0,8
1148	Toxische Wirkung von Alkohol	Weibl.	0,2	-	0,2	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3
1149		Insges.	0,4	-	0,3	0,1	0,3	0,7	0,5	0,6
1150	986	Männl.	0,5	0,7	0,3	0,1	0,2	0,5	0,6	0,8
1151	Toxische Wirkung von Kohlenmo-	Weibl.	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4
1152	noxid	Insges.	0,5	0,7	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6	0,6

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
3,3	2,8	2,1	2,4	2,4	1,9	1,3	0,9	1,2	1,3	2,1	1,8	1123
1,2	1,4	1,1	0,9	0,9	0,7	0,7	0,8	1,2	1,6	1,6	2,5	1124
2,3	2,1	1,6	1,6	1,7	1,3	0,9	0,8	1,2	1,5	1,7	2,3	1125
0,7	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	-	1126
0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	1127
0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	1128
0,7	0,7	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,8	0,4	0,7	0,7	0,8	1129
0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,6	0,4	0,5	0,4	1130
0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	1131
0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	1132
0,7	0,4	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	1133
0,5	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	1134
0,8	0,7	1,2	1,1	0,5	0,6	0,4	0,1	0,3	0,4	0,9	0,6	1135
2,0	2,2	2,8	2,1	1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	1,8	1,0	1,2	1136
1,4	1,5	2,0	1,6	0,9	0,9	0,8	0,8	1,0	1,4	1,0	1,0	1137
0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,3	-	1138
0,5	0,7	0,9	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	1139
0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	1140
1,7	1,6	1,3	1,1	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5	1,2	0,6	1141
3,0	3,0	3,0	3,5	2,0	2,0	1,5	1,2	1,3	1,2	0,8	0,6	1142
2,4	2,3	2,1	2,3	1,4	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	1143
1,7	1,5	1,3	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	1,8	1,9	1,8	1,4	1144
1,7	2,1	1,8	1,9	1,4	1,2	0,9	1,0	2,0	2,1	2,5	2,0	1145
1,7	1,8	1,5	1,4	1,2	1,0	0,9	1,0	1,9	2,0	2,3	1,8	1146
0,8	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	1147
0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	1148
0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	1149
0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	1,0	2,2	2,9	1150
0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1	0,5	0,7	1,6	2,3	3,4	1151
0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,6	1,4	2,3	3,2	1152

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Geschlecht	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1153	981-985,987-989	Männl.	2,1	3,2	13,1	3,0	1,3	1,4	1,3	1,6
1154	Toxische Wirkung von sonstigen	Weibl.	1,2	3,1	9,2	2,4	1,1	1,1	0,7	0,6
1155	vorwiegend medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen	Insges.	1,6	3,1	11,2	2,7	1,2	1,3	1,0	1,1
1156	990-995	Männl.	3,8	6,4	6,7	3,8	2,5	3,6	4,9	4,7
1157	Sonstige und nicht näher bezeichnete Folgen äußerer Ursachen	Weibl.	3,7	3,7	4,5	2,2	1,7	2,6	3,5	3,1
1158		Insges.	3,8	5,1	5,6	3,0	2,1	3,1	4,2	3,9
1159	996-999	Männl.	3,7	2,6	1,5	1,5	1,6	1,6	2,3	2,5
1160	Nicht anderenorts klassifizierte	Weibl.	3,5	2,7	1,1	1,4	1,0	1,5	2,3	2,3
1161	Komplikationen bei der chirurgischen und medizinischen Behandlung	Insges.	3,6	2,6	1,3	1,4	1,3	1,5	2,3	2,4
V-Klassifikation										
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (V01 - V82)										
1162	V01-V07	Männl.	1,4	5,3	2,2	4,0	3,9	1,3	1,0	0,9
1163	Potentielle Gesundheitsgefährdung hinsichtlich übertragbarer Krankheiten	Weibl.	1,0	3,8	1,4	2,7	2,9	2,1	1,3	0,9
1164		Insges.	1,2	4,6	1,8	3,4	3,4	1,7	1,1	0,9
1165	V22,V23,V28	Männl.	0,0	-	-	-	-	-	-	-
1166	Schwangerenbetreuung und -beobachtung	Weibl.	3,1	-	-	-	0,1	6,9	16,1	10,7
1167		Insges.	1,6	-	-	-	0,0	3,3	7,8	5,2
1168	REST V10-V49	Männl.	3,2	79,1	7,6	3,2	3,8	0,9	0,8	1,2
1169	Sonstige potentielle Gesundheitsgefährdungen sowie Gesundheitsbeeinträchtigungen	Weibl.	9,1	81,8	8,3	4,6	4,3	2,4	10,4	17,4
1170		Insges.	6,3	80,4	8,0	3,9	4,1	1,6	5,5	9,0
1171	V56	Männl.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0
1172	Nachbehandlung durch intermittierende Dialyse	Weibl.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	0,0
1173		Insges.	0,0	-	-	-	-	0,0	-	0,0
1174	V50-V55,V57-V59	Männl.	9,2	3,8	1,6	3,7	4,3	9,6	10,3	8,3
1175	Nachsorge, Prothetik, plastische Chirurgie sowie Spender	Weibl.	9,5	3,4	1,4	2,4	3,3	4,5	4,0	3,7
1176		Insges.	9,4	3,6	1,5	3,1	3,8	7,1	7,3	6,1
1177	V60-V68	Männl.	6,7	98,6	20,6	6,1	3,7	2,4	1,7	1,8
1178	Sonstige Inanspruchnahme des Gesundheitswesens	Weibl.	9,0	105,7	17,8	6,5	2,4	2,4	8,9	10,1
1179		Insges.	7,9	102,1	19,2	6,3	3,1	2,4	5,2	5,8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
1,3	1,4	1,3	1,4	1,2	1,0	0,8	0,8	1,2	0,8	1,1	0,4	1153
0,7	0,6	0,9	0,9	0,6	0,4	0,4	0,5	0,1	0,4	0,4	0,8	1154
1,0	1,0	1,1	1,2	0,9	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	1155
3,3	4,7	3,7	4,1	3,5	2,7	2,1	3,4	1,1	1,8	1,6	2,1	1156
4,7	6,2	6,9	7,2	5,1	3,7	3,0	2,0	1,4	1,0	1,0	1,1	1157
4,0	5,4	5,3	5,6	4,3	3,2	2,6	2,5	1,3	1,2	1,2	1,4	1158
2,0	2,9	3,1	4,2	5,8	7,8	8,3	10,5	9,5	8,3	8,4	4,5	1159
2,6	3,5	3,7	4,2	5,2	5,2	5,8	6,9	6,5	6,2	4,5	2,1	1160
2,3	3,2	3,4	4,2	5,5	6,5	6,8	8,2	7,5	6,9	5,7	2,8	1161
0,8	0,6	0,9	0,7	0,7	0,9	0,6	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	1162
0,6	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,4	0,5	0,3	0,1	1163
0,7	0,6	0,8	0,6	0,6	0,7	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,1	1164
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	1165
4,7	4,6	1,1	0,1	0,0	-	-	0,1	0,0	0,0	-	-	1166
2,3	2,3	0,5	0,1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	1167
1,0	1,4	1,7	2,2	2,1	2,8	2,1	2,7	1,8	1,8	1,9	0,8	1168
21,0	25,8	15,8	4,7	2,7	1,5	1,1	1,1	1,6	1,1	1,3	1,1	1169
10,7	13,4	8,6	3,4	2,4	2,1	1,5	1,7	1,7	1,3	1,5	1,0	1170
0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,1	-	0,1	-	-	-	1171
0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	1172
0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	1173
7,7	9,0	7,8	10,1	10,2	14,4	16,0	17,2	18,7	20,9	14,0	11,7	1174
6,2	7,2	11,2	15,5	17,1	17,4	17,5	20,6	15,3	12,7	11,0	6,8	1175
7,0	8,1	9,4	12,8	13,7	16,0	16,8	19,4	16,4	15,3	11,9	8,1	1176
2,1	2,9	3,8	4,6	5,7	8,4	8,4	5,1	6,0	9,5	14,1	31,4	1177
6,8	4,9	4,3	4,6	6,2	6,1	3,7	5,3	6,5	11,6	23,8	46,5	1178
4,4	3,9	4,0	4,6	6,0	7,2	5,7	5,2	6,3	11,0	20,9	42,5	1179

1.3 Krankenhausabgänge 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Ge- schlecht	Ins- gesamt	0	1	5	10	15	20	25
				Im Alter von...bis unter...Jahren						
				1	5	10	15	20	25	30
1180	V70-V72	Männl.	12,7	100,1	33,8	16,1	13,2	5,2	4,9	6,1
1181	Allgemeine und spezielle ärztliche	Weibl.	11,1	82,1	31,3	16,6	14,4	7,5	7,9	7,5
1182	Untersuchungen und Beobachtun- gen ohne angegebene Diagnose	Insges.	11,9	91,3	32,6	16,4	13,8	6,3	6,3	6,8
1183	V73,V74,V75	Männl.	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
1184	Spezielles Screening auf näher be-	Weibl.	0,1	0,7	0,1	0,1	0,0	0,3	0,2	0,1
1185	zeichnete übertragbare Krank- heiten	Insges.	0,1	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1
1186	V76	Männl.	0,0	0,3	-	0,0	-	-	0,0	0,0
1187	Spezielles Screening auf bösartige	Weibl.	0,1	0,2	-	0,0	0,0	-	0,0	0,2
1188	Neubildungen	Insges.	0,1	0,2	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1
1189	V77	Männl.	0,3	2,4	1,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2
1190	Spezielles Screening auf endokrine	Weibl.	0,3	2,6	1,6	0,8	0,7	0,3	0,4	0,3
1191	Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten sowie Immunitätsstö- rungen	Insges.	0,3	2,5	1,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,2
1192	V80	Männl.	0,1	1,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0
1193	Spezielles Screening auf neurologi-	Weibl.	0,1	1,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
1194	sche, Augen- und Ohrenkrankhei- ten	Insges.	0,1	1,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
1195	V81	Männl.	0,3	2,2	0,7	1,0	0,6	0,1	0,2	0,3
1196	Spezielles Screening auf kardio-	Weibl.	0,4	2,4	2,2	1,9	0,9	0,1	0,1	0,1
1197	vasculäre, respiratorische und Uro- genitalkrankheiten	Insges.	0,4	2,3	1,4	1,4	0,8	0,1	0,1	0,2
1198	V78,V79,V82	Männl.	0,2	1,5	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
1199	Sonstiges spezielles Screening	Weibl.	0,1	1,4	0,7	0,4	0,5	0,0	0,0	0,1
1200		Insges.	0,2	1,4	0,8	0,4	0,3	0,0	0,0	0,1

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnosen

30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren											und älter	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
8,1	9,4	10,6	11,2	12,5	16,2	16,6	11,1	8,4	8,1	4,6	3,3	1180
8,4	9,3	9,7	10,3	11,1	9,9	7,7	7,8	7,0	5,1	2,7	2,1	1181
8,2	9,3	10,2	10,8	11,8	13,0	11,5	9,0	7,5	6,0	3,3	2,4	1182
0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	1183
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-	-	-	0,0	-	1184
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	1185
0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	-	-	1186
0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	-	1187
0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	1188
0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,1	-	-	1189
0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	-	1190
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-	1191
0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	1192
0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0	-	0,0	-	1193
0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	-	1194
0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	-	-	1195
0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	-	1196
0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	-	1197
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	-	-	-	0,2	-	1198
0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	-	0,1	-	-	1199
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	-	1200

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
1	KLASSE I	1987	31.6	258.2	143.5	48.6	18.5	21.6	24.4	20.4	15.7
2	(001-139)	1988	29.6	261.4	116.5	40.3	18.7	22.0	25.4	20.6	17.8
3		1989	25.3	263.6	90.6	26.0	15.5	17.9	21.4	18.6	15.1
Weiblich											
4		1987	24.6	227.9	98.9	33.7	16.7	31.0	28.4	19.3	13.0
5		1988	24.3	236.7	88.9	30.3	16.4	28.5	30.0	20.3	15.1
6		1989	21.4	229.1	70.7	21.9	15.6	25.3	26.4	18.6	13.1
Insgesamt											
7		1987	28.0	243.4	121.8	41.3	17.6	26.2	26.4	19.9	14.4
8		1988	26.8	249.3	103.0	35.4	17.6	25.2	27.6	20.4	16.5
9		1989	23.3	246.8	80.9	24.0	15.5	21.5	23.9	18.6	14.2
Männlich											
10	KLASSE II A	1987	79.7	6.3	8.2	6.3	5.8	13.0	22.5	25.1	26.3
11	(140-208)	1988	82.5	6.8	7.9	7.3	5.6	14.8	19.1	25.1	27.5
12		1989	84.8	6.5	8.5	7.5	5.8	13.8	19.6	24.5	26.5
Weiblich											
13		1987	99.5	6.8	6.8	5.3	4.9	12.9	16.1	19.2	33.7
14		1988	102.7	7.9	8.2	4.8	4.4	9.3	14.8	20.9	36.5
15		1989	105.7	6.9	7.0	5.1	5.7	10.1	15.8	24.9	38.9
Insgesamt											
16		1987	90.1	6.5	7.5	5.8	5.4	12.9	19.4	22.2	29.9
17		1988	93.1	7.3	8.0	6.1	5.0	12.1	17.0	23.1	31.9
18		1989	95.7	6.7	7.7	6.3	5.8	12.0	17.8	24.7	32.5
Männlich											
19	KLASSE II B	1987	17.9	13.2	8.8	8.0	9.4	10.5	9.8	9.9	11.7
20	(210-239)	1988	18.2	12.8	9.2	8.3	10.1	10.3	10.1	8.4	10.9
21		1989	18.4	14.2	8.3	9.1	10.3	10.9	9.5	10.1	10.2
Weiblich											
22		1987	54.5	17.0	8.3	8.3	9.7	17.8	30.9	49.4	62.9
23		1988	56.2	16.5	8.5	8.2	10.5	19.2	33.3	49.3	64.5
24		1989	55.7	18.0	9.9	9.0	10.2	19.3	31.0	47.3	63.9
Insgesamt											
25		1987	37.1	15.1	8.5	8.2	9.5	14.1	20.1	29.1	36.7
26		1988	38.1	14.6	8.8	8.2	10.3	14.6	21.4	28.3	37.0
27		1989	37.8	16.1	9.1	9.0	10.3	15.0	19.9	28.1	36.3

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
14.4	14.4	15.3	16.7	20.0	20.5	19.1	19.8	20.8	20.5	17.6	1
14.7	14.2	15.3	15.8	19.1	20.8	21.2	20.2	21.0	18.4	17.2	2
13.9	14.0	14.7	16.2	20.1	19.7	18.8	18.1	20.6	19.3	17.7	3
Weiblich											
11.4	11.8	13.8	13.9	12.8	13.0	12.6	15.2	16.2	16.5	14.5	4
11.1	12.7	12.9	14.8	15.7	12.4	14.2	15.3	17.7	16.5	11.5	5
11.2	12.2	12.4	14.0	13.1	12.1	13.3	14.1	16.6	16.0	12.0	6
Insgesamt											
12.9	13.1	14.5	15.3	16.2	15.9	14.9	16.7	17.7	17.7	15.3	7
12.9	13.4	14.1	15.3	17.3	15.7	16.7	16.9	18.7	17.1	13.0	8
12.6	13.1	13.5	15.1	16.5	15.3	15.2	15.4	17.8	17.0	13.5	9
Männlich											
29.7	47.4	77.2	127.6	202.5	265.8	331.4	370.9	354.0	279.9	190.4	10
31.7	46.2	81.8	127.5	212.4	276.6	342.1	396.1	369.1	306.4	184.1	11
32.0	44.3	84.3	132.9	206.6	288.6	360.2	389.5	398.7	302.0	224.2	12
Weiblich											
56.4	87.9	123.9	171.8	204.5	229.8	253.2	263.3	245.4	194.3	134.7	13
54.5	93.1	136.0	172.1	208.0	230.8	274.2	274.2	255.5	205.5	135.9	14
57.7	93.9	140.5	173.0	208.9	237.2	289.9	273.9	263.1	207.4	136.5	15
Insgesamt											
42.8	67.6	100.7	149.9	203.6	243.6	280.6	298.5	279.9	220.8	149.3	16
42.9	69.6	109.0	150.1	210.1	249.1	297.9	313.8	291.0	236.1	148.6	17
44.6	68.9	112.5	153.1	207.8	258.7	314.4	311.5	305.0	235.4	159.6	18
Männlich											
12.2	17.0	20.6	27.0	36.1	41.3	43.8	43.0	40.7	32.9	25.5	19
12.5	17.4	22.6	28.1	36.1	43.2	41.0	45.4	44.3	35.1	28.0	20
13.2	16.9	21.8	27.1	35.1	44.4	42.6	45.3	42.8	38.5	24.4	21
Weiblich											
84.4	143.4	146.4	101.5	52.8	42.7	43.8	39.6	31.3	24.9	16.8	22
87.5	143.9	153.9	102.1	55.7	43.0	45.5	41.1	35.2	26.6	21.4	23
86.4	138.3	156.4	100.6	54.3	44.8	47.7	38.0	35.7	25.5	20.5	24
Insgesamt											
47.7	80.2	83.7	64.7	44.9	42.2	43.8	40.7	34.3	27.4	19.1	25
49.3	80.4	88.5	65.5	46.3	43.0	43.9	42.5	38.1	29.2	23.1	26
49.0	77.1	89.3	64.2	45.0	44.7	45.9	40.4	37.9	29.4	21.6	27

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
28	KLASSE III	1987	32.4	37.2	9.9	10.9	17.4	14.2	12.7	15.5	20.8
29	(240-279)	1988	33.0	34.1	10.3	11.2	17.7	14.1	13.5	15.3	22.9
30		1989	33.1	34.6	9.4	11.1	18.7	15.7	13.4	15.2	20.2
Weiblich											
31		1987	61.2	29.7	10.0	11.4	18.4	22.7	32.7	39.6	44.1
32		1988	61.2	27.3	10.4	11.1	19.1	23.7	30.4	36.5	44.6
33		1989	59.3	32.5	9.9	11.2	20.4	22.5	30.9	38.1	40.9
Insgesamt											
34		1987	47.5	33.5	10.0	11.1	17.9	18.3	22.4	27.3	32.2
35		1988	47.8	30.8	10.3	11.2	18.4	18.8	21.7	25.6	33.5
36		1989	46.8	33.6	9.6	11.2	19.5	19.0	21.9	26.2	30.2
Männlich											
37	KLASSE IV	1987	11.2	30.3	20.1	34.7	16.8	7.2	4.7	6.0	2.7
38	(280-289)	1988	11.1	28.6	21.2	31.7	17.7	8.7	5.0	4.6	3.7
39		1989	11.0	31.6	19.0	27.8	18.1	8.4	4.2	4.5	4.3
Weiblich											
40		1987	11.7	19.9	11.5	17.7	13.8	8.3	5.9	4.8	5.0
41		1988	11.7	23.6	12.3	17.6	14.1	8.4	5.4	4.4	5.2
42		1989	11.9	23.3	12.7	18.2	14.4	8.9	5.6	4.8	5.2
Insgesamt											
43		1987	11.4	25.2	15.9	26.4	15.3	7.7	5.3	5.4	3.8
44		1988	11.4	26.1	16.8	24.8	16.0	8.6	5.2	4.5	4.4
45		1989	11.5	27.6	15.9	23.1	16.3	8.6	4.9	4.7	4.7
Männlich											
46	KLASSE V	1987	65.2	10.7	19.4	44.6	25.7	32.7	57.1	85.2	115.7
47	(290-319)	1988	67.1	11.9	20.0	42.1	27.5	32.4	56.0	86.9	117.0
48		1989	67.4	14.6	17.6	42.0	26.8	29.4	54.0	84.3	116.7
Weiblich											
49		1987	47.8	8.8	15.9	24.9	17.0	32.6	43.0	56.4	67.6
50		1988	47.8	8.7	14.7	24.3	16.6	33.3	42.3	56.1	68.8
51		1989	48.7	9.5	14.4	23.4	16.7	32.9	42.3	56.2	73.2
Insgesamt											
52		1987	56.1	9.8	17.7	35.0	21.5	32.7	50.3	71.1	92.1
53		1988	57.0	10.4	17.4	33.4	22.2	32.8	49.3	72.0	93.5
54		1989	57.6	12.1	16.0	32.9	21.9	31.1	48.3	70.7	95.6

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
30.2	34.1	41.4	56.4	62.9	72.6	77.1	82.4	78.6	63.7	35.6	28
28.8	35.5	41.7	57.6	66.9	68.0	77.5	85.0	81.6	65.7	39.7	29
28.3	36.8	40.8	57.3	68.0	71.2	76.7	85.4	77.7	63.8	41.1	30
Weiblich											
52.0	57.9	66.0	89.1	98.5	104.7	133.5	142.0	126.0	85.5	53.6	31
52.8	60.6	68.1	86.6	95.0	105.1	130.1	146.6	127.5	99.5	53.1	32
49.7	57.3	64.1	81.6	94.1	96.6	132.9	138.9	125.8	94.6	51.3	33
Insgesamt											
40.9	46.0	53.7	72.9	81.6	92.4	113.7	122.5	111.0	78.8	48.9	34
40.6	48.0	55.0	72.2	81.5	90.3	111.7	126.6	113.1	89.2	49.6	35
38.8	47.0	52.5	69.6	81.4	86.0	113.3	121.5	110.9	85.5	48.6	36
Männlich											
3.1	3.6	5.7	6.1	9.5	11.1	15.3	19.2	28.0	29.0	25.5	37
3.5	2.8	4.9	6.4	8.9	12.0	16.9	19.5	24.5	32.5	27.6	38
3.4	3.5	5.1	5.9	10.1	12.1	19.6	22.9	26.4	35.5	33.3	39
Weiblich											
5.1	7.8	9.2	9.9	7.9	11.2	16.3	24.2	28.4	29.1	27.9	40
5.6	7.1	8.8	7.8	8.6	10.3	17.5	22.8	28.9	33.7	29.6	41
5.8	6.6	9.4	9.3	9.0	11.5	14.8	21.5	30.2	34.7	30.7	42
Insgesamt											
4.1	5.7	7.5	8.0	8.7	11.2	15.9	22.6	28.3	29.1	27.3	43
4.5	5.0	6.9	7.1	8.7	11.0	17.3	21.7	27.5	33.3	29.1	44
4.6	5.0	7.2	7.6	9.5	11.7	16.5	21.9	29.0	34.9	31.4	45
Männlich											
113.5	108.2	96.8	83.4	63.7	41.0	26.2	22.0	18.4	16.9	16.9	46
121.2	112.7	98.3	87.3	65.2	41.6	28.8	20.7	18.7	19.2	18.9	47
126.0	111.9	102.6	86.7	67.7	43.6	27.2	21.5	17.7	19.3	19.9	48
Weiblich											
73.4	85.6	78.7	70.3	56.3	42.9	38.9	35.0	26.2	21.7	19.8	49
75.1	83.8	79.5	68.5	56.8	40.2	39.9	33.8	28.2	23.5	19.2	50
80.3	82.9	82.9	70.0	57.2	42.2	39.1	32.4	28.2	21.7	18.9	51
Insgesamt											
93.8	96.9	87.8	76.8	59.8	42.2	34.4	30.8	23.7	20.2	19.0	52
98.6	98.3	88.8	77.8	60.8	40.8	36.0	29.6	25.3	22.2	19.1	53
103.7	97.5	92.7	78.3	62.3	42.8	34.9	28.9	24.9	21.0	19.2	54

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
55	KLASSE VI (320-389)	1987	59.4	218.9	129.3	63.7	36.9	29.6	31.3	32.2	35.5
56		1988	61.2	235.1	139.2	70.0	38.6	30.3	31.2	31.8	37.4
57		1989	61.3	228.1	132.9	69.0	38.7	29.0	28.4	33.5	36.5
Weiblich											
58		1987	56.4	185.0	106.1	54.1	30.8	28.7	28.0	29.1	31.9
59		1988	58.3	193.4	117.5	57.6	32.8	27.8	25.9	29.5	34.0
60		1989	59.1	189.6	110.6	59.1	32.0	30.5	24.7	29.0	35.7
Insgesamt											
61		1987	57.9	202.3	118.0	59.0	33.9	29.2	29.7	30.7	33.7
62		1988	59.7	214.8	128.6	64.0	35.8	29.1	28.6	30.7	35.8
63		1989	60.2	209.4	122.0	64.2	35.4	29.8	26.6	31.3	36.1
Männlich											
64	KLASSE VII (390-459)	1987	170.7	18.2	3.7	4.4	17.0	22.1	21.2	29.0	45.0
65		1988	171.8	18.3	4.6	5.1	19.9	23.3	23.7	31.3	44.6
66		1989	174.7	20.4	5.7	5.9	20.9	25.1	23.0	29.9	44.2
Weiblich											
67		1987	155.1	14.5	3.4	4.1	7.5	13.6	16.5	28.4	45.5
68		1988	154.6	15.4	3.5	5.3	8.6	13.3	17.6	28.6	45.8
69		1989	153.9	12.9	3.3	4.9	7.9	13.6	17.2	28.7	48.3
Insgesamt											
70		1987	162.5	16.4	3.6	4.2	12.4	17.9	18.9	28.7	45.3
71		1988	162.8	16.9	4.0	5.2	14.4	18.5	20.7	30.0	45.2
72		1989	163.8	16.7	4.5	5.4	14.6	19.5	20.2	29.3	46.2
Männlich											
73	KLASSE VIII (710-739)	1987	149.5	1041.9	778.6	240.6	68.1	61.4	56.1	54.8	51.3
74		1988	152.0	1071.1	817.0	241.8	66.4	59.9	53.9	55.5	51.7
75		1989	144.0	973.7	760.9	248.2	71.7	59.1	50.7	52.0	52.3
Weiblich											
76		1987	102.7	752.3	580.1	199.9	68.9	78.2	53.6	47.4	43.1
77		1988	106.3	758.7	627.7	202.1	72.2	76.8	52.5	48.5	43.6
78		1989	101.1	691.9	580.2	209.3	76.0	71.1	49.6	49.0	43.0
Insgesamt											
79		1987	124.9	900.5	681.9	220.7	68.5	69.6	54.9	51.2	47.2
80		1988	128.1	919.0	724.7	222.4	69.2	68.1	53.2	52.1	47.8
81		1989	121.6	836.8	672.8	229.2	73.8	64.9	50.2	50.5	47.8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
38.1	48.7	52.5	61.2	75.0	84.7	96.1	106.6	121.0	110.6	105.1	55
39.3	47.0	54.4	60.8	74.2	86.8	100.2	119.6	119.7	111.9	95.6	56
40.0	44.8	55.9	62.1	78.7	89.4	107.6	119.2	123.7	125.0	103.9	57
Weiblich											
36.7	44.9	49.4	55.7	59.2	65.0	81.6	103.0	107.7	104.3	71.8	58
36.6	43.9	51.2	54.5	61.3	64.2	86.4	109.2	115.6	107.9	80.2	59
37.2	43.6	53.1	58.5	61.4	65.5	90.5	107.1	121.1	113.4	84.9	60
Insgesamt											
37.4	46.8	51.0	58.4	66.7	72.6	86.7	104.2	111.9	106.3	80.5	61
38.0	45.4	52.8	57.6	67.5	73.2	91.3	112.6	116.9	109.1	84.3	62
38.6	44.2	54.5	60.3	69.7	75.5	96.5	111.1	121.9	116.8	89.9	63
Männlich											
69.7	125.9	190.3	301.0	457.1	562.4	540.6	707.3	803.2	835.9	863.3	64
71.8	125.5	193.6	298.7	455.3	551.6	547.4	710.9	821.1	859.9	859.4	65
73.1	122.9	193.2	300.5	462.4	571.5	574.2	679.9	813.6	869.5	870.9	66
Weiblich											
68.1	104.5	126.8	174.1	213.1	222.2	305.9	484.6	616.3	725.2	793.3	67
68.0	103.5	136.8	172.5	210.7	218.5	314.6	485.1	617.6	711.5	787.4	68
69.4	101.7	136.9	172.9	209.1	221.7	319.8	458.4	610.1	708.9	784.5	69
Insgesamt											
68.9	115.2	158.4	236.8	328.4	352.4	388.2	557.5	675.6	759.5	811.7	70
69.9	114.5	165.1	234.9	328.1	351.4	395.9	558.4	681.3	756.5	806.3	71
71.3	112.4	164.9	236.1	331.8	367.8	408.5	530.5	673.0	756.5	807.2	72
Männlich											
48.8	56.3	67.5	91.5	130.0	145.4	143.2	182.8	208.7	221.4	253.1	73
48.5	57.2	69.7	89.6	131.1	153.0	148.6	190.8	223.3	237.7	252.1	74
51.0	54.3	68.8	85.3	123.6	144.6	137.1	167.0	204.2	231.5	246.8	75
Weiblich											
40.8	47.8	47.0	48.9	50.8	49.3	56.0	76.0	93.1	106.8	131.4	76
39.6	47.6	49.7	50.4	55.5	50.5	56.7	79.7	96.8	119.2	142.5	77
42.2	42.5	49.4	49.3	54.5	47.2	55.8	71.5	91.7	109.3	129.8	78
Insgesamt											
44.8	52.1	57.2	70.0	88.2	86.1	86.6	111.0	129.8	142.3	163.3	79
44.1	52.4	59.7	69.8	91.8	91.4	88.8	115.8	136.4	155.2	171.3	80
46.7	48.4	59.1	67.1	88.0	87.9	84.2	102.5	126.4	145.5	160.6	81

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
82	KLASSE IX	1987	201.3	633.2	215.0	151.3	124.8	102.4	109.2	123.1	150.1
83	(520-579)	1988	200.2	635.8	222.2	157.4	131.2	99.7	104.1	120.9	146.9
84		1989	192.9	630.8	228.4	153.2	126.2	98.3	96.7	110.7	134.9
Weiblich											
85		1987	181.2	365.7	144.0	136.4	135.7	159.6	133.0	129.8	136.6
86		1988	179.0	383.7	148.5	140.7	127.0	150.3	132.4	123.3	135.2
87		1989	172.3	368.8	151.9	132.2	124.9	148.8	125.6	119.6	129.3
Insgesamt											
88		1987	190.8	502.6	180.4	144.0	130.1	130.3	120.7	126.4	143.5
89		1988	189.1	513.1	186.3	149.3	129.2	124.4	117.9	122.1	141.2
90		1989	182.2	503.5	191.1	142.9	125.6	122.9	110.7	115.0	132.2
Männlich											
91	KLASSE X	1987	69.2	90.6	118.4	76.2	43.0	31.4	31.5	29.9	30.2
92	(580-629)	1988	69.0	101.3	112.7	77.6	43.9	31.7	29.7	29.1	31.6
93		1989	66.6	110.9	117.3	75.1	41.1	31.1	27.1	25.9	28.0
Weiblich											
94		1987	200.7	87.1	58.6	58.9	33.4	113.4	242.4	286.4	253.8
95		1988	203.0	81.3	55.5	54.5	31.9	113.3	236.7	291.6	252.1
96		1989	199.0	89.8	56.5	47.6	31.6	107.7	223.4	281.2	254.4
Insgesamt											
97		1987	138.2	88.9	89.3	67.8	38.3	71.4	134.0	154.9	139.7
98		1988	139.1	91.6	84.8	66.3	38.0	71.5	130.2	156.6	139.1
99		1989	135.6	100.6	87.7	61.7	36.5	68.4	122.2	149.4	138.0
Männlich											
100	KLASSE XI	1987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	(630-679)	1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102		1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weiblich											
103		1987	458.8	-	-	-	4.1	708.1	2413.5	1751.5	845.5
104		1988	441.1	-	-	-	3.9	669.7	2320.2	1714.4	820.4
105		1989	409.6	-	-	-	3.4	611.3	2169.4	1621.4	767.1
Insgesamt											
106		1987	240.6	-	-	-	2.0	345.2	1173.5	853.9	414.1
107		1988	230.7	-	-	-	1.9	326.7	1126.3	832.6	400.2
108		1989	213.5	-	-	-	1.6	298.0	1051.3	784.1	372.7

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
167.4	200.1	228.4	268.3	303.6	347.6	334.6	368.4	341.9	311.9	260.8	82
165.1	198.2	223.8	264.4	301.1	338.7	335.2	361.8	347.0	311.0	263.9	83
157.5	182.8	213.3	253.1	286.4	328.4	343.2	336.6	355.0	301.5	247.8	84
Weiblich											
141.4	165.9	183.8	224.8	246.3	226.9	251.4	253.2	250.4	235.1	205.4	85
144.4	156.0	185.6	217.9	242.7	224.3	245.5	253.0	251.4	241.3	206.5	86
134.8	149.2	178.0	210.4	231.2	218.0	239.9	237.8	240.3	234.7	202.7	87
Insgesamt											
154.6	183.0	206.0	246.3	273.4	273.1	280.6	290.9	279.4	258.9	220.0	88
155.0	177.1	204.6	240.9	270.7	270.0	276.8	288.3	281.4	262.5	221.6	89
146.4	166.1	195.6	231.6	257.9	264.1	275.9	270.0	275.7	254.5	214.5	90
Männlich											
34.2	41.2	54.5	68.0	102.3	149.6	179.8	211.3	210.6	166.5	142.7	91
31.9	42.9	53.0	70.1	98.2	145.2	184.0	223.9	214.2	178.1	145.2	92
32.0	37.5	52.1	66.1	95.4	137.3	182.0	203.4	212.0	182.7	139.0	93
Weiblich											
254.3	312.8	413.2	456.0	210.1	127.6	118.7	107.5	84.0	60.2	39.5	94
250.7	315.2	422.4	469.7	217.3	130.7	122.0	110.5	87.8	62.4	42.8	95
248.2	296.2	414.5	463.0	223.9	128.0	122.4	103.5	88.7	62.8	43.4	96
Insgesamt											
142.5	177.1	234.5	264.2	159.1	136.0	140.1	141.5	124.2	93.1	66.6	97
139.2	178.6	238.4	272.0	160.1	136.5	143.7	147.3	127.3	97.5	69.7	98
137.7	165.8	233.9	266.6	161.6	131.9	143.2	136.0	126.8	98.3	68.5	99
Männlich											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
Weiblich											
443.0	146.4	18.2	3.5	-	-	-	-	-	-	-	103
418.0	138.8	17.0	3.4	-	-	-	-	-	-	-	104
395.1	138.2	14.8	2.9	-	-	-	-	-	-	-	105
Insgesamt											
217.8	73.2	9.1	1.8	-	-	-	-	-	-	-	106
204.9	69.2	8.5	1.7	-	-	-	-	-	-	-	107
193.1	68.6	7.4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	108

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insge- samt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
109	KLASSE XII	1987	32.1	102.0	40.8	19.7	18.8	30.0	33.4	33.5	32.6
110	(680-709)	1988	33.3	103.0	44.4	21.6	20.5	29.3	34.1	33.2	34.5
111		1989	32.1	91.2	43.5	20.7	18.5	29.1	31.3	31.6	32.8
Weiblich											
112		1987	25.1	80.9	32.1	16.3	16.8	30.2	26.1	23.4	20.6
113		1988	25.6	77.5	35.9	18.9	16.9	29.4	26.2	22.4	22.0
114		1989	24.7	75.3	33.2	18.1	17.9	28.6	23.3	21.5	19.9
Insgesamt											
115		1987	28.4	91.7	36.5	18.1	17.8	30.1	29.8	28.6	26.7
116		1988	29.3	90.6	40.3	20.3	18.7	29.3	30.3	28.0	28.4
117		1989	28.2	83.5	38.5	19.4	18.2	28.9	27.4	26.7	26.5
Männlich											
118	KLASSE XIII	1987	62.2	11.7	16.4	21.7	27.9	33.7	36.9	43.2	57.8
119	(710-739)	1988	62.6	9.4	16.0	22.7	28.4	36.6	38.5	44.2	56.3
120		1989	62.2	10.1	17.2	22.5	26.8	35.0	37.4	42.4	53.8
Weiblich											
121		1987	60.7	7.7	12.3	16.1	39.3	38.8	26.0	30.0	41.0
122		1988	62.8	7.4	12.1	17.6	38.0	38.5	27.7	29.9	44.3
123		1989	64.3	10.4	12.7	17.2	35.6	41.0	27.2	30.6	41.9
Insgesamt											
124		1987	61.4	9.8	14.4	19.0	33.5	36.2	31.6	36.8	49.6
125		1988	62.7	8.5	14.1	20.2	33.1	37.6	33.3	37.2	50.4
126		1989	63.3	10.2	15.0	19.9	31.1	37.9	32.5	36.7	48.1
Männlich											
127	KLASSE XIV	1987	24.8	347.4	106.3	101.2	45.8	16.0	5.7	3.3	3.2
128	(740-759)	1988	25.2	343.5	110.7	103.8	48.1	15.2	5.7	4.1	3.1
129		1989	24.9	360.0	112.0	102.4	45.4	15.2	5.4	3.8	3.1
Weiblich											
130		1987	14.1	305.4	51.9	44.8	25.2	13.3	7.5	5.4	4.6
131		1988	14.7	315.5	56.8	47.0	23.8	13.9	7.7	5.4	4.9
132		1989	14.7	323.7	55.7	48.4	26.4	13.9	7.2	5.4	4.5
Insgesamt											
133		1987	19.2	326.9	79.8	73.7	35.8	14.7	6.6	4.3	3.9
134		1988	19.7	329.8	84.4	76.1	36.2	14.5	6.7	4.7	4.0
135		1989	19.6	342.4	84.6	76.0	36.1	14.6	6.3	4.6	3.8

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
30.5	29.3	29.9	32.4	33.1	35.6	32.7	35.3	40.0	34.0	28.6	109
32.2	30.2	32.7	34.2	34.1	36.9	35.3	34.7	37.4	37.1	28.0	110
32.2	28.6	30.4	34.3	34.9	33.0	37.8	38.8	37.3	37.4	32.6	111
Weiblich											
21.6	21.4	24.1	26.3	24.6	22.8	24.2	27.7	31.7	31.0	26.8	112
21.1	21.6	23.3	26.9	27.6	24.3	25.9	28.5	32.3	31.7	23.6	113
20.7	21.4	23.5	25.7	25.8	23.5	26.9	27.6	30.5	31.6	26.9	114
Insgesamt											
26.2	25.4	27.0	29.4	28.6	27.7	27.2	30.2	34.3	31.9	27.3	115
26.8	25.9	28.0	30.5	30.7	29.4	29.2	30.5	33.9	33.3	24.8	116
26.6	25.0	26.9	30.0	30.2	27.4	30.7	31.3	32.6	33.3	28.4	117
Männlich											
67.8	90.4	99.5	105.6	124.7	128.7	95.2	86.4	68.6	33.8	20.2	118
68.4	88.2	100.0	103.5	126.7	123.3	96.6	87.1	66.3	37.8	22.5	119
68.9	85.2	100.4	104.0	125.2	122.8	95.5	86.9	69.5	40.1	20.5	120
Weiblich											
57.0	84.8	100.2	121.2	123.6	85.5	91.6	91.2	70.5	43.9	28.4	121
58.5	86.9	104.8	127.7	125.2	86.8	95.4	95.8	77.1	48.1	29.0	122
58.2	82.0	111.5	130.0	130.9	93.2	100.5	95.6	80.4	50.3	26.3	123
Insgesamt											
62.5	87.6	99.9	113.5	124.2	102.1	92.9	89.6	69.9	40.8	26.2	124
63.5	87.5	102.4	115.7	125.9	101.4	95.8	93.0	73.7	45.0	27.3	125
63.7	83.6	106.0	117.1	128.1	105.6	98.8	92.8	77.1	47.3	24.8	126
Männlich											
2.6	2.6	2.7	2.1	2.4	1.9	2.1	1.4	1.0	1.5	1.1	127
2.6	2.4	2.4	2.1	2.4	2.2	2.0	1.6	0.8	0.8	0.8	128
3.5	2.6	2.4	2.9	2.4	1.8	1.6	1.5	1.3	1.5	1.4	129
Weiblich											
3.7	3.5	3.9	3.5	2.0	2.0	1.6	1.1	1.1	0.7	0.5	130
4.4	3.9	3.7	3.9	3.1	1.5	1.6	1.5	1.5	1.0	0.7	131
4.3	3.6	4.1	3.1	2.6	2.0	2.1	1.2	1.0	0.7	0.8	132
Insgesamt											
3.2	3.1	3.3	2.8	2.2	1.9	1.8	1.2	1.1	1.0	0.7	133
3.5	3.1	3.0	3.0	2.8	1.8	1.7	1.5	1.3	0.9	0.7	134
3.9	3.1	3.3	3.0	2.5	1.9	1.9	1.3	1.1	1.0	1.0	135

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
Männlich											
136	KLASSE XV	1987	22.2	1508.4	4.3	-	-	-	-	-	-
137	(760-779)	1988	21.0	1451.2	4.6	-	-	-	-	-	-
138		1989	19.9	1458.1	5.0	-	-	-	-	-	-
Weiblich											
139		1987	17.1	1358.3	1.0	-	-	-	-	-	-
140		1988	16.4	1319.4	1.4	-	-	-	-	-	-
141		1989	15.7	1340.4	1.8	-	-	-	-	-	-
Insgesamt											
142		1987	19.5	1435.2	2.7	-	-	-	-	-	-
143		1988	18.6	1387.1	3.0	-	-	-	-	-	-
144		1989	17.7	1400.9	3.4	-	-	-	-	-	-
Männlich											
145	KLASSE XVI	1987	15.7	92.0	38.5	22.1	17.9	9.0	7.5	7.7	8.6
146	(780-799)	1988	16.6	98.9	43.7	25.7	19.5	9.1	8.1	7.9	7.8
147		1989	16.5	105.2	44.4	25.5	20.1	10.3	8.1	7.5	7.8
Weiblich											
148		1987	15.0	83.8	35.7	24.5	21.6	12.8	9.7	8.1	8.5
149		1988	16.3	95.4	40.4	27.3	23.3	14.7	10.5	9.1	9.7
150		1989	16.1	92.8	39.7	26.3	23.3	14.1	10.8	8.3	9.8
Insgesamt											
151		1987	15.3	88.0	37.1	23.3	19.7	10.9	8.6	7.9	8.6
152		1988	16.4	97.2	42.1	26.5	21.4	11.8	9.3	8.5	8.7
153		1989	16.3	99.1	42.1	25.9	21.7	12.2	9.4	7.9	8.7
Männlich											
154	KLASSE XVII	1987	171.7	112.0	173.2	172.1	157.4	268.9	236.6	199.9	178.4
155	(800-999)	1988	169.1	110.8	171.6	175.5	161.9	271.8	239.9	195.7	174.7
156		1989	163.7	110.9	171.0	185.7	161.3	269.6	218.3	184.0	164.3
Weiblich											
157		1987	108.5	85.5	132.9	112.5	93.6	122.7	74.9	64.9	69.5
158		1988	104.9	86.1	136.2	109.4	93.9	123.5	72.8	62.0	65.5
159		1989	103.1	83.9	129.4	115.1	90.9	120.0	70.9	58.0	64.4
Insgesamt											
160		1987	138.5	99.1	153.6	143.0	126.2	197.6	157.9	134.1	125.1
161		1988	135.5	98.8	154.4	143.2	128.7	199.5	158.8	130.8	121.5
162		1989	132.1	97.7	150.7	151.2	127.0	196.7	146.8	123.0	115.7

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und älter	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren												
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
Männlich												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
Weiblich												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
Insgesamt												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
Männlich												
8.6	10.0	11.4	13.8	17.7	20.2	16.8	21.9	23.0	22.5	24.2		145
8.5	10.0	11.7	15.1	17.1	18.7	18.7	23.2	22.4	25.2	23.1		146
8.3	9.8	11.2	14.6	17.4	17.5	19.3	21.3	22.4	24.5	24.6		147
Weiblich												
9.0	11.0	11.8	12.0	12.0	11.4	12.9	14.2	16.8	16.4	17.8		148
9.5	11.7	11.3	12.0	14.6	11.2	14.2	16.0	16.5	18.0	17.1		149
10.0	12.0	13.5	11.9	12.6	12.2	13.4	15.2	16.8	17.9	16.8		150
Insgesamt												
8.8	10.5	11.6	12.9	14.7	14.7	14.3	16.7	18.8	18.3	19.5		151
9.0	10.9	11.5	13.5	15.8	14.2	15.8	18.4	18.3	20.2	18.7		152
9.1	10.9	12.4	13.2	15.0	14.4	15.5	17.2	18.5	19.9	18.9		153
Männlich												
159.1	155.0	145.8	138.9	126.9	122.5	109.3	113.6	131.1	152.6	219.7		154
156.8	147.5	140.6	131.8	123.0	116.5	104.7	102.8	131.3	151.5	213.0		155
148.0	137.6	136.0	132.2	125.6	109.3	110.1	105.5	129.4	158.2	213.9		156
Weiblich												
78.0	83.3	83.6	94.3	105.6	103.4	116.1	151.8	192.0	259.3	360.8		157
70.8	79.7	79.9	90.4	98.1	96.0	110.3	145.9	187.7	258.4	360.7		158
69.2	74.3	81.9	84.2	94.1	95.2	116.1	139.0	187.5	256.5	363.0		159
Insgesamt												
119.2	119.1	114.6	116.3	115.7	110.7	113.7	139.3	172.7	226.2	323.8		160
114.6	113.7	110.1	110.9	110.1	104.2	108.3	131.9	170.1	226.0	321.8		161
109.5	106.2	108.9	108.0	109.4	101.1	114.0	128.1	169.6	227.4	323.8		162

1.4 Krankenhausabgänge 1987 bis 1989 je 10 000 der Bevölkerung gleichen

Lfd. Nr.	Diagnose	Jahr	Insgesamt	0	1	5	10	15	20	25	30
				Im Alter von...bis unter...Jahren							
				1	5	10	15	20	25	30	35
				Männlich							
163	V-KLASSI- FIKATION	1987	33.1	248.4	62.4	34.3	28.3	21.5	20.1	20.3	22.0
164		1988	33.6	255.9	65.5	33.4	27.6	22.2	21.6	20.4	21.1
165		1989	34.3	295.1	69.6	35.5	30.6	20.2	19.3	19.0	20.3
				Weiblich							
166		1987	42.0	227.6	64.9	36.0	29.2	29.5	51.8	53.5	49.0
167		1988	41.6	227.5	62.8	36.3	28.2	28.1	45.8	50.2	45.3
168		1989	44.0	285.1	65.3	36.2	29.7	26.6	49.5	51.1	48.3
				Insgesamt							
169		1987	37.8	238.3	63.6	35.1	28.7	25.4	35.5	36.5	35.2
170		1988	37.8	242.1	64.2	34.8	27.9	25.1	33.3	34.9	32.9
171		1989	39.4	290.3	67.5	35.8	30.2	23.3	33.9	34.5	33.9

Morbidität

Alters und Geschlechts nach Altersgruppen und Diagnoseklassen

35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	Lfd. Nr.
Im Alter von...bis unter...Jahren										und älter	
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
Männlich											
22.3	26.4	29.1	33.3	42.9	43.5	32.2	31.4	32.1	32.1	33.0	163
23.4	24.9	30.1	33.1	42.6	43.1	34.5	32.5	36.5	31.1	39.7	164
23.7	25.1	29.1	31.6	43.3	44.4	36.9	35.7	40.9	34.9	47.4	165
Weiblich											
47.0	42.5	32.5	36.7	37.5	28.2	29.0	25.8	26.3	30.5	56.6	166
50.1	43.7	34.5	38.5	37.1	27.9	31.1	28.9	25.7	32.8	55.1	167
53.2	43.3	36.3	38.4	36.0	30.9	35.3	31.2	31.6	39.4	56.5	168
Insgesamt											
34.5	34.5	30.8	35.0	40.1	34.0	30.1	27.7	28.1	31.0	50.4	169
36.5	34.3	32.3	35.8	39.7	34.0	32.3	30.0	29.0	32.3	51.1	170
38.1	34.1	32.7	35.1	39.5	36.5	35.9	32.7	34.4	38.1	54.1	171

Literaturverzeichnis:

Gräß, C.: "Krankenhausstatistik 1990" in WiSta 9/1992 S. 644, Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart.

Hoffmann, U.: "Neue Bundesstatistik über Krankenhäuser" in WiSta 10/1990 S. 693, Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart.

Hoffmann, U.: "Zum Aufbau einer nationalen Gesundheitsberichterstattung" in WiSta 1/1993, S. 33, Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart.

Institut für Medizinische Statistik und Datenverarbeitung: Methodischer Umstieg von Berichterstattungen der DDR zur Krankenhausstatistik, Dezember 1990.

Institut für Sozialhygiene und Organisation des Gesundheitsschutzes "Maxim Zetkin":
Das Gesundheitswesen der DDR- 1985 bis 1990 -, Berlin 1985 bis 1990.

Institut für Medizinische Statistik und Datenverarbeitung:
Mitteilungen
Allgemeines dokumentationsgerechtes Krankenblatt 1987 bis 1989
XXV. bis XXVI. Jahrgang 1989 bis 1990 Heft 1 (unveröffentlicht).

Informationskatalog des Gesundheits- und Sozialwesens -Berichtswesen -
(Ministerrat der DDR, Ministerium für Gesundheitswesen) Ausgabe 1989
(unveröffentlicht).

Staatliche Zentralverwaltung für Statistik: Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1982 bis 1990.

Tellkamp, F., Hellmund, W.: "Ärztliche Meldepflichten in der DDR", VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin, 1986.

Rechtsvorschriften

Allgemeine Bestimmungen

- Verordnung über Rechnungsführung und Statistik vom 11. Juli 1985 (GBl. I Nr. 23 S. 261),
- Gesetz über die amtliche Statistik der DDR vom 20. Juli 1990 (GBl. I Nr. 52 S. 1004),
- Anweisung über die Informationsordnung des Ministers für Gesundheitswesen - Informationsordnung - vom 18. März 1988 (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 7 S. 83),
- Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik - Ländereinführungsgesetz - vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 51 S. 955).

1 Stationäre Morbidität

- Anweisung vom 20. Juli 1964 über die Einführung neuer Einheitsvordrucke für die Bereiche Aufnahme, Verpflegung und Materialwirtschaft in den Einrichtungen des staatlichen Gesundheits- und Sozialwesens und den medizinischen Einrichtungen des Hochschulwesens (Verf. u. Mitt. Nr. 16 S. 120) sowie die zugehörige Berichtigung (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 18/1964 S. 148),
- Anweisung vom 5. Juli 1967 zur Einführung des allgemeinen dokumentationsgerechten Krankenblattes (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 15 S. 107),
- Erläuterungen zum dokumentationsgerechten Krankenblatt (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 15 S. 107),
- Anweisung vom 23. Januar 1968 über das allgemeine dokumentationsgerechte Krankenblatt (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 4 S. 22),
- Anweisung Nr. 2 vom 10. März 1969 über das allgemeine dokumentationsgerechte Krankenblatt (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 8 S. 33),
- Anweisung Nr. 3 vom 18. Juli 1969 über das allgemeine dokumentationsgerechte Krankenblatt (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 17 S. 111),
- Anweisung vom 09. März 1972 zur Erfassung der vorzeitigen Schwangerschaftsbeendigungen (Aborte) (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 4 S. 23),
Ziff. 5.1 der 1. Anweisung vom 09. Februar 1972 zur Rationalisierung der Berichterstattung im Gesundheits- und Sozialwesen (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 6 S. 35),
- Anweisung Nr. 4 vom 24. Mai 1973 über das allgemeine dokumentationsgerechte Krankenblatt - Anschlußdokumentation Geburtshilfe - (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 11 S. 106),

- Hinweis vom 20. März 1975 über die Intensivtherapie
(Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 7 S. 50),
- Anordnung über die Beurlaubung von Patienten aus Betreuung vom 25. Oktober 1977
(GBl. Nr. 34 S. 371),
- Richtlinie zur Durchführung der Anordnung über die Beurlaubung von Patienten aus stationärer Betreuung vom 28. Oktober 1977
(Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 10 S. 92),
- Anweisung vom 19. Oktober 1978 über das allgemeine dokumentationsgerechte Krankenblatt
(Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 10 S. 85),
- Anweisung Nr. 2 vom 29. Dezember 1978 über das allgemeine dokumentationsgerechte Krankenblatt - Erfassung der vorzeitigen Schwangerschaftsbeendigungen
(Verf. u. Mitt. des MfGe Nr.3 S. 46),
- Rahmenkrankenhausordnung (RKO) vom 24. Januar 1980,
Sonderdruck des Gesetzblattes Nr. 1032.

Anhang

Anlagenverzeichnis zu den Formblättern des Tabellenteils, zu den Definitionen des Krankenblattes und zur Meldung von physischen und psychischen Schädigungen bei Kindern und Jugendlichen

1 Stationäre Morbidität

- Krankenblatt allgemein (Vordruck-Nr. 0460),
- Definitionen zum Krankenblatt.

Stempel der Einrichtung

Uhrzeit Station

Name Vorname Geburtsname

Anschrift: Straße, Nr., Wohnort, Postleitzahl

SV FDGB SV St. V. SV Wiss. SZ sonst. ledig verh. gesch. verw.

Staatsangehörigkeit (für Ausländer) Kostenträger Familienstand PA-Nr.

z. Z. ausgeübte Tätigkeit Arbeitsstelle

Im Notfall zu verständigen Fernruf

Einweisung durch (a) Letzte Aufn. in eign. Eindr.

Abschluß

Weiterbehandlung durch (b)

Einr.: Fachabt.: Stat.:

Verlegung nach (c)

a b c

Arztbericht abgesandt am an sonstige (Anschrift)

Diagnosen

Nr. der Einrichtung Fachabt.

1-8

--	--	--	--

--	--

Bezirk Kreis Einricht.

9-13

--	--	--	--	--

 Aufnahme-
nummer

14-19

--	--	--

 Wohnsitz

Geburtsdatum Geschl.*
20-26

--	--	--	--

 Tag Monat Jahr

27-31

--	--	--	--	--

 PKZ

Letzte fünf Stellen d. PKZ

* Falls PKZ nicht vorhanden, dann die ersten sieben Stellen ausfüllen.
Geschlecht dabei wie folgt kodieren:
vor 1900 geb.: 2 = m, 3 = w
ab 1900 geb.: 4 = m, 5 = w

32-37

--	--	--	--

 Aufn.-
Datum

38-43

--	--	--	--

 Abgangs-
datum

44

--

 Abgangsart

- 1 = entlassen nach Hause
- 2 = entlassen ins Heim
- 3 = verlegt innerhalb d. eigenen Einricht.
- 4 = verlegt in eine andere stat. Einricht.
- 5 = verst. nicht obduz.
- 6 = verst. und obduz.
- 9 = sonstiges

Behandlungsdiagnosen

(Keine Schl.-Nr. mit „*“ verwenden)

45-48

--	--	--	--

 1. Diagnose

49-52

--	--	--	--

 2. Diagnose

53-56

--	--	--	--

 3. Diagnose
bei Tod: Grundleiden
(Sektions- bzw. klin. Diagnose)

57-60

--	--	--	--

 Operations-
datum

61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80

Dok.-Kontr.:

Namensstempel und Unterschrift des Arztes

Definitionen zum Krankenblatt

Quelle: Ausfüllvorschrift über das dokumentationsgerechte Krankenblatt vom 19. Oktober 1978 (Verf. u. Mitt. des MfGe Nr. 10 S. 85).

Behandlungsfall war jeder zusammenhängende Aufenthalt eines Patienten zur stationärmedizinischen Betreuung in ein und derselben Fachabteilung einer Gesundheitseinrichtung unabhängig von Verlegungen zwischen den Stationen innerhalb der Fachabteilung. 1) Dabei galt als zusammenhängender Aufenthalt auch

- das sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckende regelmäßige Aufsuchen einer Gesundheitseinrichtung zur halbstationären medizinischen Betreuung 2),
- der durch Beurlaubung zeitweilig unterbrochene Aufenthalt in der Fachabteilung, wenn nach deren Ablauf die Betreuung in derselben Fachabteilung fortgesetzt und während deren Dauer dem Patienten aus diesem Grunde das Krankbett freigehalten wurde.

Das Krankenblatt konnte trotz des Beginns eines neuen Behandlungsfalles weitergeführt werden, wenn der Patient wegen derselben Behandlungskrankheit

- zum Zwecke deren spezifischer Diagnostik oder Therapie innerhalb der gleichen Gesundheitseinrichtung von einer Fachabteilung in eine andere verlegt oder
- nach Entlassung aus der Einrichtung zur Kontrolle oder Nachbehandlung erneut in stationärmedizinische Betreuung derselben Fachabteilung aufgenommen worden war.

Unbeschadet der Weiterführung des Krankenblattes war auch für jeden dieser Behandlungsfälle ein Signierstreifen auszufüllen und nach den allgemeinen Vorschriften weiterzubearbeiten.

Dabei war bei Abschluß des jeweils ersten Behandlungsfalles der mit dem Krankenblatt verbundene, bei Abschluß aller nachfolgenden Behandlungsfälle der gesonderte, Krankenblattsigrierstreifen zu verwenden.

-
- 1) Damit begann auch bei Verlegungen zwischen den Fachabteilungen Gynäkologie (Kode-Nr. 41) und Geburtshilfe (Kode-Nr. 42) jeweils ein neuer Behandlungsfall.
 - 2) Halbstationäre Betreuung wurde in stationären oder ambulanten Einrichtungen des Gesundheitswesens durchgeführt, wobei der Betreute sich nur während der Nacht bzw. nur am Tage in der Einrichtung aufhielt und während dieser Zeit medizinische Betreuung, Verpflegung und Unterkunft erhielt. (Siehe hierzu unter Stichwort "Medizinische Betreuung" in Definitionen für Planung, Rechnungsführung und Statistik, Teil 6, Staatsverlag der DDR).

Für **Neugeborene** brauchte ein eigenes Krankenblatt nur angelegt werden, wenn

- das Neugeborene wegen einer Erkrankung medizinisch behandelt wurde, unabhängig davon, in welcher Fachabteilung die Betreuung erfolgte (selbständiger Behandlungsfall);
- die Mutter wegen einer Erkrankung von der Fachabteilung, in der sie entbunden hatte, in eine andere verlegt wurde und das Neugeborene mit ihr in der Gesundheitseinrichtung verblieb.
Soweit das Neugeborene in diesem Falle keiner spezifischen medizinischen Behandlung bedurfte, war es als Begleitperson zu führen (s. auch Begleitpersonen von Patienten).

Für **Totgeborene** war kein Krankenblatt anzulegen.

Wurden **Begleitpersonen von Patienten** im Krankenhaus untergebracht und belegten sie dabei ein Krankenbett, so war auch für sie der Vordruck Nr. 0460 anzulegen, bei Unterbringungsbeendigung abzuschließen und der Signierstreifen auszufüllen.

Abgabe und zentrale Auswertung des Signierstreifens entfielen bei

- Patienten, die ausschließlich halbstationär betreut wurden,
- Dauerdialysepatienten, die die Gesundheitseinrichtung in bestimmten Abständen, ständig wiederkehrend, ausschließlich zur Dialysetherapie aufsuchten,
- Neugeborenen, wenn für sie über die oben genannten Fälle hinaus ein Krankenblatt angelegt wurde.

Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehem. DDR

In der vorliegenden Reihe sind bisher erschienen:

	Preis:
Heft 1: Entwicklung der Industrie nach Wirtschaftszweigen 1975 bis 1989 Bestell-Nr. 2290101	DM 18,90
Heft 2: Wohnungsbau und Wohnungbestand 1970 bis 1990 Bestell-Nr. 2290102	DM 14,10
Heft 3: Bevölkerungsstatistische Übersichten 1946 bis 1989 Bestell-Nr. 2290103	DM 24,60
Heft 4: Produktion ausgew. Erzeugnisse des Produzierenden Gewerbes 1980 bis 1990 Bestell-Nr. 2290104	DM 14,10
Heft 5: Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte 1985 bis 1990 Bestell-Nr. 2290105	DM 24,60
Heft 6: Handwerk nach Gewerbegruppen, Gewerbezweigen u. Ländern 1988 u. 1989 Bestell-Nr. 2290106	DM 14,10
Heft 7: Kultur in Übersichten (Teil 1) 1970 bis 1989 Bestell-Nr. 2290107	DM 16,40
Heft 8: Ausgewählte Zahlen zur Agrarwirtschaft 1949 bis 1989 Bestell-Nr. 2290108	DM 24,60
Heft 9: Umsätze im Außenhandel 1975 und 1980 bis 1990 Bestell-Nr. 2290109	DM 21,30
Heft 10: Rechtspflege, Gerichte, Verfahrensstatistik 1971 bis 1990 Bestell-Nr. 2290110	DM 21,90
Heft 11: Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte 1975 bis 1984 Bestell-Nr. 2290111	DM 24,60
Heft 12: Einnahmen und Ausgaben des Staatshaushalts 1970 bis 1989 Bestell-Nr. 2290112	DM 7,10
Heft 13: Hochschulen 1980 bis 1990 Bestell-Nr. 2290113	DM 21,90

Fortsetzung nächste Seite.

Sonderreihe mit Beiträgen für das Gebiet der ehemaligen DDR

Heft 14 : Erwerbstätige 1950 bis 1989 Bestell-Nr. 2290114.....	DM 14,50
Heft 15 : Ausgewählte Zahlen der Volks- und Berufszählungen und Gebäude- und Wohnungszählungen 1950 bis 1989 Bestell-Nr. 2290115.....	DM 32,40
Heft 16 : Kultur in Übersichten (Teil 2) Bestell-Nr. 2290116.....	DM 21,90
Heft 17 : Gesundheits- und Sozialwesen in Übersichten (Teil 1) Bestell-Nr. 2290117.....	DM 28,90
Heft 18 : Verkehrsstatistische Übersichten 1950 bis 1989 Bestell-Nr. 2290118.....	DM 21,90
Heft 19 : Unternehmensbezogene Merkmale des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) 1959 bis 1989 Bestell-Nr. 2290119.....	DM 25,20
Heft 20 : Wohnungsbau nach Räumen und Wohnflächen 1980 bis 1990 Bestell-Nr. 2290120.....	DM 11,00
Heft 21 : Ausgewählte Zahlen zum Binnenhandel 1985, 1988 und 1989 Bestell-Nr. 2290121.....	DM 14,80
Heft 22 : Fachschulen 1980 und 1985 bis 1990 Bestell-Nr. 2290122.....	DM 25,70
Heft 23 : Rechtspflege - Arbeitsrechtsverfahren der Konfliktkommissionen - 1972 bis 1988 Bestell-Nr. 2290123.....	DM 22,30
Heft 24 : Gesundheits- und Sozialwesen in Übersichten (Teil II) Bestell-Nr. 2290124.....	DM 29,50
Heft 25 : Gesundheits- und Sozialwesen in Übersichten (Teil III) Bestell-Nr. 2290125.....	DM 29,50

Alle bisher veröffentlichten Berichte dieser Sonderreihe sind über das

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11

Postanschrift
Statistisches Bundesamt
ZB-PVM
65180 Wiesbaden

zu beziehen.

Im Blickpunkt: Familien heute



Statistisches Bundesamt



Die Familie — das Zusammenleben von Eltern und Kindern — ist nach wie vor die in Deutschland am weitesten verbreitete Lebensform. Doch „Familie“ wird heute anders gelebt als vor dreißig Jahren — ein späterer Zeitpunkt der Eheschließung, niedrigere Kinderzahlen sowie eine stärker ausgeprägte Erwerbsbeteiligung von Ehefrauen und Müttern sind Kennzeichen der Familien heute. Dabei sind noch deutliche Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet sowie den neuen Ländern und Berlin-Ost zu erkennen.

Die soeben erschienene Veröffentlichung „Im Blickpunkt: Familien heute“ wurde vom Statistischen Bundesamt arbeitsteilig mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erstellt. Sie informiert in ihrem ersten Teil über Haushaltsstrukturen, die typischen Phasen des Familienzyklus, über Kinderzahlen und die Phase der Ablösung der Kinder vom Elternhaus sowie die soziale Lage von Familien in

Deutschland. Darüber hinaus werden Heiratsalter und Geburtenraten einzelner Geburtsjahrgänge der heute mittleren Generation im Vergleich dargestellt. Teil II dokumentiert Haushalts- und Familienstrukturen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die in diesem Band abgegebene Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Europa basiert auf einer Vorausschätzung der Vereinten Nationen.

199 Seiten, broschiert 22,80 DM, Bestell-Nr. 1021201-95900, ISBN 3-8246-0382-9

Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag Metzler-Poeschel, Verlagsauslieferung H. Leins, Postfach 11 52, 72125 Kusterdingen, Telefon (0 70 71) 93 53 50, Telefax (0 70 71) 3 36 53.

**METZLER
POESCHEL**