

— SAARLAND —

IN ZAHLEN



**Morbidität und Mortalität an Bösartigen  
Neubildungen im Saarland  
1992**

*- Jahresbericht -*



**Kreb S register  
SAARLAND**

Sonderhefte  $\frac{180}{1995}$

Statistisches Landesamt



SAARLAND

## Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor
- () Aussagewert eingeschränkt, da der Wert Fehler aufweisen kann
- / keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
- X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl

# Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1992

## Information und Beratung

Referat für Öffentlichkeitsarbeit

(0681) 501 5935

(0681) 501 5925

Bibliothek

(0681) 501 5903

Datenbanksysteme

(0681) 501 5913

## Impressum

Herausgeber:

Statistisches Landesamt Saarland  
Virchowstr. 7, 66119 Saarbrücken

Telefon: (0681) 501-00

Telefax: (0681) 501 5921

Druck und Vertrieb:

Statistisches Landesamt Saarland  
(0681) 501 5927

Auflage: 1 500

Einzelpreis: 15,- DM

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit  
Quellenangabe gestattet

ISBN 3 - 88718 - 116 - 6

ISSN 0178 - 482X (Morbidität)

ISSN 0486 - 7890 (Saarland in Zahlen)

# Vorwort

*Mit dem Inkrafttreten des Bundeskrebsregistergesetzes (KRG) zum 1. Januar 1995 (BGBl. Teil I, S. 3351 ff.) ist nach langen Jahren teilweise kontroverser Diskussionen ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Voraussetzungen für die epidemiologische Krebsforschung in Deutschland vollzogen worden.*

*Krebsregister stehen im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Nutzung im Kampf gegen die Volksseuche "Krebs" und der Sicherung eines umfassenden Datenschutzes für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Bis heute ist weltweit kein Fall einer mißbräuchlichen Verwendung von Krebsregisterdaten bekannt geworden, ein überzeugender Beweis für wirksamen Datenschutz und verantwortungsvollen Umgang mit hochsensiblen medizinischen Informationen.*

*Das Krebsregister Saarland legt hiermit seine regelmäßige Jahresdokumentation 1994 mit den Ergebnissen zur Krebsinzidenz und -mortalität für 1992 vor. Mit dem umfangreichen Zahlenwerk wird ein weiterer Beitrag zur Erweiterung und Verbreitung des Wissens über Art, Ausmaß und Bedeutung bösartiger Tumorerkrankungen für die Gesundheit der Bevölkerung unseres Landes geleistet.*

*Die erfolgreiche Arbeit dieser wichtigen Einrichtung des Gesundheitswesens ist untrennbar mit einer engagierten und stetigen Zusammenarbeit der Ärzteschaft mit dem Register verbunden. Unser Dank gilt den saarländischen Ärztinnen und Ärzten in den Kliniken und Krankenhäusern, die durch regelmäßige Meldungen eine vollständige und valide Erfassung garantieren. Hervorzuheben ist insbesondere die vertrauensvolle Kooperation mit den pathologischen Instituten, die den Grundstock der Datenbasis des Registers sichert. Überaus wertvoll sind viele ergänzende Informationen, die aus den niedergelassenen Praxen kommen. Auch hierfür ein aufrichtiges Wort des Dankes.*

*Nur mit einer begleitenden Unterstützung durch die Saarländische Ärztekammer konnte die breite Mitarbeit der Ärzteschaft auf Dauer gesichert werden. Den Dank hierfür verbinden wir mit der Hoffnung auf neuen Rückenwind bei der anstehenden Novellierung des Saarländischen Krebsregistergesetzes.*

*Unser Dank gebührt dem Bundesministerium für Gesundheit für die großzügige finanzielle Förderung, die angesichts der allseits bekannten Haushaltsnöte des Saarlandes den Fortbestand des Registers gewährleistet.*

*Die Dokumentation wurde von der Referentin für das Krebsregister, Frau Dipl.-Informatikerin med. Christa Stegmaier, und meinem Stellvertreter, Herrn Ltd. Wirtschaftsdirektor Hartwig Ziegler, erstellt. Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den übrigen Mitarbeitern meines Hauses, die am Zustandekommen dieser Schrift beteiligt waren.*

*Saarbrücken, im Januar 1995*

*Josef Mailänder  
Direktor*

# Inhaltsübersicht

## Textteil

	Seite
Summary: Methods and Material	5
1. Vorbemerkungen	7
2. Rechtsgrundlage	7
3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe	7
4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern	8
5. Registerpopulation	10

## Tabellen und Schaubilder

### Teil I

#### Tabellen

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen	10
2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1992	16
3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1992	17
4. Bösartige Neubildungen insgesamt 1992	20
5. Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 - 1992	22
6. Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 - 1992	26
7. Rohe und standardisierte Inzidenzraten an bösartigen Neubildungen 1992	30
8. Rohe und standardisierte Mortalitätsraten an bösartigen Neubildungen 1992	32
9. Kumulative Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992	34
10. Kumulative Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992	35
11. Altersspezifische Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992	36
12. Altersspezifische Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992	40

#### Schaubilder

1. Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1992	12
2. Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1992	13
3. Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1974 - 1992	14
4. Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %	14
5. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen in v. H. der gesamten Neuzugänge 1992	15
6. Art der Diagnosesicherung 1992	18
7. Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1972 - 1992, insgesamt	18
8. Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992	19

## Tabellen und Schaubilder

### Teil II

#### Übersichtstabellen der häufigsten Lokalisationen bei Männern und Frauen

151	Magen	46
153	Dickdarm	48
154	Mastdarm	50
156	Gallenblase und Gallenwege	52
157	Bauchspeicheldrüse	54
161	Kehlkopf	56
162	Lunge	58
172	Melanome der Haut	60

175	Männliche Brustdrüse	87
170 - 175	Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse insgesamt	87

### **Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane**

179	Nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	87
180	Gebärmutterhals	87
181	Plazenta	87
182	Gebärmutter (corpus uteri)	87
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	88
184	Sonst. u. nicht näher bezeichnete weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva usw.)	88
185	Prostata	88
186	Hoden	88
187	Sonst. u. nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis usw.)	88
188	Harnblase	88
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	89
189.0	Niere	89
179 - 189	Harn- und Geschlechtsorgane insgesamt	89

### **Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze**

190	Auge	89
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	89
193	Schilddrüse	89
194	Sonstige endokrine Drüsen	90
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntem Sitzes	90
190 - 199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze insgesamt	90

### **Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe**

200 + 202	Maligne Lymphome	90
201	Lymphogranulomatose	90
203	Multiples Myelom	90
204	Lymphatische Leukämie	91
205	Myeloische Leukämie	91
206 - 208	Sonstige und nicht näher bezeichnete Leukämien	91
200 - 208	Lymphatische und blutbildende Organe insgesamt	91
	Bösartige Neubildungen insgesamt ohne ICD 173	91

<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>91</b>
---	-----------

## **Anhang**

Zur Standardisierung verwendete Populationen	94
Mittlere Wohnbevölkerung 1992	95
Gesetz Nr. 1094 "Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17. Januar 1979	96
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen vom 23. März 1979	98
Erläuternde Hinweise zur internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979	100
Verwaltungskarte des Saarlandes	103

173	Haut	62
188	Harnblase	64
189.0	Nieren	66
185	Prostata	68
186	Hoden	70
174	Weibliche Brustdrüse	72
180	Gebärmutterhals	74
182	Gebärmutterkörper (corpus uteri)	76
183	Eierstock	78

## Tabellen

### Teil III

#### Gesamtzahl der im Jahr 1992 erfaßten Personen

#### Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens

140	Lippe	82
141	Zunge	82
142	Hauptspeicheldrüsen	82
143 + 145	Zahnfleisch, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	82
144	Mundboden	82
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx und Rachen ohne nähere Angaben	82
140 - 149	Mundhöhle und Rachen insgesamt	83

#### Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

150	Speiseröhre	83
151	Magen	83
152	Dünndarm, einschließlich Zwölffingerdarm	83
153	Dickdarm, ausgenommen Mastdarm	83
154	Mastdarm und Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum	83
155	Leber	84
156	Gallenblase und Gallenwege	84
157	Bauchspeicheldrüse	84
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	84
159	Sonstige nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	84
150 - 159	Verdauungsorgane und Bauchfell insgesamt	84

#### Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe

160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	85
161	Kehlkopf	85
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	85
163	Rippenfell	85
164	Thymus, Herz und Mediastinum	85
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe	85
160 - 165	Atmungs- und intrathorakale Organe insgesamt	86

#### Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse

170	Knochen	86
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	86
172	Melanome der Haut	86
173	Sonstige Haut	86
174	Weibliche Brustdrüse	86

## Summary: Methods and Material

### Introduction

The Cancer Registry of Saarland is a population-based registry which covers the total population of this federal state. The registry was established in 1967 at the State Office for Statistics and provides yearly reports of cancer incidence and mortality in this area.

This volume presents updated results of cancer registration in Saarland/W-Germany for the year 1992. Included are numbers of cancer cases and incidence and mortality rates as well as descriptive analyses of time trends over the 1978 - 1992 period. The volume contains only basic data. More detailed analyses can be provided by the registry upon request.

### Legal Basis

Since January 1979 notification has been based on the "Law of Cancer Registration", which integrated registration and follow-up of incident cases into the official statistics of the Saarland. Registration remains voluntary and very strict data protection rules are followed in order to maintain the highest possible level of confidentiality.

### Registry Population

The "population-at-risk" covered by the registry is defined by place of residence in the state of Saarland, which is located in the very South West of the Federal Republic of Germany (FRG). The mean population of 1992 was 1 079 686 persons (48,4 % males, 51,6 % female). Given an area of 2,567 square kilometres, the population density amounts to 420 inhabitants per square kilometre.

In 1992 some 53,6 % lived in conurbations of more than 20,000 inhabitants. About 50,4 % of the population of Saarland was married, 35,9 % was unmarried, 13,7 % widowed and divorced. The working population, 44,4 % of the total, 34,5 % was employed in industry (55,9 % male, 16,8 % female); 18,9 % commerce and transport (13,8 % male, 27,3 % female) and 38,9 % other personal services (29,0 % male, 55,2 % female). Agriculture has a minor position.

### Registration

The main sources of information are notifications from pathology departments (about 50 % of all new cases reported to the registry), hospital in- and out-patient units, radiology departments and medical practitioners. Use of multiple sources warrants a high level of completeness of registration. Identification of previously registered cases is done by sophisticated computer-aided record linkage. All information concerning one patient is assigned at a single registration-number. Follow-up information includes all relevant changes in health status as well as notification of secondary malignancies and date and cause of death. The latter are provided by record linkage with death certificates of all residents of the Saarland. For those cancer patients, whose first notification to the registry is by

death certificate, the notifying physician is asked for additional information such as time of diagnosis, treatment etc. If no additional information can be obtained, patients are nevertheless included in incidence calculations as (Death Certificate Only = "DCO" cases).

All primary sites are coded according to the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD) from 1979. Positions 140 - 208 (malignant neoplasms) as well as 230 - 234 (in situ cases) and 235 - 238 (neoplasms of uncertain behaviour) are also registered. This publication provides information on positions 140 - 208, additional information on in situ cases is given separately for the most common cancer sites.

### Analyses

Sex-, age- and site specific incidence and mortality rates (cases per 100,000) are given for ICD-9 positions 140 - 208. For the most common sites of cancer, these incidence rates are also graphically presented for non-overlapping 5-year birth cohorts.

In addition, the following sex- and site specific summary measures are provided:

- crude incidence and mortality rates
- directly standardized incidence and mortality rates using WHO standard populations (World, Europe, "truncated") and the population of the FRG in 1987(see annex)
- cumulative incidence and mortality rates for ages 0 - 14, 35 - 64 and 0 - 74.

Quality and completeness control measures such as the proportion of histologically verified cases and "DCO-cases" are also included.



## 1. Vorbemerkungen

Das vorliegende Sonderheft enthält die Ergebnisse der Krebsregistrierung für das Jahr 1992 im Saarland. Die Publikation bietet in tabellarischer und grafischer Form die wichtigsten aktuellen Zahlen und Raten zur Krebsinzidenz und -mortalität.

Dargestellt sind die Daten auf der Ebene des dreistelligen ICD-Schlüssels für das Berichtsjahr 1992 und die Entwicklung für den Zeitraum 1978 bis 1992.

Daten und Zahlenreihen, die über den Umfang des Sonderheftes hinausgehen, können auf Anfrage aufbereitet werden.

## 2. Rechtsgrundlage

Die rechtliche Grundlage der Erfassung und Registrierung der Krebserkrankungen im Saarland bildet das "Saarländische Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17.01.1979 (Amtsblatt des Saarlandes 1979, Nr. 7 vom 21.02.1979, Seite 105 ff). Durch diese Rechtsvorschrift ist das Krebsregister zu einem integrierten Bestandteil der amtlichen Statistik im Saarland geworden. Neben der abschließenden Regelung des zu erhebenden Merkmalprogramms gehören spezielle Datenschutzvorschriften zu den wichtigsten Vorschriften des Gesetzes. Diese waren besonders streng und restriktiv zu fassen, da nur so ein wirksamer Schutz der personenbezogenen Erhebung, die für ein epidemiologisches Register unverzichtbar ist, sichergestellt werden kann.

## 3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe

Zur Beobachtung des Krebsgeschehens einer bestimmten Region gilt es, alle auftretenden bösartigen Neubildungen in der Bevölkerung dieses Gebietes zu erfassen.

Um dabei ein möglichst umfassendes Bild über Erkrankung und Krankheitsverlauf aller Personen zu erhalten, ist es notwendig, Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu schöpfen; diese Quellen sind Krankenhäuser, Pathologische Institute, Radiologien und freipraktizierende Ärzte. Dabei muß die korrekte Zusammenführung aller eingehenden Informationen zu einer Person gewährleistet sein (Record-Linkage). Es ist daher notwendig, außer den epidemiologisch relevanten persönlichen Daten wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Sterbejahr usw. auch Identifikationsmerkmale wie das genaue Geburtsdatum, Name, Vor- und Geburtsname und die Adresse der erkrankten Personen zu erheben.

Diese Daten ermöglichen es, eine Meldung zu einem Patienten, der bereits erfaßt ist, als Folgemeldung zu identifizieren. Doppel- und Mehrfachzählungen werden dadurch verhindert.

Um dies zu gewährleisten, werden auf einem nur dem Register zugänglichen, autonom arbeitenden Personalcomputer nach den gesetzlichen Vorschriften die persönlichen und sozialen Merkmale sowie die medizinischen Daten in zwei streng getrennten Datenbanken vorgehalten. Aus Datenschutzgründen wurden zudem unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für die einzelnen Mitarbeiter angeordnet. Das Bindeglied zwischen beiden Datenbanken stellt die bei der Ersterfassung zugeteilte Registriernummer dar, die zusammen mit dem Er-

fassungsjahr (= Diagnose) eine eindeutige Zuordnung der Patienten erlaubt.

Zur Sicherung des Record-Linkage und zur Vermeidung von Doppelerfassungen stehen vier programmgesteuerte Suchstrategien zur Verfügung. Darin werden die Nachnamen durch die Bildung phonetischer Suchbegriffe ersetzt, um mögliche Fehler durch unterschiedliche Schreibweisen von Namen zu vermeiden.

Die Suchstrategien sind:

- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens kombiniert mit Geburtsdatum und Geschlecht
- Geburtsdatum und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens verknüpft mit Wohnort und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Namens und Geschlecht

Charakteristisch für dieses Verfahren ist, daß der Sachbearbeiter anhand aller ihm durch die Suchstrategien zur Verfügung gestellten Informationen letztlich über die Zuordnung zu einer bereits erfaßten Person oder Neuaufnahme entscheidet. Es ist kein automatischer maschineller Zuordnungsalgorithmus eingebaut worden.

Entsprechend der Bearbeitung der Meldungen werden auch die Sterbefallzählkarten eines jeden Jahres aus der amtlichen Todesursachenstatistik mit den Patienten des Registers abgeglichen, um einmal die Verstorbenen zu eliminieren und die bereits registrierten Daten um die Todesursachen zu ergänzen, und andererseits aber auch eventuelle Erfassungslücken im Register, die durch unterlassene Meldungen entstanden sind, zu schließen. Der Mortalitätsabgleich erfolgt nach den gleichen Suchstrategien wie das Zusammenführen eingehender Meldebögen. Tritt dabei der Fall auf, daß ein Patient an einem Karzinom verstorben ist, ohne daß diese Person dem Register als erkrankt bekannt ist, wird dieser Patient erst einmal mit den Daten des Leichenschauheines im Sterbejahr erfaßt. Das Register versucht jedoch, über den Arzt, der den Leichenschauheine ausgestellt hat, die notwendigen Informationen über Erkrankungszeitpunkt und Krankheitsverlauf einzuholen.

Geht innerhalb eines gewissen Zeitraumes keine Rückantwort ein, verbleibt der Fall mit den Daten des Leichenschauheines im Sterbejahr als Neuzugang und wird in die Inzidenzberechnung dieses Jahres miteinbezogen. (Death-Certificate-Only-Fälle).

Erhält das Register vom Arzt eine Auskunft über das Erkrankungsdatum des Patienten, so wird dieser nachträglich dem Erkrankungsjahr zugeordnet und als DCO-Fall im Sterbejahr wieder gelöscht. Dieses Vorgehen bringt zwar die Schwierigkeit, daß sich Fall- und Inzidenzzahlen eines Jahres im Nachhinein geringfügig ändern können; es hat aber den Vorteil, daß bei späteren Studien eine korrekte zeitliche Zuordnung der Erkrankungsfälle möglich ist.

Im Saarländischen Krebsregister werden alle Erkrankungen an bösartigen Neubildungen, die den Positionen 140 bis 208 ICD-9 (International Classification of Diseases, 9. Revision), entsprechen, erfaßt. Auf diese Positionen beschränkt sich auch die Ermittlung der Inzidenz eines Jahres. Die Positionen

210 bis 229, die die gutartigen Neubildungen umfassen, bleiben außerhalb der Registrierung. Registriert werden jedoch die "In-situ-Karzinome", denen seit der 9. Revision der ICD die Code-Nummern 230 bis 234 für die unterschiedlichen Organe zugeordnet sind. Da die 9. Revision erst ab dem Jahre 1979 angewandt wird, sind für die vorangegangenen Jahre lediglich die Karzinome in situ der Cervix gesondert ausgewiesen, da für diese intern ein besonderer Code vergeben wurde.

Für alle Fälle von "In-situ-Karzinomen" werden ebenfalls Datensätze angelegt, in die Inzidenzberechnung gehen sie jedoch nicht ein. Ähnlich wie bei den "In-situ-Fällen" erfolgt die Bearbeitung der Neubildungen unsicheren Verhaltens. Sie werden ebenfalls aus der Inzidenzberechnung ausgeklammert. Diese Tumoren, früher die Nummern 230 bis 239 nehmen heute die Positionen 235 bis 238 ein.

Für Verdachtsfälle gilt, daß sie zwar in die personenbezogene Datenbank aufgenommen werden, jedoch kein medizinischer Datensatz angelegt wird. Bestätigt sich nach einer gewissen Zeit der Verdacht, d.h. ein Karzinom wird histologisch, operativ, röntgenologisch, zytologisch oder klinisch gesichert, erfolgt eine Aufnahme in den Bestand, der Fall wird dann in alle Berechnungen miteinbezogen.

In die Reihe der bereits erwähnten "Neubildungen unsicheren Verhaltens" sind seit der 9. Revision auch die Plasmozytome, die Polycythaemia vera und die Myelofibrosen eingeordnet. In den früheren Jahrgängen waren diese bei den bösartigen Neubildungen von 200-209 zu finden und gingen alle in die Berechnung der Inzidenz ein. Das Plasmozytom wird im saarländischen Krebsregister, angelehnt an die Todesursachenstatistik, weiterhin mit 203 verschlüsselt.

Bei der Interpretation der zeitlichen Entwicklungsreihen maligner Tumoren ist es notwendig, die Homogenität der Daten besonders im Auge zu behalten. Angesichts sich im Zeitverlauf ständig ändernder Diagnosepraktiken und -techniken sowie der in bestimmten Zeitabständen durchgeführten Revision der internationalen Krankheitsystematiken muß auf die Einheitlichkeit der Begriffsinhalte geachtet werden, wenn man vermeiden will, "künstliche" - durch den Wandel von Diagnose und Codierungsmethoden initiierte - mit echten Entwicklungstrends zu vermischen.

Ein international strittiger Punkt war bislang, ob die Position 173, "bösartige Neubildungen der Haut" auch die Basaliome enthalten, und ob diese bei der Berechnung der Inzidenz eingeschlossen sein sollten. Viele Register behelfen sich damit, daß sie zwei Inzidenzen berechnen und publizieren, einmal mit und einmal ohne die Position 173. Heute geht man immer mehr davon aus, die bösartigen Neubildungen der Haut außer den Melanomen alle unter der Nummer 173 zusammenzufassen und in die Inzidenz einzubeziehen. Im saarländischen Register schloß die Inzidenz in allen Perioden diese Krebse mit ein.

Eine Zuordnungsschwierigkeit besteht in allen Registern für die Lymphome der inneren Organe (z. B. Lymphom des Magens); laut ICD-9 müßte der Code 202.8, Lymphom ohne näher bezeichneten Sitz, vergeben werden. Dabei geht jedoch eine wichtige Information verloren; im saarländischen Krebsregister wird so verfahren, daß zum Beispiel für maligne Lymphome des Magens die Nummer 151 vergeben wird und in

einer zusätzlichen Position codiert wird, daß es sich dabei um ein Lymphom handelt. In den nach ICD-Codes gegliederten Auswertungstabellen ist der Fall dann allerdings unter der Position 151 aufgeführt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese Fälle getrennt aus dem Datenmaterial herauszuziehen.

Zweitkarzinome sind in dieser Standardveröffentlichung noch nicht ausgewiesen, da einer solchen Tabelle eine tiefere Revision der Daten vorausgehen muß; dies bedeutet daß derzeit eine Person nur als ein Fall in die Inzidenz eingeht, auch wenn sie zwei oder mehr Primärkarzinome hat. Gezählt wird in diesem Fall der zuerst auftretende Krebs.

Bei einem anderen Vorgehen wäre derselbe Patient eventuell in der Inzidenz verschiedener Jahre zu berücksichtigen, falls die unterschiedlichen Primärtumoren zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten. Ein solche Differenzierung erlaubt das momentane Auswertungsprogramm nicht; sie ist auch nur für spezielle epidemiologische Fragestellungen sinnvoll und erforderlich.

#### 4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern

Grundlage für die Berechnung epidemiologischer Maßzahlen bilden die geschlechts- und altersgegliederten absoluten Fallzahlen für jede Lokalisation. Auf dieser Basis, die es aus den eingehenden Meldungen zu ermitteln gilt, können alle weiteren Raten berechnet werden. Die reinen absoluten Häufigkeiten haben keine große Aussagekraft, sieht man sie nicht im Zusammenhang mit anderen Daten. Als einfaches Beispiel sei angeführt: Anhand der Fallzahlen eines bestimmten Karzinoms in einer Großstadt und in einer ländlichen Gemeinde kann nicht abgeleitet werden, daß für die Großstadt aufgrund der höheren Fallzahl ein höheres Krebsrisiko besteht. Dort, wo viele Menschen wohnen, erkranken in der Regel auch mehr als in einer Gemeinde mit geringerer Einwohnerzahl. Die Erkrankungsfälle müssen demzufolge auf die jeweilige Wohnbevölkerung bezogen werden. Epidemiologische Gebietsregister beziehen sich auf räumlich definierte Populationen. Das saarländische Register erfaßt die Krebserkrankungen der Wohnbevölkerung des Saarlandes. Diese Personengesamtheit bildet die sogenannte "Bevölkerung unter Risiko". Mögliche andere räumliche Abgrenzungen, wie beispielsweise Einzugsgebiete von Krankenhäusern, entsprechen nicht dem Forschungsansatz flächendeckender Register.

Die Erkrankungshäufigkeit in einer Region ist von vielen Faktoren abhängig, die u. a. auch in Eigenschaften und Verhaltensweisen der dort wohnenden Menschen selbst zu suchen sind. Bei der Entstehung von Krebserkrankungen ist z.B. das Alter ein wichtiger Risikofaktor. Bei der Beurteilung des regionalen Krankheitsgeschehens sind daher detaillierte Kenntnisse der sozialen Struktur der Bevölkerung unverzichtbar.

Um geeignete Werte zu erhalten, sei es um Vergleiche zwischen den Geschlechtern oder zwischen einzelnen Lokalisationen in einer bestimmten Population anzustellen, sei es um interregionale oder -nationale Vergleiche durchführen zu können, errechnet man sogenannte Inzidenz- oder Erkrankungsraten. Die einfachste Rate ist die "rohe" Inzidenz; dies ist die Zahl aller Neuerkrankungen einer oder aller Lokalisationen pro

100 000 der Bevölkerung unter Risiko in einem bestimmten Zeitraum. Als Zeitraum wird normalerweise das Kalenderjahr verwendet.

Hiernach erhält man als Berechnungsformel für die "rohe" Rate im Jahr  $j$ :

$$E_j = \frac{N_j}{B_j} \times 10^5$$

Es bedeuten:

$E_j$  = Inzidenz im Zeitraum  $j$

$N_j$  = Neuerkrankungen im Zeitraum  $j$

$B_j$  = Durchschnittliche Wohnbevölkerung im Zeitraum  $j$

Da Krebs eine Erkrankung ist, deren Häufigkeit stark mit dem Lebensalter variiert, ist es zweckmäßig, "altersspezifische" Inzidenzen zu berechnen. Im Unterschied zur Gesamtinzidenz werden hier nur die Krebsneuerkrankungen in einer bestimmten Altersklasse auf die Zahl der Angehörigen dieser Altersgruppe in der "Bevölkerung unter Risiko" bezogen.

Formal ergibt sich hieraus:

$$A_{ij} = \frac{N_{ij}}{B_{ij}} \times 10^5$$

Es bedeuten:

$A_{ij}$  = Altersspezifische Inzidenz der Altersgruppe  $i$  im Zeitraum  $j$

$N_{ij}$  = Neuerkrankte Personen der Altersgruppe  $i$  im Zeitraum  $j$

$B_{ij}$  = Durchschnittliche Gesamtbevölkerung der Altersgruppe  $i$  im Zeitraum  $j$

Auch hier wird das Kalenderjahr als Berechnungszeitraum gewählt.

Obwohl die altersspezifischen Raten eigentlich die detailliertesten Informationen für Vergleichsuntersuchungen enthalten, ist eine umfassende Analyse aller altersspezifischen Raten für eine große Anzahl von Krebslokalisationen sehr aufwendig und für einen Gesamtüberblick zu unübersichtlich. Hier haben sich die sogenannten standardisierten Inzidenzen bewährt. Bei den vorliegenden Berechnungen haben wir uns für die Methode der direkten Standardisierung entschieden. Die Standardisierung ist notwendig, da bei intertemporalen oder interregionalen Vergleichen von Populationen in der Regel ein unterschiedlicher Altersaufbau vorliegt. Da der Krebsbefall, wie oben erwähnt, stark altersabhängig ist, muß bei Vergleichsstudien der Struktureffekt des Altersaufbaus der Bevölkerung herausgerechnet werden. Man erhält durch diese Operation Vergleichszahlen, die um den Einfluß abweichender Altersstrukturen auf die Krebshäufigkeit bereinigt sind. Dies geschieht durch Gewichtung und Zusammenfassung der altersspezifischen Raten zu einer Gesamtrate. Die Gewichte werden dabei durch die gewählte Standardbevölkerung vor-

gegeben. Demnach kann folgender Berechnungsmodus für altersstandardisierte Raten abgeleitet werden:

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{\sum_{i=1}^{18} G_i}$$

Die Summationsgrenzen  $i = 1, 2, \dots, 18$  ergeben sich aus 17 Fünfjahresaltersgruppen und der nach oben offenen Gruppe "85 und mehr Jahre".

Es bedeuten:

$D_j$  = Direkt standardisierte Rate im Zeitraum  $j$

$G_i$  = Angehörige der Altersgruppe  $i$  in der Standardbevölkerung

Da bei Standardbevölkerungen üblicherweise von einem Kollektiv von 100 000 ausgegangen wird, also  $\sum_{i=1}^{18} G_i = 10^5$  ist, erhält man

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{10^5}$$

Für die Altersstandardisierung wurden von der WHO verschiedene Modellbevölkerungen entwickelt, die auch hier den Berechnungen zugrunde liegen, z. B. die Weltbevölkerung nach Segi. Die so ermittelten Raten geben an, welche Inzidenz für eine bestimmte Lokalisation festgestellt worden wäre, wenn die Alterszusammensetzung der beobachteten Bevölkerungsgruppen derjenigen des gewählten Standards entsprochen hätte. Hieraus wird deutlich, daß die berechneten Werte durch die Wahl des Standards wesentlich beeinflusst werden, da durch verschiedene Standards unterschiedliche Altersklassen stärker oder schwächer gewichtet werden.

Ein Näherungswert für das Risiko (Nettorisiko) oder die Wahrscheinlichkeit eines Individuums, bis zu einem bestimmten Lebensalter an Krebs zu erkranken, unter der Voraussetzung von keiner anderen Krankheit betroffen zu werden (Prinzip der konkurrierenden Risiken), ist die sogenannte "kumulative Rate".

Bei der Berechnung dieser Rate geht man von einer hypothetischen Standardbevölkerung mit gleich großen Altersgruppen aus. Die Rate wird ermittelt aus der Summe der altersspezifischen Inzidenzen, die mit dem Faktor fünf multipliziert werden muß, da diese Zahlen in der Regel für Fünf-Jahres-Altersklassen vorliegen.

Da Wahrscheinlichkeiten in Prozenten ausgedrückt werden, bezieht sich die "kumulative Rate" auf 100 Personen und nicht

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen

Altersgruppen in Jahren	Anteile in v. Hundert der Gesamtbevölkerung										
	Mittlere Bevölkerung					VZ					
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
<b>0 bis unter 15</b>											
männlich	17,1	16,3	15,9	15,4	15,3	14,9	15,1	15,3	15,5	15,8	16,0
weiblich	14,8	14,1	13,8	13,2	13,3	13,0	13,2	13,3	13,7	13,9	14,1
<b>zusammen</b>	<b>15,9</b>	<b>15,3</b>	<b>14,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,2</b>	<b>13,9</b>	<b>14,0</b>	<b>14,2</b>	<b>14,6</b>	<b>14,8</b>	<b>15,1</b>
<b>15 bis unter 35</b>											
männlich	34,4	34,6	34,8	34,7	34,5	33,5	32,9	32,4	31,9	31,4	30,8
weiblich	29,6	29,7	30,0	29,8	29,6	29,3	28,8	28,3	27,9	27,5	27,0
<b>zusammen</b>	<b>31,8</b>	<b>32,0</b>	<b>32,2</b>	<b>32,1</b>	<b>32,0</b>	<b>31,3</b>	<b>30,7</b>	<b>30,2</b>	<b>29,9</b>	<b>29,4</b>	<b>28,9</b>
<b>35 bis unter 65</b>											
männlich	38,0	38,4	39,1	39,6	39,8	41,1	41,4	41,5	41,6	41,7	41,9
weiblich	37,9	38,1	38,6	38,8	38,7	39,0	38,9	38,7	38,6	38,6	31,5
<b>zusammen</b>	<b>37,8</b>	<b>38,4</b>	<b>38,7</b>	<b>39,1</b>	<b>39,2</b>	<b>40,0</b>	<b>40,1</b>	<b>40,2</b>	<b>40,0</b>	<b>40,9</b>	<b>40,2</b>
<b>65 und älter</b>											
männlich	10,6	10,2	10,0	10,1	10,3	10,5	10,8	10,9	11,0	11,1	11,4
weiblich	17,9	17,6	17,6	18,2	18,4	18,7	19,3	19,7	19,8	20,0	20,1
<b>zusammen</b>	<b>14,3</b>	<b>14,1</b>	<b>14,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,6</b>	<b>14,8</b>	<b>15,2</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,7</b>	<b>16,0</b>

auf 100 000 der Bevölkerung, so daß das Summationsergebnis noch durch den Faktor 1 000 zu dividieren ist.

Die Summationsgrenzen sind dabei je nach Fragestellung variabel. Man errechnet üblicherweise die Werte für die Altersklassen 0-74 Jahre, 35-64 Jahre, 0-14 Jahre.

Man erhält als Berechnungsformel:

$$K_j = \frac{5 \times \sum_{i=k}^m A_{ij}}{10^3}$$

Es bedeuten:

- $K_j$  = Kumulative Inzidenzrate im Zeitraum  $j$
- $k$  = Untere Altersgrenze, von der ab die kumulative Rate berechnet werden soll
- $m$  = Obere Altersgrenze, bis zu der die kumulative Rate berechnet werden soll

5. Registerpopulation

Nach dem Ergebnis der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung lebten im Jahresdurchschnitt 1992 1 079 686 Personen im Saarland. Davon waren 522 387 (48,4 %) männlichen und 557 299 (51,6 %) weiblichen Geschlechts.

Damit kamen auf 1 000 Männer 1 067 Frauen. Auf einem Quadratkilometer lebten durchschnittlich 420 Personen. Etwas mehr als die Hälfte (53,6 %) der Saarländer hatten ihren Wohnsitz in Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern.

Der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich von den jüngeren zu den älteren Jahrgängen verschoben. Waren 1972 noch 23,3 % der Einwohner jünger als 15 Jahre, so ging dieser Anteil auf nunmehr 15,1 % zurück. Dagegen erreichte die Gruppe der 15 bis unter 65jährigen 68,9 % (1972: 64,2 %). Die stärkste Zunahme wurde bei den Personen im Alter von 65 und mehr Jahren festgestellt. Sie brachten es auf einen Anteil von 16,0 %, 1972 waren es nur 12,5 %. Die Gliederung der Bevölkerung nach dem Familienstand zeigte folgendes Bild: 50,4 % der Saarländer waren verheiratet, 35,9 % ledig, 9,1 % verwitwet und 4,6 % geschieden.

Am 31.12.1992 lebten nach Angaben des Ausländerzentralregisters 68 237 Ausländer im Saarland. Das waren 7 740 oder 12,8 % mehr als im Jahr zuvor. Die stärkste Ausländergruppe bildeten nach wie vor die Italiener mit 17 503 Personen (25,7 %). Es folgten die Türken mit 18,4 % und die Franzosen mit 10,2 %.

Rund 442 900 Saarländer/-innen gingen 1992 einer Erwerbstätigkeit nach, etwa 30 600 oder 7,4 % mehr als bei der Volkszählung 1987. (Männer: + 1,8 %, Frauen: + 18,3 %). Zusammen mit der Zahl der Erwerbslosen von 35 500 ergibt sich für das Jahr 1992 eine Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) von 44,4 % gegenüber 44,0 % im Jahr 1987. Die Quote für Frauen ist im gleichen Zeitraum von 29,2 % auf 32,1 % angestiegen und für Männer von 60,0 % auf 57,5 % gefallen.

Die Gliederung nach Wirtschaftsbereichen zeigt, daß 55,9 % der männlichen Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe tätig sind. 1987 waren 55,0 % der Männer in diesem Bereich beschäftigt. 13,8 % haben einen Arbeitsplatz in Betrieben des Handels, des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung (1987: 14,7 %). Der Anteil der männlichen Erwerbstätigen in den übrigen Wirtschaftsbereichen (Dienstleistungen) hat sich von 29,5 % im Jahre 1987 auf 29,0 % verringert.

Der Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit der Frauen lag 1992 im zuletzt genannten Wirtschaftsbereich. Mit 55,2 % steht weit mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in einem Arbeitsverhältnis in diesem Bereich (1987: 53,7 %). Im Bereich Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung ist bei den Frauen eine Steigerung von 24,5 % (1987) auf 27,3 % und im Produzierenden Gewerbe ein Rückgang von 20,9 % auf 16,8 % zu verzeichnen.


Im Blickwinkel der Erwerbstätigkeitsstatistik spielt die Land- und Forstwirtschaft im Saarland nur eine untergeordnete Rolle.

Im Blickwinkel der Erwerbstätigkeitsstatistik spielt die Land- und Forstwirtschaft im Saarland nur eine untergeordnete Rolle.



# **TABELLEN UND SCHAUBILDER**

## **TEIL I**


# 1) Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1992




## 2) Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1992




### 3) Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1974-1992



### 4) Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %



**5) Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen  
in v.H. der gesamten Neuzugänge 1992**




**2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen im Saarland 1992  
nach Lokalisationen und Geschlecht**

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil	Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil
140	Lippe	9	0,3	1	0,04
141	Zunge	29	1,0	8	0,3
142	Hauptspeicheldrüsen	5	0,2	6	0,2
144	Mundboden	28	1,0	5	0,2
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	19	0,6	7	0,2
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	62	2,1	19	0,7
<b>140 - 149</b>	<b>Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens</b>	<b>152</b>	<b>5,2</b>	<b>46</b>	<b>1,6</b>
150	Speiseröhre	38	1,3	8	0,3
151	Magen	135	4,6	123	4,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	6	0,2	8	0,3
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	224	7,6	250	8,8
154	Mastdarm	134	4,5	135	4,7
155	Leber	34	1,2	22	0,8
156	Gallenblase und Gallenwege	27	0,9	55	1,9
157	Bauchspeicheldrüse	52	1,8	58	2,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	3	0,1	2	0,1
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	5	0,2	18	0,6
<b>150 - 159</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells</b>	<b>658</b>	<b>22,3</b>	<b>679</b>	<b>23,8</b>
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazu gehörigen Nebenhöhlen	4	0,1	2	0,1
161	Kehlkopf	61	2,1	4	0,1
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	550	18,7	118	4,1
163	Rippenfell	4	0,1	6	0,2
164	Thymus, Herz und Mediastinum	1	0,03	2	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-
<b>160 - 165</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe</b>	<b>620</b>	<b>21,0</b>	<b>132</b>	<b>4,6</b>
170	Knochen	6	0,2	5	0,2
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	15	0,5	19	0,7
172	Melanome der Haut	37	1,3	58	2,0
173	Sonstige Haut	464	15,8	455	16,0
174	weibliche Brustdrüse	-	-	613	21,5
175	männliche Brustdrüse	6	0,2	-	-
<b>170 - 175</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse</b>	<b>528</b>	<b>17,9</b>	<b>1 150</b>	<b>40,4</b>
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	6	0,2
180	Gebärmutterhals	-	-	84	2,9
181	Plazenta	-	-	2	0,1
182	Gebärmutterkörper	-	-	145	5,1
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	112	3,9
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	23	0,8
185	Prostata	336	11,4	-	-
186	Hoden	31	1,1	-	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	12	0,4	-	-
188	Harnblase	195	6,6	52	1,8
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	112	3,8	80	2,8
189.0	Niere	101	3,4	70	2,5
<b>179 - 189</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane</b>	<b>686</b>	<b>23,3</b>	<b>504</b>	<b>17,7</b>
190	Auge	4	0,1	5	0,2
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	35	1,2	34	1,2
193	Schilddrüse	12	0,4	36	1,3
194	Sonstige endokrine Drüsen	2	0,1	1	0,04
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	112	3,8	106	3,7
<b>190 - 199</b>	<b>Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze</b>	<b>165</b>	<b>5,6</b>	<b>182</b>	<b>6,4</b>
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	65	2,2	68	2,4
201	Lymphogranulomatose	12	0,4	14	0,5
203	Multiples Myelom	16	0,5	22	0,8
204	Lymphatische Leukämie	12	0,4	21	0,7
205	Myeloische Leukämie	28	1,0	23	0,8
206 - 208	Sonstige Leukämien	4	0,1	9	0,3
<b>200 - 208</b>	<b>Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes</b>	<b>137</b>	<b>4,7</b>	<b>157</b>	<b>5,5</b>
	Insgesamt ohne ICD 173	2 482	84,2	2 395	84,0
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>2 946</b>	<b>100,0</b>	<b>2 850</b>	<b>100,0</b>


### 3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1992 nach Lokalisationen und Geschlecht

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Sterbefälle	% Anteil	Zahl der Sterbefälle	% Anteil
140	Lippe	-	-	1	0,1
141	Zunge	20	1,3	3	0,2
142	Hauptspeicheldrüsen	1	0,1	2	0,1
144	Mundboden	15	1,0	1	0,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1	0,1	1	0,1
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	28	1,8	8	0,6
<b>140 - 149</b>	<b>Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens</b>	<b>65</b>	<b>4,2</b>	<b>16</b>	<b>1,1</b>
150	Speiseröhre	53	3,4	9	0,6
151	Magen	103	6,6	108	7,7
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	2	0,1	1	0,1
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	131	8,4	159	11,4
154	Mastdarm	65	4,2	67	4,8
155	Leber	30	1,9	24	1,7
156	Gallenblase und Gallenwege	23	1,5	48	3,4
157	Bauchspeicheldrüse	52	3,3	64	4,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	1	0,1	2	0,1
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	14	0,9	23	1,6
<b>150 - 159</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells</b>	<b>474</b>	<b>30,3</b>	<b>505</b>	<b>36,1</b>
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazu gehörigen Nebenhöhlen	2	0,1	1	0,1
161	Kehlkopf	27	1,7	2	0,1
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	523	33,4	116	8,3
163	Rippenfell	4	0,3	4	0,3
164	Thymus, Herz und Mediastinum	3	0,2	1	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-
<b>160 - 165</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe</b>	<b>559</b>	<b>35,7</b>	<b>124</b>	<b>8,9</b>
170	Knochen	-	-	3	0,2
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	9	0,6	16	1,1
172	Melanome der Haut	10	0,6	11	0,8
173	Sonstige Haut	4	0,3	2	0,1
174	weibliche Brustdrüse	-	-	256	18,3
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-
<b>170 - 175</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse</b>	<b>23</b>	<b>1,5</b>	<b>288</b>	<b>20,6</b>
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	22	1,6
180	Gebärmutterhals	-	-	32	2,3
181	Plazenta	-	-	-	-
182	Gebärmutterkörper	-	-	20	1,4
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	78	5,6
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	12	0,9
185	Prostata	100	6,4	-	-
186	Hoden	3	0,2	-	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	1	0,1	-	-
188	Harnblase	52	3,3	12	0,9
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	51	3,3	36	2,6
189.0	Niere	37	2,4	31	2,2
<b>179 - 189</b>	<b>Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane</b>	<b>207</b>	<b>13,2</b>	<b>212</b>	<b>15,2</b>
190	Auge	-	-	1	0,1
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	24	1,5	22	1,6
193	Schilddrüse	6	0,4	15	1,1
194	Sonstige endokrine Drüsen	1	0,1	2	0,1
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	110	7,0	121	8,7
<b>190 - 199</b>	<b>Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze</b>	<b>141</b>	<b>9,0</b>	<b>161</b>	<b>11,5</b>
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	33	2,1	23	1,6
201	Lymphogranulomatose	3	0,2	4	0,3
203	Multiplies Myelom	17	1,1	21	1,5
204	Lymphatische Leukämie	11	0,7	7	0,5
205	Myeloische Leukämie	25	1,6	24	1,7
206 - 208	Sonstige Leukämien	7	0,4	13	0,9
<b>200 - 208</b>	<b>Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes</b>	<b>96</b>	<b>6,1</b>	<b>92</b>	<b>6,6</b>
	Insgesamt ohne ICD 173	1 561	99,7	1 396	99,9
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>1 565</b>	<b>100,0</b>	<b>1 398</b>	<b>100,0</b>

### 6) Art der Diagnosesicherung 1992




### 7) Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1972-1992 Insgesamt




## 8) Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Alter 1992

### Neuerkrankungen



### Sterbefälle



Alter

0-39
  40-59
  60-79
  80 u.m.

#### 4a) Bösartige Neubildungen insgesamt 1992

Alter von... bis unter...	Fallzahl				Inzidenz				Mortalität			
	mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	8	7	8	7	27,6	25,7	27,6	25,7	13,8	3,7	13,8	3,7
05 - 10	-	2	-	2	-	7,7	-	7,7	-	-	-	-
10 - 15	2	2	1	2	7,4	7,8	3,7	7,8	-	-	-	-
15 - 20	6	6	6	6	23,1	24,4	23,1	24,4	3,8	-	3,8	-
20 - 25	7	11	7	11	17,9	29,8	17,9	29,8	5,1	10,8	5,1	10,8
25 - 30	25	20	21	15	51,8	44,2	43,5	33,1	4,1	13,3	4,1	13,3
30 - 35	30	30	25	29	63,2	68,1	52,7	65,9	8,4	20,4	8,4	20,4
35 - 40	46	63	43	58	108,3	158,1	101,2	145,6	33,0	30,1	33,0	30,1
40 - 45	75	101	62	88	189,1	273,5	156,3	238,3	73,1	48,7	73,1	48,7
45 - 50	112	125	100	109	390,2	449,2	348,4	391,7	170,7	115,0	170,7	115,0
50 - 55	245	226	212	188	605,5	556,5	523,9	462,9	294,1	189,6	294,1	189,6
55 - 60	343	251	294	209	949,9	682,6	814,2	568,4	456,9	277,4	456,9	277,4
60 - 65	475	301	401	262	1517,3	896,1	1280,9	780,0	725,1	407,9	725,1	407,9
65 - 70	478	405	412	346	1993,2	1146,8	1718,0	979,7	1142,5	540,8	1142,5	540,8
70 - 75	411	374	333	311	2676,5	1405,6	2168,5	1168,9	1322,0	684,0	1315,4	684,0
75 - 80	314	333	251	267	3197,6	1591,2	2556,0	1275,9	1883,9	970,0	1883,9	970,0
80 - 85	233	344	188	270	3433,0	1913,9	2770,0	1502,2	2578,5	1262,9	2549,0	1257,4
85+	136	249	118	215	4008,3	2186,1	3477,7	1887,6	3300,9	1729,6	3271,4	1720,8
<b>Insgesamt</b>	<b>2946</b>	<b>2850</b>	<b>2482</b>	<b>2395</b>	<b>563,9</b>	<b>511,4</b>	<b>475,1</b>	<b>429,8</b>	<b>299,6</b>	<b>250,9</b>	<b>298,8</b>	<b>250,5</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich/weiblich</b>					<b>1,1</b>		<b>1,1</b>		<b>1,2</b>		<b>1,2</b>	


Standard	Standardisierte Inzidenz				Standardisierte Mortalität			
	mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	368,2	259,5	311,9	221,8	190,8	106,7	190,4	106,6
Europastandard	535,4	362,0	451,4	307,3	288,1	158,8	287,3	158,6
BRD-87	676,0	436,8	565,9	368,0	377,3	204,4	376,0	204,1
Truncated	549,1	463,9	472,1	398,7	253,6	156,6	253,5	156,5

Altersklasse	Kumulative Inzidenz				Kumulative Mortalität			
	mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	0,18	0,21	0,16	0,21	0,07	0,02	0,07	0,02
35 - 64	18,80	15,08	16,13	12,93	8,77	5,35	8,76	5,34
0 - 74	43,11	28,88	36,40	24,65	21,27	11,71	21,23	11,71


Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit				Mittleres Erkrankungs- alter		"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230-234	
	mit 173		ohne 173		mit 173	ohne 173	mit 232	ohne 232
	HV	DCO	HV	DCO				
männlich	87,5	7,7	85,2	9,1	65,0	65,0	60,0	33,0
weiblich	87,5	7,9	85,4	9,4	68,0	68,0	220,0	188,0

## 4 b) Bösartige Neubildungen insgesamt 1992


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentualer Anteil der histologisch gesicherten und der DCO-Fälle an der Gesamtzahl 1971-1992



5a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	1,2	0,9	1,2	1,4	1,6	1,5	1,1	1,6	2,0	1,7
141	Zunge	3,9	3,0	4,0	4,4	7,3	4,6	3,5	4,6	5,0	9,4
142	Hauptspeicheldrüsen	1,6	1,1	1,6	2,0	1,7	0,7	0,5	0,8	0,9	0,5
144	Mundboden	2,1	1,6	2,1	2,4	3,6	1,3	1,0	1,3	1,5	2,4
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,4	1,0	1,4	1,6	1,8	2,4	1,8	2,4	2,6	4,5
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	4,6	3,6	4,6	5,1	9,0	6,0	4,6	6,2	6,7	11,7
150	Speiseröhre	6,6	4,9	7,1	8,9	8,1	7,4	5,3	7,7	9,2	10,3
151	Magen	33,0	23,4	35,1	46,2	31,0	31,9	21,9	33,8	45,3	27,2
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,7	0,5	0,7	0,9	1,1	0,5	0,3	0,5	0,7	0,6
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	27,5	19,9	30,1	39,6	26,3	32,0	21,8	33,2	44,1	28,8
154	Mastdarm	29,1	20,1	30,3	39,9	26,4	27,6	18,7	28,2	37,6	25,2
155	Leber	4,5	3,0	4,4	5,7	3,7	5,2	3,7	5,2	6,2	5,7
156	Gallenblase und Gallenwege	3,5	2,5	3,8	5,2	2,2	3,6	2,5	3,7	4,8	3,5
157	Bauchspeicheldrüse	9,2	6,7	9,7	12,2	10,0	11,2	7,8	12,0	15,9	10,2
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,6	0,5	0,8	1,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,1	0,7	1,2	1,6	0,6	1,6	1,3	2,1	2,7	1,6
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,7	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	0,9	1,2	1,6	1,9
161	Kehlkopf	10,3	7,9	11,0	12,9	17,4	8,8	6,4	9,1	10,8	12,5
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	100,1	71,7	104,5	131,1	109,0	97,8	68,3	100,4	126,7	101,0
163	Rippenfell	0,9	0,6	0,9	1,1	0,7	0,7	0,6	0,8	1,0	1,1
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,8	0,6	0,9	1,1	0,7	0,9	0,7	0,9	1,1	1,6
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
170	Knochen	1,6	1,3	1,5	1,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,0	2,6	3,3	3,6	5,0	3,3	2,5	3,4	3,8	5,0
172	Melanome der Haut	4,3	3,4	4,5	5,0	7,0	5,6	4,3	5,5	6,0	8,4
173	Sonstige Haut	26,5	19,9	29,3	36,2	32,1	41,9	29,3	44,0	57,2	39,4
175	männliche Brustdrüse	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7	0,9	1,1	1,5
185	Prostata	44,7	30,2	48,3	68,3	21,4	42,8	27,3	44,0	64,1	20,6
186	Hoden	5,4	5,1	5,2	5,4	6,1	5,8	5,3	5,4	5,8	5,5
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	0,9	0,6	0,9	1,1	0,9	1,5	1,0	1,6	2,2	1,0
188	Harnblase	27,1	19,2	28,6	36,8	25,7	33,4	23,2	34,1	43,9	30,9
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	11,8	9,3	12,6	14,9	17,7	14,7	10,8	15,1	17,8	21,1
189.0	Niere	10,2	8,2	10,9	12,6	16,1	12,2	9,0	12,6	14,6	18,1
190	Auge	0,6	0,6	0,7	0,8	0,3	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	7,8	6,2	7,9	8,5	13,8	6,9	6,0	7,1	7,5	8,3
193	Schilddrüse	1,5	1,2	1,5	1,8	2,4	2,3	1,8	2,4	2,8	4,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,3	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	20,2	14,4	21,2	27,3	21,4	25,5	17,9	27,4	36,5	21,5
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	7,7	6,2	8,0	9,4	9,0	8,4	6,7	8,7	10,3	11,2
201	Lymphogranulomatose	3,4	2,9	3,3	3,5	3,5	3,2	2,8	3,2	3,6	3,4
203	Multiples Myelom	2,7	1,9	2,8	3,6	3,2	4,0	3,0	4,2	4,9	4,2
204	Lymphatische Leukämie	4,3	3,6	4,7	5,7	3,1	5,2	4,5	5,7	6,6	5,3
205	Myeloische Leukämie	2,8	2,3	2,8	3,2	3,4	2,3	1,7	2,3	3,0	3,1
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,4	1,9	2,6	3,2	3,0	3,0	2,3	3,0	3,9	1,8
	Insgesamt ohne ICD 173	396,4	288,7	417,7	530,1	413,3	418,3	296,4	432,0	552,3	421,0
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>422,9</b>	<b>308,6</b>	<b>447,0</b>	<b>566,3</b>	<b>445,4</b>	<b>460,2</b>	<b>325,7</b>	<b>476,0</b>	<b>609,5</b>	<b>460,4</b>

noch: 5a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (männlich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1992				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	2,5	1,6	2,5	3,5	1,6	1,3	0,9	1,3	1,6	1,6	1,8	1,1	1,6	2,2	1,7
141	5,6	4,1	5,5	5,9	10,8	6,1	4,3	5,8	6,5	10,5	5,1	3,7	4,9	5,2	9,8
142	1,3	0,9	1,3	1,5	1,5	1,0	0,7	0,9	1,1	1,7	1,0	0,7	0,8	1,0	0,7
144	3,4	2,6	3,4	3,6	6,7	4,6	3,3	4,3	4,6	9,2	4,4	3,2	4,2	4,6	9,7
143 + 145	3,3	2,5	3,3	3,5	6,4	2,7	1,9	2,6	2,7	4,5	2,9	2,0	2,7	2,9	5,1
146 - 149	8,2	6,0	8,0	8,9	14,3	8,5	6,3	8,1	8,6	16,9	10,9	7,9	10,5	11,3	21,5
150	8,2	5,8	8,1	9,4	13,5	8,8	6,1	8,5	9,9	13,6	8,5	5,9	8,2	9,3	13,0
151	30,1	20,8	31,4	40,8	28,4	28,4	18,3	27,7	37,1	24,4	25,4	16,1	24,2	31,8	21,4
152	1,1	0,7	1,1	1,5	1,1	1,2	0,8	1,2	1,4	1,3	1,2	0,7	1,1	1,5	1,2
153	34,9	23,4	35,4	47,1	28,7	34,0	22,0	33,9	45,9	23,9	40,8	26,0	39,6	51,7	32,9
154	25,6	17,0	25,9	34,2	21,2	25,7	16,6	24,8	32,0	26,9	26,2	16,8	24,8	30,9	26,2
155	7,2	4,9	7,0	8,8	8,2	5,2	3,3	5,0	6,5	5,0	6,9	4,4	6,3	7,9	6,2
156	6,0	3,9	6,1	8,3	5,3	4,3	2,8	4,3	5,8	3,0	5,1	3,2	5,1	6,9	3,1
157	11,3	7,6	11,5	15,1	12,1	11,7	7,4	11,2	14,8	10,3	9,8	6,3	9,5	12,4	9,0
158	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,8	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
159	1,8	1,4	2,2	2,9	1,4	1,5	1,0	1,6	2,1	0,7	0,7	0,5	0,8	1,0	0,3
160	0,7	0,5	0,6	0,7	1,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,8	0,6	0,7	0,9	1,2
161	10,1	7,1	9,8	11,2	17,1	11,6	7,8	11,0	12,6	16,7	11,7	8,0	11,2	12,8	18,0
162	103,6	70,9	103,7	129,9	116,5	103,6	68,0	100,2	127,6	102,7	101,2	65,9	96,0	118,8	100,4
163	1,4	1,0	1,4	1,9	1,3	0,7	0,4	0,6	0,9	0,8	1,5	1,1	1,6	2,0	2,0
164	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,4	0,5	0,6	0,1
165	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
170	1,7	1,5	1,5	1,8	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,1	1,3	1,4	1,6
171	3,0	2,4	3,1	3,5	4,0	2,6	2,0	2,6	2,8	4,1	2,1	1,7	2,0	2,1	2,1
172	7,0	5,3	6,9	7,6	10,7	8,2	6,0	7,7	8,5	11,7	7,3	5,1	6,8	7,8	10,0
173	61,9	43,0	63,4	81,1	64,3	72,2	48,1	71,7	91,1	68,5	83,4	54,6	80,9	104,2	74,7
175	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,7	0,8	0,5	0,8	1,1	0,8
185	47,2	30,5	48,7	69,0	21,8	42,6	26,7	42,8	60,6	18,9	58,3	36,1	57,7	81,0	27,6
186	7,4	6,4	6,6	7,0	6,8	6,9	5,8	6,1	6,5	5,9	7,8	6,8	6,9	7,2	7,1
187	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4	0,9	0,6	0,9	1,2	0,8	1,5	1,0	1,5	1,9	1,8
188	33,6	22,9	34,0	43,9	30,4	30,5	20,0	29,9	38,6	25,0	35,6	22,6	34,0	44,5	29,4
189	13,5	9,6	13,4	16,1	17,7	14,1	9,8	13,9	16,4	17,3	19,1	12,8	18,0	21,4	22,2
189.0	11,9	8,6	11,9	14,2	16,0	12,1	8,5	11,9	13,8	15,4	17,6	11,9	16,5	19,5	21,6
190	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6
191 + 192	6,9	5,8	6,9	7,4	8,2	7,5	6,0	7,3	8,2	8,3	5,9	4,7	5,6	6,2	7,3
193	2,4	1,8	2,3	2,6	3,7	2,0	1,5	1,9	2,2	2,5	3,0	2,1	2,7	3,1	4,4
194	1,0	0,9	1,1	1,1	0,9	1,4	1,5	1,5	1,4	1,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
195 - 199	21,2	14,3	21,8	29,4	19,5	19,9	12,6	19,7	26,9	15,3	22,1	14,2	21,4	27,7	21,6
200 + 202	8,6	6,4	8,4	9,9	11,0	9,5	7,1	9,2	10,9	12,3	13,0	9,6	12,5	15,2	14,6
201	3,5	2,8	3,4	3,7	4,9	2,2	1,8	2,0	2,3	2,1	3,0	2,5	2,9	3,3	2,6
203	2,3	1,7	2,4	2,6	3,0	4,2	2,7	4,1	5,4	3,7	3,2	2,0	3,0	4,2	2,1
204	4,9	4,4	5,3	6,1	4,5	4,9	4,1	5,1	6,1	4,1	5,0	3,9	4,9	5,9	4,6
205	3,9	3,1	3,9	4,5	5,2	5,8	4,2	5,7	6,9	5,8	5,3	3,8	5,0	6,1	5,1
206 - 208	2,3	1,6	2,2	2,9	1,9	1,5	1,0	1,5	2,1	0,9	1,2	0,8	1,3	1,7	0,5
Insg. ohne ICD 173	439,8	306,6	443,3	561,3	456,2	429,0	287,8	418,2	532,2	417,7	463,3	307,0	444,0	559,1	450,2
<b>Insgesamt</b>	<b>501,7</b>	<b>349,6</b>	<b>506,7</b>	<b>642,4</b>	<b>520,5</b>	<b>501,2</b>	<b>335,9</b>	<b>489,9</b>	<b>623,3</b>	<b>486,2</b>	<b>546,7</b>	<b>361,6</b>	<b>524,9</b>	<b>663,3</b>	<b>524,9</b>

### 5b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
141	Zunge	1,2	0,8	1,1	1,3	1,9	0,8	0,5	0,7	0,8	1,0
142	Hauptspeicheldrüsen	0,9	0,5	0,7	0,8	0,9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9
144	Mundboden	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,2	0,9	1,1	1,2	2,4	1,4	0,8	1,1	1,4	2,1
150	Speiseröhre	1,7	0,7	1,1	1,7	0,7	1,4	0,7	1,1	1,4	1,1
151	Magen	24,5	11,4	17,7	24,1	12,9	27,2	12,0	18,8	25,4	13,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	33,1	16,3	24,4	32,3	22,9	38,2	17,6	26,3	34,4	23,4
154	Mastdarm	23,6	11,9	17,6	22,6	18,0	25,1	12,5	18,3	22,7	20,1
155	Leber	4,7	2,4	3,5	4,6	3,3	3,1	1,7	2,3	2,9	2,1
156	Gallenblase und Gallenwege	11,1	5,1	7,9	10,4	5,4	14,0	5,7	9,0	12,7	5,1
157	Bauchspeicheldrüse	7,8	3,5	5,4	7,3	3,7	9,6	4,0	6,4	8,8	5,1
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,5	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,8	0,8	1,4	2,1	0,3	2,2	0,8	1,3	2,1	0,6
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
161	Kehlkopf	0,8	0,6	0,8	0,9	1,6	0,5	0,4	0,5	0,5	1,0
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	12,1	6,3	9,3	11,5	10,7	12,8	6,7	9,5	11,6	12,7
163	Rippenfell	0,9	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,2	0,4	0,6	0,3
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	1,2	0,9	1,0	1,2	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8	0,3
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,1	2,0	2,6	3,1	3,2	3,4	2,5	3,0	3,2	3,4
172	Melanome der Haut	5,9	4,4	5,4	5,9	8,3	6,8	4,8	6,1	6,8	9,9
173	Sonstige Haut	26,1	13,5	20,2	25,8	19,8	37,2	18,0	27,0	34,6	28,2
174	Brustdrüse	84,6	52,9	72,2	82,3	117,9	93,7	56,8	77,1	88,2	123,6
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	1,9	0,8	1,2	1,5	1,2	2,6	1,1	1,8	2,4	1,3
180	Gebärmutterhals	20,5	13,8	18,1	20,1	30,2	16,3	11,1	14,3	15,7	23,1
181	Plazenta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
182	Gebärmutter	23,9	13,9	19,5	22,5	28,3	25,6	13,5	19,3	22,8	25,3
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	13,5	8,0	11,1	13,2	15,9	17,4	10,5	14,1	16,1	20,9
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	5,0	2,4	3,7	5,1	3,5	4,7	2,1	3,3	4,4	2,7
188	Harnblase	6,4	3,2	4,7	6,0	4,5	10,9	5,2	7,8	9,9	7,1
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	6,4	4,1	5,3	5,9	7,0	9,1	5,0	6,9	8,2	9,2
189.0	Niere	5,4	3,5	4,5	5,0	5,8	7,7	4,4	6,0	7,0	8,6
190	Auge	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	1,0	0,7	0,8	0,9	0,8
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,7	5,3	6,2	6,4	9,6	6,1	5,0	5,8	6,0	8,6
193	Schilddrüse	5,2	3,7	4,7	5,4	6,2	6,0	4,1	5,2	5,9	8,8
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,7	0,6	0,7	0,7	1,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	23,9	11,9	18,0	23,5	16,6	27,6	12,3	18,8	25,5	14,9
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	5,4	3,2	4,3	5,0	5,3	8,2	5,1	6,5	7,6	8,8
201	Lymphogranulomatose	1,8	1,4	1,6	1,9	1,5	2,1	1,7	1,8	2,1	1,9
203	Multiples Myelom	2,8	1,4	2,0	2,6	1,7	3,6	1,9	2,8	3,3	3,7
204	Lymphatische Leukämie	2,4	1,7	2,1	2,4	1,7	2,6	1,7	2,1	2,5	1,4
205	Myeloische Leukämie	3,1	2,0	2,6	3,1	1,9	3,5	2,2	2,9	3,4	3,5
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,5	1,8	2,2	2,4	2,7	2,3	1,5	1,8	2,2	1,7
	Insgesamt ohne ICD 173	354,8	202,4	283,9	344,0	357,5	395,7	215,6	302,2	366,9	373,3
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>380,9</b>	<b>215,9</b>	<b>304,1</b>	<b>369,8</b>	<b>377,3</b>	<b>432,9</b>	<b>233,6</b>	<b>329,2</b>	<b>401,5</b>	<b>401,5</b>

noch: 5b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (weiblich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1992				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
141	0,9	0,5	0,7	0,9	1,2	0,9	0,5	0,7	0,8	1,2	1,3	0,6	0,9	1,1	1,4
142	0,8	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	1,0	0,4	0,6	0,8	0,5
144	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	1,1	0,9	0,6	0,8	0,8	1,8
143 + 145	0,8	0,5	0,7	0,7	1,2	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	1,4	0,7	1,0	1,2	1,2
146 - 149	1,3	0,7	1,1	1,2	1,0	1,7	1,2	1,5	1,6	2,8	2,2	1,4	1,8	2,0	3,4
150	1,9	0,8	1,3	1,7	1,3	2,0	0,9	1,4	1,7	1,6	1,6	0,7	1,0	1,3	1,3
151	26,9	11,1	17,2	23,5	12,4	24,1	9,8	15,0	20,1	12,0	21,1	8,1	12,4	17,0	8,7
152	1,5	0,6	0,9	1,2	0,8	0,9	0,4	0,6	0,8	1,0	1,4	0,6	0,9	1,1	0,6
153	44,1	20,0	29,7	38,5	28,0	43,5	18,3	27,5	36,3	23,1	45,9	19,1	28,6	37,3	26,4
154	21,7	9,9	14,8	18,9	15,4	22,3	10,1	14,8	19,0	15,7	23,5	10,3	15,3	19,5	16,5
155	3,3	1,5	2,2	2,8	2,1	4,0	1,5	2,4	3,3	1,8	3,5	1,6	2,3	2,9	1,6
156	13,6	5,6	8,5	11,5	7,7	14,7	5,4	8,5	11,9	4,2	10,3	4,0	6,2	8,2	4,7
157	10,5	4,2	6,6	8,9	4,7	11,6	4,6	7,1	9,6	5,9	10,1	3,8	5,9	8,0	4,4
158	0,7	0,4	0,5	0,6	0,8	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	1,0	0,5	0,7	0,9	0,6
159	2,0	0,6	1,1	1,7	0,5	1,6	0,6	0,9	1,3	0,4	2,1	0,6	1,1	1,6	0,4
160	0,7	0,4	0,5	0,6	1,1	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
161	1,3	0,8	1,2	1,2	2,3	1,2	0,6	0,8	1,0	1,0	0,9	0,6	0,8	0,8	1,4
162	14,0	6,9	10,0	12,3	11,9	17,7	8,5	12,3	15,1	15,5	20,0	10,3	14,5	17,3	20,1
163	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	1,0	0,5	0,7	0,8	1,0
164	0,5	0,4	0,5	0,5	0,9	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
165	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
170	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,7	0,4	0,5	0,6	0,3	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
171	3,0	2,0	2,4	2,8	3,2	1,6	1,1	1,3	1,5	1,4	2,5	1,9	2,2	2,3	2,5
172	8,5	5,8	7,3	8,2	11,7	9,8	6,4	8,1	9,1	11,2	8,1	5,3	6,7	7,5	10,8
173	53,5	25,3	37,2	47,1	38,9	68,6	30,6	45,1	57,7	43,8	77,6	35,3	51,4	65,3	56,1
174	97,2	57,0	77,4	89,1	124,4	95,5	55,0	74,8	85,7	121,6	108,5	62,4	84,8	97,0	135,3
179	2,7	1,1	1,6	2,4	1,4	3,0	1,3	2,0	2,5	2,0	2,4	1,2	1,7	2,0	1,8
180	16,7	10,9	14,2	15,5	22,6	15,3	10,3	13,2	14,3	22,7	15,7	11,0	13,9	14,8	26,5
181	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
182	28,2	14,5	20,4	24,4	25,4	20,9	10,6	15,0	17,8	19,7	26,3	12,9	18,5	22,1	22,7
183	16,3	9,2	12,6	14,7	17,5	16,8	8,8	12,2	14,6	15,8	17,2	8,8	12,3	14,5	14,9
184	5,5	2,2	3,4	4,8	2,5	4,6	1,9	2,9	3,9	2,4	4,6	2,0	3,0	3,8	2,4
188	10,0	4,2	6,3	8,4	4,3	10,1	4,2	6,5	8,5	6,0	12,4	5,1	7,6	9,9	5,4
189	11,2	6,0	8,3	9,9	9,2	8,1	4,3	5,9	6,9	6,8	12,0	6,2	8,6	10,4	11,6
189.0	9,9	5,5	7,6	8,8	8,8	7,5	4,0	5,5	6,4	6,7	10,7	5,6	7,8	9,3	11,1
190	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
191 + 192	6,1	5,7	6,1	5,9	6,6	7,0	5,7	6,5	6,6	9,3	6,1	4,4	5,2	5,5	7,1
193	5,6	3,7	4,7	5,3	6,4	5,0	3,3	4,1	4,6	6,0	5,5	3,5	4,5	5,1	6,9
194	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	0,6	0,7	0,7	1,1	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
195 - 199	21,2	9,1	14,0	18,5	10,9	20,3	7,9	12,4	16,7	8,7	19,0	8,0	12,0	15,7	11,2
200 + 202	7,6	4,5	5,8	6,8	6,8	6,9	3,4	4,7	5,9	5,4	12,1	7,0	9,2	10,7	12,1
201	2,4	1,9	2,1	2,3	2,1	2,0	1,7	1,8	1,9	2,4	2,1	2,0	2,0	2,2	1,8
203	3,0	1,4	2,0	2,6	2,0	4,6	2,1	3,0	3,9	3,4	4,1	1,8	2,6	3,3	2,7
204	3,5	2,3	2,8	3,2	1,9	4,1	2,2	2,9	3,5	2,2	3,8	2,8	3,2	3,4	2,9
205	3,5	2,0	2,6	3,1	3,1	3,3	1,8	2,3	3,0	2,6	4,2	2,6	3,2	3,8	4,0
206 - 208	2,6	1,2	1,8	2,3	1,0	1,9	0,9	1,3	1,7	0,8	1,7	0,7	1,0	1,4	0,8
Insg. ohne ICD 173	404,2	211,8	296,2	360,4	360,1	393,2	198,8	278,9	340,2	342,1	420,0	215,6	300,0	360,5	382,1
<b>Insgesamt</b>	<b>457,7</b>	<b>237,1</b>	<b>333,4</b>	<b>407,5</b>	<b>399,0</b>	<b>461,8</b>	<b>229,4</b>	<b>324,0</b>	<b>397,9</b>	<b>385,9</b>	<b>497,6</b>	<b>250,9</b>	<b>351,4</b>	<b>425,8</b>	<b>438,2</b>

6a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0
141	Zunge	1,4	1,1	1,5	1,7	3,0	1,9	1,4	1,9	2,2	3,8
142	Hauptspeicheldrüsen	0,5	0,4	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,5	0,6	0,3
144	Mundboden	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	1,0	1,1	1,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	2,8	2,0	2,8	3,2	4,7	3,6	2,8	3,8	4,2	6,1
150	Speiseröhre	7,7	5,9	8,5	10,7	10,0	6,5	4,7	6,8	8,4	8,0
151	Magen	25,8	17,9	27,9	37,9	19,4	28,0	18,7	29,5	41,5	19,0
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,3	0,4	0,6	0,5
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	20,6	14,5	23,0	32,1	14,4	21,8	14,6	23,1	32,0	15,6
154	Mastdarm	15,6	10,5	16,4	22,8	10,9	13,7	9,4	14,3	19,7	10,6
155	Leber	3,0	2,0	3,0	3,9	2,0	5,4	3,7	5,4	6,8	5,3
156	Gallenblase und Gallenwege	3,2	2,2	3,4	4,8	1,6	3,9	2,7	4,2	5,6	3,2
157	Bauchspeicheldrüse	9,4	7,0	10,0	12,4	11,9	11,5	7,8	11,9	15,8	11,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,5	0,4	0,7	0,9	0,2	0,7	0,5	0,8	1,0	0,9
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,0	2,0	3,1	4,1	1,8	2,8	1,8	3,2	4,9	0,9
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
161	Kehlkopf	5,3	3,7	5,4	7,1	6,7	4,8	3,1	4,7	6,2	4,6
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	96,0	68,1	100,3	127,9	98,5	91,3	62,7	93,3	120,9	84,7
163	Rippenfell	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,8
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,7	0,5	0,7	0,9	0,3	0,5	0,4	0,6	0,7	0,7
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
170	Knochen	2,0	1,5	2,0	2,6	1,8	1,5	1,1	1,4	1,7	2,1
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,1	1,0	1,2	1,4	1,3	2,1	1,6	2,1	2,4	2,8
172	Melanome der Haut	1,7	1,3	1,7	2,0	3,2	1,7	1,2	1,8	2,1	2,3
173	Sonstige Haut	0,7	0,5	1,0	1,6	0,2	0,7	0,4	0,7	1,1	0,4
175	männliche Brustdrüse	0,5	0,3	0,6	0,8	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
185	Prostata	22,5	15,2	26,2	39,1	6,3	20,6	12,8	22,1	33,8	4,9
186	Hoden	1,1	1,0	1,1	1,2	0,9	1,5	1,3	1,3	1,5	0,9
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	0,5	0,3	0,5	0,7	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
188	Harnblase	10,2	7,2	11,2	15,4	6,4	8,2	5,4	8,4	11,8	4,4
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	6,9	5,2	7,2	8,5	8,7	9,9	7,1	10,5	13,4	12,0
189.0	Niere	6,4	4,9	6,7	7,9	8,6	6,5	4,7	6,7	8,2	9,7
190	Auge	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,1	5,0	6,2	6,7	9,9	4,2	3,5	4,4	4,7	5,9
193	Schilddrüse	0,9	0,7	1,0	1,3	1,2	0,9	0,7	0,9	1,1	0,7
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	16,7	12,1	17,7	22,7	17,4	21,8	14,9	22,8	31,4	16,0
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	3,3	2,6	3,4	3,9	3,5	4,6	3,4	4,8	6,1	5,6
201	Lymphogranulomatose	2,1	1,7	2,2	2,5	2,9	1,3	1,0	1,4	1,6	1,3
203	Multiples Myelom	1,3	0,8	1,3	2,0	0,8	2,6	1,9	2,8	3,4	1,7
204	Lymphatische Leukämie	1,9	1,5	2,1	2,5	1,6	2,7	2,2	2,7	3,4	1,6
205	Myeloische Leukämie	2,5	1,8	2,5	3,1	3,0	2,3	1,7	2,2	2,8	2,3
206 - 208	Sonstige Leukämien	3,5	2,9	3,6	4,1	3,8	2,7	2,0	2,8	3,6	2,1
	Insgesamt ohne ICD 173	282,5	202,0	301,5	394,8	261,8	288,6	198,7	299,6	399,3	245,9
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>283,2</b>	<b>202,5</b>	<b>302,5</b>	<b>396,4</b>	<b>262,0</b>	<b>289,3</b>	<b>199,1</b>	<b>300,3</b>	<b>400,4</b>	<b>246,3</b>

noch: 6a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (männlich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1992				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-	-	0,6	0,3	0,6	0,9	0,3
141	2,7	1,9	2,6	2,9	4,9	2,5	1,8	2,4	2,7	3,6	3,3	2,3	3,2	3,5	6,0
142	0,7	0,5	0,7	1,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
144	1,2	0,9	1,2	1,3	2,4	1,8	1,2	1,7	1,9	2,9	2,3	1,6	2,2	2,4	3,8
143 + 145	0,7	0,5	0,7	0,8	1,3	1,0	0,7	1,0	1,0	1,8	0,6	0,4	0,6	0,8	0,8
146 - 149	4,3	3,3	4,3	4,6	8,2	6,3	4,4	6,0	6,7	11,1	6,5	4,6	6,2	7,2	10,7
150	8,3	6,0	8,5	10,0	12,3	9,2	6,2	8,9	10,6	12,5	9,6	6,6	9,2	10,8	13,8
151	23,0	15,3	24,3	33,1	15,8	20,9	13,0	20,5	28,9	15,2	20,6	12,8	20,1	27,9	13,6
152	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,6	0,3
153	20,8	13,6	21,8	30,6	13,8	24,3	15,1	24,0	33,9	17,0	24,5	15,2	24,4	33,5	13,0
154	12,3	8,3	13,0	17,4	9,0	11,6	7,3	11,5	15,9	8,4	13,5	8,5	13,1	17,2	11,3
155	5,8	3,9	5,7	7,3	6,2	4,6	3,0	4,5	5,9	3,8	5,5	3,5	5,3	6,8	4,1
156	4,5	2,9	4,5	6,4	2,7	3,3	2,2	3,4	4,5	1,7	4,1	2,6	4,1	5,5	2,9
157	12,9	8,5	12,9	17,2	14,4	13,2	8,7	12,9	16,7	11,6	10,2	6,4	9,9	13,5	8,2
158	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
159	2,5	1,8	3,0	4,2	1,1	2,4	1,4	2,5	3,8	0,2	2,2	1,3	2,2	3,1	0,8
160	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
161	5,4	3,6	5,3	6,7	6,7	5,0	3,4	4,9	5,8	6,4	6,2	4,0	5,9	7,1	7,9
162	102,7	69,4	103,3	131,9	104,1	98,4	64,1	97,5	124,3	86,8	99,9	64,0	94,8	121,8	90,7
163	1,1	0,8	1,1	1,4	1,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,9	0,8	0,6	1,0	1,2	0,7
164	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,9	0,6	0,8	1,0	0,9	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7
171	1,3	0,9	1,3	1,5	1,4	1,2	1,0	1,3	1,3	1,7	2,2	1,5	2,1	2,5	3,0
172	2,5	1,7	2,3	2,8	3,3	2,4	1,8	2,4	2,6	3,0	3,0	2,0	2,8	3,3	4,4
173	0,6	0,4	0,7	0,9	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,3	0,6	0,9	0,1
175	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
185	24,1	14,8	25,7	39,7	4,9	22,8	13,7	23,3	35,4	6,3	23,3	13,8	24,3	37,2	5,4
186	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7
187	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5
188	11,7	7,2	11,5	16,8	6,3	11,2	7,1	11,4	16,4	5,1	10,0	6,2	10,1	14,4	3,6
189	9,6	6,5	9,7	13,1	7,9	8,8	5,9	8,6	10,8	8,8	10,2	6,5	9,9	12,8	8,6
189.0	7,5	5,3	7,6	9,9	7,0	7,5	5,1	7,4	9,1	7,7	7,7	5,0	7,4	9,3	7,1
190	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	5,2	4,2	5,2	5,8	6,7	4,5	3,8	4,5	4,8	5,2	4,7	3,7	4,6	4,9	6,2
193	1,3	0,9	1,3	1,6	2,1	0,9	0,6	0,9	1,1	0,5	1,1	0,8	1,1	1,3	1,2
194	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
195 - 199	21,6	14,6	22,6	30,1	18,4	21,7	13,8	21,5	29,5	18,0	20,7	13,0	20,2	27,2	16,9
200 + 202	5,2	3,6	5,1	6,6	5,2	5,4	3,7	5,4	6,9	5,0	5,8	3,7	5,6	7,4	5,0
201	1,1	0,8	1,1	1,3	1,2	1,0	0,7	0,9	1,2	1,0	1,0	0,7	0,9	1,1	1,1
203	0,7	0,5	0,7	0,9	0,8	3,0	1,8	2,8	4,0	2,6	3,5	2,2	3,4	4,6	2,2
204	3,0	2,4	3,2	3,9	2,6	2,0	1,5	1,9	2,5	2,0	2,2	1,5	2,2	2,9	1,6
205	2,5	1,8	2,5	2,9	3,8	4,1	2,8	3,9	4,9	3,9	4,2	3,1	4,1	4,8	4,6
206 - 208	2,7	2,1	2,7	3,6	1,8	2,4	1,8	2,5	3,2	1,1	1,5	1,0	1,5	2,1	0,5
Insg. ohne ICD 173	305,3	206,5	311,6	412,1	275,0	300,2	195,5	295,4	392,5	251,2	307,1	196,8	298,6	393,4	256,7
<b>Insgesamt</b>	<b>305,9</b>	<b>206,9</b>	<b>312,3</b>	<b>413,0</b>	<b>275,3</b>	<b>300,6</b>	<b>195,8</b>	<b>295,9</b>	<b>393,1</b>	<b>251,5</b>	<b>307,6</b>	<b>197,1</b>	<b>299,2</b>	<b>394,3</b>	<b>256,8</b>

6b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-
141	Zunge	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6
142	Hauptspeicheldrüsen	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
144	Mundboden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,6	0,5	0,6	0,7	1,4	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
150	Speiseröhre	1,8	0,7	1,2	1,7	0,8	1,5	0,7	1,1	1,5	1,0
151	Magen	19,4	8,7	13,8	19,1	8,8	24,0	9,8	15,8	22,4	9,5
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	25,2	11,9	18,4	24,7	15,2	25,9	11,2	17,5	24,0	12,4
154	Mastdarm	13,8	6,9	10,5	13,6	10,5	12,9	5,9	9,0	11,9	7,0
155	Leber	4,0	2,0	3,0	4,0	3,3	3,8	2,0	2,7	3,4	2,1
156	Gallenblase und Gallenwege	11,2	5,2	7,9	10,4	6,1	11,7	4,9	7,6	10,5	6,1
157	Bauchspeicheldrüse	9,6	4,3	6,8	9,0	4,3	11,4	4,7	7,4	10,4	5,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,8	0,4	0,6	0,8	0,8	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,5	1,4	2,5	3,8	1,1	3,9	1,5	2,5	3,8	1,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
161	Kehlkopf	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	10,3	5,5	8,0	10,1	9,5	12,9	6,4	9,4	11,7	10,2
163	Rippenfell	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
170	Knochen	1,2	0,8	1,0	1,2	0,4	0,8	0,5	0,7	0,8	0,4
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,4	1,6	2,1	2,4	2,1	1,5	0,9	1,1	1,3	0,7
172	Melanome der Haut	1,5	1,0	1,3	1,5	1,9	1,6	0,9	1,2	1,4	1,1
173	Sonstige Haut	1,1	0,5	0,9	1,3	0,1	1,0	0,4	0,7	1,0	0,0
174	Brustdrüse	37,0	21,4	30,2	35,7	44,3	39,2	21,8	31,0	36,4	45,3
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	4,0	2,0	2,9	3,9	3,0	6,9	3,2	4,8	6,2	4,0
180	Gebärmutterhals	7,8	4,6	6,4	7,5	9,3	6,2	3,7	4,9	5,8	6,4
181	Plazenta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
182	Gebärmutter	5,5	2,7	3,9	4,9	3,8	2,2	0,8	1,3	1,8	0,5
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	13,1	7,3	10,4	12,3	14,7	13,6	7,0	10,2	12,4	12,3
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	7,3	3,5	5,3	6,9	4,2	5,1	2,1	3,3	4,7	2,2
188	Harnblase	3,1	1,3	2,0	2,9	0,8	3,2	1,4	2,1	2,9	1,6
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	4,6	2,4	3,5	4,2	4,2	4,8	2,2	3,4	4,5	3,1
189.0	Niere	4,3	2,3	3,3	3,9	3,9	3,5	1,7	2,5	3,2	2,6
190	Auge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	5,1	3,5	4,4	4,7	6,7	3,8	3,0	3,6	3,6	5,2
193	Schilddrüse	2,2	1,3	1,9	2,3	2,6	2,4	1,1	1,6	2,1	1,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	19,6	9,2	14,2	19,1	11,2	23,4	9,7	15,6	21,9	9,7
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	1,9	1,0	1,5	1,7	1,7	2,9	1,7	2,3	2,7	1,9
201	Lymphogranulomatose	1,3	0,8	1,1	1,3	1,7	1,4	0,8	1,0	1,3	1,2
203	Multiples Myelom	1,6	0,8	1,1	1,4	1,0	2,2	1,0	1,5	1,9	1,0
204	Lymphatische Leukämie	1,5	1,1	1,4	1,5	1,3	2,1	1,1	1,6	2,0	1,3
205	Myeloische Leukämie	2,2	1,2	1,7	2,2	0,9	2,6	1,6	2,1	2,5	2,9
206 - 208	Sonstige Leukämien	3,2	2,4	2,8	3,2	2,7	2,8	1,6	2,1	2,6	1,8
	Insgesamt ohne ICD 173	229,5	119,4	175,0	222,0	183,4	244,4	115,5	171,6	222,6	163,0
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>230,6</b>	<b>119,9</b>	<b>175,9</b>	<b>223,3</b>	<b>183,5</b>	<b>245,4</b>	<b>115,9</b>	<b>172,3</b>	<b>223,6</b>	<b>163,0</b>

noch: 6b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1992 (weiblich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1992				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
141	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,4	0,5	0,9	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5
142	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
144	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5
143 + 145	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
146 - 149	0,8	0,5	0,6	0,7	1,2	1,1	0,7	0,9	1,0	1,7	1,3	0,8	1,1	1,2	2,1
150	2,4	1,0	1,6	2,0	1,5	2,1	0,9	1,4	1,7	1,5	1,9	0,7	1,2	1,5	0,9
151	21,5	8,2	13,1	18,6	8,1	19,2	7,3	11,6	15,9	7,3	17,9	6,6	10,3	14,3	7,9
152	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4
153	29,6	11,9	18,7	25,6	13,1	29,1	10,8	17,4	23,9	11,9	28,7	10,3	16,4	22,7	11,2
154	11,6	4,7	7,2	9,9	6,1	11,1	4,4	6,8	9,2	5,8	10,9	4,2	6,4	8,8	5,3
155	3,8	1,6	2,4	3,2	1,9	4,3	1,7	2,6	3,6	2,3	3,8	1,5	2,3	3,1	1,7
156	12,1	4,9	7,5	10,2	6,4	12,0	4,3	6,8	9,6	4,0	10,6	4,0	6,3	8,5	4,5
157	11,0	4,5	7,0	9,4	5,6	13,1	5,3	8,0	10,9	7,0	11,3	4,4	6,8	9,2	5,3
158	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6	0,2	0,4	0,5	0,4
159	3,8	1,3	2,2	3,3	0,7	3,2	1,0	1,7	2,5	0,6	3,6	1,2	1,9	2,7	1,0
160	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
161	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8
162	15,2	7,5	10,8	13,3	12,1	16,0	7,2	10,7	13,4	11,8	20,3	9,8	14,1	17,3	17,1
163	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,6
164	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,5	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
171	2,4	1,2	1,6	2,1	1,2	2,1	1,2	1,6	1,8	2,2	1,9	1,0	1,4	1,6	1,4
172	2,0	1,2	1,5	1,9	1,8	2,7	1,5	2,1	2,4	3,6	2,2	1,3	1,8	2,1	2,6
173	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,5	0,1	0,2	0,3	0,0
174	42,7	23,2	32,4	38,4	47,0	41,5	21,6	30,6	36,3	44,2	44,8	22,6	32,4	38,5	45,5
179	5,8	2,5	3,8	4,9	3,6	5,3	2,3	3,5	4,5	3,4	4,3	1,6	2,5	3,5	1,8
180	6,4	3,7	5,1	5,8	7,3	5,5	2,9	4,1	4,8	5,8	6,1	3,5	4,6	5,3	7,0
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	3,3	1,3	2,1	2,8	1,6	3,8	1,5	2,3	3,2	1,7	4,0	1,7	2,5	3,3	2,2
183	13,8	6,9	9,9	12,0	11,8	15,2	7,4	10,5	12,9	12,2	13,3	6,0	8,9	11,1	9,6
184	5,6	2,4	3,7	4,9	3,1	4,1	1,6	2,5	3,4	1,7	3,0	1,0	1,6	2,3	0,9
188	4,1	1,5	2,4	3,5	1,0	5,8	2,0	3,4	4,7	1,8	3,7	1,4	2,2	3,0	1,5
189	6,3	2,8	4,1	5,3	4,2	6,0	2,8	4,0	5,0	3,6	5,8	2,3	3,6	4,7	2,7
189.0	5,3	2,3	3,5	4,5	3,5	5,5	2,6	3,7	4,6	3,6	4,5	1,8	2,7	3,7	2,3
190	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
191 + 192	3,1	2,5	2,8	2,9	3,1	2,7	2,0	2,4	2,5	3,2	4,3	3,0	3,6	3,9	4,7
193	2,2	1,1	1,6	1,9	2,4	1,9	0,8	1,2	1,6	1,2	2,5	1,0	1,5	2,0	1,1
194	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3
195 - 199	21,8	8,8	13,9	19,0	9,6	21,9	8,2	13,0	18,0	8,5	20,4	7,5	11,9	16,2	7,8
200 + 202	4,8	2,3	3,3	4,2	4,0	5,0	1,9	2,9	4,1	2,3	4,6	1,9	2,9	3,8	2,6
201	1,1	0,8	1,0	1,1	1,9	1,0	0,6	0,8	0,9	0,9	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3
203	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	3,2	1,4	2,0	2,6	1,7	4,0	1,6	2,4	3,3	2,3
204	1,7	0,7	1,1	1,5	0,3	1,9	0,8	1,2	1,6	0,5	1,7	0,9	1,2	1,5	0,5
205	3,2	1,8	2,4	2,8	3,0	2,1	1,2	1,6	1,9	2,5	3,6	1,5	2,2	2,9	1,3
206 - 208	3,1	1,3	2,0	2,7	1,6	2,7	1,2	1,7	2,3	0,9	2,5	1,2	1,6	2,1	0,7
Insg. ohne ICD 173	255,5	114,2	169,1	217,8	168,7	259,4	108,9	162,4	210,4	159,8	248,1	107,2	159,0	204,4	157,7
<b>Insgesamt</b>	<b>255,9</b>	<b>114,4</b>	<b>169,4</b>	<b>218,2</b>	<b>168,9</b>	<b>259,9</b>	<b>109,1</b>	<b>162,7</b>	<b>210,8</b>	<b>159,9</b>	<b>248,6</b>	<b>107,3</b>	<b>159,2</b>	<b>204,7</b>	<b>157,7</b>

## 7a) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	1,7	1,0	1,6	2,2	1,6
141	Zunge	5,6	4,0	5,2	5,4	11,4
142	Hauptspeicheldrüsen	1,0	0,5	0,8	1,2	0,7
144	Mundboden	5,4	3,7	5,0	5,4	10,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	3,6	2,5	3,3	3,4	6,3
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	11,9	9,1	11,7	12,3	24,6
150	Speiseröhre	7,3	5,4	7,0	7,7	14,2
151	Magen	25,8	16,7	24,6	31,6	23,0
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	1,1	0,8	1,1	1,3	2,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	42,9	27,3	41,1	52,0	38,2
154	Mastdarm	25,7	16,3	23,9	29,1	26,8
155	Leber	6,5	4,1	6,0	7,4	6,3
156	Gallenblase und Gallenwege	5,2	3,2	5,4	7,2	3,5
157	Bauchspeicheldrüse	10,0	6,4	9,8	12,4	9,4
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,6	0,3	0,5	0,7	0,4
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,0	0,6	1,0	1,3	0,8
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,8	0,5	0,7	0,9	1,3
161	Kehlkopf	11,7	8,0	11,2	12,8	16,8
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	105,3	67,4	98,0	121,9	104,8
163	Rippenfell	0,8	0,7	1,0	1,1	1,7
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,2	0,1	0,2	0,2	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	1,1	1,1	1,2	1,3	1,8
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,9	2,4	2,8	2,9	3,8
172	Melanome der Haut	7,1	5,0	6,8	7,8	9,1
173	Sonstige Haut	88,8	56,3	84,0	110,1	77,0
175	männliche Brustdrüse	1,1	0,8	1,1	1,4	1,6
185	Prostata	64,3	39,1	62,8	89,3	31,6
186	Hoden	5,9	5,4	5,3	5,5	4,1
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	2,3	1,7	2,5	3,1	3,0
188	Harnblase	37,3	23,8	35,6	46,4	32,4
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	21,4	14,2	19,7	22,9	24,2
189.0	Niere	19,3	12,8	17,7	20,2	23,8
190	Auge	0,8	0,5	0,7	0,7	1,3
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,7	5,4	6,3	7,0	6,9
193	Schilddrüse	2,3	1,6	2,0	2,0	3,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	21,4	13,6	20,7	26,2	20,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	12,4	8,5	11,8	15,0	12,6
201	Lymphogranulomatose	2,3	1,8	2,1	2,4	1,3
203	Multiples Myelom	3,1	1,8	2,7	3,9	2,0
204	Lymphatische Leukämie	2,3	1,6	2,2	2,9	3,4
205	Myeloische Leukämie	5,4	4,1	5,2	6,3	3,8
206 - 208	Sonstige Leukämien	0,8	0,5	1,0	1,2	0,4
	Insgesamt ohne ICD 173	475,1	311,9	451,4	565,9	472,1
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>563,9</b>	<b>368,2</b>	<b>535,4</b>	<b>676,0</b>	<b>549,1</b>

**7b) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992 (weiblich)**

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
141	Zunge	1,4	0,9	1,2	1,3	2,3
142	Hauptspeicheldrüsen	1,1	0,5	0,7	0,9	1,1
144	Mundboden	0,9	0,7	0,9	0,9	2,4
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,3	0,6	0,8	1,1	0,9
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	3,4	2,0	2,6	3,0	4,9
150	Speiseröhre	1,4	0,6	0,9	1,2	1,1
151	Magen	22,1	8,1	12,7	17,3	8,5
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	1,4	0,7	1,0	1,2	0,7
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	44,9	18,7	27,9	36,1	25,2
154	Mastdarm	24,2	11,1	16,2	20,2	20,2
155	Leber	3,9	1,5	2,2	3,1	1,2
156	Gallenblase und Gallenwege	9,9	3,9	6,0	7,7	4,6
157	Bauchspeicheldrüse	10,4	3,9	6,0	8,4	3,9
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,1	0,2	0,3	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,2	1,0	1,8	2,4	0,8
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4
161	Kehlkopf	0,7	0,5	0,6	0,6	1,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	21,2	10,7	15,3	18,6	22,2
163	Rippenfell	1,1	0,5	0,7	0,9	0,7
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,4	0,2	0,2	0,2	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	0,9	1,0	1,0	1,1	0,4
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,4	2,6	3,0	3,0	4,4
172	Melanome der Haut	10,4	6,5	8,5	9,5	12,7
173	Sonstige Haut	81,6	37,7	54,7	68,8	65,2
174	Brustdrüse	110,0	63,8	86,5	99,5	141,6
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	1,1	0,6	0,9	0,9	1,5
180	Gebärmutterhals	15,1	10,6	13,5	14,4	27,3
181	Plazenta	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
182	Gebärmutter	26,0	12,7	18,2	21,5	21,5
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	20,1	10,4	14,4	16,7	16,7
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva usw.)	4,1	1,9	2,8	3,4	3,7
188	Harnblase	9,3	3,5	5,4	7,2	2,2
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	14,4	7,1	9,8	12,1	11,5
189.0	Niere	12,6	6,3	8,7	10,6	10,8
190	Auge	0,9	0,5	0,7	0,7	1,1
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,1	5,2	5,5	5,5	6,8
193	Schilddrüse	6,5	4,2	5,3	6,3	7,6
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntem Sitzes	19,0	7,8	11,8	15,3	10,8
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	12,2	7,1	9,2	10,9	12,8
201	Lymphogranulomatose	2,5	2,5	2,6	2,7	3,2
203	Multiples Myelom	3,9	1,8	2,6	3,1	2,9
204	Lymphatische Leukämie	3,8	2,2	2,7	3,0	1,9
205	Myeloische Leukämie	4,1	2,7	3,2	3,8	4,0
206 - 208	Sonstige Leukämien	1,6	0,5	0,8	1,1	0,5
	Insgesamt ohne ICD 173	429,8	221,8	307,3	368,0	398,7
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>511,4</b>	<b>259,5</b>	<b>362,0</b>	<b>436,8</b>	<b>463,9</b>

### 8a) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	-	-	-	-	-
141	Zunge	3,8	2,6	3,6	3,7	6,8
142	Hauptspeicheldrüsen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
144	Mundboden	2,9	1,9	2,7	3,1	4,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	5,4	4,0	5,2	5,8	11,0
150	Speiseröhre	10,1	7,3	9,9	11,1	16,9
151	Magen	19,7	12,2	19,0	26,3	12,9
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	25,1	15,4	24,5	33,5	13,4
154	Mastdarm	12,4	7,7	11,9	15,8	9,9
155	Leber	5,7	3,6	5,4	7,1	4,2
156	Gallenblase und Gallenwege	4,4	2,8	4,5	5,7	4,4
157	Bauchspeicheldrüse	10,0	6,5	10,0	13,4	8,8
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,2	0,1	0,1	0,3	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	2,7	1,6	2,6	4,0	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8
161	Kehlkopf	5,2	3,4	4,9	5,9	6,8
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	100,1	63,0	93,4	119,7	89,8
163	Rippenfell	0,8	0,5	0,9	1,1	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,6	0,4	0,5	0,5	0,8
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,7	1,1	1,6	2,0	0,9
172	Melanome der Haut	1,9	1,5	2,0	2,2	4,4
173	Sonstige Haut	0,8	0,4	0,8	1,3	-
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-
185	Prostata	19,1	11,1	19,5	30,4	4,3
186	Hoden	0,6	0,3	0,5	0,6	0,5
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	0,2	0,1	0,2	0,4	-
188	Harnblase	10,0	6,2	10,1	13,8	3,2
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	9,8	6,3	9,3	12,0	9,6
189.0	Niere	7,1	4,6	6,7	8,5	7,6
190	Auge	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	4,6	3,9	4,5	4,8	6,1
193	Schilddrüse	1,1	0,8	1,0	1,0	1,7
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	21,1	12,7	20,1	26,9	18,1
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	6,3	4,2	6,2	8,4	5,1
201	Lymphogranulomatose	0,6	0,4	0,5	0,5	0,9
203	Multiples Myelom	3,3	2,0	3,3	4,6	1,3
204	Lymphatische Leukämie	2,1	1,4	2,0	2,3	1,2
205	Myeloische Leukämie	4,8	3,7	4,7	5,7	3,5
206 - 208	Sonstige Leukämien	1,3	0,8	1,3	1,9	-
	Insgesamt ohne ICD 173	298,8	190,4	287,3	376,0	253,5
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>299,6</b>	<b>190,8</b>	<b>288,1</b>	<b>377,3</b>	<b>253,6</b>

8b) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	0,2	0,0	0,1	0,1	-
141	Zunge	0,5	0,5	0,6	0,6	1,5
142	Hauptspeicheldrüsen	0,4	0,1	0,2	0,2	-
144	Mundboden	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,0	0,1	0,1	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,4	0,9	1,2	1,3	2,2
150	Speiseröhre	1,6	0,6	1,0	1,2	0,4
151	Magen	19,4	7,3	11,2	15,4	10,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,2	0,0	0,1	0,2	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	28,5	10,4	16,3	22,3	11,3
154	Mastdarm	12,0	4,4	6,8	9,5	5,1
155	Leber	4,3	1,7	2,5	3,4	1,5
156	Gallenblase und Gallenwege	8,6	3,0	4,8	6,6	3,4
157	Bauchspeicheldrüse	11,5	4,6	7,0	9,4	5,8
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,1	0,2	0,3	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	4,1	1,3	2,1	3,0	0,8
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,1	0,1	-
161	Kehlkopf	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	20,8	10,8	15,2	18,3	21,0
163	Rippenfell	0,7	0,4	0,5	0,8	0,7
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,9	1,4	2,0	2,2	2,2
172	Melanome der Haut	2,0	1,5	1,8	2,0	2,6
173	Sonstige Haut	0,4	0,1	0,1	0,2	-
174	Brustdrüse	45,9	22,9	32,6	38,9	44,3
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	3,9	1,5	2,4	3,2	1,8
180	Gebärmutterhals	5,7	3,2	4,4	4,9	6,5
181	Plazenta	-	-	-	-	-
182	Gebärmutter	3,6	1,4	2,1	2,8	0,8
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	14,0	6,0	9,1	11,2	10,1
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva usw.)	2,2	0,8	1,3	1,8	1,1
188	Harnblase	2,2	0,8	1,3	1,7	1,1
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	6,5	2,4	3,8	5,1	2,6
189.0	Niere	5,6	2,0	3,2	4,4	2,3
190	Auge	0,2	0,0	0,1	0,1	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,9	2,7	3,1	3,3	3,0
193	Schilddrüse	2,7	1,1	1,6	2,2	1,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	21,7	7,6	12,1	16,8	7,2
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	4,1	1,8	2,6	3,5	2,6
201	Lymphogranulomatose	0,7	0,4	0,5	0,7	0,3
203	Multiples Myelom	3,8	1,4	2,2	3,1	1,9
204	Lymphatische Leukämie	1,3	0,5	0,8	1,0	-
205	Myeloische Leukämie	4,3	1,6	2,5	3,6	1,5
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,3	0,7	1,1	1,6	-
	Insgesamt ohne ICD 173	250,5	106,6	158,6	204,1	156,5
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>250,9</b>	<b>106,7</b>	<b>158,8</b>	<b>204,4</b>	<b>156,6</b>

## 9. "Kumulative") Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 - 14		35 - 64		0 - 74	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	-	-	0,06	0,01	0,11	0,01
141	Zunge	-	-	0,36	0,07	0,44	0,09
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	0,03	0,04	0,04	0,05
144	Mundboden	-	-	0,33	0,07	0,38	0,07
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	0,20	0,03	0,31	0,06
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	0,74	0,16	0,99	0,22
150	Speiseröhre	-	-	0,43	0,04	0,58	0,06
151	Magen	-	-	0,80	0,29	2,01	0,80
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	0,07	0,02	0,07	0,09
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	1,36	0,89	3,26	2,13
154	Mastdarm	-	-	0,96	0,67	2,06	1,20
155	Leber	-	-	0,23	0,04	0,54	0,19
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	0,14	0,17	0,25	0,46
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	0,33	0,13	0,65	0,37
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	0,02	-	0,04	0,02
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	0,03	0,03	0,06	0,09
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	0,04	0,02	0,04	0,02
161	Kehlkopf	-	-	0,56	0,04	1,02	0,06
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	3,70	0,76	8,69	1,24
163	Rippenfell	-	-	0,05	0,02	0,05	0,06
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	0,02	0,03
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	0,06	0,01	0,09	0,07
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,02	0,02	0,13	0,14	0,26	0,26
172	Melanome der Haut	-	-	0,28	0,39	0,54	0,67
173	Sonstige Haut	0,02	-	2,68	2,15	6,71	4,23
174	weibliche Brustdrüse	-	-	-	4,43	-	7,20
175	männliche Brustdrüse	-	-	0,04	-	0,06	-
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	-	0,05	-	0,08
180	Gebärmutterhals	-	-	-	0,81	-	1,04
181	Plazenta	-	-	-	0,01	-	0,03
182	Gebärmutter	-	-	-	0,76	-	1,72
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	-	0,55	-	1,32
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	-	0,13	-	0,25
185	Prostata	-	-	1,17	-	4,53	-
186	Hoden	0,02	-	0,12	-	0,38	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	0,09	-	0,15	-
188	Harnblase	-	-	1,13	0,08	2,83	0,50
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	0,02	0,02	0,83	0,37	1,87	0,80
189.0	Niere	0,02	0,02	0,81	0,34	1,64	0,67
190	Auge	-	-	0,04	0,04	0,06	0,06
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,03	0,09	0,22	0,22	0,53	0,45
193	Schilddrüse	-	-	0,11	0,24	0,19	0,40
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	0,01	0,01	0,04	0,01
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	0,72	0,37	1,51	0,83
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	0,04	0,02	0,39	0,41	0,75	0,71
201	Lymphogranulomatose	-	-	0,04	0,09	0,18	0,20
203	Multiples Myelom	-	-	0,07	0,11	0,24	0,26
204	Lymphatische Leukämie	-	0,04	0,11	0,07	0,16	0,25
205	Myeloische Leukämie	0,03	0,02	0,13	0,12	0,40	0,20
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	0,01	0,01	0,05	0,01
	Insgesamt ohne ICD 173	0,16	0,21	16,13	12,93	36,40	24,65
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>0,18</b>	<b>0,21</b>	<b>18,80</b>	<b>15,08</b>	<b>43,11</b>	<b>28,88</b>

\*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung

## 10. "Kumulative") Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1992

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 - 14		35 - 64		0 - 74	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	0,22	0,05	0,29	0,05
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	0,01	-	0,01	-
144	Mundboden	-	-	0,14	0,01	0,26	0,01
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	0,01	-	0,01	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	0,35	0,07	0,47	0,10
150	Speiseröhre	-	-	0,54	0,01	0,89	0,09
151	Magen	-	-	0,44	0,33	1,31	0,64
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	0,02	-	0,02	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	0,48	0,40	1,68	1,14
154	Mastdarm	-	-	0,35	0,18	0,84	0,48
155	Leber	-	-	0,15	0,06	0,50	0,23
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	0,16	0,13	0,23	0,31
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	0,30	0,19	0,63	0,48
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	0,03	0,19	0,11
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	0,03	-	0,03	0,02
161	Kehlkopf	-	-	0,23	0,01	0,44	0,01
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	3,19	0,71	7,83	1,27
163	Rippenfell	-	-	0,01	0,02	0,03	0,02
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	0,03	0,01	0,05	0,01
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	0,02	-	0,03
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	0,03	0,07	0,14	0,16
172	Melanome der Haut	-	-	0,14	0,07	0,14	0,13
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	0,03	-
174	weibliche Brustdrüse	-	-	-	1,48	-	2,66
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	-	0,07	-	0,16
180	Gebärmutterhals	-	-	-	0,20	-	0,36
181	Plazenta	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutter	-	-	-	0,03	-	0,20
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	-	0,37	-	0,73
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	-	0,04	-	0,09
185	Prostata	-	-	0,16	-	0,77	-
186	Hoden	-	-	0,01	-	0,02	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	0,12	0,04	0,64	0,09
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	0,34	0,10	0,73	0,27
189.0	Niere	-	-	0,26	0,09	0,55	0,21
190	Auge	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,03	0,02	0,20	0,11	0,38	0,29
193	Schilddrüse	-	-	0,06	0,04	0,10	0,13
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntem Sitzes	-	-	0,65	0,25	1,23	0,76
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	0,17	0,09	0,38	0,21
201	Lymphogranulomatose	-	-	0,02	0,01	0,05	0,04
203	Multiples Myelom	-	-	0,04	0,07	0,19	0,12
204	Lymphatische Leukämie	-	-	0,05	-	0,27	0,09
205	Myeloische Leukämie	0,03	-	0,11	0,06	0,35	0,17
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	0,10	0,04
	Insgesamt ohne ICD 173	0,07	0,02	8,76	5,34	21,23	11,71
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>8,77</b>	<b>5,35</b>	<b>21,27</b>	<b>11,71</b>

\*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung

**11a) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1992 (männlich)**

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	7,1
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	2,1	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	9,4
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	2,1	4,7
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,4
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magen	-	-	-	-	-	-	-	2,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	-	-	4,2	4,7
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	2,1	2,4
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	2,1	-
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	3,8	-	-	-	11,8
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	3,8	2,6	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,5	-	-	-	2,6	-	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	-	4,1	2,1	9,4
173	Sonstige Haut	-	-	3,7	-	-	8,3	10,5	7,1
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Hoden	3,5	-	-	7,7	7,7	18,6	14,7	14,1
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	2,1	7,1
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	3,5	-	-	-	-	2,1	2,1	2,4
189.0	Niere	3,5	-	-	-	-	2,1	2,1	2,4
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	2,4
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,9	-	-	3,8	-	6,2	6,3	-
193	Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	2,1	2,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	-	-	-	4,7
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	3,5	-	3,7	-	-	4,1	2,1	9,4
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	3,8	2,6	2,1	6,3	4,7
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	6,9	-	-	-	2,6	2,1	2,1	-
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt ohne ICD 173	27,6	-	3,7	23,1	17,9	43,5	52,7	101,2
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>27,6</b>	<b>-</b>	<b>7,4</b>	<b>23,1</b>	<b>17,9</b>	<b>51,8</b>	<b>63,2</b>	<b>108,3</b>

**noch 11a) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1992 (männlich)**

ICD Code	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	2,5	-	-	5,5	3,2	4,2	6,5	20,4	14,7	-	1,7
141	2,5	17,4	12,4	19,4	12,8	16,7	-	-	-	-	5,6
142	-	-	-	5,5	-	-	-	-	29,5	-	1,0
144	2,5	10,5	17,3	16,6	9,6	4,2	6,5	10,2	14,7	-	5,4
143 + 145	5,0	3,5	9,9	16,6	-	-	19,5	-	-	-	3,6
146 - 149	10,1	52,3	44,5	22,2	16,0	20,8	26,0	-	-	-	11,9
150	15,1	24,4	14,8	16,6	16,0	16,7	13,0	10,2	14,7	-	7,3
151	10,1	17,4	14,8	22,2	92,6	125,1	117,2	152,7	162,1	235,8	25,8
152	-	3,5	4,9	2,8	3,2	-	-	-	14,7	-	1,1
153	5,0	20,9	39,5	85,9	115,0	175,1	201,9	234,2	250,5	471,6	42,9
154	2,5	7,0	39,5	60,9	79,9	100,1	117,2	132,4	88,4	147,4	25,7
155	-	-	9,9	11,1	25,6	29,2	32,6	30,5	29,5	29,5	6,5
156	-	-	-	11,1	16,0	16,7	6,5	40,7	44,2	176,8	5,2
157	-	3,5	19,8	11,1	31,9	29,2	32,6	61,1	58,9	176,8	10,0
158	-	-	-	-	3,2	4,2	-	-	14,7	-	0,6
159	-	-	-	2,8	3,2	-	6,5	-	14,7	29,5	1,0
160	2,5	-	-	-	6,4	-	-	10,2	-	-	0,8
161	10,1	20,9	9,9	36,0	35,1	33,4	58,6	20,4	29,5	58,9	11,7
162	22,7	45,3	128,5	177,2	354,6	446,2	547,0	549,9	515,7	442,1	105,3
163	-	7,0	-	2,8	-	-	-	-	-	29,5	0,8
164	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	0,2
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	3,5	-	5,5	3,2	-	-	-	-	-	1,1
171	-	7,0	2,5	2,8	12,8	20,8	-	-	-	-	2,9
172	5,0	10,5	7,4	8,3	16,0	25,0	19,5	30,5	-	58,9	7,1
173	32,8	41,8	81,6	135,7	236,4	275,2	507,9	641,5	663,0	530,5	88,8
175	2,5	3,5	2,5	-	-	4,2	-	-	29,5	-	1,1
185	-	10,5	19,8	60,9	143,7	208,5	462,4	672,1	677,8	736,8	64,3
186	-	3,5	-	5,5	-	-	-	-	-	-	5,9
187	2,5	7,0	-	2,8	6,4	4,2	6,5	10,2	14,7	58,9	2,3
188	10,1	17,4	32,1	44,3	115,0	141,8	195,4	285,1	221,0	294,7	37,3
189	17,7	7,0	37,1	49,8	51,1	83,4	117,2	81,5	58,9	-	21,4
189.0	17,7	7,0	34,6	49,8	51,1	66,7	91,2	61,1	58,9	-	19,3
190	-	-	2,5	-	3,2	4,2	-	-	-	-	0,8
191 + 192	5,0	10,5	7,4	8,3	12,8	25,0	13,0	10,2	29,5	-	6,7
193	5,0	-	2,5	-	12,8	12,5	-	-	-	-	2,3
194	-	-	-	2,8	-	4,2	-	-	-	-	0,4
195 - 199	7,6	10,5	9,9	63,7	47,9	79,2	78,1	91,6	162,1	324,2	21,4
200 + 202	7,6	13,9	17,3	16,6	12,8	45,9	13,0	40,7	162,1	117,9	12,4
201	-	-	-	2,8	-	-	13,0	-	14,7	-	2,3
203	-	-	4,9	2,8	6,4	8,3	26,0	10,2	58,9	-	3,1
204	2,5	7,0	2,5	2,8	6,4	4,2	6,5	20,4	14,7	-	2,3
205	-	3,5	9,9	5,5	6,4	20,8	19,5	30,5	29,5	29,5	5,4
206 - 208	-	-	-	2,8	-	-	6,5	-	-	58,9	0,8
Insg. ohne											
ICD 173	156,3	348,4	523,9	814,2	1 280,9	1 718,0	2 168,5	2 556,0	2 770,0	3 477,7	475,1
<b>Insgesamt</b>	<b>189,1</b>	<b>390,2</b>	<b>605,5</b>	<b>949,9</b>	<b>1 517,3</b>	<b>1 993,2</b>	<b>2 676,5</b>	<b>3 197,6</b>	<b>3 433,0</b>	<b>4 008,3</b>	<b>563,9</b>

**11b) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1992 (weiblich)**

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	2,5
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magen	-	-	-	-	2,7	-	-	-
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	2,7	4,4	4,5	-
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	10,0
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	2,5
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	-	2,5
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	8,1	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	3,9	-	-	2,7	2,2	-	5,0
172	Melanome der Haut	-	-	-	4,1	2,7	-	11,4	10,0
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	-	11,0	2,3	12,5
174	Weibliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	8,8	22,7	47,7
179	N. n. bez. Teile der Gebärmutter	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Gebärmutterhals	-	-	-	-	-	6,6	4,5	20,1
181	Plazenta	-	-	-	-	2,7	-	-	-
182	Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)	-	-	-	-	-	-	-	2,5
183	Eierstock, Eileiter und Ligam. Latum	-	-	-	4,1	-	-	2,3	5,0
184	Sonst. u.n.n. bez. weibl. Geschl. Organe	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	3,7	-	-	-	-	-	-	2,5
189.0	Niere	3,7	-	-	-	-	-	-	2,5
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	14,7	3,9	-	-	-	2,2	-	7,5
193	Schilddrüse	-	-	-	-	5,4	2,2	6,8	7,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	-	-	2,3	-
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	3,7	-	-	-	5,4	2,2	2,3	10,0
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	8,1	5,4	-	4,5	7,5
203	Multipl. Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	7,8	-	-	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	3,7	-	-	-	-	4,4	4,5	-
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	2,5
	Insgesamt ohne ICD 173	25,7	7,7	7,8	24,4	29,8	33,1	65,9	145,6
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>25,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>24,4</b>	<b>29,8</b>	<b>44,2</b>	<b>68,1</b>	<b>158,1</b>

**noch 11b) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1992 (weiblich)**

ICD Code	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	0,2
141	2,7	3,6	-	5,4	3,0	-	3,8	-	-	17,6	1,4
142	-	-	4,9	2,7	-	2,8	-	-	11,1	-	1,1
144	2,7	3,6	2,5	-	6,0	-	-	-	-	-	0,9
143 + 145	2,7	-	-	-	3,0	2,8	3,8	9,6	-	8,8	1,3
146 - 149	5,4	3,6	2,5	5,4	11,9	8,5	3,8	4,8	11,1	8,8	3,4
150	-	-	2,5	2,7	3,0	-	3,8	4,8	5,6	17,6	1,4
151	5,4	3,6	9,8	16,3	23,8	42,5	56,4	95,6	133,5	237,1	22,1
152	-	3,6	-	-	-	14,2	-	4,8	5,6	-	1,4
153	8,1	10,8	34,5	46,2	77,4	99,1	139,1	167,2	228,1	298,5	44,9
154	8,1	14,4	22,2	32,6	47,6	68,0	37,6	95,6	111,3	114,1	24,2
155	-	-	-	2,7	3,0	11,3	18,8	14,3	27,8	17,6	3,9
156	-	-	7,4	8,2	17,9	25,5	33,8	38,2	33,4	96,6	9,9
157	2,7	3,6	4,9	5,4	8,9	36,8	11,3	71,7	61,2	61,5	10,4
158	-	-	-	-	-	-	3,8	-	5,6	-	0,4
159	-	-	2,5	2,7	-	5,7	7,5	14,3	16,7	52,7	3,2
160	-	-	-	-	3,0	-	-	-	5,6	-	0,4
161	2,7	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	-	0,7
162	2,7	21,6	27,1	35,4	62,5	51,0	45,1	90,8	66,8	35,1	21,2
163	-	3,6	-	-	-	-	7,5	-	5,6	17,6	1,1
164	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	0,4
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	2,5	-	-	-	3,8	4,8	-	-	0,9
171	8,1	-	2,5	2,7	8,9	8,5	7,5	-	-	8,8	3,4
172	5,4	10,8	27,1	13,6	11,9	14,2	22,6	19,1	33,4	8,8	10,4
173	35,2	57,5	93,6	114,2	116,1	167,1	236,8	315,4	411,7	298,5	81,6
174	113,7	183,3	155,1	165,9	220,3	220,9	300,7	286,7	255,9	219,5	110,0
179	-	-	4,9	5,4	-	5,7	-	-	-	-	1,1
180	29,8	32,3	32,0	24,5	23,8	19,8	15,0	23,9	16,7	17,6	15,1
181	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
182	2,7	7,2	32,0	51,7	56,6	90,6	101,5	71,7	55,6	52,7	26,0
183	10,8	14,4	14,8	32,6	32,7	68,0	78,9	38,2	33,4	105,4	20,1
184	-	3,6	7,4	8,2	6,0	2,8	22,6	-	27,8	17,6	4,1
188	-	-	4,9	8,2	3,0	28,3	56,4	33,4	50,1	43,9	9,3
189	5,4	14,4	14,8	13,6	23,8	36,8	45,1	38,2	77,9	52,7	14,4
189.0	5,4	14,4	14,8	13,6	17,9	31,1	30,1	33,4	72,3	52,7	12,6
190	-	-	2,5	2,7	3,0	-	3,8	-	-	8,8	0,9
191 + 192	2,7	3,6	4,9	13,6	11,9	17,0	7,5	9,6	11,1	-	6,1
193	-	14,4	4,9	5,4	14,9	14,2	3,8	23,9	11,1	8,8	6,5
194	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2
195 - 199	-	14,4	12,3	8,2	38,7	34,0	56,4	62,1	77,9	228,3	19,0
200 + 202	2,7	14,4	12,3	16,3	26,8	22,7	22,6	33,4	44,5	43,9	12,2
201	5,4	-	-	5,4	-	-	3,8	-	-	-	2,5
203	-	-	-	10,9	11,9	11,3	18,8	-	22,3	8,8	3,9
204	-	-	2,5	2,7	8,9	8,5	18,8	4,8	11,1	26,3	3,8
205	5,4	7,2	2,5	2,7	6,0	2,8	-	14,3	27,8	8,8	4,1
206 - 208	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	43,9	1,6
Insg. ohne ICD 173	238,3	391,7	462,9	568,4	780,0	979,7	1 168,9	1 275,9	1 502,2	1 887,6	429,8
<b>Insgesamt</b>	<b>273,5</b>	<b>449,2</b>	<b>556,5</b>	<b>682,6</b>	<b>896,1</b>	<b>1 146,8</b>	<b>1 405,6</b>	<b>1 591,2</b>	<b>1 913,9</b>	<b>2 186,1</b>	<b>511,4</b>

**12a) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1992 (männlich)**

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	4,7
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magen	-	-	-	-	-	-	-	4,7
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	-	-	2,1	2,4
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	2,4
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	2,1	-
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	-	7,1
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	-	-	-	2,4
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	-	-	-	-
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Hoden	-	-	-	-	-	-	2,1	2,4
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	-	-	-	2,1	-	-
189.0	Niere	-	-	-	-	-	2,1	-	-
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,9	-	-	3,8	-	-	-	-
193	Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	-	2,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	-	-	-	-
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	-	-	5,1	-	-	-
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	-	-	-	-	2,4
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	6,9	-	-	-	-	2,1	2,1	2,4
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt ohne ICD 173	13,8	-	-	3,8	5,1	4,1	8,4	33,0
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>13,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,1</b>	<b>8,4</b>	<b>33,0</b>

**noch 12a) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1992 (männlich)**

ICD Code	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										zus.	
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr		
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	5,0	3,5	12,4	11,1	6,4	8,3	6,5	-	-	29,5	3,8	
142	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
144	-	7,0	4,9	13,8	3,2	4,2	19,5	-	14,7	-	2,9	
143 + 145	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	0,2	
146 - 149	5,0	20,9	9,9	8,3	25,6	4,2	19,5	-	14,7	-	5,4	
150	2,5	34,8	19,8	24,9	25,6	37,5	32,6	10,2	14,7	29,5	10,1	
151	2,5	10,5	14,8	16,6	38,3	83,4	91,2	152,7	235,7	235,8	19,7	
152	-	-	-	-	3,2	-	-	10,2	-	-	0,4	
153	2,5	-	19,8	33,2	38,3	108,4	130,2	224,0	221,0	383,1	25,1	
154	2,5	7,0	7,4	30,5	19,2	54,2	45,6	71,3	132,6	147,4	12,4	
155	-	3,5	4,9	8,3	12,8	25,0	45,6	30,5	44,2	29,5	5,7	
156	2,5	-	4,9	8,3	16,0	8,3	6,5	20,4	29,5	147,4	4,4	
157	-	10,5	9,9	11,1	28,7	25,0	39,1	91,6	58,9	176,8	10,0	
158	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	0,2	
159	-	-	-	-	-	12,5	26,0	30,5	44,2	29,5	2,7	
160	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	0,4	
161	-	7,0	9,9	13,8	16,0	8,3	32,6	-	44,2	29,5	5,2	
162	20,2	34,8	111,2	160,6	303,5	446,2	481,9	672,1	604,1	471,6	100,1	
163	-	-	2,5	-	-	4,2	-	-	-	58,9	0,8	
164	-	-	-	-	6,4	4,2	-	-	-	-	0,6	
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	2,5	-	-	-	3,2	16,7	6,5	20,4	-	-	1,7	
172	-	10,5	-	8,3	6,4	-	-	-	-	29,5	1,9	
173	-	-	-	-	-	-	6,5	-	29,5	29,5	0,8	
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	-	3,5	-	5,5	22,4	50,0	71,6	173,1	456,8	560,0	19,1	
186	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	0,6	
187	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	0,2	
188	-	-	2,5	5,5	16,0	58,4	45,6	40,7	132,6	294,7	10,0	
189	-	7,0	14,8	16,6	28,7	25,0	52,1	50,9	73,7	88,4	9,8	
189.0	-	7,0	12,4	13,8	19,2	16,7	39,1	40,7	44,2	29,5	7,1	
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191 + 192	7,6	3,5	4,9	5,5	19,2	12,5	13,0	10,2	14,7	-	4,6	
193	-	-	-	2,8	6,4	8,3	-	-	-	-	1,1	
194	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	0,2	
195 - 199	10,1	-	22,2	52,6	44,7	58,4	58,6	122,2	265,2	324,2	21,1	
200 + 202	5,0	3,5	7,4	8,3	9,6	16,7	19,5	61,1	44,2	88,4	6,3	
201	2,5	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	0,6	
203	2,5	-	-	2,8	3,2	16,7	13,0	50,9	14,7	58,9	3,3	
204	-	-	-	-	9,6	12,5	32,6	-	-	-	2,1	
205	-	3,5	7,4	2,8	6,4	16,7	19,5	20,4	44,2	29,5	4,8	
206 - 208	-	-	-	-	-	12,5	6,5	10,2	14,7	29,5	1,3	
Insg. ohne ICD	73,1	170,7	294,1	456,9	725,1	1 142,5	1 315,4	1 883,9	2 549,0	3 271,4	298,8	
<b>Insgesamt</b>	<b>73,1</b>	<b>170,7</b>	<b>294,1</b>	<b>456,9</b>	<b>725,1</b>	<b>1 142,5</b>	<b>1 322,0</b>	<b>1 883,9</b>	<b>2 578,5</b>	<b>3 300,9</b>	<b>299,6</b>	

**12b) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation**  
**Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1992 (weiblich)**

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magen	-	-	-	-	2,7	-	-	-
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	-	-	-	2,5
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	2,3	-
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	2,7	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	2,7	2,2	-	2,5
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Weibliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	2,2	6,8	15,1
179	N. n. bez. Teile der Gebärmutter	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Gebärmutterhals	-	-	-	-	-	-	2,3	10,0
181	Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Eierstock, Eileiter und Ligam. Latum	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Sonst. u.n.n. bez. weibl. Geschl. Organe	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	-	-	-	-	-	-
189.0	Niere	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,7	-	-	-	-	6,6	2,3	-
193	Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	2,7	-	2,3	-
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	-	-	2,2	-	-
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	-	-	-	-	-	-	2,3	-
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	2,3	-
	Insgesamt ohne ICD 173	3,7	-	-	-	10,8	13,3	20,4	30,1
	<b>Bösartige Neubildungen insgesamt</b>	<b>3,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,8</b>	<b>13,3</b>	<b>20,4</b>	<b>30,1</b>

noch 12b) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation  
Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1992 (weiblich)

ICD Code	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	0,2
141	-	3,6	2,5	-	3,0	-	-	-	-	-	0,5
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	0,4
144	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2
143 + 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	0,2
146 - 149	-	3,6	4,9	2,7	3,0	5,7	-	-	5,6	-	1,4
150	-	-	2,5	-	-	8,5	7,5	-	5,6	17,6	1,6
151	2,7	18,0	7,4	8,2	29,8	17,0	41,3	52,6	155,8	254,6	19,4
152	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	0,2
153	5,4	3,6	7,4	19,0	41,7	62,3	86,4	119,5	189,2	237,1	28,5
154	2,7	-	7,4	5,4	20,8	25,5	33,8	57,3	89,0	70,2	12,0
155	-	-	2,5	2,7	6,0	11,3	22,6	19,1	22,3	17,6	4,3
156	-	-	4,9	8,2	11,9	11,3	26,3	28,7	61,2	96,6	8,6
157	2,7	3,6	12,3	5,4	14,9	34,0	22,6	71,7	55,6	61,5	11,5
158	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,6	-	0,4
159	-	-	2,5	-	3,0	5,7	11,3	9,6	33,4	70,2	4,1
160	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	0,2
161	-	-	-	2,7	-	-	-	4,8	-	-	0,4
162	2,7	32,3	17,2	35,4	53,6	65,1	45,1	76,5	55,6	52,7	20,8
163	-	3,6	-	-	-	-	-	9,6	-	8,8	0,7
164	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	0,2
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	3,0	-	-	4,8	-	-	0,5
171	5,4	-	2,5	2,7	3,0	11,3	7,5	4,8	-	35,1	2,9
172	-	7,2	2,5	2,7	-	2,8	3,8	4,8	-	8,8	2,0
173	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	8,8	0,4
174	24,4	28,7	51,7	84,3	92,3	101,9	124,0	143,4	155,8	166,8	45,9
179	-	-	2,5	8,2	3,0	11,3	7,5	23,9	16,7	26,3	3,9
180	2,7	3,6	7,4	10,9	6,0	25,5	3,8	14,3	11,1	8,8	5,7
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	-	-	2,5	-	3,0	11,3	22,6	19,1	11,1	17,6	3,6
183	-	-	14,8	27,2	32,7	25,5	45,1	43,0	50,1	105,4	14,0
184	-	-	2,5	2,7	3,0	2,8	7,5	14,3	11,1	8,8	2,2
188	-	-	-	5,4	3,0	2,8	7,5	9,6	11,1	17,6	2,2
189	-	-	-	5,4	14,9	11,3	22,6	33,4	27,8	61,5	6,5
189.0	-	-	-	2,7	14,9	8,5	15,0	28,7	27,8	61,5	5,6
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	0,2
191 + 192	-	-	4,9	10,9	6,0	11,3	11,3	-	11,1	-	3,9
193	-	-	4,9	-	3,0	11,3	7,5	14,3	16,7	-	2,7
194	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	8,8	0,4
195 - 199	-	3,6	12,3	10,9	23,8	36,8	60,1	81,2	161,3	228,3	21,7
200 + 202	-	3,6	-	2,7	11,9	8,5	15,0	23,9	16,7	17,6	4,1
201	-	-	-	2,7	-	-	3,8	4,8	-	-	0,7
203	-	-	2,5	5,4	6,0	5,7	3,8	28,7	22,3	26,3	3,8
204	-	-	-	-	-	2,8	15,0	9,6	-	-	1,3
205	-	-	2,5	2,7	6,0	8,5	11,3	33,4	27,8	8,8	4,3
206 - 208	-	-	-	-	-	2,8	3,8	-	27,8	43,9	2,3
Insg. ohne ICD 173	48,7	115,0	189,6	277,4	407,9	540,8	684,0	970,0	1 257,4	1 720,8	250,5
	<b>48,7</b>	<b>115,0</b>	<b>189,6</b>	<b>277,4</b>	<b>407,9</b>	<b>540,8</b>	<b>684,0</b>	<b>970,0</b>	<b>1 262,9</b>	<b>1 729,6</b>	<b>250,9</b>



# **TABELLEN UND SCHAUBILDER**

## **TEIL II**


Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	-	2,7	-	2,7
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	2,4	-	4,7	-
40 - 45	4	2	10,1	5,4	2,5	2,7
45 - 50	5	1	17,4	3,6	10,5	18,0
50 - 55	6	4	14,8	9,8	14,8	7,4
55 - 60	8	6	22,2	16,3	16,6	8,2
60 - 65	29	8	92,6	23,8	38,3	29,8
65 - 70	30	15	125,1	42,5	83,4	17,0
70 - 75	18	15	117,2	56,4	91,2	41,3
75 - 80	15	20	152,7	95,6	152,7	52,6
80 - 85	11	24	162,1	133,5	235,7	155,8
85+	8	27	235,8	237,1	235,8	254,6
<b>Insgesamt</b>	<b>135</b>	<b>123</b>	<b>25,8</b>	<b>22,1</b>	<b>19,7</b>	<b>19,4</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>1,2</b>		<b>1,0</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	16,7	8,1	12,2	7,3
Europastandard	24,6	12,7	19,0	11,2
BRD-87	31,6	17,3	26,3	15,4
Truncated	23,0	8,5	12,9	10,1


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,80	0,29	0,44	0,33
0 - 74	2,01	0,80	1,31	0,64

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	88,1	6,7	66	-
weiblich	72,4	22,8	77	1


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	-	2,7	-	-
25 - 30	-	2	-	4,4	-	-
30 - 35	2	2	4,2	4,5	2,1	-
35 - 40	2	-	4,7	-	2,4	2,5
40 - 45	2	3	5,0	8,1	2,5	5,4
45 - 50	6	3	20,9	10,8	-	3,6
50 - 55	16	14	39,5	34,5	19,8	7,4
55 - 60	31	17	85,9	46,2	33,2	19,0
60 - 65	36	26	115,0	77,4	38,3	41,7
65 - 70	42	35	175,1	99,1	108,4	62,3
70 - 75	31	37	201,9	139,1	130,2	86,4
75 - 80	23	35	234,2	167,2	224,0	119,5
80 - 85	17	41	250,5	228,1	221,0	189,2
85+	16	34	471,6	298,5	383,1	237,1
<b>Insgesamt</b>	<b>224</b>	<b>250</b>	<b>42,9</b>	<b>44,9</b>	<b>25,1</b>	<b>28,5</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>1,0</b>		<b>0,9</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	27,3	18,7	15,4	10,4
Europastandard	41,1	27,9	24,5	16,3
BRD-87	52,0	36,1	33,5	22,3
Truncated	38,2	25,2	13,4	11,3


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	1,36	0,89	0,48	0,40
0 - 74	3,26	2,13	1,68	1,14

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	92,9	5,4	67	12
weiblich	93,3	4,4	72	12


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	2,1	-	-	-
35 - 40	1	4	2,4	10,0	2,4	-
40 - 45	1	3	2,5	8,1	2,5	2,7
45 - 50	2	4	7,0	14,4	7,0	-
50 - 55	16	9	39,5	22,2	7,4	7,4
55 - 60	22	12	60,9	32,6	30,5	5,4
60 - 65	25	16	79,9	47,6	19,2	20,8
65 - 70	24	24	100,1	68,0	54,2	25,5
70 - 75	18	10	117,2	37,6	45,6	33,8
75 - 80	13	20	132,4	95,6	71,3	57,3
80 - 85	6	20	88,4	111,3	132,6	89,0
85+	5	13	147,4	114,1	147,4	70,2
<b>Insgesamt</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>25,7</b>	<b>24,2</b>	<b>12,4</b>	<b>12,0</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>1,1</b>		<b>1,0</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	16,3	11,1	7,7	4,4
Europastandard	23,9	16,2	11,9	6,8
BRD-87	29,1	20,2	15,8	9,5
Truncated	26,8	20,2	9,9	5,1


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,96	0,67	0,35	0,18
0 - 74	2,06	1,20	0,84	0,48

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	97,0	2,2	64	2
weiblich	93,3	4,4	69	6


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	2,5	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	3	-	7,4	4,9	4,9
55 - 60	4	3	11,1	8,2	8,3	8,2
60 - 65	5	6	16,0	17,9	16,0	11,9
65 - 70	4	9	16,7	25,5	8,3	11,3
70 - 75	1	9	6,5	33,8	6,5	26,3
75 - 80	4	8	40,7	38,2	20,4	28,7
80 - 85	3	6	44,2	33,4	29,5	61,2
85+	6	11	176,8	96,6	147,4	96,6
<b>Insgesamt</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>5,2</b>	<b>9,9</b>	<b>4,4</b>	<b>8,6</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>0,5</b>		<b>0,5</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	3,2	3,9	2,8	3,0
Europastandard	5,4	6,0	4,5	4,8
BRD-87	7,2	7,7	5,7	6,6
Truncated	3,5	4,6	4,4	3,4


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,14	0,17	0,16	0,13
0 - 74	0,25	0,46	0,23	0,31

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	40,7	29,6	74	-
weiblich	61,8	18,2	73	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	2,1	-	2,1	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	-	2,7	-	2,7
45 - 50	1	1	3,5	3,6	10,5	3,6
50 - 55	8	2	19,8	4,9	9,9	12,3
55 - 60	4	2	11,1	5,4	11,1	5,4
60 - 65	10	3	31,9	8,9	28,7	14,9
65 - 70	7	13	29,2	36,8	25,0	34,0
70 - 75	5	3	32,6	11,3	39,1	22,6
75 - 80	6	15	61,1	71,7	91,6	71,7
80 - 85	4	11	58,9	61,2	58,9	55,6
85+	6	7	176,8	61,5	176,8	61,5
<b>Insgesamt</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>10,0</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	<b>11,5</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>1,0</b>		<b>0,9</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	6,4	3,9	6,5	4,6
Europastandard	9,8	6,0	10,0	7,0
BRD-87	12,4	8,4	13,4	9,4
Truncated	9,4	3,9	8,8	5,8


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,33	0,13	0,30	0,19
0 - 74	0,65	0,37	0,63	0,48

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	50,0	25,0	66	-
weiblich	48,3	29,3	76	1


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	4	1	10,1	2,7	-	-
45 - 50	6	-	20,9	-	7,0	-
50 - 55	4	-	9,9	-	9,9	-
55 - 60	13	2	36,0	5,4	13,8	2,7
60 - 65	11	-	35,1	-	16,0	-
65 - 70	8	-	33,4	-	8,3	-
70 - 75	9	1	58,6	3,8	32,6	-
75 - 80	2	-	20,4	-	-	4,8
80 - 85	2	-	29,5	-	44,2	-
85+	2	-	58,9	-	29,5	-
<b>Insgesamt</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>11,7</b>	<b>0,7</b>	<b>5,2</b>	<b>0,4</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>16,7</b>		<b>13,0</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	8,0	0,5	3,4	0,2
Europastandard	11,2	0,6	4,9	0,3
BRD-87	12,8	0,6	5,9	0,3
Truncated	16,8	1,2	6,8	0,3


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,56	0,04	0,23	0,01
0 - 74	1,02	0,06	0,44	0,01

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	93,4	6,6	60	2
weiblich	75,0	25,0	57	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	3,8	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	2,3
35 - 40	5	1	11,8	2,5	7,1	-
40 - 45	9	1	22,7	2,7	20,2	2,7
45 - 50	13	6	45,3	21,6	34,8	32,3
50 - 55	52	11	128,5	27,1	111,2	17,2
55 - 60	64	13	177,2	35,4	160,6	35,4
60 - 65	111	21	354,6	62,5	303,5	53,6
65 - 70	107	18	446,2	51,0	446,2	65,1
70 - 75	84	12	547,0	45,1	481,9	45,1
75 - 80	54	19	549,9	90,8	672,1	76,5
80 - 85	35	12	515,7	66,8	604,1	55,6
85+	15	4	442,1	35,1	471,6	52,7
<b>Insgesamt</b>	<b>550</b>	<b>118</b>	<b>105,3</b>	<b>21,2</b>	<b>100,1</b>	<b>20,8</b>

Geschlechtsrelation männlich / weiblich

5,0


4,8

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	67,4	10,7	63,0	10,8
Europastandard	98,0	15,3	93,4	15,2
BRD-87	121,9	18,6	119,7	18,3
Truncated	104,8	22,2	89,8	21,0


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	3,70	0,76	3,19	0,71
0 - 74	8,69	1,24	7,83	1,27

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	74,5	14,9	65	4
weiblich	74,6	13,6	67	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	-	4,1	-	-
20 - 25	-	1	-	2,7	-	2,7
25 - 30	2	-	4,1	-	-	2,2
30 - 35	1	5	2,1	11,4	-	-
35 - 40	4	4	9,4	10,0	2,4	2,5
40 - 45	2	2	5,0	5,4	-	-
45 - 50	3	3	10,5	10,8	10,5	7,2
50 - 55	3	11	7,4	27,1	-	2,5
55 - 60	3	5	8,3	13,6	8,3	2,7
60 - 65	5	4	16,0	11,9	6,4	-
65 - 70	6	5	25,0	14,2	-	2,8
70 - 75	3	6	19,5	22,6	-	3,8
75 - 80	3	4	30,5	19,1	-	4,8
80 - 85	-	6	-	33,4	-	-
85+	2	1	58,9	8,8	29,5	8,8
<b>Insgesamt</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>7,1</b>	<b>10,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>0,7</b>		<b>1,0</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	5,0	6,5	1,5	1,5
Europastandard	6,8	8,5	2,0	1,8
BRD-87	7,8	9,5	2,2	2,0
Truncated	9,1	12,7	4,4	2,6


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,28	0,39	0,14	0,07
0 - 74	0,54	0,67	0,14	0,13

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	97,3	2,7	60	-
weiblich	96,6	1,7	56	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	3,7	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	4	5	8,3	11,0	-	-
30 - 35	5	1	10,5	2,3	-	-
35 - 40	3	5	7,1	12,5	-	-
40 - 45	13	13	32,8	35,2	-	-
45 - 50	12	16	41,8	57,5	-	-
50 - 55	33	38	81,6	93,6	-	-
55 - 60	49	42	135,7	114,2	-	-
60 - 65	74	39	236,4	116,1	-	-
65 - 70	66	59	275,2	167,1	-	-
70 - 75	78	63	507,9	236,8	6,5	-
75 - 80	63	66	641,5	315,4	-	-
80 - 85	45	74	663,0	411,7	29,5	5,6
85+	18	34	530,5	298,5	29,5	8,8
<b>Insgesamt</b>	<b>464</b>	<b>455</b>	<b>88,8</b>	<b>81,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>1,1</b>		<b>2,0</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	56,3	37,7	0,4	0,1
Europastandard	84,0	54,7	0,8	0,1
BRD-87	110,1	68,8	1,3	0,2
Truncated	77,0	65,2	-	-


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	0,02	-	-	-
35 - 64	2,68	2,15	-	-
0 - 74	6,71	4,23	0,03	-

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	99,6	0,2	67	27
weiblich	98,9	0,2	70	32


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	2,1	-	-	-
35 - 40	3	-	7,1	-	-	-
40 - 45	4	-	10,1	-	-	-
45 - 50	5	-	17,4	-	-	-
50 - 55	13	2	32,1	4,9	2,5	-
55 - 60	16	3	44,3	8,2	5,5	5,4
60 - 65	36	1	115,0	3,0	16,0	3,0
65 - 70	34	10	141,8	28,3	58,4	2,8
70 - 75	30	15	195,4	56,4	45,6	7,5
75 - 80	28	7	285,1	33,4	40,7	9,6
80 - 85	15	9	221,0	50,1	132,6	11,1
85+	10	5	294,7	43,9	294,7	17,6
<b>Insgesamt</b>	<b>195</b>	<b>52</b>	<b>37,3</b>	<b>9,3</b>	<b>10,0</b>	<b>2,2</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>4,0</b>		<b>4,5</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	23,8	3,5	6,2	0,8
Europastandard	35,6	5,4	10,1	1,3
BRD-87	46,4	7,2	13,8	1,7
Truncated	32,4	2,2	3,2	1,1


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	1,13	0,08	0,12	0,04
0 - 74	2,83	0,50	0,64	0,90

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	96,4	2,6	67	5
weiblich	86,3	5,0	73	3


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	1	1	3,5	3,7	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	2,1	-	2,1	-
30 - 35	1	-	2,1	-	-	-
35 - 40	1	1	2,4	2,5	-	-
40 - 45	7	2	17,7	5,4	-	-
45 - 50	2	4	7,0	14,4	7,0	-
50 - 55	14	6	34,6	14,8	12,4	-
55 - 60	18	5	49,8	13,6	13,8	2,7
60 - 65	16	6	51,1	17,9	19,2	14,9
65 - 70	16	11	66,7	31,1	16,7	8,5
70 - 75	14	8	91,2	30,1	39,1	15,0
75 - 80	6	7	61,1	33,4	40,7	28,7
80 - 85	4	13	58,9	72,3	44,2	27,8
85+	-	6	-	52,7	29,5	61,5
<b>Insgesamt</b>	<b>101</b>	<b>70</b>	<b>19,3</b>	<b>12,6</b>	<b>7,1</b>	<b>5,6</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>1,5</b>		<b>1,3</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	12,8	6,3	4,6	2,0
Europastandard	17,7	8,7	6,7	3,2
BRD-87	20,2	10,6	8,5	4,4
Truncated	23,8	10,8	7,6	2,3


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	0,02	0,02	-	-
35 - 64	0,81	0,34	0,26	0,09
0 - 74	1,64	0,67	0,55	0,21

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	89,1	5,9	61	1
weiblich	84,3	5,7	69	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	3	-	10,5	-	3,5	-
50 - 55	8	-	19,8	-	-	-
55 - 60	22	-	60,9	-	5,5	-
60 - 65	45	-	143,7	-	22,4	-
65 - 70	50	-	208,5	-	50,0	-
70 - 75	71	-	462,4	-	71,6	-
75 - 80	66	-	672,1	-	173,1	-
80 - 85	46	-	677,8	-	456,8	-
85+	25	-	736,8	-	560,0	-
<b>Insgesamt</b>	<b>336</b>	-	<b>64,3</b>	-	<b>19,1</b>	-
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	39,1	-	11,1	-
Europastandard	62,8	-	19,5	-
BRD-87	89,3	-	30,4	-
Truncated	31,6	-	4,3	-


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	1,17	-	0,16	-
0 - 74	4,53	-	0,77	-

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	92,3	6,0	72	-
weiblich	-	-	-	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	1	-	3,5	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	2	-	7,7	-	-	-
20 - 25	3	-	7,7	-	-	-
25 - 30	9	-	18,6	-	-	-
30 - 35	7	-	14,7	-	2,1	-
35 - 40	6	-	14,1	-	2,4	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	3,5	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	2	-	5,5	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	14,7	-
85+	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>5,9</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	5,4	-	0,3	-
Europastandard	5,3	-	0,5	-
BRD-87	5,5	-	0,6	-
Truncated	4,1	-	0,5	-


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	0,02	-	-	-
35 - 64	0,12	-	0,01	-
0 - 74	0,38	-	0,02	-

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	100,0	-	30	-
weiblich	-	-	-	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Männer




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	4	-	8,8	-	2,2
30 - 35	-	10	-	22,7	-	6,8
35 - 40	-	19	-	47,7	-	15,1
40 - 45	-	42	-	113,7	-	24,4
45 - 50	-	51	-	183,3	-	28,7
50 - 55	-	63	-	155,1	-	51,7
55 - 60	-	61	-	165,9	-	84,3
60 - 65	-	74	-	220,3	-	92,3
65 - 70	-	78	-	220,9	-	101,9
70 - 75	-	80	-	300,7	-	124,0
75 - 80	-	60	-	286,7	-	143,4
80 - 85	-	46	-	255,9	-	155,8
85+	-	25	-	319,5	-	166,8
<b>Insgesamt</b>	-	<b>613</b>	-	<b>110,0</b>	-	<b>45,9</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	63,8	-	22,9
Europastandard	-	86,5	-	32,6
BRD-87	-	99,5	-	38,9
Truncated	-	141,6	-	44,3


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	4,43	-	1,48
0 - 74	-	7,20	-	2,66

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	94,5	3,4	64	14


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	3	-	6,6	-	-
30 - 35	-	2	-	4,5	-	2,3
35 - 40	-	8	-	20,1	-	10,0
40 - 45	-	11	-	29,8	-	2,7
45 - 50	-	9	-	32,3	-	3,6
50 - 55	-	13	-	32,0	-	7,4
55 - 60	-	9	-	24,5	-	10,9
60 - 65	-	8	-	23,8	-	6,0
65 - 70	-	7	-	19,8	-	25,5
70 - 75	-	4	-	15,0	-	3,8
75 - 80	-	5	-	23,9	-	14,3
80 - 85	-	3	-	16,7	-	11,1
85+	-	2	-	17,6	-	8,8
<b>Insgesamt</b>	-	<b>84</b>	-	<b>15,1</b>	-	<b>5,7</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	10,6	-	3,2
Europastandard	-	13,5	-	4,4
BRD-87	-	14,4	-	4,9
Truncated	-	27,3	-	6,5


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	0,81	-	0,20
0 - 74	-	1,04	-	0,36

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	96,4	3,6	53	141


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	-	2,5	-	-
40 - 45	-	1	-	2,7	-	-
45 - 50	-	2	-	7,2	-	-
50 - 55	-	15	-	36,9	-	4,9
55 - 60	-	21	-	57,1	-	8,2
60 - 65	-	19	-	56,6	-	6,0
65 - 70	-	34	-	96,3	-	22,7
70 - 75	-	27	-	101,5	-	30,1
75 - 80	-	15	-	71,7	-	43,0
80 - 85	-	10	-	55,6	-	27,8
85+	-	6	-	52,7	-	43,9
<b>Insgesamt</b>	-	<b>151</b>	-	<b>27,1</b>	-	<b>7,5</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	13,3	-	2,9
Europastandard	-	19,1	-	4,5
BRD-87	-	22,4	-	6,0
Truncated	-	23,0	-	2,6


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	0,82	-	0,10
0 - 74	-	1,80	-	0,36

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	98,0	0,7	68	8


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	-	4,1	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	-	2,3	-	-
35 - 40	-	2	-	5,0	-	-
40 - 45	-	4	-	10,8	-	-
45 - 50	-	4	-	14,4	-	-
50 - 55	-	6	-	14,8	-	14,8
55 - 60	-	12	-	32,6	-	27,2
60 - 65	-	11	-	32,7	-	32,7
65 - 70	-	24	-	68,0	-	25,5
70 - 75	-	21	-	78,9	-	45,1
75 - 80	-	8	-	38,2	-	43,0
80 - 85	-	6	-	33,4	-	50,1
85+	-	12	-	105,4	-	105,4
<b>Insgesamt</b>	-	<b>112</b>	-	<b>20,1</b>	-	<b>14,0</b>
<b>Geschlechtsrelation männlich / weiblich</b>			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	10,4	-	6,0
Europastandard	-	14,4	-	9,1
BRD-87	-	16,7	-	11,2
Truncated	-	16,7	-	10,1


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	0,55	-	0,37
0 - 74	-	1,32	-	0,73

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	81,3	8,9	67	2


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1992




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-92




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1992



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1992



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1992 Frauen





# TABELLEN

## TEIL III

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

140 = Lippe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	11,1	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	2	1	3	22,2	100,0
60 - 65	1	-	1	11,1	-
65 - 70	1	-	1	11,1	-
70 - 75	1	-	1	11,1	-
75 - 80	2	-	2	22,2	-
80 - 85	1	-	1	11,1	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

141 = Zunge

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	3	-	3	10,3	-
40 - 45	1	1	2	3,4	12,5
45 - 50	5	1	6	17,2	12,5
50 - 55	5	-	5	17,2	-
55 - 60	7	2	9	24,1	25,0
60 - 65	4	1	5	13,8	12,5
65 - 70	4	-	4	13,8	-
70 - 75	-	1	1	-	12,5
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	2	2	-	25,0
<b>Zus</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

142 = Hauptspeicheldrüsen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	20,0	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	2	2	-	33,3
55 - 60	2	1	3	40,0	16,7
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	1	1	-	16,7
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	2	2	4	40,0	33,3
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

143 + 145 = Sonstige Teile des Mundes

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	5,3	-
35 - 40	2	-	2	10,5	-
40 - 45	2	1	3	10,5	14,3
45 - 50	1	-	1	5,3	-
50 - 55	4	-	4	21,1	-
55 - 60	6	-	6	31,6	-
60 - 65	-	1	1	-	14,3
65 - 70	-	1	1	-	14,3
70 - 75	3	1	4	15,8	14,3
75 - 80	-	2	2	-	28,6
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	1	1	-	14,3
<b>Zus</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

144 = Mundboden

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	4	-	4	14,3	-
40 - 45	1	1	2	3,6	20,0
45 - 50	3	1	4	10,7	20,0
50 - 55	7	1	8	25,0	20,0
55 - 60	6	-	6	21,4	-
60 - 65	3	2	5	10,7	40,0
65 - 70	1	-	1	3,6	-
70 - 75	1	-	1	3,6	-
75 - 80	1	-	1	3,6	-
80 - 85	1	-	1	3,6	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

146 - 149 = Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx, Rachen o.n.A

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	1,6	-
30 - 35	1	-	1	1,6	-
35 - 40	1	1	2	1,6	5,3
40 - 45	4	2	6	6,5	10,5
45 - 50	15	1	16	24,2	5,3
50 - 55	18	1	19	29,0	5,3
55 - 60	8	2	10	12,9	10,5
60 - 65	5	4	9	8,1	21,1
65 - 70	5	3	8	8,1	15,8
70 - 75	4	1	5	6,5	5,3
75 - 80	-	1	1	-	5,3
80 - 85	-	2	2	-	10,5
85 u.m.	-	1	1	-	5,3
<b>Zus</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
140 - 149 = Mundhöhle und Rachen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	2	1,3	-
30 - 35	2	-	2	1,3	-
35 - 40	10	1	11	6,6	2,2
40 - 45	9	5	14	5,9	10,9
45 - 50	24	3	27	15,8	6,5
50 - 55	34	4	38	22,4	8,7
55 - 60	31	6	37	20,4	13,0
60 - 65	13	8	21	8,6	17,4
65 - 70	11	5	16	7,2	10,9
70 - 75	9	3	12	5,9	6,5
75 - 80	3	3	6	2,0	6,5
80 - 85	4	4	8	2,6	8,7
85 u.m.	-	4	4	-	8,7
<b>Zus</b>	<b>152</b>	<b>46</b>	<b>198</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
150 = Speiseröhre

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	6	-	6	15,8	-
45 - 50	7	-	7	18,4	-
50 - 55	6	1	7	15,8	12,5
55 - 60	6	1	7	15,8	12,5
60 - 65	5	1	6	13,2	12,5
65 - 70	4	-	4	10,5	-
70 - 75	2	1	3	5,3	12,5
75 - 80	1	1	2	2,6	12,5
80 - 85	1	1	2	2,6	12,5
85 u.m.	-	2	2	-	25,0
<b>Zus</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>46</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
151 = Magen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	0,8
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	0,7	-
40 - 45	4	2	6	3,0	1,6
45 - 50	5	1	6	3,7	0,8
50 - 55	6	4	10	4,4	3,3
55 - 60	8	6	14	5,9	4,9
60 - 65	29	8	37	21,5	6,5
65 - 70	30	15	45	22,2	12,2
70 - 75	18	15	33	13,3	12,2
75 - 80	15	20	35	11,1	16,3
80 - 85	11	24	35	8,1	19,5
85 u.m.	8	27	35	5,9	22,0
<b>Zus</b>	<b>135</b>	<b>123</b>	<b>258</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
152 = Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	1	2	16,7	12,5
50 - 55	2	-	2	33,3	-
55 - 60	1	-	1	16,7	-
60 - 65	1	-	1	16,7	-
65 - 70	-	5	5	-	62,5
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	1	1	-	12,5
80 - 85	1	1	2	16,7	12,5
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
153 = Dickdarm (ausgen. Mastdarm)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	0,4
25 - 30	-	2	2	-	0,8
30 - 35	2	2	4	0,9	0,8
35 - 40	2	-	2	0,9	-
40 - 45	2	3	5	0,9	1,2
45 - 50	6	3	9	2,7	1,2
50 - 55	16	14	30	7,1	5,6
55 - 60	31	17	48	13,8	6,8
60 - 65	36	26	62	16,1	10,4
65 - 70	42	35	77	18,8	14,0
70 - 75	31	37	68	13,8	14,8
75 - 80	23	35	58	10,3	14,0
80 - 85	17	41	58	7,6	16,4
85 u.m.	16	34	50	7,1	13,6
<b>Zus</b>	<b>224</b>	<b>250</b>	<b>474</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
154 = Mastdarm

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	0,7	-
35 - 40	1	4	5	0,7	3,0
40 - 45	1	3	4	0,7	2,2
45 - 50	2	4	6	1,5	3,0
50 - 55	16	9	25	11,9	6,7
55 - 60	22	12	34	16,4	8,9
60 - 65	25	16	41	18,7	11,9
65 - 70	24	24	48	17,9	17,8
70 - 75	18	10	28	13,4	7,4
75 - 80	13	20	33	9,7	14,8
80 - 85	6	20	26	4,5	14,8
85 u.m.	5	13	18	3,7	9,6
<b>Zus</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>269</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

155 = Leber

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	4,5
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	4	-	4	11,8	-
55 - 60	4	1	5	11,8	4,5
60 - 65	8	1	9	23,5	4,5
65 - 70	7	4	11	20,6	18,2
70 - 75	5	5	10	14,7	22,7
75 - 80	3	3	6	8,8	13,6
80 - 85	2	5	7	5,9	22,7
85 u.m.	1	2	3	2,9	9,1
<b>Zus</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>56</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

156 = Gallenblase und Gallenwege

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	3	3	-	5,5
55 - 60	4	3	7	14,8	5,5
60 - 65	5	6	11	18,5	10,9
65 - 70	4	9	13	14,8	16,4
70 - 75	1	9	10	3,7	16,4
75 - 80	4	8	12	14,8	14,5
80 - 85	3	6	9	11,1	10,9
85 u.m.	6	11	17	22,2	20,0
<b>Zus</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

157 = Bauchspeicheldrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	1,9	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	1,7
45 - 50	1	1	2	1,9	1,7
50 - 55	8	2	10	15,4	3,4
55 - 60	4	2	6	7,7	3,4
60 - 65	10	3	13	19,2	5,2
65 - 70	7	13	20	13,5	22,4
70 - 75	5	3	8	9,6	5,2
75 - 80	6	15	21	11,5	25,9
80 - 85	4	11	15	7,7	19,0
85 u.m.	6	7	13	11,5	12,1
<b>Zus</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>110</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

158 = Bauchfell und retroperitoneales Gewebe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	33,3	-
65 - 70	1	-	1	33,3	-
70 - 75	-	1	1	-	50,0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	1	2	33,3	50,0
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

159 = Sonstige und nicht näher bez. Verdauungsorgane

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	1	1	-	5,6
55 - 60	1	1	2	20,0	5,6
60 - 65	1	-	1	20,0	-
65 - 70	-	2	2	-	11,1
70 - 75	1	2	3	20,0	11,1
75 - 80	-	3	3	-	16,7
80 - 85	1	3	4	20,0	16,7
85 u.m.	1	6	7	20,0	33,3
<b>Zus</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

150 - 159 = Verdauungsorgane und Bauchfell

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	2	2	-	0,3
25 - 30	-	2	2	-	0,3
30 - 35	4	2	6	0,6	0,3
35 - 40	4	5	9	0,6	0,7
40 - 45	13	9	22	2,0	1,3
45 - 50	22	10	32	3,3	1,5
50 - 55	58	34	92	8,8	5,0
55 - 60	81	43	124	12,3	6,3
60 - 65	121	61	182	18,4	9,0
65 - 70	119	107	226	18,1	15,8
70 - 75	81	83	164	12,3	12,2
75 - 80	65	106	171	9,9	15,6
80 - 85	47	113	160	7,1	16,6
85 u.m.	43	102	145	6,5	15,0
<b>Zus</b>	<b>658</b>	<b>679</b>	<b>1 337</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**160 = Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugeh. Nebenhöhlen**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	25,0	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	2	1	3	50,0	50,0
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	1	-	1	25,0	-
80 - 85	-	1	1	-	50,0
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**161 = Kehlkopf**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	4	1	5	6,6	25,0
45 - 50	6	-	6	9,8	-
50 - 55	4	-	4	6,6	-
55 - 60	13	2	15	21,3	50,0
60 - 65	11	-	11	18,0	-
65 - 70	8	-	8	13,1	-
70 - 75	9	1	10	14,8	25,0
75 - 80	2	-	2	3,3	-
80 - 85	2	-	2	3,3	-
85 u.m.	2	-	2	3,3	-
<b>Zus</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>65</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**162 = Luftröhre, Bronchien und Lunge**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	0,2	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	5	1	6	0,9	0,8
40 - 45	9	1	10	1,6	0,8
45 - 50	13	6	19	2,4	5,1
50 - 55	52	11	63	9,5	9,3
55 - 60	64	13	77	11,6	11,0
60 - 65	111	21	132	20,2	17,8
65 - 70	107	18	125	19,5	15,3
70 - 75	84	12	96	15,3	10,2
75 - 80	54	19	73	9,8	16,1
80 - 85	35	12	47	6,4	10,2
85 u.m.	15	4	19	2,7	3,4
<b>Zus</b>	<b>550</b>	<b>118</b>	<b>668</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**163 = Rippenfell**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	2	1	3	50,0	16,7
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	25,0	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	2	2	-	33,3
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	1	1	-	16,7
85 u.m.	1	2	3	25,0	33,3
<b>Zus</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**164 = Thymus, Herz und Mediastinum**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	1	2	3	100,0	100,0
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**165 = Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**160 - 165 = Atmungs- und intrathorakale Organe**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	0,2	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	5	1	6	0,8	0,8
40 - 45	14	2	16	2,3	1,5
45 - 50	21	7	28	3,4	5,3
50 - 55	56	11	67	9,0	8,3
55 - 60	78	15	93	12,6	11,4
60 - 65	124	22	146	20,0	16,7
65 - 70	116	20	136	18,7	15,2
70 - 75	93	15	108	15,0	11,4
75 - 80	57	19	76	9,2	14,4
80 - 85	37	14	51	6,0	10,6
85 u.m.	18	6	24	2,9	4,5
<b>Zus</b>	<b>620</b>	<b>132</b>	<b>752</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**170 = Knochen**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	2	3	16,7	40,0
20 - 25	1	-	1	16,7	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	16,7	-
50 - 55	-	1	1	-	20,0
55 - 60	2	-	2	33,3	-
60 - 65	1	-	1	16,7	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	1	1	-	20,0
75 - 80	-	1	1	-	20,0
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**171 = Bindegewebe und sonstige Weichteile**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	6,7	-
5 - 10	-	1	1	-	5,3
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	1	2	6,7	5,3
25 - 30	-	1	1	-	5,3
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	2	2	-	10,5
40 - 45	-	3	3	-	15,8
45 - 50	2	-	2	13,3	-
50 - 55	1	1	2	6,7	5,3
55 - 60	1	1	2	6,7	5,3
60 - 65	4	3	7	26,7	15,8
65 - 70	5	3	8	33,3	15,8
70 - 75	-	2	2	-	10,5
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	1	1	-	5,3
<b>Zus</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**172 = Melanome der Haut**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	1,7
20 - 25	-	1	1	-	1,7
25 - 30	2	-	2	5,4	-
30 - 35	1	5	6	2,7	8,6
35 - 40	4	4	8	10,8	6,9
40 - 45	2	2	4	5,4	3,4
45 - 50	3	3	6	8,1	5,2
50 - 55	3	11	14	8,1	19,0
55 - 60	3	5	8	8,1	8,6
60 - 65	5	4	9	13,5	6,9
65 - 70	6	5	11	16,2	8,6
70 - 75	3	6	9	8,1	10,3
75 - 80	3	4	7	8,1	6,9
80 - 85	-	6	6	-	10,3
85 u.m.	2	1	3	5,4	1,7
<b>Zus</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**173 = Sonstige Haut**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	0,2	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	4	5	9	0,9	1,1
30 - 35	5	1	6	1,1	0,2
35 - 40	3	5	8	0,6	1,1
40 - 45	13	13	26	2,8	2,9
45 - 50	12	16	28	2,6	3,5
50 - 55	33	38	71	7,1	8,4
55 - 60	49	42	91	10,6	9,2
60 - 65	74	39	113	15,9	8,6
65 - 70	66	59	125	14,2	13,0
70 - 75	78	63	141	16,8	13,8
75 - 80	63	66	129	13,6	14,5
80 - 85	45	74	119	9,7	16,3
85 u.m.	18	34	52	3,9	7,5
<b>Zus</b>	<b>464</b>	<b>455</b>	<b>919</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**174 = Weibliche Brustdrüse**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	4	4	-	0,7
30 - 35	-	10	10	-	1,6
35 - 40	-	19	19	-	3,1
40 - 45	-	42	42	-	6,9
45 - 50	-	51	51	-	8,3
50 - 55	-	63	63	-	10,3
55 - 60	-	61	61	-	10,0
60 - 65	-	74	74	-	12,1
65 - 70	-	78	78	-	12,7
70 - 75	-	80	80	-	13,1
75 - 80	-	60	60	-	9,8
80 - 85	-	46	46	-	7,5
85 u.m.	-	25	25	-	4,1
<b>Zus</b>	<b>-</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
175 = Männliche Brustdrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	16,7	-
45 - 50	1	-	1	16,7	-
50 - 55	1	-	1	16,7	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	1	-	1	16,7	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	2	-	2	33,3	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
170 - 175 = Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	0,2	-
5 - 10	-	1	1	-	0,1
10 - 15	1	-	1	0,2	-
15 - 20	1	3	4	0,2	0,3
20 - 25	2	2	4	0,4	0,2
25 - 30	6	10	16	1,1	0,9
30 - 35	6	16	22	1,1	1,4
35 - 40	7	30	37	1,3	2,6
40 - 45	16	60	76	3,0	5,2
45 - 50	19	70	89	3,6	6,1
50 - 55	38	114	152	7,2	9,9
55 - 60	55	109	164	10,4	9,5
60 - 65	84	120	204	15,9	10,4
65 - 70	78	145	223	14,8	12,6
70 - 75	81	152	233	15,3	13,2
75 - 80	66	131	197	12,5	11,4
80 - 85	47	126	173	8,9	11,0
85 u.m.	20	61	81	3,8	5,3
<b>Zus</b>	<b>528</b>	<b>1 150</b>	<b>1 678</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
179 = Nicht näher bez. Teile der Gebärmutter

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	2	2	-	33,3
55 - 60	-	2	2	-	33,3
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	2	2	-	33,3
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
180 = Gebärmutterhals

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	3	3	-	3,6
30 - 35	-	2	2	-	2,4
35 - 40	-	8	8	-	9,5
40 - 45	-	11	11	-	13,1
45 - 50	-	9	9	-	10,7
50 - 55	-	13	13	-	15,5
55 - 60	-	9	9	-	10,7
60 - 65	-	8	8	-	9,5
65 - 70	-	7	7	-	8,3
70 - 75	-	4	4	-	4,8
75 - 80	-	5	5	-	6,0
80 - 85	-	3	3	-	3,6
85 u.m.	-	2	2	-	2,4
<b>Zus</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
181 = Plazenta

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	50,0
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	50,0
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
182 = Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	0,7
40 - 45	-	1	1	-	0,7
45 - 50	-	2	2	-	1,4
50 - 55	-	13	13	-	9,0
55 - 60	-	19	19	-	13,1
60 - 65	-	19	19	-	13,1
65 - 70	-	32	32	-	22,1
70 - 75	-	27	27	-	18,6
75 - 80	-	15	15	-	10,3
80 - 85	-	10	10	-	6,9
85 u.m.	-	6	6	-	4,1
<b>Zus</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**183 = Eierstock, Eileiter und Ligamentum Latum**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	0,9
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	0,9
35 - 40	-	2	2	-	1,8
40 - 45	-	4	4	-	3,6
45 - 50	-	4	4	-	3,6
50 - 55	-	6	6	-	5,4
55 - 60	-	12	12	-	10,7
60 - 65	-	11	11	-	9,8
65 - 70	-	24	24	-	21,4
70 - 75	-	21	21	-	18,8
75 - 80	-	8	8	-	7,1
80 - 85	-	6	6	-	5,4
85 u.m.	-	12	12	-	10,7
<b>Zus</b>	-	<b>112</b>	<b>112</b>	-	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**184 = Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche  
Geschlechtsorgane**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	1	1	-	4,3
50 - 55	-	3	3	-	13,0
55 - 60	-	3	3	-	13,0
60 - 65	-	2	2	-	8,7
65 - 70	-	1	1	-	4,3
70 - 75	-	6	6	-	26,1
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	5	5	-	21,7
85 u.m.	-	2	2	-	8,7
<b>Zus</b>	-	<b>23</b>	<b>23</b>	-	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**185 = Prostata**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	3	-	3	0,9	-
50 - 55	8	-	8	2,4	-
55 - 60	22	-	22	6,5	-
60 - 65	45	-	45	13,4	-
65 - 70	50	-	50	14,9	-
70 - 75	71	-	71	21,1	-
75 - 80	66	-	66	19,6	-
80 - 85	46	-	46	13,7	-
85 u.m.	25	-	25	7,4	-
<b>Zus</b>	<b>336</b>	-	<b>336</b>	<b>100,0</b>	-

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**186 = Hoden**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	3,2	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	2	-	2	6,5	-
20 - 25	3	-	3	9,7	-
25 - 30	9	-	9	29,0	-
30 - 35	7	-	7	22,6	-
35 - 40	6	-	6	19,4	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	3,2	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	2	-	2	6,5	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>31</b>	-	<b>31</b>	<b>100,0</b>	-

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**187 = Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche  
Geschlechtsorgane**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	8,3	-
45 - 50	2	-	2	16,7	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	8,3	-
60 - 65	2	-	2	16,7	-
65 - 70	1	-	1	8,3	-
70 - 75	1	-	1	8,3	-
75 - 80	1	-	1	8,3	-
80 - 85	1	-	1	8,3	-
85 u.m.	2	-	2	16,7	-
<b>Zus</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>	<b>100,0</b>	-

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**188 = Harnblase**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	0,5	-
35 - 40	3	-	3	1,5	-
40 - 45	4	-	4	2,1	-
45 - 50	5	-	5	2,6	-
50 - 55	13	2	15	6,7	3,8
55 - 60	16	3	19	8,2	5,8
60 - 65	36	1	37	18,5	1,9
65 - 70	34	10	44	17,4	19,2
70 - 75	30	15	45	15,4	28,8
75 - 80	28	7	35	14,4	13,5
80 - 85	15	9	24	7,7	17,3
85 u.m.	10	5	15	5,1	9,6
<b>Zus</b>	<b>195</b>	<b>52</b>	<b>247</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**189 = Sonstige und nicht näher bez. Harnorgane**  
**(Niere, Nierenbecken, Harnleiter)**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	1	2	0,9	1,3
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	0,9	-
30 - 35	1	-	1	0,9	-
35 - 40	1	1	2	0,9	1,3
40 - 45	7	2	9	6,3	2,5
45 - 50	2	4	6	1,8	5,0
50 - 55	15	6	21	13,4	7,5
55 - 60	18	5	23	16,1	6,3
60 - 65	16	8	24	14,3	10,0
65 - 70	20	13	33	17,9	16,3
70 - 75	18	12	30	16,1	15,0
75 - 80	8	8	16	7,1	10,0
80 - 85	4	14	18	3,6	17,5
85 u.m.	-	6	6	-	7,5
<b>Zus</b>	<b>112</b>	<b>80</b>	<b>192</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**189.0 = Nieren**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	1	2	1,0	1,4
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	1,0	-
30 - 35	1	-	1	1,0	-
35 - 40	1	1	2	1,0	1,4
40 - 45	7	2	9	6,9	2,9
45 - 50	2	4	6	2,0	5,7
50 - 55	14	6	20	13,9	8,6
55 - 60	18	5	23	17,8	7,1
60 - 65	16	6	22	15,8	8,6
65 - 70	16	11	27	15,8	15,7
70 - 75	14	8	22	13,9	11,4
75 - 80	6	7	13	5,9	10,0
80 - 85	4	13	17	4,0	18,6
85 u.m.	-	6	6	-	8,6
<b>Zus</b>	<b>101</b>	<b>70</b>	<b>171</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**179 - 189 = Harn- und Geschlechtsorgane**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	2	1	3	0,3	0,2
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	2	1	3	0,3	0,2
20 - 25	3	1	4	0,4	0,2
25 - 30	10	3	13	1,5	0,6
30 - 35	9	3	12	1,3	0,6
35 - 40	10	12	22	1,5	2,4
40 - 45	12	19	31	1,7	3,8
45 - 50	13	20	33	1,9	4,0
50 - 55	36	45	81	5,2	8,9
55 - 60	59	53	112	8,6	10,5
60 - 65	99	49	148	14,4	9,7
65 - 70	105	89	194	15,3	17,7
70 - 75	120	85	205	17,5	16,9
75 - 80	103	43	146	15,0	8,5
80 - 85	66	47	113	9,6	9,3
85 u.m.	37	33	70	5,4	6,5
<b>Zus</b>	<b>686</b>	<b>504</b>	<b>1 190</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**190 = Auge**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	25,0	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	1	2	25,0	20,0
55 - 60	-	1	1	-	20,0
60 - 65	1	1	2	25,0	20,0
65 - 70	1	-	1	25,0	-
70 - 75	-	1	1	-	20,0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	1	1	-	20,0
<b>Zus</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**191 + 192 = Gehirn und Nervensystem**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	2	4	6	5,7	11,8
5 - 10	-	1	1	-	2,9
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	2,9	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	3	1	4	8,6	2,9
30 - 35	3	-	3	8,6	-
35 - 40	-	3	3	-	8,8
40 - 45	2	1	3	5,7	2,9
45 - 50	3	1	4	8,6	2,9
50 - 55	3	2	5	8,6	5,9
55 - 60	3	5	8	8,6	14,7
60 - 65	4	4	8	11,4	11,8
65 - 70	6	6	12	17,1	17,6
70 - 75	2	2	4	5,7	5,9
75 - 80	1	2	3	2,9	5,9
80 - 85	2	2	4	5,7	5,9
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>69</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt**  
**193 = Schilddrüse**

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	2	2	-	5,6
25 - 30	-	1	1	-	2,8
30 - 35	1	3	4	8,3	8,3
35 - 40	1	3	4	8,3	8,3
40 - 45	2	-	2	16,7	-
45 - 50	-	4	4	-	11,1
50 - 55	1	2	3	8,3	5,6
55 - 60	-	2	2	-	5,6
60 - 65	4	5	9	33,3	13,9
65 - 70	3	5	8	25,0	13,9
70 - 75	-	1	1	-	2,8
75 - 80	-	5	5	-	13,9
80 - 85	-	2	2	-	5,6
85 u.m.	-	1	1	-	2,8
<b>Zus</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

194 = Sonstige endokrine Drüsen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	1	1	-	100,0
55 - 60	1	-	1	50,0	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	1	-	1	50,0	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

195 - 199 = Sek. bösartige Neubildungen und sonst. Neubildungen unbek. Sitzes

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	0,9
35 - 40	2	-	2	1,8	-
40 - 45	3	-	3	2,7	-
45 - 50	3	4	7	2,7	3,8
50 - 55	4	5	9	3,6	4,7
55 - 60	23	3	26	20,5	2,8
60 - 65	15	13	28	13,4	12,3
65 - 70	19	12	31	17,0	11,3
70 - 75	12	15	27	10,7	14,2
75 - 80	9	13	22	8,0	12,3
80 - 85	11	14	25	9,8	13,2
85 u.m.	11	26	37	9,8	24,5
<b>Zus</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>218</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

190 - 199 = Bösartige Neubildungen sonstiger u. n. näher bez. Sitze

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	2	4	6	1,2	2,2
5 - 10	-	1	1	-	0,5
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	0,6	-
20 - 25	-	2	2	-	1,1
25 - 30	3	2	5	1,8	1,1
30 - 35	4	4	8	2,4	2,2
35 - 40	4	6	10	2,4	3,3
40 - 45	7	1	8	4,2	0,5
45 - 50	6	9	15	3,6	4,9
50 - 55	9	11	20	5,5	6,0
55 - 60	27	11	38	16,4	6,0
60 - 65	24	23	47	14,5	12,6
65 - 70	30	23	53	18,2	12,6
70 - 75	14	19	33	8,5	10,4
75 - 80	10	20	30	6,1	11,0
80 - 85	13	18	31	7,9	9,9
85 u.m.	11	28	39	6,7	15,4
<b>Zus</b>	<b>165</b>	<b>182</b>	<b>347</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

200 + 202 = Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	1	2	1,5	1,5
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	1,5	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	2	2	-	2,9
25 - 30	2	1	3	3,1	1,5
30 - 35	1	1	2	1,5	1,5
35 - 40	4	4	8	6,2	5,9
40 - 45	3	1	4	4,6	1,5
45 - 50	4	4	8	6,2	5,9
50 - 55	7	5	12	10,8	7,4
55 - 60	6	6	12	9,2	8,8
60 - 65	4	9	13	6,2	13,2
65 - 70	11	8	19	16,9	11,8
70 - 75	2	6	8	3,1	8,8
75 - 80	4	7	11	6,2	10,3
80 - 85	11	8	19	16,9	11,8
85 u.m.	4	5	9	6,2	7,4
<b>Zus</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>133</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

201 = Lymphogranulomatose

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	2	3	8,3	14,3
20 - 25	1	2	3	8,3	14,3
25 - 30	1	-	1	8,3	-
30 - 35	3	2	5	25,0	14,3
35 - 40	2	3	5	16,7	21,4
40 - 45	-	2	2	-	14,3
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	2	3	8,3	14,3
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	2	1	3	16,7	7,1
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	-	1	8,3	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
<b>Zus</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

203 = Multiples Myelom

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	2	-	2	12,5	-
55 - 60	1	4	5	6,3	18,2
60 - 65	2	4	6	12,5	18,2
65 - 70	2	4	6	12,5	18,2
70 - 75	4	5	9	25,0	22,7
75 - 80	1	-	1	6,3	-
80 - 85	4	4	8	25,0	18,2
85 u.m.	-	1	1	-	4,5
<b>Zus</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
204 = Lymphatische Leukämie

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	2	2	-	9,5
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	8,3	-
45 - 50	2	-	2	16,7	-
50 - 55	1	1	2	8,3	4,8
55 - 60	1	1	2	8,3	4,8
60 - 65	2	3	5	16,7	14,3
65 - 70	1	3	4	8,3	14,3
70 - 75	1	5	6	8,3	23,8
75 - 80	2	1	3	16,7	4,8
80 - 85	1	2	3	8,3	9,5
85 u.m.	-	3	3	-	14,3
<b>Zus</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
205 = Myeloische Leukämie

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	2	1	3	7,1	4,3
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	1	3,6	-
25 - 30	1	2	3	3,6	8,7
30 - 35	1	2	3	3,6	8,7
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	2	2	-	8,7
45 - 50	1	2	3	3,6	8,7
50 - 55	4	1	5	14,3	4,3
55 - 60	2	1	3	7,1	4,3
60 - 65	2	2	4	7,1	8,7
65 - 70	5	1	6	17,9	4,3
70 - 75	3	-	3	10,7	-
75 - 80	3	3	6	10,7	13,0
80 - 85	2	5	7	7,1	21,7
85 u.m.	1	1	2	3,6	4,3
<b>Zus</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
206 - 208 = Sonstige Leukämien

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	11,1
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	25,0	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	1	-	1	25,0	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	3	3	-	33,3
85 u.m.	2	5	7	50,0	55,6
<b>Zus</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
200 - 208 = Lymphatisches und Hämatopoetisches Gewebe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	3	2	5	2,2	1,3
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	2	3	0,7	1,3
15 - 20	1	2	3	0,7	1,3
20 - 25	2	4	6	1,5	2,5
25 - 30	4	3	7	2,9	1,9
30 - 35	5	5	10	3,6	3,2
35 - 40	6	8	14	4,4	5,1
40 - 45	4	5	9	2,9	3,2
45 - 50	7	6	13	5,1	3,8
50 - 55	14	7	21	10,2	4,5
55 - 60	12	14	26	8,8	8,9
60 - 65	10	18	28	7,3	11,5
65 - 70	19	16	35	13,9	10,2
70 - 75	13	17	30	9,5	10,8
75 - 80	10	11	21	7,3	7,0
80 - 85	19	22	41	13,9	14,0
85 u.m.	7	15	22	5,1	9,6
<b>Zus</b>	<b>137</b>	<b>157</b>	<b>294</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
Alle Lokalisationen  
ohne ICD 173

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	8	7	15	0,3	0,3
5 - 10	0	2	2	0,0	0,1
10 - 15	1	2	3	0,0	0,1
15 - 20	6	6	12	0,2	0,3
20 - 25	7	11	18	0,3	0,5
25 - 30	21	15	36	0,8	0,6
30 - 35	25	29	54	1,0	1,2
35 - 40	43	58	101	1,7	2,4
40 - 45	62	88	150	2,5	3,7
45 - 50	100	109	209	4,0	4,6
50 - 55	212	188	400	8,5	7,8
55 - 60	294	209	503	11,8	8,7
60 - 65	401	262	663	16,2	10,9
65 - 70	412	346	758	16,6	14,4
70 - 75	333	311	644	13,4	13,0
75 - 80	251	267	518	10,1	11,1
80 - 85	188	270	458	7,6	11,3
85 u.m.	118	215	333	4,8	9,0
<b>Zus</b>	<b>2482</b>	<b>2395</b>	<b>4877</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

1992 erfaßte Personen - Saarland insgesamt  
Alle Lokalisationen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	8	7	15	0,3	0,2
5 - 10	-	2	2	-	0,1
10 - 15	2	2	4	0,1	0,1
15 - 20	6	6	12	0,2	0,2
20 - 25	7	11	18	0,2	0,4
25 - 30	25	20	45	0,8	0,7
30 - 35	30	30	60	1,0	1,1
35 - 40	46	63	109	1,6	2,2
40 - 45	75	101	176	2,5	3,5
45 - 50	112	125	237	3,8	4,4
50 - 55	245	226	471	8,3	7,9
55 - 60	343	251	594	11,6	8,8
60 - 65	475	301	776	16,1	10,6
65 - 70	478	405	883	16,2	14,2
70 - 75	411	374	785	14,0	13,1
75 - 80	314	333	647	10,7	11,7
80 - 85	233	344	577	7,9	12,1
85 u.m.	136	249	385	4,6	8,7
<b>Zus</b>	<b>2 946</b>	<b>2 850</b>	<b>5 796</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



# Anhang

## Zur Standardisierung der Inzidenzzahlen verwendete Standardpopulationen

Altersklassen	Weltstandard- population	Europastandard- population	BRD - Standard- population 1987	Truncated* population
0-4	12 000	8 000	4 887	-
5-9	10 000	7 000	4 796	-
10-14	9 000	7 000	4 894	-
15-19	9 000	7 000	7 189	-
20-24	8 000	7 000	8 721	-
25-29	8 000	7 000	8 044	-
30-34	6 000	7 000	7 062	-
35-39	6 000	7 000	6 886	6 000
40-44	6 000	7 000	6 161	6 000
45-49	6 000	7 000	8 043	6 000
50-54	5 000	7 000	6 654	5 000
55-59	4 000	6 000	5 920	4 000
60-64	4 000	5 000	5 438	4 000
65-69	3 000	4 000	4 338	-
70-74	2 000	3 000	3 801	-
75-79	1 000	2 000	3 646	-
80-84	500	1 000	2 251	-
85 und mehr	500	1 000	1 269	-
<b>zusammen</b>	100 000	100 000	100 000	31 000

\* Aus "Cancer Incidence in Five Continents-Volume IV".

## Durchschnittliche Bevölkerung 1992 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Bevölkerung			Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	10 824	5 571	5 253	50 - 51	14 167	7 126	7 041
1 - 2	11 364	5 897	5 467	51 - 52	16 437	8 248	8 189
2 - 3	11 412	5 877	5 535	52 - 53	17 157	8 510	8 647
3 - 4	11 291	5 808	5 483	53 - 54	16 905	8 420	8 485
4 - 5	11 295	5 805	5 490	54 - 55	16 412	8 161	8 251
<b>zusammen</b>	<b>56 186</b>	<b>28 958</b>	<b>27 228</b>	<b>zusammen</b>	<b>81 078</b>	<b>40 465</b>	<b>40 613</b>
5 - 6	11 175	5 761	5 414	55 - 56	16 696	8 219	8 477
6 - 7	10 789	5 598	5 191	56 - 57	16 168	7 996	8 172
7 - 8	10 388	5 361	5 027	57 - 58	14 630	7 272	7 358
8 - 9	10 428	5 390	5 038	58 - 59	13 016	6 489	6 527
9 - 10	10 667	5 503	5 164	59 - 60	12 372	6 133	6 239
<b>zusammen</b>	<b>53 447</b>	<b>27 613</b>	<b>25 834</b>	<b>zusammen</b>	<b>72 882</b>	<b>36 109</b>	<b>36 773</b>
10 - 11	10 933	5 651	5 282	60 - 61	12 750	6 28	6 542
11 - 12	10 903	5 620	5 283	61 - 62	13 188	6 451	6 737
12 - 13	10 600	5 372	5 228	62 - 63	13 229	6 443	6 786
13 - 14	10 113	5 089	5 024	63 - 64	13 043	6 254	6 789
14 - 15	10 018	5 128	4 890	64 - 65	12 685	5 949	6 736
<b>zusammen</b>	<b>52 567</b>	<b>26 860</b>	<b>25 707</b>	<b>zusammen</b>	<b>64 895</b>	<b>31 305</b>	<b>33 590</b>
15 - 16	9 938	5 114	4 824	65 - 66	12 128	5 448	6 680
16 - 17	9 767	5 048	4 719	66 - 67	11 821	4 998	6 823
17 - 18	9 899	5 118	4 781	67 - 68	11 701	4 582	7 119
18 - 19	10 036	5 140	4 896	68 - 69	11 912	4 518	7 394
19 - 20	10 886	5 556	5 330	69 - 70	11 736	4 436	7 300
<b>zusammen</b>	<b>50 526</b>	<b>25 976</b>	<b>24 550</b>	<b>zusammen</b>	<b>59 298</b>	<b>23 982</b>	<b>35 316</b>
20 - 21	12 632	6 410	6 222	70 - 71	11 262	4 196	7 066
21 - 22	13 912	7 140	6 772	71 - 72	10 540	3 889	6 651
22 - 23	15 238	7 847	7 391	72 - 73	8 639	3 165	5 474
23 - 24	16 732	8 637	8 095	73 - 74	6 344	2 285	4 059
24 - 25	17 561	9 162	8 399	74 - 75	5 178	1 821	3 357
<b>zusammen</b>	<b>76 075</b>	<b>39 196</b>	<b>36 879</b>	<b>zusammen</b>	<b>41 963</b>	<b>15 356</b>	<b>26 607</b>
25 - 26	18 123	9 473	8 650	75 - 76	4 988	1 695	3 293
26 - 27	18 492	9 547	8 945	76 - 77	5 458	1 819	3 639
27 - 28	18 822	9 614	9 208	77 - 78	6 624	2 127	4 497
28 - 29	19 120	9 824	9 296	78 - 79	7 041	2 192	4 849
29 - 30	18 985	9 815	9 170	79 - 80	6 636	1 987	4 649
<b>zusammen</b>	<b>93 542</b>	<b>48 273</b>	<b>45 269</b>	<b>zusammen</b>	<b>30 747</b>	<b>9 820</b>	<b>20 927</b>
30 - 31	18 790	9 772	9 018	80 - 81	5 990	1 744	4 246
31 - 32	18 566	9 596	8 970	81 - 82	5 443	1 555	3 888
32 - 33	18 306	9 450	8 856	82 - 83	5 008	1 351	3 657
33 - 34	18 170	9 441	8 729	83 - 84	4 470	1 148	3 322
34 - 35	17 667	9 201	8 466	84 - 85	3 850	989	2 861
<b>zusammen</b>	<b>91 499</b>	<b>47 460</b>	<b>44 039</b>	<b>zusammen</b>	<b>24 761</b>	<b>6 787</b>	<b>17 974</b>
35 - 36	17 125	8 886	8 239	85 - 86	3 234	815	2 419
36 - 37	16 510	8 520	7 990	86 - 87	2 681	642	2 039
37 - 38	16 311	8 416	7 895	87 - 88	2 233	523	1 710
38 - 39	16 277	8 379	7 898	88 - 89	1 776	394	1 382
39 - 40	16 091	8 270	7 821	89 - 90	1 393	312	1 081
<b>zusammen</b>	<b>82 314</b>	<b>42 471</b>	<b>39 843</b>	<b>zusammen</b>	<b>11 317</b>	<b>2 686</b>	<b>8 631</b>
40 - 41	15 775	8 111	7 664	90 und älter	3 466	707	2 759
41 - 42	15 755	8 118	7 637				
42 - 43	16 222	8 439	7 783				
43 - 44	15 549	8 094	7 455				
44 - 45	13 292	6 898	6 394				
<b>zusammen</b>	<b>76 593</b>	<b>39 660</b>	<b>36 933</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>1 079 686</b>	<b>522 387</b>	<b>557 299</b>
45 - 46	10 937	5 633	5 304				
46 - 47	9 618	4 904	4 714				
47 - 48	10 964	5 559	5 405				
48 - 49	12 558	6 341	6 217				
49 - 50	12 453	6 266	6 187				
<b>zusammen</b>	<b>56 530</b>	<b>28 703</b>	<b>27 827</b>				

# Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 21. Februar	Nr. 7
------	---	-------

## Inhalt

I. Amtliche Texte	Seite
Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“. Vom 17. Januar 1979	105

## I. Amtliche Texte

48 Gesetz Nr. 1094  
„Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“

Vom 17. Januar 1979

### Inhaltsübersicht

- § 1 Zweck
- § 2 Aufgabe
- § 3 Zuständigkeit
- § 4 Inhalt der Erhebungen
- § 5 Anonymisierung
- § 6 Übermittlung
- § 7 Kosten
- § 8 Auskunftsstellen
- § 9 Befreiung von Verschwiegenheitspflichten
- § 10 Entschädigung
- § 11 Wissenschaftlicher Beirat
- § 12 Durchführungsbestimmungen
- § 13 Einschränkung von Grundrechten
- § 14 Inkrafttreten

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

### § 1

#### Zweck

Zur Überwachung der Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung und für die Zwecke der epidemiologischen Krebsforschung wird ein Krebsregister als Landesstatistik geführt. Es ist die zentrale Registrierstelle für bösartige Geschwulsterkrankungen im Lande.

### § 2

#### Aufgabe

Das Krebsregister hat die Aufgabe, fortlaufend statistische Daten über das Entstehen, das Auftreten und den Verlauf bösartiger Geschwulsterkrankungen, insbesondere Karzinome, Sarkome, Leukosen, Präkanzerosen, zu erheben, zu bearbeiten, bereitzustellen und in fortlaufend erscheinenden Jahresberichten zu veröffentlichen.

### § 3

#### Zuständigkeit

Die Führung des Krebsregisters und die Erhebung der erforderlichen Daten obliegen ausschließlich dem Statistischen Amt des Saarlandes. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 105 zur Regelung des Statistischen Dienstes im Saarland vom 25. Juni 1949 in der Fassung des Gesetzes Nr. 982 vom 5. Dezember 1973 (Amtsbl. 1974 S. 33) findet keine Anwendung.

### § 4

#### Inhalt der Erhebungen

Neben der Quelle der Angaben (§ 8) dürfen ausschließlich erhoben und verarbeitet werden

#### a) an personenbezogenen Daten

Vor- und Familienname, Geburtsname, Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Beruf, Nationalität, bei Frauen die Zahl der Kinder, Sterbedatum;

#### b) an medizinischen Daten

Art der Geschwulsterkrankung, Organlokalisierung, Ausbreitung und Stadium der Krankheit im Zeitpunkt der Diagnose, Art der Diagnosesicherung, Zeitpunkt der ersten Beschwerden, Schadstoffexpositionen, Verdacht auf Berufskrebs, Beginn und Art der Behandlung, jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes, Durchführung von Krebsvorsorgeuntersuchungen, Todesursache.

### § 5

#### Anonymisierung

Das Statistische Amt des Saarlandes hat die Daten zu anonymisieren. Es hat die personenbezogenen Merkmale, mit deren Hilfe anonymisierte Daten derart verändert werden können, daß sie sich auf eine bestimmte Person beziehen oder eine solche erkennen lassen, gesondert zu speichern. Es darf diese mit den anonymisierten Daten nur dann zusammenführen, wenn die dadurch ermöglichte Nutzung der Daten zu statistischen Zwecken erforderlich ist. In diesem Fall ist ein Protokoll mit der Begründung des Vorgangs zu fertigen. Die Merkmale nach Satz 2 dürfen nicht an Stellen weitergegeben werden, die die anonymisierten Daten im Auftrag verarbeiten.

## § 6

### Übermittlung

Aus dem Krebsregister dürfen Daten nur in anonymisierter Form und nur zu dem in § 1 bestimmten Zweck und grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftliche Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. Einzelpersonen dürfen anonymisierte Daten nur dann übermittelt werden, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

## § 7

### Kosten

Die durch Zuwendungen Dritter nicht gedeckten Kosten des Krebsregisters trägt das Land nach Maßgabe des Haushalts.

## § 8

### Auskunftsstellen

Auskünfte an das Krebsregister erteilen Ärzte und Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien, die im Saarland ihren Beruf ausüben. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Auskünfte werden auf einem einheitlichen Formblatt erteilt, dessen Muster der für das Gesundheitswesen zuständige Minister festlegt.

## § 9

### Befreiung von Verschwiegenheitspflichten

(1) Ärzte und Zahnärzte, in ihrem Auftrag handelnde Angehörige anderer Heilberufe, berufsmäßig tätige Gehilfen, bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätige Personen sowie Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien handeln auch ohne Einwilligung der Betroffenen weder rechts- noch standeswidrig, wenn sie dem Krebsregister unter Verwendung des in § 8 genannten Formblattes die für die Erhebung nach § 4 dieses Gesetzes erforderlichen Tatsachen mitteilen.

(2) Standesrechtliche Vorschriften, die einer Tatsachenmitteilung an das Krebsregister nach Absatz 1 entgegenstehen, finden keine Anwendung.

## § 10

### Entschädigung

Für die Erstattung jeder Meldung wird vom Statistischen Amt ohne Aufforderung eine Gebühr nach Buchst. A Nr. II Ziff. 17 des Gebührenverzeichnisses nach der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte vom 18. März 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 89) zuzüglich der Portokosten für einen Standardbrief im Briefverkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gezahlt. Nehmen in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätige Melder für die Meldungen Personal und Sachmittel des Trägers der Organisation in Anspruch, so kann dieser einen Betrag in Höhe von 20 vom Hundert der gezahlten Entschädigung verlangen.

## § 11

### Wissenschaftlicher Beirat

(1) Zur fachlichen und wissenschaftlichen Beratung der das Krebsregister führenden Stelle und zur Durchführung dieses Gesetzes beruft der Chef der Staatskanzlei im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister einen wissenschaftlichen Beirat.

(2) Dem Beirat gehören an:

1. Ein Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministers,
2. ein ärztlicher Vertreter der Staatlichen Gesundheitsämter,
3. ein Vertreter des Statistischen Amtes des Saarlandes,
4. ein Vertreter der Ärztekammer des Saarlandes,
5. fünf ärztliche Vertreter der Universität des Saarlandes,

6. ein ärztlicher Vertreter kommunaler Krankenhäuser,
7. ein ärztlicher Vertreter freigemeinnütziger Krankenhäuser,
8. ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Krebsforschung und Krebsbekämpfung, Landesverband Saar,
9. ein Vertreter der Krebsliga Saarland,
10. der Landesbeauftragte für Datenschutz.

Die Berufung der unter Nr. 4, 5, 8 und 9 genannten Mitglieder des Beirats erfolgt auf Vorschlag der nach Gesetz oder Satzung zuständigen Organe, die Berufung der unter Nr. 6 und 7 genannten Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Die ärztlichen Mitglieder des Beirats sollen unterschiedliche berufliche Gebiete und Teilgebiete vertreten.

(3) Zu den Beratungen des Beirats können Vertreter weiterer Behörden, Anstalten oder Vereinigungen sowie andere fachkundige Personen hinzugezogen werden.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich für die Dauer von fünf Jahren aus. Mitglieder, deren Zugehörigkeit zu den von ihnen vertretenen Körperschaften und Anstalten vorzeitig endet, scheiden aus. Für die restliche Zeit wird ein neues Mitglied berufen.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister hat den Vorsitz im Beirat. Er erläßt die Geschäftsordnung. Die laufenden Geschäfte des Beirats führt das Statistische Amt des Saarlandes.

## § 12

### Durchführungsbestimmungen

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister im Benehmen mit dem Chef der Staatskanzlei. Der Landesbeauftragte für Datenschutz ist zu hören.

## § 13

### Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht auf Achtung des privaten Bereichs (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird den aus den vorstehenden Bestimmungen sich ergebenden Beschränkungen unterworfen.

## § 14

### Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 7. Februar 1979

**Der Ministerpräsident**

Dr. Franz Josef Röder

**Der Minister des Innern**

Alfred Wilhelm

**Der Minister der Finanzen**

Ferdi Behles

**Der Minister  
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung**

Dr. Rosemarie Scheurlen

# Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 7. Mai	Nr. 18
------	--------------------------------------	--------

## Inhalt

I. Amtliche Texte	Seite
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen. Vom 23. März 1979 . . . . .	417

## I. Amtliche Texte

110 **Verordnung  
über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen**

Vom 23. März 1979

Auf Grund des § 8 Satz 3 des Gesetzes Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S.105) wird verordnet:

### § 1

Inhalt, Form und Farbe des einheitlichen Formblattes, auf dem Ärzte, Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizini-

schen Instituten und Laboratorien Auskünfte an das Krebsregister erteilen (§ 8 Satz 1 und 3 SKRG), richten sich nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Muster.

### § 2

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. März 1979

**Der Minister  
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung**

Dr. Rosemarie Scheurlen

Anlage zu § 1 der Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen

Muster

An das  
 Statistische Amt des Saarlandes  
 Krebsregister  
 Hardenbergstraße 3  
 6600 Saarbrücken

Mitteilung über Geschwulsterkrankung

Die Mitteilung, Erhebung und Verarbeitung der nachstehenden Daten richten sich nach dem Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S. 105). Das Statistische Landesamt hat die Daten zu anonymisieren. Anonymisierte Daten dürfen grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftl. Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. An Einzelpersonen erfolgt eine Übermittlung anonymisierter Daten nur dann, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

**PERSONENBEZOGENE DATEN**

Reg.-Nr.:

Vor- und Familienname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsname: \_\_\_\_\_  
 Geschlecht: männl., weibl. \_\_\_\_\_  
 Geburtstag, -monat, -jahr: \_\_\_\_\_  
 Familienstand: led., verh., früher verh. \_\_\_\_\_  
 Wohnort: \_\_\_\_\_  
 Beruf jetzt: \_\_\_\_\_  
 früher: \_\_\_\_\_  
 Nationalität: \_\_\_\_\_  
 Bei Frauen: Zahl der geborenen Kinder (ohne Fehlgeburten): \_\_\_\_\_  
 Sterbedatum: \_\_\_\_\_

Hier abtrennen!

**MEDIZINISCHE DATEN**

Reg.-Nr.:

Art der Geschwulsterkrankung: Ca., Sa., Leu., Präkanz., and.: \_\_\_\_\_  
 Organlokalisation: \_\_\_\_\_  
 Lokale Ausbreitung: T \_\_\_\_\_  
 Lymphknotenmetastasen: N \_\_\_\_\_  
 Fernmetastasen: M \_\_\_\_\_  
 Zusammengefaßte histologische Diagnose: \_\_\_\_\_  
 Diagnose gestellt am: \_\_\_\_\_  
 Art der Diagnosesicherung: hist., röntg., op., Autopsie, and.: \_\_\_\_\_  
 Zeitpunkt der ersten Beschwerden: wann: \_\_\_\_\_ wie: \_\_\_\_\_  
 Schadstoffexpositionen: ja  nein  welche: \_\_\_\_\_  
 Verdacht auf Berufskrebs: ja  nein  welcher: \_\_\_\_\_  
 Beginn der Behandlung: \_\_\_\_\_  
 Art der Behandlung: Op., ja  nein   
 Strahlenbehandlung: Röntgen  Radium  Gammatron  Betatron   
 Behandlung mit: Hormonen ja  nein ; Cytostatika ja  nein   
 Jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes: Heil., Recidiv ja  nein , Metastasen ja  nein , and.: \_\_\_\_\_  
 Krebsvorsorgeuntersuchung: wann: \_\_\_\_\_ welche: \_\_\_\_\_  
 Todesursache lt. Totenschein: \_\_\_\_\_  
 lt. Obduktion: \_\_\_\_\_  
 Anschrift der berichtenden Stelle: \_\_\_\_\_  
 (Name des Arztes, Zahnarztes, Leiters der Krankenanstalt, medizinischen Instituts bzw. medizinischen Laboratoriums)  
 Bankverbindung: \_\_\_\_\_ Kro.-Nr. \_\_\_\_\_

## Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod erfordert internationale Systematiken für eine einheitliche Erfassung von Krankheiten und Todesursachen. Bereits 1893 wurde eine internationale Klassifikation der Todesursachen entwickelt, die seither etwa alle zehn Jahre einer Revision unterlag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) baute die Systematik in der 6. Revision zu einer Klassifikation aus, die nicht nur Todesursachen, sondern auch Krankheiten und Verletzungen umfasste. Nach Billigung der 9. Revision durch die XXIX. Vollversammlung der WHO im Mai 1976 wurde die revidierte Klassifikation ab 1. Januar 1979 in den Gesundheitsstatistiken der Mitgliedstaaten eingeführt.

Im saarländischen Krebsregister wird ab dem Jahrgang 1979 die vierstellige ausführliche Systematik dieser 9. Revision angewandt; die Positionsnummern in den Tabellen dieser Veröffentlichung sind jedoch nach der dreistelligen allgemeinen Systematik ausgewiesen.

### Dreistellige Allgemeine Systematik der Neubildungen

#### 140-149 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens

- 140 Bösartige Neubildung der Lippe
- 141 Bösartige Neubildung der Zunge
- 142 Bösartige Neubildung der Hauptspeicheldrüsen
- 143 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches
- 144 Bösartige Neubildung des Mundbodens
- 145 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes
- 146 Bösartige Neubildung des Rachenringes
- 147 Bösartige Neubildung des Nasenrachenraumes
- 148 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes innerhalb der Lippe, der Mundhöhle und des Rachenraumes

#### 150-159 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

- 150 Bösartige Neubildung der Speiseröhre
- 151 Bösartige Neubildung des Magens
- 152 Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschließlich des Zwölffingerdarmes
- 153 Bösartige Neubildung des Dickdarmes ausgen. Mastdarm
- 154 Bösartige Neubildung des Mastdarmes und der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum und des Anus
- 155 Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegende Gallenwege mit der Angabe primärer Sitz
- 156 Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallenwege
- 157 Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse
- 158 Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes
- 159 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Verdauungsorgane und des Bauchfells

#### 160-165 Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe

- 160 Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen, der -nebenhöhlen, des Mittelohres
- 161 Bösartige Neubildung des Kehlkopfes
- 162 Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge
- 163 Bösartige Neubildung des Rippenfells
- 164 Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum
- 165 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Atmungs- und intrathorakalen Organe

**170-175 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse**

- 170 Bösartige Neubildungen der Knochen und Gelenkknorpel
- 171 Bösartige Neubildungen des Bindegewebes und sonstiger Weichteile
- 172 Bösartiges Melanom der Haut
- 173 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
- 174 Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse
- 175 Bösartige Neubildung der männlichen Brustdrüse

**179-189 Bösartige Neubildung der Harn- und Geschlechtsorgane**

- 179 Bösartige Neubildung der Gebärmutter n. n. bez. Teil
- 180 Bösartige Neubildung der Zervix uteri
- 181 Bösartige Neubildung der Plazenta
- 182 Bösartige Neubildung des Corpus uteri
- 183 Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adenexe
- 184 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane
- 185 Bösartige Neubildung der Prostata
- 186 Bösartige Neubildung des Hodens
- 187 Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane
- 188 Bösartige Neubildung der Harnblase
- 189 Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n. n. bez. Harnorgane

**190-199 Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. Sitze**

- 190 Bösartige Neubildung des Auges
- 191 Bösartige Neubildung des Gehirns
- 192 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Nervensystems
- 193 Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- 194 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen
- 195 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes
- 196 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten
- 197 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane
- 198 Sekundäre Neubildung sonstiger näher bez. Sitze
- 199 Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes

**200-208 Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes**

- 200 Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom
- 201 Morbus Hodgkin
- 202 Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems
- 203 Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen
- 204 Lymphatische Leukämie
- 205 Myeloische Leukämie
- 206 Monozytäre Leukämie
- 207 Sonstige näher bez. Formen der Leukämie
- 208 Leukämie n. n. bez. Zellart



Mehr als 74 000 Schriften  
Über 600 laufende Zeitschriften und Zeitungen

Statistiken des In- und Auslandes,  
der deutschen Bundesländer,  
des Deutschen Reiches,  
der ehemaligen deutschen Länder

Statistisches  
Landesamt  **Saarland**

Virchowstr. 7, 66119 Saarbrücken, Tel. (0681) 501-5901/5903

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr



# VIERTELJAHRESHEFT

Die amtliche Statistik ist nicht nur eine der wesentlichen Informationsquellen für Parlamente und öffentliche Verwaltung, darüber hinaus werden in immer stärkerem Maße von Seiten der Öffentlichkeit, von Wirtschaft und Wissenschaft differenzierte Anforderungen an die statistischen Informationen gestellt. Aktualität und Problemorientierung des statistischen Datenmaterials sind weitere Bedürfnisse, die es zu erfüllen gilt.

## STATISTISCHE NACHRICHTEN

In Aufsätzen, Darstellungen von Zeitreihen und statistischen Erhebungsverfahren werden informative Beiträge zu problemorientierten Fragenkomplexen angeboten. Über die reine Ergebnisdarstellung statistischer Erhebungen hinaus werden Struktur und Entwicklungen mit deren Besonderheiten und Ursachen aufgezeigt.

Brauchen Sie Zahlen für einen umfangreichen Überblick über wichtige Bevölkerungs- und Wirtschaftsdaten des Saarlandes?

Der "Zahlenspiegel" informiert Sie!

240  
MERKMALE

Entwicklung der Preise

Beschäftigte  
Umsätze  
Arbeitsmarkt  
Wanderungsbilanz  
Steuern  
Löhne und Gehälter




Table headers visible in the collage include: **Betriebe**, **Ausfuhr und Einfuhr**, **Kreditvolumen**, **Verkehrswesen**, **Auftragseingänge**, **Produktionszahlen**.

Wenn Sie außerdem noch wissen wollen, wie die Saarländer im Bundesdurchschnitt abschneiden, eine auf 50 Merkmale gestraffte Tabelle mit **BUNDESZAHLEN** gibt Ihnen Auskunft.

Die wichtigsten und interessantesten Eckdaten statistischer Erhebungen erhalten Sie vorweg aus den **Statistischen Kurzinformationen**. Außerdem: Diese Meldung zeigt an, daß in Kürze das gesamte Zahlenmaterial dieser Erhebung zur Verfügung steht. Wenn Sie also mehr darüber wissen wollen, fordern Sie unseren umfangreicheren Statistischen Bericht dazu an.

Bilden Sie sich mit unseren STATISTISCHEN NACHRICHTEN Ihr eigenes Urteil über Stand und Verlauf unserer Wirtschaft. Unsere VIERTELJAHRESHEFTE bieten Ihnen die Möglichkeit dazu.

Bezugspreis: Einzelheft 3,00 DM, Jahresabonnement 10,00 DM, Bestellungen: Statistisches Landesamt SAARLAND, ☎ 0681/506-927



## Zu diesem Thema bereits erschienene Sonderhefte:

125	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1982 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)	151	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1987 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	12,— DM
129	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1983 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)	157	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1988 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	12,— DM
133	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1984 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	10,— DM	166	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1989 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)
137	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1985 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)	167	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1990 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	12,— DM
143	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1986 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	10,— DM	175	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1991 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	15,— DM

## Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes

### I. Zusammenfassende Schriften

#### **Statistisches Handbuch für das Saarland** (14. Ausgabe 1992, Preis 40,00 DM)

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reichhaltiges Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerung, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

#### **Statistisches Taschenbuch für das Saarland** (11. Ausgabe 1993, Preis 14,00 DM)

Das Statistische Taschenbuch füllt die durch die zweijährliche Erscheinungsweise des "Handbuchs" entstehende Lücke durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik aus. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

#### **Saarland heute - Statistische Kurzinformationen** (erscheint jährlich, kostenlos)

### II. Fachstatistische Schriften

#### **Handbuch Öffentliche Finanzen** (22. Ausgabe 1993, Preis 18,00 DM)

Das jährlich erscheinende Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

#### **Statistische Berichte**

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

#### **Bildung - Kurzinformationen** (erscheint jährlich, kostenlos)

### III. Reihen

#### **Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes**

In dieser Reihe, die bis heute über 90 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

#### **Saarland in Zahlen (Sonderhefte)**

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

#### **Gemeinde- und Kreisstatistiken**

In dieser im 2-Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

#### **Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter)**

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

### IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystems SAPLIS usw. Werden jährlich aktualisiert herausgegeben.