


— SAARLAND

IN ZAHLEN



Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland

1993

- Jahresbericht -



Kreb **S** **register**
SAARLAND

G
20
101
93(4)

Sonderhefte

$\frac{186}{1996}$

Statistisches Landesamt



SAARLAND

Zeichenerklärung

- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- ... Zahlenwert lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor
- () Aussagewert eingeschränkt, da der Wert Fehler aufweisen kann
- / keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
- X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl

Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1993

93 1

G 20-101



Information und Beratung

Referat für Öffentlichkeitsarbeit

(0681) 501 5935
(0681) 501 5925

Bibliothek

(0681) 501 5903

Datenbanksysteme

(0681) 501 5913

Impressum

Herausgeber:

Statistisches Landesamt Saarland
Virchowstr. 7, 66119 Saarbrücken

Telefon: (0681) 501-00
Telefax: (0681) 501 5921

Druck und Vertrieb:

Statistisches Landesamt Saarland
(0681) 501 5927

Auflage: 1 500

Einzelpreis: 15,- DM

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Quellenangabe gestattet

ISBN 3 - 88718 - 130 - 1

ISSN 0178 - 482X (Morbidität)

ISSN 0486 - 7890 (Saarland in Zahlen)

Vorwort

Die Epidemiologie als Instrument zur Erforschung, Bekämpfung und Kontrolle der Krebskrankheiten gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Das Bewußtsein über die Zweckdienlichkeit und die breiten Einsatzmöglichkeiten epidemiologischer Methoden und Analyseinstrumente hat sich auch in Deutschland durchgesetzt. Zur Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten ist die Epidemiologie auf umfassende und valide Daten angewiesen. Funktionierende bevölkerungsbezogene Krebsregister verfügen über einen optimalen Grundstock an aussagekräftigen epidemiologischen Daten.

Einhalb Jahre nach dem Inkrafttreten des Bundeskrebsregistergesetzes zum 1.1.1995 ist in der Bundesrepublik Deutschland die Rechts- und Datenlage der bestehenden Krebsregister immer noch sehr heterogen. Während sich die übrigen epidemiologischen Krebsregister in Deutschland während der letzten Jahre in der Phase des Neu- bzw. Wiederaufbaus befanden, konnte die Kontinuität und Stabilität der Registrierung von Krebserkrankungen im Saarland weiter gesichert werden.

Das auf einem gesetzlich begründeten freiwilligen Melderecht basierende Berichtssystem funktioniert - dank der hervorragenden und stetigen Kooperation der saarländischen Ärzteschaft - reibungslos.

Sicherlich ist das wenig aufwendige und unkomplizierte Verfahren des Melderechts ein wichtiger Grund für die Akzeptanz und die Bereitschaft der saarländischen Ärzteschaft, dem Register die benötigten Daten möglichst vollständig und aktuell zur Verfügung zu stellen. Hierfür gilt an dieser Stelle unser Dank allen aktiv mitarbeitenden saarländischen Ärztinnen und Ärzten sowie der Saarländischen Ärztekammer, die das Register kontinuierlich seit Aufnahme seiner Aktivitäten positiv begleitet hat.

Die Bundesregierung hat ebenfalls seit Beginn bis heute großzügige Förderbeiträge zur Finanzierung des Registers geleistet. Ohne die Unterstützung durch den Bund hätte das Register nicht seinen derzeitigen Leistungsstand erreichen und halten können. Den Dank hierfür verbinden wir mit der Bitte um Fortführung, da das Saarland angesichts seiner extremen Haushaltsnotlage dringend darauf angewiesen ist.

Das vorliegende Sonderheft mit den Basisdaten des Jahres 1993 knüpft konzeptionell unverändert an die Reihe "Morbidity und Mortality an Bösartigen Neubildungen im Saarland" an.

Die Dokumentation wurde im Referat Krebsregister unter Leitung meines Stellvertreters, Herrn Ltd. Wirtschaftsdirektor Hartwig Ziegler und der Referatsleiterin, Frau Dipl.inform.med. Christa Stegmaier erstellt. Mein Dank gilt allen Mitarbeitern meines Hauses, die beim Zustandekommen dieser Schrift beteiligt waren.

Saarbrücken im Mai 1996

*Josef Mailänder
Direktor*

Inhaltsübersicht

Textteil

	Seite
Summary: Methods and Material	5
1. Vorbemerkungen	7
2. Rechtsgrundlage	7
3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe	7
4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern	8
5. Registerpopulation	10

Tabellen und Schaubilder

Teil I

Tabellen

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen	10
2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1993	16
3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1993	17
4. Bösartige Neubildungen insgesamt 1993	20
5. Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 - 1993	22
6. Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 - 1993	26
7. Rohe und standardisierte Inzidenzraten an bösartigen Neubildungen 1993	30
8. Rohe und standardisierte Mortalitätsraten an bösartigen Neubildungen 1993	32
9. Kumulative Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993	34
10. Kumulative Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993	35
11. Altersspezifische Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993	36
12. Altersspezifische Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993	40

Schaubilder

1. Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1993	12
2. Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1993	13
3. Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1975 - 1993	14
4. Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %	14
5. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen in v. H. der gesamten Neuzugänge 1993	15
6. Art der Diagnosesicherung 1993	18
7. Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1973 - 1993, insgesamt	18
8. Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993	19

Tabellen und Schaubilder

Teil II

Übersichtstabellen der häufigsten Lokalisationen bei Männern und Frauen

151	Magen	46
153	Dickdarm	48
154	Mastdarm	50
156	Gallenblase und Gallenwege	52
157	Bauchspeicheldrüse	54
161	Kehlkopf	56
162	Lunge	58
172	Melanome der Haut	60

173	Haut	62
188	Harnblase	64
189.0	Nieren	66
185	Prostata	68
186	Hoden	70
174	Weibliche Brustdrüse	72
180	Gebärmutterhals	74
182	Gebärmutterkörper (corpus uteri)	76
183	Eierstock	78

Tabellen

Teil III

Gesamtzahl der im Jahr 1993 erfaßten Personen

Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens

140	Lippe	82
141	Zunge	82
142	Hauptspeicheldrüsen	82
143 + 145	Zahnfleisch, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	82
144	Mundboden	82
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx und Rachen ohne nähere Angaben	82
140 - 149	Mundhöhle und Rachen insgesamt	83

Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

150	Speiseröhre	83
151	Magen	83
152	Dünndarm, einschließlich Zwölffingerdarm	83
153	Dickdarm, ausgenommen Mastdarm	83
154	Mastdarm und Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum	83
155	Leber	84
156	Gallenblase und Gallenwege	84
157	Bauchspeicheldrüse	84
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	84
159	Sonstige nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	84
150 - 159	Verdauungsorgane und Bauchfell insgesamt	84

Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe

160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	85
161	Kehlkopf	85
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	85
163	Rippenfell	85
164	Thymus, Herz und Mediastinum	85
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe	85
160 - 165	Atmungs- und intrathorakale Organe insgesamt	86

Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse

170	Knochen	86
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	86
172	Melanome der Haut	86
173	Sonstige Haut	86
174	Weibliche Brustdrüse	86

175	Männliche Brustdrüse	87
170 - 175	Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse insgesamt	87

Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane

179	Nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	87
180	Gebärmutterhals	87
181	Plazenta	87
182	Gebärmutter (corpus uteri)	87
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	88
184	Sonst. u. nicht näher bezeichnete weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva usw.)	88
185	Prostata	88
186	Hoden	88
187	Sonst. u. nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis usw.)	88
188	Harnblase	88
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	89
189.0	Niere	89
179 - 189	Harn- und Geschlechtsorgane insgesamt	89

Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze

190	Auge	89
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	89
193	Schilddrüse	89
194	Sonstige endokrine Drüsen	90
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	90
190 - 199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze insgesamt	90

Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe

200 + 202	Maligne Lymphome	90
201	Lymphogranulomatose	90
203	Multiples Myelom	90
204	Lymphatische Leukämie	91
205	Myeloische Leukämie	91
206 - 208	Sonstige und nicht näher bezeichnete Leukämien	91
200 - 208	Lymphatische und blutbildende Organe insgesamt	91
	Bösartige Neubildungen insgesamt ohne ICD 173	91

Bösartige Neubildungen insgesamt 91

Anhang

Zur Standardisierung verwendete Populationen	94
Mittlere Wohnbevölkerung 1993	95
Gesetz Nr. 1094 "Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17. Januar 1979	96
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen vom 23. März 1979	98
Erläuternde Hinweise zur internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979	100
Verwaltungskarte des Saarlandes	103

Summary: Methods and Material

Introduction

The Cancer Registry of Saarland is a population-based registry which covers the total population of this federal state. The registry was established in 1967 at the State Office for Statistics and provides yearly reports of cancer incidence and mortality in this area.

This volume presents updated results of cancer registration in Saarland/W-Germany for the year 1993. Included are numbers of cancer cases and incidence and mortality rates as well as descriptive analyses of time trends over the 1978 - 1993 period. The volume contains only basic data. More detailed analyses can be provided by the registry upon request.

Legal Basis

Since January 1979 notification has been based on the "Law of Cancer Registration", which integrated registration and follow-up of incident cases into the official statistics of the Saarland. Registration remains voluntary and very strict data protection rules are followed in order to maintain the highest possible level of confidentiality.

Registry Population

The "population-at-risk" covered by the registry is defined by place of residence in the state of Saarland, which is located in the very South West of the Federal Republic of Germany (FRG). The mean population of 1993 was 1 084 585 persons (48,5 % males, 51,5 % female). Given an area of 2,567 square kilometres, the population density amounts to 422 inhabitants per square kilometre.

In 1993 some 53,5 % lived in conurbations of more than 20,000 inhabitants. About 50,1 % of the population of Saarland was married, 36,0 % was unmarried, 13,9 % widowed and divorced. The working population, 43,4 % of the total, 38,7 % was employed in industry (52,1 % male, 16,5 % female); 21,5 % commerce and transport (17,2 % male, 28,6 % female) and 39,0 % other personal services (29,8 % male, 54,3 % female). Agriculture has a minor position.

Registration

The main sources of information are notifications from pathology departments (about 50 % of all new cases reported to the registry), hospital in- and out-patient units, radiology departments and medical practitioners. Use of multiple sources warrants a high level of completeness of registration. Identification of previously registered cases is done by sophisticated computer-aided record linkage. All information concerning one patient is assigned at a single registration-number. Follow-up information includes all relevant changes in health status as well as notification of secondary malignancies and date and cause of death. The latter are provided by record linkage with death certificates of all residents of the Saarland. For those cancer patients, whose first notification to the registry is by

death certificate, the notifying physician is asked for additional information such as time of diagnosis, treatment etc. If no additional information can be obtained, patients are nevertheless included in incidence calculations as (Death Certificate Only = "DCO" cases).

All primary sites are coded according to the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD) from 1979. Positions 140 - 208 (malignant neoplasms) as well as 230 - 234 (in situ cases) and 235 - 238 (neoplasms of uncertain behaviour) are also registered. This publication provides information on positions 140 - 208, additional information on in situ cases is given separately for the most common cancer sites.

Analyses

Sex-, age- and site specific incidence and mortality rates (cases per 100,000) are given for ICD-9 positions 140 - 208. For the most common sites of cancer, these incidence rates are also graphically presented for non-overlapping 5-year birth cohorts.

In addition, the following sex- and site specific summary measures are provided:

- crude incidence and mortality rates
- directly standardized incidence and mortality rates using WHO standard populations (World, Europe, "truncated") and the population of the FRG in 1987(see annex)
- cumulative incidence and mortality rates for ages 0 - 14, 35 - 64 and 0 - 74.

Quality and completeness control measures such as the proportion of histologically verified cases and "DCO-cases" are also included.

f

1. Vorbemerkungen

Das vorliegende Sonderheft enthält die Ergebnisse der Krebsregistrierung für das Jahr 1993 im Saarland. Die Publikation bietet in tabellarischer und grafischer Form die wichtigsten aktuellen Zahlen und Raten zur Krebsinzidenz und -mortalität.

Dargestellt sind die Daten auf der Ebene des dreistelligen ICD-Schlüssels für das Berichtsjahr 1993 und die Entwicklung für den Zeitraum 1978 bis 1993.

Daten und Zahlenreihen, die über den Umfang des Sonderheftes hinausgehen, können auf Anfrage aufbereitet werden.

2. Rechtsgrundlage

Die rechtliche Grundlage der Erfassung und Registrierung der Krebserkrankungen im Saarland bildet das "Saarländische Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17.01.1979 (Amtsblatt des Saarlandes 1979, Nr. 7 vom 21.02.1979, Seite 105 ff). Durch diese Rechtsvorschrift ist das Krebsregister zu einem integrierten Bestandteil der amtlichen Statistik im Saarland geworden. Neben der abschließenden Regelung des zu erhebenden Merkmalprogramms gehören spezielle Datenschutzvorschriften zu den wichtigsten Vorschriften des Gesetzes. Diese waren besonders streng und restriktiv zu fassen, da nur so ein wirksamer Schutz der personenbezogenen Erhebung, die für ein epidemiologisches Register unverzichtbar ist, sichergestellt werden kann.

3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe

Zur Beobachtung des Krebsgeschehens einer bestimmten Region gilt es, alle auftretenden bösartigen Neubildungen in der Bevölkerung dieses Gebietes zu erfassen.

Um dabei ein möglichst umfassendes Bild über Erkrankung und Krankheitsverlauf aller Personen zu erhalten, ist es notwendig, Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu schöpfen; diese Quellen sind Krankenhäuser, Pathologische Institute, Radiologien und freipraktizierende Ärzte. Dabei muß die korrekte Zusammenführung aller eingehenden Informationen zu einer Person gewährleistet sein (Record-Linkage). Es ist daher notwendig, außer den epidemiologisch relevanten persönlichen Daten wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Sterbejahr usw. auch Identifikationsmerkmale wie das genaue Geburtsdatum, Name, Vor- und Geburtsname und die Adresse der erkrankten Personen zu erheben.

Diese Daten ermöglichen es, eine Meldung zu einem Patienten, der bereits erfaßt ist, als Folgemeldung zu identifizieren. Doppel- und Mehrfachzahlungen werden dadurch verhindert.

Um dies zu gewährleisten, werden auf einem nur dem Register zugänglichen, autonom arbeitenden Personalcomputer nach den gesetzlichen Vorschriften die persönlichen und sozialen Merkmale sowie die medizinischen Daten in zwei streng getrennten Datenbanken vorgehalten. Aus Datenschutzgründen wurden zudem unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für die einzelnen Mitarbeiter angeordnet. Das Bindeglied zwischen beiden Datenbanken stellt die bei der Erfassung zugeteilte Registriernummer dar, die zusammen mit dem Er-

fassungsjahr (= Diagnose) eine eindeutige Zuordnung der Patienten erlaubt.

Zur Sicherung des Record-Linkage und zur Vermeidung von Doppelerfassungen stehen vier programmgesteuerte Suchstrategien zur Verfügung. Darin werden die Nachnamen durch die Bildung phonetischer Suchbegriffe ersetzt, um mögliche Fehler durch unterschiedliche Schreibweisen von Namen zu vermeiden.

Die Suchstrategien sind:

- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens kombiniert mit Geburtsdatum und Geschlecht
- Geburtsdatum und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens verknüpft mit Wohnort und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Namens und Geschlecht

Charakteristisch für dieses Verfahren ist, daß der Sachbearbeiter anhand aller ihm durch die Suchstrategien zur Verfügung gestellten Informationen letztlich über die Zuordnung zu einer bereits erfaßten Person oder Neuaufnahme entscheidet. Es ist kein automatischer maschineller Zuordnungsalgorithmus eingebaut worden.

Entsprechend der Bearbeitung der Meldungen werden auch die Sterbefallzählkarten eines jeden Jahres aus der amtlichen Todesursachenstatistik mit den Patienten des Registers abgeglichen, um einmal die Verstorbenen zu eliminieren und die bereits registrierten Daten um die Todesursachen zu ergänzen, und andererseits aber auch eventuelle Erfassungslücken im Register, die durch unterlassene Meldungen entstanden sind, zu schließen. Der Mortalitätsabgleich erfolgt nach den gleichen Suchstrategien wie das Zusammenführen eingehender Meldebögen. Tritt dabei der Fall auf, daß ein Patient an einem Karzinom verstorben ist, ohne daß diese Person dem Register als erkrankt bekannt ist, wird dieser Patient erst einmal mit den Daten des Leichenschauheines im Sterbejahr erfaßt. Das Register versucht jedoch, über den Arzt, der den Leichenschauheine ausgestellt hat, die notwendigen Informationen über Erkrankungszeitpunkt und Krankheitsverlauf einzuholen.

Geht innerhalb eines gewissen Zeitraumes keine Rückantwort ein, verbleibt der Fall mit den Daten des Leichenschauheines im Sterbejahr als Neuzugang und wird in die Inzidenzberechnung dieses Jahres miteinbezogen. (Death-Certificate-Only-Fälle).

Erhält das Register vom Arzt eine Auskunft über das Erkrankungsdatum des Patienten, so wird dieser nachträglich dem Erkrankungsjahr zugeordnet und als DCO-Fall im Sterbejahr wieder gelöscht. Dieses Vorgehen bringt zwar die Schwierigkeit, daß sich Fall- und Inzidenzzahlen eines Jahres im Nachhinein geringfügig ändern können; es hat aber den Vorteil, daß bei späteren Studien eine korrekte zeitliche Zuordnung der Erkrankungsfälle möglich ist.

Im Saarländischen Krebsregister werden alle Erkrankungen an bösartigen Neubildungen, die den Positionen 140 bis 208 ICD-9 (International Classification of Diseases, 9. Revision), entsprechen, erfaßt. Auf diese Positionen beschränkt sich auch die Ermittlung der Inzidenz eines Jahres. Die Positionen

210 bis 229, die die gutartigen Neubildungen umfassen, bleiben außerhalb der Registrierung. Registriert werden jedoch die "In-situ-Karzinome", denen seit der 9. Revision der ICD die Code-Nummern 230 bis 234 für die unterschiedlichen Organe zugeordnet sind. Da die 9. Revision erst ab dem Jahre 1979 angewandt wird, sind für die vorangegangenen Jahre lediglich die Karzinome in situ der Cervix gesondert ausgewiesen, da für diese intern ein besonderer Code vergeben wurde.

Für alle Fälle von "In-situ-Karzinomen" werden ebenfalls Datensätze angelegt, in die Inzidenzberechnung gehen sie jedoch nicht ein. Ähnlich wie bei den "In-situ-Fällen" erfolgt die Bearbeitung der Neubildungen unsicheren Verhaltens. Sie werden ebenfalls aus der Inzidenzberechnung ausgeklammert. Diese Tumoren, früher die Nummern 230 bis 239 nehmen heute die Positionen 235 bis 238 ein.

Für Verdachtsfälle gilt, daß sie zwar in die personenbezogene Datenbank aufgenommen werden, jedoch kein medizinischer Datensatz angelegt wird. Bestätigt sich nach einer gewissen Zeit der Verdacht, d.h. ein Karzinom wird histologisch, operativ, röntgenologisch, zytologisch oder klinisch gesichert, erfolgt eine Aufnahme in den Bestand, der Fall wird dann in alle Berechnungen miteinbezogen.

In die Reihe der bereits erwähnten "Neubildungen unsicheren Verhaltens" sind seit der 9. Revision auch die Plasmozytome, die Polycythaemia vera und die Myelofibrosen eingeordnet. In den früheren Jahrgängen waren diese bei den bösartigen Neubildungen von 200-209 zu finden und gingen alle in die Berechnung der Inzidenz ein. Das Plasmozytom wird im saarländischen Krebsregister, angelehnt an die Todesursachenstatistik, weiterhin mit 203 verschlüsselt.

Bei der Interpretation der zeitlichen Entwicklungsreihen maligner Tumoren ist es notwendig, die Homogenität der Daten besonders im Auge zu behalten. Angesichts sich im Zeitverlauf ständig ändernder Diagnosepraktiken und -techniken sowie der in bestimmten Zeitabständen durchgeführten Revision der internationalen Krankheitsystematiken muß auf die Einheitlichkeit der Begriffsinhalte geachtet werden, wenn man vermeiden will, "künstliche" - durch den Wandel von Diagnose und Codierungsmethoden initiierte - mit echten Entwicklungstrends zu vermischen.

Ein international strittiger Punkt war bislang, ob die Position 173, "bösartige Neubildungen der Haut" auch die Basaliome enthalten, und ob diese bei der Berechnung der Inzidenz eingeschlossen sein sollten. Viele Register behelfen sich damit, daß sie zwei Inzidenzen berechnen und publizieren, einmal mit und einmal ohne die Position 173. Heute geht man immer mehr davon aus, die bösartigen Neubildungen der Haut außer den Melanomen alle unter der Nummer 173 zusammenzufassen und in die Inzidenz einzubeziehen. Im saarländischen Register schloß die Inzidenz in allen Perioden diese Krebse mit ein.

Eine Zuordnungsschwierigkeit besteht in allen Registern für die Lymphome der inneren Organe (z. B. Lymphom des Magens); laut ICD-9 müßte der Code 202.8, Lymphom ohne näher bezeichneten Sitz, vergeben werden. Dabei geht jedoch eine wichtige Information verloren; im saarländischen Krebsregister wird so verfahren, daß zum Beispiel für maligne Lymphome des Magens die Nummer 151 vergeben wird und in

einer zusätzlichen Position codiert wird, daß es sich dabei um ein Lymphom handelt. In den nach ICD-Codes gegliederten Auswertungstabellen ist der Fall dann allerdings unter der Position 151 aufgeführt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese Fälle getrennt aus dem Datenmaterial herauszuziehen.

Zweitkarzinome sind in dieser Standardveröffentlichung noch nicht ausgewiesen, da einer solchen Tabelle eine tiefere Revision der Daten vorausgehen muß; dies bedeutet daß derzeit eine Person nur als ein Fall in die Inzidenz eingeht, auch wenn sie zwei oder mehr Primärkarzinome hat. Gezählt wird in diesem Fall der zuerst auftretende Krebs.

Bei einem anderen Vorgehen wäre derselbe Patient eventuell in der Inzidenz verschiedener Jahre zu berücksichtigen, falls die unterschiedlichen Primärtumoren zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten. Ein solche Differenzierung erlaubt das momentane Auswertungsprogramm nicht; sie ist auch nur für spezielle epidemiologische Fragestellungen sinnvoll und erforderlich.

4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern

Grundlage für die Berechnung epidemiologischer Maßzahlen bilden die geschlechts- und altersgegliederten absoluten Fallzahlen für jede Lokalisation. Auf dieser Basis, die es aus den eingehenden Meldungen zu ermitteln gilt, können alle weiteren Raten berechnet werden. Die reinen absoluten Häufigkeiten haben keine große Aussagekraft, sieht man sie nicht im Zusammenhang mit anderen Daten. Als einfaches Beispiel sei angeführt: Anhand der Fallzahlen eines bestimmten Karzinoms in einer Großstadt und in einer ländlichen Gemeinde kann nicht abgeleitet werden, daß für die Großstadt aufgrund der höheren Fallzahl ein höheres Krebsrisiko besteht. Dort, wo viele Menschen wohnen, erkranken in der Regel auch mehr als in einer Gemeinde mit geringerer Einwohnerzahl. Die Erkrankungsfälle müssen demzufolge auf die jeweilige Wohnbevölkerung bezogen werden. Epidemiologische Gebietsregister beziehen sich auf räumlich definierte Populationen. Das saarländische Register erfaßt die Krebserkrankungen der Wohnbevölkerung des Saarlandes. Diese Personengesamtheit bildet die sogenannte "Bevölkerung unter Risiko". Mögliche andere räumliche Abgrenzungen, wie beispielsweise Einzugsgebiete von Krankenhäusern, entsprechen nicht dem Forschungsansatz flächendeckender Register.

Die Erkrankungshäufigkeit in einer Region ist von vielen Faktoren abhängig, die u. a. auch in Eigenschaften und Verhaltensweisen der dort wohnenden Menschen selbst zu suchen sind. Bei der Entstehung von Krebserkrankungen ist z.B. das Alter ein wichtiger Risikofaktor. Bei der Beurteilung des regionalen Krankheitsgeschehens sind daher detaillierte Kenntnisse der sozialen Struktur der Bevölkerung unverzichtbar.

Um geeignete Werte zu erhalten, sei es um Vergleiche zwischen den Geschlechtern oder zwischen einzelnen Lokalisationen in einer bestimmten Population anzustellen, sei es um interregionale oder -nationale Vergleiche durchführen zu können, errechnet man sogenannte Inzidenz- oder Erkrankungs-raten. Die einfachste Rate ist die "rohe" Inzidenz; dies ist die Zahl aller Neuerkrankungen einer oder aller Lokalisationen pro

100 000 der Bevölkerung unter Risiko in einem bestimmten Zeitraum. Als Zeitraum wird normalerweise das Kalenderjahr verwendet.

Hiernach erhält man als Berechnungsformel für die "rohe" Rate im Jahr j :

$$E_j = \frac{N_j}{B_j} \times 10^5$$

Es bedeuten:

E_j = Inzidenz im Zeitraum j

N_j = Neuerkrankungen im Zeitraum j

B_j = Durchschnittliche Wohnbevölkerung im Zeitraum j

Da Krebs eine Erkrankung ist, deren Häufigkeit stark mit dem Lebensalter variiert, ist es zweckmäßig, "altersspezifische" Inzidenzen zu berechnen. Im Unterschied zur Gesamtinzidenz werden hier nur die Krebsneuerkrankungen in einer bestimmten Altersklasse auf die Zahl der Angehörigen dieser Altersgruppe in der "Bevölkerung unter Risiko" bezogen.

Formal ergibt sich hieraus:

$$A_{ij} = \frac{N_{ij}}{B_{ij}} \times 10^5$$

Es bedeuten:

A_{ij} = Altersspezifische Inzidenz der Altersgruppe i im Zeitraum j

N_{ij} = Neuerkrankte Personen der Altersgruppe i im Zeitraum j

B_{ij} = Durchschnittliche Gesamtbevölkerung der Altersgruppe i im Zeitraum j

Auch hier wird das Kalenderjahr als Berechnungszeitraum gewählt.

Obwohl die altersspezifischen Raten eigentlich die detailliertesten Informationen für Vergleichsuntersuchungen enthalten, ist eine umfassende Analyse aller altersspezifischen Raten für eine große Anzahl von Krebslokalisationen sehr aufwendig und für einen Gesamtüberblick zu unübersichtlich. Hier haben sich die sogenannten standardisierten Inzidenzen bewährt. Bei den vorliegenden Berechnungen haben wir uns für die Methode der direkten Standardisierung entschieden. Die Standardisierung ist notwendig, da bei intertemporalen oder interregionalen Vergleichen von Populationen in der Regel ein unterschiedlicher Altersaufbau vorliegt. Da der Krebsbefall, wie oben erwähnt, stark altersabhängig ist, muß bei Vergleichsstudien der Struktureffekt des Altersaufbaus der Bevölkerung herausgerechnet werden. Man erhält durch diese Operation Vergleichszahlen, die um den Einfluß abweichender Altersstrukturen auf die Krebshäufigkeit bereinigt sind. Dies geschieht durch Gewichtung und Zusammenfassung der altersspezifischen Raten zu einer Gesamtrate. Die Gewichte werden dabei durch die gewählte Standardbevölkerung vor-

gegeben. Demnach kann folgender Berechnungsmodus für altersstandardisierte Raten abgeleitet werden:

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{\sum_{i=1}^{18} G_i}$$

Die Summationsgrenzen $i = 1, 2, \dots, 18$ ergeben sich aus 17 Fünfjahresaltersgruppen und der nach oben offenen Gruppe "85 und mehr Jahre".

Es bedeuten:

D_j = Direkt standardisierte Rate im Zeitraum j

G_i = Angehörige der Altersgruppe i in der Standardbevölkerung

Da bei Standardbevölkerungen üblicherweise von einem Kollektiv von 100 000 ausgegangen wird, also $\sum_{i=1}^{18} G_i = 10^5$ ist, erhält man

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{10^5}$$

Für die Altersstandardisierung wurden von der WHO verschiedene Modellbevölkerungen entwickelt, die auch hier den Berechnungen zugrunde liegen, z. B. die Weltbevölkerung nach Segi. Die so ermittelten Raten geben an, welche Inzidenz für eine bestimmte Lokalisation festgestellt worden wäre, wenn die Alterszusammensetzung der beobachteten Bevölkerungsgruppen derjenigen des gewählten Standards entsprochen hätte. Hieraus wird deutlich, daß die berechneten Werte durch die Wahl des Standards wesentlich beeinflusst werden, da durch verschiedene Standards unterschiedliche Altersklassen stärker oder schwächer gewichtet werden.

Ein Näherungswert für das Risiko (Nettorisiko) oder die Wahrscheinlichkeit eines Individuums, bis zu einem bestimmten Lebensalter an Krebs zu erkranken, unter der Voraussetzung von keiner anderen Krankheit betroffen zu werden (Prinzip der konkurrierenden Risiken), ist die sogenannte "kumulative Rate".

Bei der Berechnung dieser Rate geht man von einer hypothetischen Standardbevölkerung mit gleich großen Altersgruppen aus. Die Rate wird ermittelt aus der Summe der altersspezifischen Inzidenzen, die mit dem Faktor fünf multipliziert werden muß, da diese Zahlen in der Regel für Fünf-Jahres-Altersklassen vorliegen.

Da Wahrscheinlichkeiten in Prozenten ausgedrückt werden, bezieht sich die "kumulative Rate" auf 100 Personen und nicht

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen

Altersgruppen in Jahren	Anteile in v. Hundert der Gesamtbevölkerung											
	Mittlere Bevölkerung					VZ						
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
0 bis unter 15												
männlich	17,1	16,3	15,9	15,4	15,3	14,9	15,1	15,3	15,5	15,8	16,0	16,2
weiblich	14,8	14,1	13,8	13,2	13,3	13,0	13,2	13,3	13,7	13,9	14,1	14,3
zusammen	15,9	15,3	14,8	14,3	14,2	13,9	14,0	14,2	14,6	14,8	15,1	15,2
15 bis unter 35												
männlich	34,4	34,6	34,8	34,7	34,5	33,5	32,9	32,4	31,9	31,4	30,8	30,1
weiblich	29,6	29,7	30,0	29,8	29,6	29,3	28,8	28,3	27,9	27,5	27,0	26,5
zusammen	31,8	32,0	32,2	32,1	32,0	31,3	30,7	30,2	29,9	29,4	28,9	28,3
35 bis unter 65												
männlich	38,0	38,4	39,1	39,6	39,8	41,1	41,4	41,5	41,6	41,7	41,9	42,0
weiblich	37,9	38,1	38,6	38,8	38,7	39,0	38,9	38,7	38,6	38,6	38,7	38,9
zusammen	37,8	38,4	38,7	39,1	39,2	40,0	40,1	40,2	40,0	40,9	40,2	40,4
65 und älter												
männlich	10,6	10,2	10,0	10,1	10,3	10,5	10,8	10,9	11,0	11,1	11,4	11,7
weiblich	17,9	17,6	17,6	18,2	18,4	18,7	19,3	19,7	19,8	20,0	20,1	20,3
zusammen	14,3	14,1	14,0	14,4	14,6	14,8	15,2	15,5	15,5	15,7	16,0	16,1

auf 100 000 der Bevölkerung, so daß das Summationsergebnis noch durch den Faktor 1 000 zu dividieren ist.

Die Summationsgrenzen sind dabei je nach Fragestellung variabel. Man errechnet üblicherweise die Werte für die Altersklassen 0-74 Jahre, 35-64 Jahre, 0-14 Jahre.

Man erhält als Berechnungsformel:

$$K_j = \frac{5 \times \sum_{i=k}^m A_{ij}}{10^3}$$

Es bedeuten:

- K_j = Kumulative Inzidenzrate im Zeitraum j
- k = Untere Altersgrenze, von der ab die kumulative Rate berechnet werden soll
- m = Obere Altersgrenze, bis zu der die kumulative Rate berechnet werden soll

5. Registerpopulation

Nach dem Ergebnis der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung lebten im Jahresdurchschnitt 1993 1 084 585 Personen im Saarland. Davon waren 525 787 (48,5 %) männlichen und 558 798 (51,5 %) weiblichen Geschlechts.

Damit kamen auf 1 000 Männer 1 063 Frauen. Auf einem Quadratkilometer lebten durchschnittlich 422 Personen. Etwas mehr als die Hälfte (53,5 %) der Saarländer hatten ihren Wohnsitz in Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern.

Der Altersaufbau der Bevölkerung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich von den jüngeren zu den älteren Jahrgängen verschoben. Waren 1973 noch 23,0 % der Einwohner jünger als 15 Jahre, so ging dieser Anteil auf nunmehr 15,2 % zurück. Dagegen erreichte die Gruppe der 15 bis unter 65jährigen 68,7 % (1973: 64,3 %). Die stärkste Zunahme wurde bei den Personen im Alter von 65 und mehr Jahren festgestellt. Sie brachten es auf einen Anteil von 16,1 %, 1973 waren es nur 12,7 %. Die Gliederung der Bevölkerung nach dem Familienstand zeigte folgendes Bild: 50,1 % der Saarländer waren verheiratet, 36,0 % ledig, 9,1 % verwitwet und 4,8 % geschieden.

Am 31.12.1993 lebten nach Angaben des Ausländerzentralregisters 72 123 Ausländer im Saarland. Das waren 3 886 oder 5,7 % mehr als im Jahr zuvor. Die stärkste Ausländergruppe bildeten nach wie vor die Italiener mit 17 650 Personen (24,5 %). Es folgten die Türken mit 18,7 % und die Franzosen mit 9,5 %.

Rund 431 300 Saarländer/-innen gingen 1993 einer Erwerbstätigkeit nach, etwa 19 000 oder 4,6 % mehr als bei der Volkszählung 1987. (Männer: - 0,6 %, Frauen: + 14,5 %). Zusammen mit der Zahl der Erwerbslosen von 39 000 ergibt sich für das Jahr 1993 eine Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) von 43,4 % gegenüber 44,0 % im Jahr 1987. Die Quote für Frauen ist im gleichen Zeitraum von 29,2 % auf 31,3 % angestiegen und für Männer von 60,0 % auf 56,2 % gefallen.

Die Gliederung nach Wirtschaftsbereichen zeigt, daß 52,1 % der männlichen Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe tätig sind. 1987 waren 55,0 % der Männer in diesem Bereich beschäftigt.

17,2 % haben einen Arbeitsplatz in Betrieben des Handels, des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung (1987: 14,7 %). Der Anteil der männlichen Erwerbstätigen in den übrigen Wirtschaftsbereichen (Dienstleistungen) hat sich von 29,5 % im Jahre 1987 auf 29,8 % erhöht.


Der Schwerpunkt der Erwerbstätigkeit der Frauen lag 1993 im zuletzt genannten Wirtschaftsbereich. Mit 54,3 % steht weit mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in einem Arbeitsverhältnis in diesem Bereich (1987: 53,7 %). Im Bereich Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung ist bei den Frauen eine Steigerung von 24,5 % (1987) auf 28,6 % und im Produzierenden Gewerbe ein Rückgang von 20,9 % auf 16,5 % zu verzeichnen.

Im Blickwinkel der Erwerbstätigkeitsstatistik spielt die Land- und Forstwirtschaft im Saarland nur eine untergeordnete Rolle.



TABELLEN UND SCHAUBILDER

TEIL I

1) Die häufigsten Todesursachen nach Alter und Geschlecht 1993




2) Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1993




3) Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1974-1993


Fälle



4) Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %



**5) Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen
in v.H. der gesamten Neuzugänge 1993**




**2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen im Saarland 1993
nach Lokalisationen und Geschlecht**

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil	Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil
140	Lippe	10	0,4	1	0,0
141	Zunge	27	1,0	5	0,2
142	Hauptspeicheldrüsen	5	0,2	2	0,1
144	Mundboden	27	1,0	8	0,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	21	0,8	6	0,2
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	38	1,4	18	0,6
140 - 149	Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	128	4,6	40	1,4
150	Speiseröhre	47	1,7	9	0,3
151	Magen	115	4,2	127	4,6
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	3	0,1	1	0,0
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	209	7,5	292	10,5
154	Mastdarm	130	4,7	120	4,3
155	Leber	36	1,3	26	0,9
156	Gallenblase und Gallenwege	32	1,2	69	2,5
157	Bauchspeicheldrüse	53	1,9	72	2,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	1	0,0	3	0,1
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	8	0,3	11	0,4
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	634	22,9	730	26,3
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazu gehörigen Nebenhöhlen	2	0,1	4	0,1
161	Kehlkopf	57	2,1	5	0,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	475	17,1	111	4,0
163	Rippenfell	6	0,2	1	0,0
164	Thymus, Herz und Mediastinum	2	0,1	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	542	19,6	121	4,4
170	Knochen	4	0,1	5	0,2
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	15	0,5	7	0,3
172	Melanome der Haut	42	1,5	45	1,6
173	Sonstige Haut	471	17,0	444	16,0
174	weibliche Brustdrüse	-	-	572	20,6
175	männliche Brustdrüse	6	0,2	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	538	19,4	1 073	38,7
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	9	0,3
180	Gebärmutterhals	-	-	84	3,0
181	Plazenta	-	-	-	-
182	Gebärmutterkörper	-	-	138	5,0
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	99	3,6
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	32	1,2
185	Prostata	345	12,5	-	-
186	Hoden	39	1,4	-	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	5	0,2	-	-
188	Harnblase	112	4,0	37	1,3
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	103	3,7	56	2,0
189.0	Niere	89	3,2	50	1,8
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	604	21,8	455	16,4
190	Auge	6	0,2	5	0,2
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	43	1,6	39	1,4
193	Schilddrüse	21	0,8	40	1,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	1	0,0	4	0,1
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	115	4,2	119	4,3
190 - 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze	186	6,7	207	7,5
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	60	2,2	57	2,1
201	Lymphogranulomatose	12	0,4	10	0,4
203	Multiple Myelom	17	0,6	28	1,0
204	Lymphatische Leukämie	25	0,9	15	0,5
205	Myeloische Leukämie	19	0,7	29	1,0
206 - 208	Sonstige Leukämien	5	0,2	7	0,3
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	138	5,0	146	5,3
	Insgesamt ohne ICD 173	2 299	83,0	2 328	84,0
	Bösartige Neubildungen insgesamt	2 770	100,0	2 772	100,0


3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1993 nach Lokalisationen und Geschlecht

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Sterbefälle	% Anteil	Zahl der Sterbefälle	% Anteil
140	Lippe	-	-	-	-
141	Zunge	20	1,2	1	0,1
142	Hauptspeicheldrüsen	5	0,3	3	0,2
144	Mundboden	1	0,1	1	0,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	15	0,9	3	0,2
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	35	2,1	7	0,5
140 - 149	Bösartige Neubildung der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	76	4,6	15	1,0
150	Speiseröhre	52	3,2	13	0,9
151	Magen	91	5,5	98	6,8
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	1	0,1
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	115	7,0	188	13,1
154	Mastdarm	59	3,6	55	3,8
155	Leber	31	1,9	28	2,0
156	Gallenblase und Gallenwege	24	1,5	46	3,2
157	Bauchspeicheldrüse	70	4,3	91	6,4
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	2	0,1	5	0,3
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	11	0,7	20	1,4
150 - 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	455	27,7	545	38,1
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazu gehörigen Nebenhöhlen	1	0,1	1	0,1
161	Kehlkopf	36	2,2	2	0,1
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	540	32,9	109	7,6
163	Rippenfell	5	0,3	2	0,1
164	Thymus, Herz und Mediastinum	4	0,2	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-
160 - 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	586	35,7	114	8,0
170	Knochen	-	-	2	0,1
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	4	0,2	5	0,3
172	Melanome der Haut	17	1,0	15	1,0
173	Sonstige Haut	3	0,2	1	0,1
174	weibliche Brustdrüse	-	-	254	17,7
175	männliche Brustdrüse	1	0,1	-	-
170 - 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	25	1,5	277	19,3
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	33	2,3
180	Gebärmutterhals	-	-	34	2,4
181	Plazenta	-	-	1	0,1
182	Gebärmutterkörper	-	-	9	0,6
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	75	5,2
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	19	1,3
185	Prostata	122	7,4	-	-
186	Hoden	5	0,3	-	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	5	0,3	-	-
188	Harnblase	56	3,4	20	1,4
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	65	4,0	38	2,7
189.0	Niere	54	3,3	30	2,1
179 - 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	253	15,4	229	16,0
190	Auge	1	0,1	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	26	1,6	35	2,4
193	Schilddrüse	7	0,4	7	0,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	2	0,1
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	107	6,5	115	8,0
190 - 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze	141	8,6	159	11,1
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	34	2,1	31	2,2
201	Lymphogranulomatose	4	0,2	5	0,3
203	Multiples Myelom	14	0,9	30	2,1
204	Lymphatische Leukämie	17	1,0	5	0,3
205	Myeloische Leukämie	22	1,3	11	0,8
206 - 208	Sonstige Leukämien	13	0,8	11	0,8
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	104	6,3	93	6,5
	Insgesamt ohne ICD 173	1 637	99,8	1 431	99,9
	Bösartige Neubildungen insgesamt	1 640	100,0	1 432	100,0

6) Art der Diagnosesicherung 1993




7) Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1972-1993 Insgesamt




8) Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Alter 1993

Neuerkrankungen




Männer




Frauen

Sterbefälle



Männer



Frauen

Alter

0-39
 40-59
 60-79
 80 u.m.

4a) Bösartige Neubildungen insgesamt 1993

Alter von... bis unter...	Fallzahl				Inzidenz				Mortalität			
	mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	3	2	3	2	10,3	7,3	10,3	7,3	3,4	11,0	3,4	11,0
05 - 10	2	3	2	3	7,1	11,3	7,1	11,3	-	-	-	-
10 - 15	6	7	6	7	21,7	26,6	21,7	26,6	-	-	-	-
15 - 20	3	5	3	4	11,6	20,4	11,6	16,3	3,9	-	3,9	-
20 - 25	8	8	7	8	22,1	23,4	19,3	23,4	-	2,9	-	2,9
25 - 30	31	11	28	10	64,7	24,7	58,4	22,4	6,3	11,2	6,3	11,2
30 - 35	17	44	15	41	35,2	97,9	31,0	91,2	10,3	8,9	10,3	8,9
35 - 40	53	71	45	65	121,8	174,6	103,4	159,8	32,2	29,5	32,2	29,5
40 - 45	87	109	71	97	212,1	283,7	173,1	252,5	112,1	114,5	112,1	114,5
45 - 50	107	108	85	97	365,6	385,2	290,4	346,0	153,7	164,1	153,7	164,1
50 - 55	201	198	168	171	523,7	514,6	437,8	444,4	273,6	176,7	273,6	176,7
55 - 60	307	241	259	208	811,2	622,9	684,4	537,6	433,4	245,5	433,4	245,5
60 - 65	420	292	359	244	1355,4	888,1	1158,6	742,1	787,4	346,7	787,4	346,7
65 - 70	482	375	396	300	1942,2	1091,8	1595,7	873,4	1100,1	489,1	1100,1	489,1
70 - 75	446	419	371	353	2594,8	1403,2	2158,5	1182,1	1710,5	803,7	1698,9	803,7
75 - 80	261	282	204	225	2920,1	1503,7	2282,4	1199,7	2092,2	1050,4	2081,0	1050,4
80 - 85	225	359	185	298	3265,1	1967,0	2684,7	1632,8	2336,4	1375,3	2336,4	1375,3
85+	111	238	92	195	3118,9	1980,2	2585,0	1622,4	2725,5	1530,9	2725,5	1522,6
Insgesamt	2770	2772	2299	2328	526,8	496,1	437,2	416,6	311,9	256,3	311,3	256,1
Geschlechtsrelation männlich/weiblich					1,1		1,0		1,2		1,2	


Standard	Standardisierte Inzidenz				Standardisierte Mortalität			
	mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	340,1	248,3	282,9	212,0	195,7	109,8	195,4	109,7
Europastandard	492,0	347,0	407,5	294,5	294,9	162,2	294,3	162,2
BRD-87	622,2	419,4	512,8	353,7	386,0	210,2	385,2	210,1
Truncated	499,4	441,2	418,1	383,6	259,3	164,5	259,3	164,6

Altersklasse	Kumulative Inzidenz				Kumulative Mortalität			
	mit 173		ohne 173		mit 173		ohne 173	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	0,20	0,23	0,20	0,23	0,02	0,06	0,02	0,05
35 - 64	16,95	14,35	14,24	12,41	8,96	5,39	8,96	5,39
0 - 74	40,50	27,88	33,81	23,68	23,13	12,02	23,08	12,02


Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit				Mittleres Erkrankungsalter		"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230-234	
	mit 173		ohne 173		mit 173	ohne 173	mit 232	ohne 232
	HV	DCO	HV	DCO				
männlich	87,8	7,4	85,3	9,0	66	66	126	96
weiblich	87,0	7,8	84,6	9,3	68	68	270	214

4 b) Bösartige Neubildungen insgesamt 1993


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentualer Anteil der histologisch gesicherten und der DCO-Fälle an der Gesamtzahl 1971-1993



5a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	1,2	0,9	1,2	1,4	1,6	1,5	1,1	1,6	2,0	1,7
141	Zunge	3,9	3,0	4,0	4,4	7,3	4,6	3,5	4,6	5,0	9,4
142	Hauptspeicheldrüsen	1,6	1,1	1,6	2,0	1,7	0,7	0,5	0,8	0,9	0,5
144	Mundboden	2,1	1,6	2,1	2,4	3,6	1,3	1,0	1,3	1,5	2,4
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,4	1,0	1,4	1,6	1,8	2,4	1,8	2,4	2,6	4,5
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	4,6	3,6	4,6	5,1	9,0	6,0	4,6	6,2	6,7	11,7
150	Speiseröhre	6,6	4,9	7,1	8,9	8,1	7,4	5,3	7,7	9,2	10,3
151	Magen	33,0	23,4	35,1	46,2	31,0	31,9	21,9	33,8	45,3	27,2
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,7	0,5	0,7	0,9	1,1	0,5	0,3	0,5	0,7	0,6
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	27,5	19,9	30,1	39,6	26,3	32,0	21,8	33,2	44,1	28,8
154	Mastdarm	29,1	20,1	30,3	39,9	26,4	27,6	18,7	28,2	37,6	25,2
155	Leber	4,5	3,0	4,4	5,7	3,7	5,2	3,7	5,2	6,2	5,7
156	Gallenblase und Gallenwege	3,5	2,5	3,8	5,2	2,2	3,6	2,5	3,7	4,8	3,5
157	Bauchspeicheldrüse	9,2	6,7	9,7	12,2	10,0	11,2	7,8	12,0	15,9	10,2
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,6	0,5	0,8	1,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,1	0,7	1,2	1,6	0,6	1,6	1,3	2,1	2,7	1,6
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,7	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	0,9	1,2	1,6	1,9
161	Kehlkopf	10,3	7,9	11,0	12,9	17,4	8,8	6,4	9,1	10,8	12,5
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	100,1	71,7	104,5	131,1	109,0	97,8	68,3	100,4	126,7	101,0
163	Rippenfell	0,9	0,6	0,9	1,1	0,7	0,7	0,6	0,8	1,0	1,1
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,8	0,6	0,9	1,1	0,7	0,9	0,7	0,9	1,1	1,6
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-	-
170	Knochen	1,6	1,3	1,5	1,8	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,0	2,6	3,3	3,6	5,0	3,3	2,5	3,4	3,8	5,0
172	Melanome der Haut	4,3	3,4	4,5	5,0	7,0	5,6	4,3	5,5	6,0	8,4
173	Sonstige Haut	26,5	19,9	29,3	36,2	32,1	41,9	29,3	44,0	57,2	39,4
175	männliche Brustdrüse	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8	0,9	0,7	0,9	1,1	1,5
185	Prostata	44,7	30,2	48,3	68,3	21,4	42,8	27,3	44,0	64,1	20,6
186	Hoden	5,4	5,1	5,2	5,4	6,1	5,8	5,3	5,4	5,8	5,5
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	0,9	0,6	0,9	1,1	0,9	1,5	1,0	1,6	2,2	1,0
188	Harnblase	27,1	19,2	28,6	36,8	25,7	33,4	23,2	34,1	43,9	30,9
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	11,8	9,3	12,6	14,9	17,7	14,7	10,8	15,1	17,8	21,1
189.0	Niere	10,2	8,2	10,9	12,6	16,1	12,2	9,0	12,6	14,6	18,1
190	Auge	0,6	0,6	0,7	0,8	0,3	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	7,8	6,2	7,9	8,5	13,8	6,9	6,0	7,1	7,5	8,3
193	Schilddrüse	1,5	1,2	1,5	1,8	2,4	2,3	1,8	2,4	2,8	4,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,3	0,4	0,4	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	20,2	14,4	21,2	27,3	21,4	25,5	17,9	27,4	36,5	21,5
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	7,7	6,2	8,0	9,4	9,0	8,4	6,7	8,7	10,3	11,2
201	Lymphogranulomatose	3,4	2,9	3,3	3,5	3,5	3,2	2,8	3,2	3,6	3,4
203	Multiples Myelom	2,7	1,9	2,8	3,6	3,2	4,0	3,0	4,2	4,9	4,2
204	Lymphatische Leukämie	4,3	3,6	4,7	5,7	3,1	5,2	4,5	5,7	6,6	5,3
205	Myeloische Leukämie	2,8	2,3	2,8	3,2	3,4	2,3	1,7	2,3	3,0	3,1
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,4	1,9	2,6	3,2	3,0	3,0	2,3	3,0	3,9	1,8
	Insgesamt ohne ICD 173	396,4	288,7	417,7	530,1	413,3	418,3	296,4	432,0	552,3	421,0
	Bösartige Neubildungen insgesamt	422,9	308,6	447,0	566,3	445,4	460,2	325,7	476,0	609,5	460,4

noch: 5a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (männlich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1993				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	2,5	1,6	2,5	3,5	1,6	1,3	0,9	1,3	1,6	1,6	1,8	1,1	1,7	2,2	1,6
141	5,6	4,1	5,5	5,9	10,8	6,1	4,3	5,8	6,5	10,5	5,2	3,7	4,9	5,3	9,6
142	1,3	0,9	1,3	1,5	1,5	1,0	0,7	0,9	1,1	1,7	1,0	0,7	0,8	1,0	0,8
144	3,4	2,6	3,4	3,6	6,7	4,6	3,3	4,3	4,6	9,2	4,3	3,1	4,1	4,4	9,2
143 + 145	3,3	2,5	3,3	3,5	6,4	2,7	1,9	2,6	2,7	4,5	3,4	2,4	3,3	3,5	6,5
146 - 149	8,2	6,0	8,0	8,9	14,3	8,5	6,3	8,1	8,6	16,9	10,0	7,3	9,6	10,3	20,0
150	8,2	5,8	8,1	9,4	13,5	8,8	6,1	8,5	9,9	13,6	8,7	5,9	8,3	9,4	12,9
151	30,1	20,8	31,4	40,8	28,4	28,4	18,3	27,7	37,1	24,4	24,5	15,6	23,5	31,0	20,6
152	1,1	0,7	1,1	1,5	1,1	1,2	0,8	1,2	1,4	1,3	1,0	0,6	0,9	1,3	1,1
153	34,9	23,4	35,4	47,1	28,7	34,0	22,0	33,9	45,9	23,9	40,6	25,8	39,2	51,2	32,3
154	25,6	17,0	25,9	34,2	21,2	25,7	16,6	24,8	32,0	26,9	25,9	16,5	24,4	30,5	25,7
155	7,2	4,9	7,0	8,8	8,2	5,2	3,3	5,0	6,5	5,0	6,9	4,4	6,3	7,9	6,0
156	6,0	3,9	6,1	8,3	5,3	4,3	2,8	4,3	5,8	3,0	5,4	3,4	5,2	7,1	4,0
157	11,3	7,6	11,5	15,1	12,1	11,7	7,4	11,2	14,8	10,3	10,0	6,4	9,6	12,3	9,8
158	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	0,8	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4
159	1,8	1,4	2,2	2,9	1,4	1,5	1,0	1,6	2,1	0,7	0,9	0,6	0,9	1,2	0,5
160	0,7	0,5	0,6	0,7	1,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,8	0,5	0,7	0,8	1,1
161	10,1	7,1	9,8	11,2	17,1	11,6	7,8	11,0	12,6	16,7	11,6	7,9	11,0	12,7	17,3
162	103,6	70,9	103,7	129,9	116,5	103,6	68,0	100,2	127,6	102,7	98,6	63,7	92,8	115,2	96,9
163	1,4	1,0	1,4	1,9	1,3	0,7	0,4	0,6	0,9	0,8	1,4	1,0	1,4	1,8	1,8
164	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,3	0,4	0,6	0,2
165	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
170	1,7	1,5	1,5	1,8	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,0	1,1	1,2	1,1
171	3,0	2,4	3,1	3,5	4,0	2,6	2,0	2,6	2,8	4,1	2,3	1,9	2,2	2,5	2,3
172	7,0	5,3	6,9	7,6	10,7	8,2	6,0	7,7	8,5	11,7	7,5	5,2	7,0	8,0	9,9
173	61,9	43,0	63,4	81,1	64,3	72,2	48,1	71,7	91,1	68,5	85,1	55,3	81,8	105,4	76,6
175	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,7	0,9	0,6	0,9	1,1	0,8
185	47,2	30,5	48,7	69,0	21,8	42,6	26,7	42,8	60,6	18,9	60,2	36,9	58,5	82,2	29,9
186	7,4	6,4	6,6	7,0	6,8	6,9	5,8	6,1	6,5	5,9	7,6	6,6	6,6	7,0	7,0
187	1,1	0,9	1,3	1,5	1,4	0,9	0,6	0,9	1,2	0,8	1,3	0,9	1,4	1,7	1,5
188	33,6	22,9	34,0	43,9	30,4	30,5	20,0	29,9	38,6	25,0	32,0	20,2	30,5	40,1	25,6
189	13,5	9,6	13,4	16,1	17,7	14,1	9,8	13,9	16,4	17,3	19,2	13,0	18,2	21,6	21,7
189.0	11,9	8,6	11,9	14,2	16,0	12,1	8,5	11,9	13,8	15,4	17,4	11,9	16,5	19,3	20,7
190	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,8	0,5
191 + 192	6,9	5,8	6,9	7,4	8,2	7,5	6,0	7,3	8,2	8,3	6,6	5,4	6,3	6,8	7,7
193	2,4	1,8	2,3	2,6	3,7	2,0	1,5	1,9	2,2	2,5	3,2	2,4	3,0	3,3	4,8
194	1,0	0,9	1,1	1,1	0,9	1,4	1,5	1,5	1,4	1,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
195 - 199	21,2	14,3	21,8	29,4	19,5	19,9	12,6	19,7	26,9	15,3	22,0	14,1	21,1	27,1	21,7
200 + 202	8,6	6,4	8,4	9,9	11,0	9,5	7,1	9,2	10,9	12,3	12,7	9,2	12,1	14,7	15,1
201	3,5	2,8	3,4	3,7	4,9	2,2	1,8	2,0	2,3	2,1	2,8	2,3	2,6	2,9	3,0
203	2,3	1,7	2,4	2,6	3,0	4,2	2,7	4,1	5,4	3,7	3,3	2,0	3,1	4,2	2,6
204	4,9	4,4	5,3	6,1	4,5	4,9	4,1	5,1	6,1	4,1	5,0	3,7	4,8	5,8	4,3
205	3,9	3,1	3,9	4,5	5,2	5,8	4,2	5,7	6,9	5,8	4,8	3,4	4,6	5,7	4,6
206 - 208	2,3	1,6	2,2	2,9	1,9	1,5	1,0	1,5	2,1	0,9	1,1	0,7	1,2	1,6	0,5
Insg. ohne ICD 173	439,8	306,6	443,3	561,3	456,2	429,0	287,8	418,2	532,2	417,7	457,8	301,5	435,8	549,0	443,5
Insgesamt	501,7	349,6	506,7	642,4	520,5	501,2	335,9	489,9	623,3	486,2	542,9	356,8	517,6	654,4	520,1

5b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
141	Zunge	1,2	0,8	1,1	1,3	1,9	0,8	0,5	0,7	0,8	1,0
142	Hauptspeicheldrüsen	0,9	0,5	0,7	0,8	0,9	0,7	0,5	0,6	0,7	0,9
144	Mundboden	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,2	0,9	1,1	1,2	2,4	1,4	0,8	1,1	1,4	2,1
150	Speiseröhre	1,7	0,7	1,1	1,7	0,7	1,4	0,7	1,1	1,4	1,1
151	Magen	24,5	11,4	17,7	24,1	12,9	27,2	12,0	18,8	25,4	13,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	33,1	16,3	24,4	32,3	22,9	38,2	17,6	26,3	34,4	23,4
154	Mastdarm	23,6	11,9	17,6	22,6	18,0	25,1	12,5	18,3	22,7	20,1
155	Leber	4,7	2,4	3,5	4,6	3,3	3,1	1,7	2,3	2,9	2,1
156	Gallenblase und Gallenwege	11,1	5,1	7,9	10,4	5,4	14,0	5,7	9,0	12,7	5,1
157	Bauchspeicheldrüse	7,8	3,5	5,4	7,3	3,7	9,6	4,0	6,4	8,8	5,1
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,5	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,8	0,8	1,4	2,1	0,3	2,2	0,8	1,3	2,1	0,6
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
161	Kehlkopf	0,8	0,6	0,8	0,9	1,6	0,5	0,4	0,5	0,5	1,0
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	12,1	6,3	9,3	11,5	10,7	12,8	6,7	9,5	11,6	12,7
163	Rippenfell	0,9	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,2	0,4	0,6	0,3
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	1,2	0,9	1,0	1,2	0,6	0,8	0,8	0,7	0,8	0,3
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,1	2,0	2,6	3,1	3,2	3,4	2,5	3,0	3,2	3,4
172	Melanome der Haut	5,9	4,4	5,4	5,9	8,3	6,8	4,8	6,1	6,8	9,9
173	Sonstige Haut	26,1	13,5	20,2	25,8	19,8	37,2	18,0	27,0	34,6	28,2
174	Brustdrüse	84,6	52,9	72,2	82,3	117,9	93,7	56,8	77,1	88,2	123,6
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	1,9	0,8	1,2	1,5	1,2	2,6	1,1	1,8	2,4	1,3
180	Gebärmutterhals	20,5	13,8	18,1	20,1	30,2	16,3	11,1	14,3	15,7	23,1
181	Plazenta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
182	Gebärmutter	23,9	13,9	19,5	22,5	28,3	25,6	13,5	19,3	22,8	25,3
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	13,5	8,0	11,1	13,2	15,9	17,4	10,5	14,1	16,1	20,9
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	5,0	2,4	3,7	5,1	3,5	4,7	2,1	3,3	4,4	2,7
188	Harnblase	6,4	3,2	4,7	6,0	4,5	10,9	5,2	7,8	9,9	7,1
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	6,4	4,1	5,3	5,9	7,0	9,1	5,0	6,9	8,2	9,2
189.0	Niere	5,4	3,5	4,5	5,0	5,8	7,7	4,4	6,0	7,0	8,6
190	Auge	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	1,0	0,7	0,8	0,9	0,8
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,7	5,3	6,2	6,4	9,6	6,1	5,0	5,8	6,0	8,6
193	Schilddrüse	5,2	3,7	4,7	5,4	6,2	6,0	4,1	5,2	5,9	8,8
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,7	0,6	0,7	0,7	1,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	23,9	11,9	18,0	23,5	16,6	27,6	12,3	18,8	25,5	14,9
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	5,4	3,2	4,3	5,0	5,3	8,2	5,1	6,5	7,6	8,8
201	Lymphogranulomatose	1,8	1,4	1,6	1,9	1,5	2,1	1,7	1,8	2,1	1,9
203	Multiples Myelom	2,8	1,4	2,0	2,6	1,7	3,6	1,9	2,8	3,3	3,7
204	Lymphatische Leukämie	2,4	1,7	2,1	2,4	1,7	2,6	1,7	2,1	2,5	1,4
205	Myeloische Leukämie	3,1	2,0	2,6	3,1	1,9	3,5	2,2	2,9	3,4	3,5
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,5	1,8	2,2	2,4	2,7	2,3	1,5	1,8	2,2	1,7
	Insgesamt ohne ICD 173	354,8	202,4	283,9	344,0	357,5	395,7	215,6	302,2	366,9	373,3
	Bösartige Neubildungen insgesamt	380,9	215,9	304,1	369,8	377,3	432,9	233,6	329,2	401,5	401,5

noch: 5b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (weiblich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1993				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
141	0,9	0,5	0,7	0,9	1,2	0,9	0,5	0,7	0,8	1,2	1,2	0,7	0,9	1,1	1,5
142	0,8	0,5	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,3	0,5	0,7	0,6
144	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	1,1	0,9	0,6	0,8	0,9	1,8
143 + 145	0,8	0,5	0,7	0,7	1,2	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	1,4	0,8	1,0	1,2	1,4
146 - 149	1,3	0,7	1,1	1,2	1,0	1,7	1,2	1,5	1,6	2,8	2,5	1,6	2,1	2,3	3,8
150	1,9	0,8	1,3	1,7	1,3	2,0	0,9	1,4	1,7	1,6	1,6	0,7	1,1	1,3	1,3
151	26,9	11,1	17,2	23,5	12,4	24,1	9,8	15,0	20,1	12,0	21,6	8,3	12,7	17,4	9,4
152	1,5	0,6	0,9	1,2	0,8	0,9	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	0,5	0,7	0,9	0,4
153	44,1	20,0	29,7	38,5	28,0	43,5	18,3	27,5	36,3	23,1	47,6	19,7	29,5	38,6	27,7
154	21,7	9,9	14,8	18,9	15,4	22,3	10,1	14,8	19,0	15,7	23,0	10,2	15,1	19,2	17,2
155	3,3	1,5	2,2	2,8	2,1	4,0	1,5	2,4	3,3	1,8	3,9	1,7	2,4	3,2	2,2
156	13,6	5,6	8,5	11,5	7,7	14,7	5,4	8,5	11,9	4,2	10,8	4,3	6,6	8,6	5,2
157	10,5	4,2	6,6	8,9	4,7	11,6	4,6	7,1	9,6	5,9	10,9	4,2	6,4	8,7	4,7
158	0,7	0,4	0,5	0,6	0,8	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,9	0,4	0,6	0,7	0,5
159	2,0	0,6	1,1	1,7	0,5	1,6	0,6	0,9	1,3	0,4	2,1	0,6	1,1	1,6	0,4
160	0,7	0,4	0,5	0,6	1,1	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
161	1,3	0,8	1,2	1,2	2,3	1,2	0,6	0,8	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,9	1,6
162	14,0	6,9	10,0	12,3	11,9	17,7	8,5	12,3	15,1	15,5	20,0	10,4	14,6	17,4	19,9
163	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
164	0,5	0,4	0,5	0,5	0,9	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
165	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
170	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	0,7	0,4	0,5	0,6	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
171	3,0	2,0	2,4	2,8	3,2	1,6	1,1	1,3	1,5	1,4	2,3	1,8	2,0	2,1	2,2
172	8,5	5,8	7,3	8,2	11,7	9,8	6,4	8,1	9,1	11,2	8,2	5,5	6,9	7,7	11,2
173	53,5	25,3	37,2	47,1	38,9	68,6	30,6	45,1	57,7	43,8	78,3	35,5	51,8	65,5	56,6
174	97,2	57,0	77,4	89,1	124,4	95,5	55,0	74,8	85,7	121,6	107,2	61,2	83,4	95,4	133,0
179	2,7	1,1	1,6	2,4	1,4	3,0	1,3	2,0	2,5	2,0	2,2	1,1	1,6	1,9	1,8
180	16,7	10,9	14,2	15,5	22,6	15,3	10,3	13,2	14,3	22,7	15,6	10,8	13,7	14,6	26,2
181	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
182	28,2	14,5	20,4	24,4	25,4	20,9	10,6	15,0	17,8	19,7	25,9	12,9	18,4	21,8	22,7
183	16,3	9,2	12,6	14,7	17,5	16,8	8,8	12,2	14,6	15,8	17,3	8,8	12,4	14,5	15,1
184	5,5	2,2	3,4	4,8	2,5	4,6	1,9	2,9	3,9	2,4	4,9	2,0	3,1	3,9	2,5
188	10,0	4,2	6,3	8,4	4,3	10,1	4,2	6,5	8,5	6,0	10,9	4,4	6,6	8,8	4,7
189	11,2	6,0	8,3	9,9	9,2	8,1	4,3	5,9	6,9	6,8	11,5	5,9	8,2	10,0	11,1
189.0	9,9	5,5	7,6	8,8	8,8	7,5	4,0	5,5	6,4	6,7	10,3	5,4	7,5	8,9	10,6
190	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6
191 + 192	6,1	5,7	6,1	5,9	6,6	7,0	5,7	6,5	6,6	9,3	6,5	4,9	5,7	5,9	7,7
193	5,6	3,7	4,7	5,3	6,4	5,0	3,3	4,1	4,6	6,0	5,9	3,9	5,0	5,6	8,5
194	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	0,6	0,7	0,7	1,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
195 - 199	21,2	9,1	14,0	18,5	10,9	20,3	7,9	12,4	16,7	8,7	19,5	8,0	12,1	15,9	11,0
200 + 202	7,6	4,5	5,8	6,8	6,8	6,9	3,4	4,7	5,9	5,4	11,6	6,6	8,7	10,2	11,3
201	2,4	1,9	2,1	2,3	2,1	2,0	1,7	1,8	1,9	2,4	2,0	1,8	1,9	2,1	1,7
203	3,0	1,4	2,0	2,6	2,0	4,6	2,1	3,0	3,9	3,4	4,4	2,0	2,9	3,6	3,2
204	3,5	2,3	2,8	3,2	1,9	4,1	2,2	2,9	3,5	2,2	3,5	2,5	2,8	3,1	2,5
205	3,5	2,0	2,6	3,1	3,1	3,3	1,8	2,3	1,7	0,8	4,5	2,8	3,5	4,1	4,0
206 - 208	2,6	1,2	1,8	2,3	1,0	1,9	0,9	1,3	1,7	0,8	1,6	0,6	0,9	1,2	0,6
Insg. ohne ICD 173	404,2	211,8	296,2	360,4	360,1	393,2	198,8	278,9	340,2	342,1	420,3	215,5	299,4	360,0	383,8
Insgesamt	457,7	237,1	333,4	407,5	399,0	461,8	229,4	324,0	397,9	385,9	498,6	251,0	351,2	425,5	440,4

6a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,0
141	Zunge	1,4	1,1	1,5	1,7	3,0	1,9	1,4	1,9	2,2	3,8
142	Hauptspeicheldrüsen	0,5	0,4	0,6	0,8	0,7	0,5	0,3	0,5	0,6	0,3
144	Mundboden	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,7	1,0	1,1	1,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	2,8	2,0	2,8	3,2	4,7	3,6	2,8	3,8	4,2	6,1
150	Speiseröhre	7,7	5,9	8,5	10,7	10,0	6,5	4,7	6,8	8,4	8,0
151	Magen	25,8	17,9	27,9	37,9	19,4	28,0	18,7	29,5	41,5	19,0
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,4	0,3	0,4	0,6	0,5
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	20,6	14,5	23,0	32,1	14,4	21,8	14,6	23,1	32,0	15,6
154	Mastdarm	15,6	10,5	16,4	22,8	10,9	13,7	9,4	14,3	19,7	10,6
155	Leber	3,0	2,0	3,0	3,9	2,0	5,4	3,7	5,4	6,8	5,3
156	Gallenblase und Gallenwege	3,2	2,2	3,4	4,8	1,6	3,9	2,7	4,2	5,6	3,2
157	Bauchspeicheldrüse	9,4	7,0	10,0	12,4	11,9	11,5	7,8	11,9	15,8	11,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,5	0,4	0,7	0,9	0,2	0,7	0,5	0,8	1,0	0,9
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,0	2,0	3,1	4,1	1,8	2,8	1,8	3,2	4,9	0,9
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
161	Kehlkopf	5,3	3,7	5,4	7,1	6,7	4,8	3,1	4,7	6,2	4,6
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	96,0	68,1	100,3	127,9	98,5	91,3	62,7	93,3	120,9	84,7
163	Rippenfell	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	1,0	0,8
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,7	0,5	0,7	0,9	0,3	0,5	0,4	0,6	0,7	0,7
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
170	Knochen	2,0	1,5	2,0	2,6	1,8	1,5	1,1	1,4	1,7	2,1
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,1	1,0	1,2	1,4	1,3	2,1	1,6	2,1	2,4	2,8
172	Melanome der Haut	1,7	1,3	1,7	2,0	3,2	1,7	1,2	1,8	2,1	2,3
173	Sonstige Haut	0,7	0,5	1,0	1,6	0,2	0,7	0,4	0,7	1,1	0,4
175	männliche Brustdrüse	0,5	0,3	0,6	0,8	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
185	Prostata	22,5	15,2	26,2	39,1	6,3	20,6	12,8	22,1	33,8	4,9
186	Hoden	1,1	1,0	1,1	1,2	0,9	1,5	1,3	1,3	1,5	0,9
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	0,5	0,3	0,5	0,7	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
188	Harnblase	10,2	7,2	11,2	15,4	6,4	8,2	5,4	8,4	11,8	4,4
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	6,9	5,2	7,2	8,5	8,7	9,9	7,1	10,5	13,4	12,0
189.0	Niere	6,4	4,9	6,7	7,9	8,6	6,5	4,7	6,7	8,2	9,7
190	Auge	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,1	5,0	6,2	6,7	9,9	4,2	3,5	4,4	4,7	5,9
193	Schilddrüse	0,9	0,7	1,0	1,3	1,2	0,9	0,7	0,9	1,1	0,7
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	16,7	12,1	17,7	22,7	17,4	21,8	14,9	22,8	31,4	16,0
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	3,3	2,6	3,4	3,9	3,5	4,6	3,4	4,8	6,1	5,6
201	Lymphogranulomatose	2,1	1,7	2,2	2,5	2,9	1,3	1,0	1,4	1,6	1,3
203	Multiples Myelom	1,3	0,8	1,3	2,0	0,8	2,6	1,9	2,8	3,4	1,7
204	Lymphatische Leukämie	1,9	1,5	2,1	2,5	1,6	2,7	2,2	2,7	3,4	1,6
205	Myeloische Leukämie	2,5	1,8	2,5	3,1	3,0	2,3	1,7	2,2	2,8	2,3
206 - 208	Sonstige Leukämien	3,5	2,9	3,6	4,1	3,8	2,7	2,0	2,8	3,6	2,1
	Insgesamt ohne ICD 173	282,5	202,0	301,5	394,8	261,8	288,6	198,7	299,6	399,3	245,9
	Bösartige Neubildungen insgesamt	283,2	202,5	302,5	396,4	262,0	289,3	199,1	300,3	400,4	246,3

noch: 6a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (männlich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1993				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,7	0,2
141	2,7	1,9	2,6	2,9	4,9	2,5	1,8	2,4	2,7	3,6	3,5	2,4	3,3	3,6	6,2
142	0,7	0,5	0,7	1,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	0,4	0,3	0,4	0,6	0,2
144	1,2	0,9	1,2	1,3	2,4	1,8	1,2	1,7	1,9	2,9	2,4	1,6	2,3	2,5	3,8
143 + 145	0,7	0,5	0,7	0,8	1,3	1,0	0,7	1,0	1,0	1,8	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6
146 - 149	4,3	3,3	4,3	4,6	8,2	6,3	4,4	6,0	6,7	11,1	6,5	4,6	6,2	7,0	11,7
150	8,3	6,0	8,5	10,0	12,3	9,2	6,2	8,9	10,6	12,5	9,7	6,6	9,2	10,7	13,9
151	23,0	15,3	24,3	33,1	15,8	20,9	13,0	20,5	28,9	15,2	19,8	12,2	19,3	26,8	13,6
152	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
153	20,8	13,6	21,8	30,6	13,8	24,3	15,1	24,0	33,9	17,0	23,9	14,7	23,4	32,4	12,9
154	12,3	8,3	13,0	17,4	9,0	11,6	7,3	11,5	15,9	8,4	13,0	8,1	12,6	16,7	10,5
155	5,8	3,9	5,7	7,3	6,2	4,6	3,0	4,5	5,9	3,8	5,6	3,5	5,3	6,9	4,4
156	4,5	2,9	4,5	6,4	2,7	3,3	2,2	3,4	4,5	1,7	4,2	2,7	4,2	5,7	3,0
157	12,9	8,5	12,9	17,2	14,4	13,2	8,7	12,9	16,7	11,6	11,0	6,9	10,7	14,4	9,0
158	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
159	2,5	1,8	3,0	4,2	1,1	2,4	1,4	2,5	3,8	0,2	2,2	1,3	2,1	3,0	0,9
160	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
161	5,4	3,6	5,3	6,7	6,7	5,0	3,4	4,9	5,8	6,4	6,3	4,1	6,0	7,4	7,7
162	102,7	69,4	103,3	131,9	104,1	98,4	64,1	97,5	124,3	86,8	100,6	64,4	95,2	121,6	90,2
163	1,1	0,8	1,1	1,4	1,6	0,7	0,4	0,6	0,7	0,9	0,9	0,6	0,9	1,1	0,8
164	0,3	0,2	0,4	0,6	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,6	0,7
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,9	0,6	0,8	1,0	0,9	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5
171	1,3	0,9	1,3	1,5	1,4	1,2	1,0	1,3	1,3	1,7	1,9	1,2	1,7	2,1	2,3
172	2,5	1,7	2,3	2,8	3,3	2,4	1,8	2,4	2,6	3,0	3,0	2,1	2,8	3,3	4,4
173	0,6	0,4	0,7	0,9	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,3	0,6	0,8	0,1
175	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
185	24,1	14,8	25,7	39,7	4,9	22,8	13,7	23,3	35,4	6,3	23,3	13,8	24,0	36,4	5,3
186	1,0	1,1	0,9	0,9	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0	0,7	0,4	0,6	0,7	0,8
187	0,3	0,2	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	0,5	0,3	0,4	0,6	0,7
188	11,7	7,2	11,5	16,8	6,3	11,2	7,1	11,4	16,4	5,1	10,2	6,2	10,3	14,8	3,7
189	9,6	6,5	9,7	13,1	7,9	8,8	5,9	8,6	10,8	8,8	10,7	6,9	10,3	13,2	9,3
189.0	7,5	5,3	7,6	9,9	7,0	7,5	5,1	7,4	9,1	7,7	8,4	5,4	7,9	9,9	7,9
190	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
191 + 192	5,2	4,2	5,2	5,8	6,7	4,5	3,8	4,5	4,8	5,2	4,8	3,5	4,5	4,9	6,3
193	1,3	0,9	1,3	1,6	2,1	0,9	0,6	0,9	1,1	0,5	1,2	0,8	1,1	1,4	1,5
194	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
195 - 199	21,6	14,6	22,6	30,1	18,4	21,7	13,8	21,5	29,5	18,0	20,6	13,0	20,0	26,6	16,9
200 + 202	5,2	3,6	5,1	6,6	5,2	5,4	3,7	5,4	6,9	5,0	6,0	3,8	5,8	7,7	4,9
201	1,1	0,8	1,1	1,3	1,2	1,0	0,7	0,9	1,2	1,0	0,9	0,6	0,8	1,0	1,1
203	0,7	0,5	0,7	0,9	0,8	3,0	1,8	2,8	4,0	2,6	3,3	2,0	3,1	4,3	1,9
204	3,0	2,4	3,2	3,9	2,6	2,0	1,5	1,9	2,5	2,0	2,5	1,6	2,4	3,3	1,5
205	2,5	1,8	2,5	2,9	3,8	4,1	2,8	3,9	4,9	3,9	4,2	3,1	4,1	4,8	4,7
206 - 208	2,7	2,1	2,7	3,6	1,8	2,4	1,8	2,5	3,2	1,1	1,7	1,1	1,7	2,5	0,5
Insg. ohne ICD 173	305,3	206,5	311,6	412,1	275,0	300,2	195,5	295,4	392,5	251,2	308,2	196,6	297,8	391,7	257,5
Insgesamt	305,9	206,9	312,3	413,0	275,0	300,6	195,8	295,9	393,1	251,5	308,7	196,9	298,4	392,5	257,6

6b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	1978 - 1980					1981 - 1983				
		Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	Lippe	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-
141	Zunge	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6
142	Hauptspeicheldrüsen	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
144	Mundboden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,6	0,5	0,6	0,7	1,4	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7
150	Speiseröhre	1,8	0,7	1,2	1,7	0,8	1,5	0,7	1,1	1,5	1,0
151	Magen	19,4	8,7	13,8	19,1	8,8	24,0	9,8	15,8	22,4	9,5
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	25,2	11,9	18,4	24,7	15,2	25,9	11,2	17,5	24,0	12,4
154	Mastdarm	13,8	6,9	10,5	13,6	10,5	12,9	5,9	9,0	11,9	7,0
155	Leber	4,0	2,0	3,0	4,0	3,3	3,8	2,0	2,7	3,4	2,1
156	Gallenblase und Gallenwege	11,2	5,2	7,9	10,4	6,1	11,7	4,9	7,6	10,5	6,1
157	Bauchspeicheldrüse	9,6	4,3	6,8	9,0	4,3	11,4	4,7	7,4	10,4	5,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,8	0,4	0,6	0,8	0,8	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,5	1,4	2,5	3,8	1,1	3,9	1,5	2,5	3,8	1,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
161	Kehlkopf	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	10,3	5,5	8,0	10,1	9,5	12,9	6,4	9,4	11,7	10,2
163	Rippenfell	0,9	0,5	0,7	0,9	0,9	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
170	Knochen	1,2	0,8	1,0	1,2	0,4	0,8	0,5	0,7	0,8	0,4
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,4	1,6	2,1	2,4	2,1	1,5	0,9	1,1	1,3	0,7
172	Melanome der Haut	1,5	1,0	1,3	1,5	1,9	1,6	0,9	1,2	1,4	1,1
173	Sonstige Haut	1,1	0,5	0,9	1,3	0,1	1,0	0,4	0,7	1,0	0,0
174	Brustdrüse	37,0	21,4	30,2	35,7	44,3	39,2	21,8	31,0	36,4	45,3
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	4,0	2,0	2,9	3,9	3,0	6,9	3,2	4,8	6,2	4,0
180	Gebärmutterhals	7,8	4,6	6,4	7,5	9,3	6,2	3,7	4,9	5,8	6,4
181	Plazenta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
182	Gebärmutter	5,5	2,7	3,9	4,9	3,8	2,2	0,8	1,3	1,8	0,5
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	13,1	7,3	10,4	12,3	14,7	13,6	7,0	10,2	12,4	12,3
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	7,3	3,5	5,3	6,9	4,2	5,1	2,1	3,3	4,7	2,2
188	Harnblase	3,1	1,3	2,0	2,9	0,8	3,2	1,4	2,1	2,9	1,6
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	4,6	2,4	3,5	4,2	4,2	4,8	2,2	3,4	4,5	3,1
189.0	Niere	4,3	2,3	3,3	3,9	3,9	3,5	1,7	2,5	3,2	2,6
190	Auge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	5,1	3,5	4,4	4,7	6,7	3,8	3,0	3,6	3,6	5,2
193	Schilddrüse	2,2	1,3	1,9	2,3	2,6	2,4	1,1	1,6	2,1	1,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	19,6	9,2	14,2	19,1	11,2	23,4	9,7	15,6	21,9	9,7
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	1,9	1,0	1,5	1,7	1,7	2,9	1,7	2,3	2,7	1,9
201	Lymphogranulomatose	1,3	0,8	1,1	1,3	1,7	1,4	0,8	1,0	1,3	1,2
203	Multipl. Myelom	1,6	0,8	1,1	1,4	1,0	2,2	1,0	1,5	1,9	1,0
204	Lymphatische Leukämie	1,5	1,1	1,4	1,5	1,3	2,1	1,1	1,6	2,0	1,3
205	Myeloische Leukämie	2,2	1,2	1,7	2,2	0,9	2,6	1,6	2,1	2,5	2,9
206 - 208	Sonstige Leukämien	3,2	2,4	2,8	3,2	2,7	2,8	1,6	2,1	2,6	1,8
	Insgesamt ohne ICD 173	229,5	119,4	175,0	222,0	183,4	244,4	115,5	171,6	222,6	163,0
	Bösartige Neubildungen insgesamt	230,6	119,9	175,9	223,3	183,5	245,4	115,9	172,3	223,6	163,0

noch: 6b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1978 bis 1993 (weiblich)

ICD Code	1984 - 1986					1987 - 1989					1990 - 1993				
	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD 87	Trunc
140	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	-
141	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	0,4	0,5	0,9	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3
142	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
144	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6
143 + 145	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
146 - 149	0,8	0,5	0,6	0,7	1,2	1,1	0,7	0,9	1,0	1,7	1,3	0,8	1,1	1,2	2,1
150	2,4	1,0	1,6	2,0	1,5	2,1	0,9	1,4	1,7	1,5	2,0	0,8	1,2	1,6	0,9
151	21,5	8,2	13,1	18,6	8,1	19,2	7,3	11,6	15,9	7,3	17,8	6,5	10,1	14,2	7,5
152	0,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
153	29,6	11,9	18,7	25,6	13,1	29,1	10,8	17,4	23,9	11,9	30,0	10,6	16,8	23,5	11,2
154	11,6	4,7	7,2	9,9	6,1	11,1	4,4	6,8	9,2	5,8	10,6	4,1	6,3	8,6	5,1
155	3,8	1,6	2,4	3,2	1,9	4,3	1,7	2,6	3,6	2,3	4,1	1,7	2,5	3,3	2,1
156	12,1	4,9	7,5	10,2	6,4	12,0	4,3	6,8	9,6	4,0	10,0	3,8	5,9	8,0	4,2
157	11,0	4,5	7,0	9,4	5,6	13,1	5,3	8,0	10,9	7,0	12,6	4,8	7,4	10,0	5,2
158	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7	0,7	0,3	0,4	0,6	0,4
159	3,8	1,3	2,2	3,3	0,7	3,2	1,0	1,7	2,5	0,6	3,6	1,1	1,9	2,7	0,9
160	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
161	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8
162	15,2	7,5	10,8	13,3	12,1	16,0	7,2	10,7	13,4	11,8	20,1	9,8	14,0	17,2	17,4
163	0,4	0,2	0,3	0,4	0,1	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5
164	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	0,5	0,3	0,3	0,4	0,0	0,5	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
171	2,4	1,2	1,6	2,1	1,2	2,1	1,2	1,6	1,8	2,2	1,7	0,9	1,2	1,4	1,3
172	2,0	1,2	1,5	1,9	1,8	2,7	1,5	2,1	2,4	3,6	2,3	1,4	1,8	2,1	2,6
173	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,4	0,1	0,2	0,3	-
174	42,7	23,2	32,4	38,4	47,0	41,5	21,6	30,6	36,3	44,2	45,0	22,7	32,4	38,6	45,7
179	5,8	2,5	3,8	4,9	3,6	5,3	2,3	3,5	4,5	3,4	4,7	1,9	2,9	3,9	2,5
180	6,4	3,7	5,1	5,8	7,3	5,5	2,9	4,1	4,8	5,8	6,1	3,7	4,8	5,4	8,2
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
182	3,3	1,3	2,1	2,8	1,6	3,8	1,5	2,3	3,2	1,7	3,4	1,4	2,1	2,8	1,8
183	13,8	6,9	9,9	12,0	11,8	15,2	7,4	10,5	12,9	12,2	13,3	6,0	8,9	11,1	9,4
184	5,6	2,4	3,7	4,9	3,1	4,1	1,6	2,5	3,4	1,7	3,1	1,0	1,7	2,3	0,9
188	4,1	1,5	2,4	3,5	1,0	5,8	2,0	3,4	4,7	1,8	3,7	1,3	2,1	2,9	1,3
189	6,3	2,8	4,1	5,3	4,2	6,0	2,8	4,0	5,0	3,6	6,1	2,4	3,7	5,0	3,0
189.0	5,3	2,3	3,5	4,5	3,5	5,5	2,6	3,7	4,6	3,6	4,7	1,9	2,9	3,9	2,5
190	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
191 + 192	3,1	2,5	2,8	2,9	3,1	2,7	2,0	2,4	2,5	3,2	4,8	3,3	4,0	4,3	5,7
193	2,2	1,1	1,6	1,9	2,4	1,9	0,8	1,2	1,6	1,2	2,2	0,9	1,3	1,7	1,0
194	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3
195 - 199	21,8	8,8	13,9	19,0	9,6	21,9	8,2	13,0	18,0	8,5	20,4	7,3	11,6	16,1	7,4
200 + 202	4,8	2,3	3,3	4,2	4,0	5,0	1,9	2,9	4,1	2,3	4,8	2,2	3,2	4,0	3,1
201	1,1	0,8	1,0	1,1	1,9	1,0	0,6	0,8	0,9	0,9	0,7	0,4	0,5	0,7	0,6
203	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	3,2	1,4	2,0	2,6	1,7	4,4	1,7	2,4	3,6	2,1
204	1,7	0,7	1,1	1,5	0,3	1,9	0,8	1,2	1,6	0,5	1,5	0,8	1,0	1,3	0,5
205	3,2	1,8	2,4	2,8	3,0	2,1	1,2	1,6	1,9	2,5	3,2	1,3	2,0	2,6	1,2
206 - 208	9,2	1,3	2,0	2,7	1,6	11,9	1,2	1,7	2,3	0,9	2,4	1,1	1,4	1,9	0,6
Insg. ohne ICD 173	255,5	114,2	169,1	217,8	168,7	259,4	108,9	162,4	210,4	159,8	250,2	107,9	159,8	205,8	159,5
Insgesamt	255,9	114,4	169,4	218,2	168,9	259,9	109,1	162,7	210,8	159,9	250,6	108,0	160,0	206,1	159,5

7a) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	1,9	1,2	1,6	1,8	1,5
141	Zunge	5,1	3,7	4,9	5,2	8,3
142	Hauptspeicheldrüsen	1,0	0,7	0,9	1,0	1,1
144	Mundboden	4,0	2,8	3,8	4,0	7,8
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	5,1	3,9	5,2	5,9	11,2
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	7,2	5,4	7,0	7,5	15,6
150	Speiseröhre	8,9	5,7	8,2	9,5	11,7
151	Magen	21,9	13,8	21,4	28,2	18,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,6	0,4	0,5	0,5	0,8
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	39,7	24,6	37,2	48,7	30,9
154	Mastdarm	24,7	15,7	23,0	29,1	24,0
155	Leber	6,8	4,3	6,1	7,6	5,5
156	Gallenblase und Gallenwege	6,1	3,8	5,7	7,6	6,1
157	Bauchspeicheldrüse	10,1	6,4	9,0	11,1	10,8
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,5	0,9	1,3	1,7	1,3
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,4	0,2	0,3	0,5	0,4
161	Kehlkopf	10,8	7,3	10,0	11,5	14,8
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	90,3	57,3	83,6	104,0	85,2
163	Rippenfell	1,1	0,7	1,0	1,4	1,3
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,4	0,2	0,4	0,6	0,3
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	0,8	0,7	0,9	0,9	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,9	2,5	3,0	3,7	2,9
172	Melanome der Haut	8,0	5,6	7,3	8,5	9,3
173	Sonstige Haut	89,6	57,3	84,5	109,4	81,3
175	männliche Brustdrüse	1,1	0,7	1,1	1,4	0,7
185	Prostata	65,6	39,3	61,1	85,7	37,2
186	Hoden	7,4	5,9	6,1	6,4	6,8
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	1,0	0,6	0,9	1,2	0,7
188	Harnblase	21,3	13,3	20,4	27,2	13,9
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	19,6	13,3	18,4	21,6	20,4
189.0	Niere	16,9	11,6	15,9	18,2	18,0
190	Auge	1,1	0,7	1,0	1,3	0,3
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	8,2	7,1	7,9	7,9	8,8
193	Schilddrüse	4,0	3,1	3,7	4,0	5,9
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	21,9	13,7	20,1	25,5	22,1
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	11,4	7,6	10,4	12,5	16,6
201	Lymphogranulomatose	2,3	1,7	2,0	2,0	4,3
203	Multiples Myelom	3,2	2,1	3,2	4,2	3,7
204	Lymphatische Leukämie	4,8	3,0	4,2	5,0	3,2
205	Myeloische Leukämie	3,6	2,4	3,3	4,4	3,0
206 - 208	Sonstige Leukämien	1,0	0,5	0,9	1,3	0,4
	Insgesamt ohne ICD 173	437,2	282,9	407,5	512,8	418,1
	Bösartige Neubildungen insgesamt	526,8	340,1	492,0	622,2	499,4

7b) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	0,2	0,1	0,1	0,2	-
141	Zunge	0,9	0,7	0,9	1,0	1,9
142	Hauptspeicheldrüsen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8
144	Mundboden	1,1	0,6	0,9	0,9	1,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,4	1,2	1,3	1,3	1,9
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	3,2	2,3	2,9	3,2	5,1
150	Speiseröhre	1,6	0,8	1,2	1,4	1,5
151	Magen	22,7	9,2	13,8	18,3	11,9
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,2	0,0	0,1	0,1	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	52,3	21,1	32,0	42,2	31,0
154	Mastdarm	21,5	10,0	14,5	18,0	19,4
155	Leber	4,7	1,8	2,7	3,8	3,4
156	Gallenblase und Gallenwege	12,3	5,2	7,6	9,6	6,7
157	Bauchspeicheldrüse	12,9	4,8	7,3	10,0	5,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	2,0	0,6	1,0	1,5	0,7
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,7	0,4	0,5	0,6	1,1
161	Kehlkopf	0,9	0,8	1,0	1,0	2,3
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	19,9	10,4	14,4	17,2	18,3
163	Rippenfell	0,2	0,1	0,1	0,1	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,3	1,0	1,1	1,2	1,1
172	Melanome der Haut	8,1	5,6	6,9	7,7	11,4
173	Sonstige Haut	79,5	36,3	52,6	65,7	57,7
174	Brustdrüse	102,4	57,0	78,3	89,5	125,2
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	1,6	0,9	1,2	1,5	1,6
180	Gebärmutterhals	15,0	10,1	12,8	13,6	24,3
181	Plazenta	-	-	-	-	-
182	Gebärmutter	24,7	12,9	18,0	21,0	23,0
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	17,7	9,0	12,6	15,0	15,6
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva usw.)	5,7	2,3	3,5	4,5	3,2
188	Harnblase	6,6	2,5	3,8	5,3	2,6
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	10,0	5,1	7,0	8,6	9,2
189.0	Niere	8,9	4,7	6,3	7,7	8,8
190	Auge	0,9	0,4	0,6	0,7	0,3
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	7,0	5,7	6,3	6,4	8,5
193	Schilddrüse	7,2	4,9	6,3	6,6	13,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,7	0,8	0,7	0,6	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	21,3	8,2	12,6	17,2	10,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	10,2	5,3	7,3	8,6	9,2
201	Lymphogranulomatose	1,8	1,4	1,6	1,6	1,6
203	Multiplies Myelom	5,0	2,5	3,5	4,2	4,4
204	Lymphatische Leukämie	2,7	1,8	2,0	2,4	1,4
205	Myeloische Leukämie	5,2	3,0	3,9	4,6	3,4
206 - 208	Sonstige Leukämien	1,3	0,5	0,7	1,0	0,4
	Insgesamt ohne ICD 173	416,6	212,0	294,5	353,7	383,6
	Bösartige Neubildungen insgesamt	496,1	248,3	347,0	419,4	441,2

8a) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	-	-	-	-	-
141	Zunge	3,8	2,7	3,6	3,8	6,7
142	Hauptspeicheldrüsen	1,0	0,6	1,0	1,4	-
144	Mundboden	2,9	1,8	2,7	3,0	3,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,1	0,2	0,2	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	6,7	4,9	6,4	6,7	14,7
150	Speiseröhre	9,9	6,6	9,1	10,2	13,6
151	Magen	17,3	10,8	17,1	24,2	13,5
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	21,9	13,0	20,6	29,2	12,7
154	Mastdarm	11,2	6,9	11,2	15,4	8,0
155	Leber	5,9	3,5	5,3	7,1	5,0
156	Gallenblase und Gallenwege	4,6	2,9	4,7	6,3	3,5
157	Bauchspeicheldrüse	13,3	8,4	12,7	16,7	11,5
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	2,1	1,2	1,9	2,8	1,3
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,2	0,2	-
161	Kehlkopf	6,8	4,2	6,3	8,2	7,1
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	102,7	64,9	95,5	119,8	88,6
163	Rippenfell	1,0	0,6	0,8	0,9	1,2
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,8	0,5	0,7	1,0	0,8
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,8	0,4	0,7	1,1	-
172	Melanome der Haut	3,2	2,1	2,9	3,3	4,4
173	Sonstige Haut	0,6	0,3	0,6	0,8	-
175	männliche Brustdrüse	0,2	0,1	0,2	0,4	-
185	Prostata	23,2	13,6	22,8	34,2	5,1
186	Hoden	1,0	0,7	0,8	0,8	0,9
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	1,0	0,7	0,9	1,3	1,1
188	Harnblase	10,7	6,4	10,8	16,0	4,0
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	12,4	7,7	11,3	14,1	11,5
189.0	Niere	10,3	6,5	9,3	11,2	10,2
190	Auge	0,2	0,1	0,2	0,2	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	4,9	3,1	4,3	4,7	6,8
193	Schilddrüse	1,3	0,9	1,2	1,4	2,1
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	20,4	12,8	19,0	24,7	17,4
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	6,5	3,9	6,2	8,2	4,8
201	Lymphogranulomatose	0,8	0,4	0,6	0,8	1,2
203	Multiples Myelom	2,7	1,6	2,5	3,5	0,8
204	Lymphatische Leukämie	3,2	2,1	3,4	4,8	1,5
205	Myeloische Leukämie	4,2	3,0	4,0	4,8	4,9
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,5	1,6	2,4	3,7	0,3
	Insgesamt ohne ICD 173	311,3	195,4	294,3	385,2	259,3
	Bösartige Neubildungen insgesamt	311,9	195,7	294,9	386,0	259,3

8b) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1987" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	-	-	-	-	-
141	Zunge	0,2	0,0	0,1	0,1	-
142	Hauptspeicheldrüsen	0,5	0,2	0,3	0,4	-
144	Mundboden	0,5	0,4	0,5	0,6	1,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,3	0,8	1,1	1,2	1,9
150	Speiseröhre	2,3	0,9	1,3	1,8	0,8
151	Magen	17,5	5,9	9,6	13,6	6,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,2	0,0	0,1	0,1	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	33,6	11,3	18,4	25,9	11,1
154	Mastdarm	9,8	3,8	5,8	8,0	4,6
155	Leber	5,0	2,0	2,9	4,0	3,5
156	Gallenblase und Gallenwege	8,2	3,2	4,9	6,5	3,3
157	Bauchspeicheldrüse	16,3	5,7	8,9	12,5	4,8
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,9	0,5	0,6	0,7	0,4
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	3,6	1,1	1,8	2,7	0,7
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4
161	Kehlkopf	0,4	0,3	0,3	0,3	0,9
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	19,5	9,7	13,8	16,9	18,5
163	Rippenfell	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-
170	Knochen	0,4	0,1	0,2	0,2	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,9	0,6	0,8	0,9	1,0
172	Melanome der Haut	2,7	1,5	2,0	2,3	2,5
173	Sonstige Haut	0,2	0,0	0,1	0,1	-
174	Brustdrüse	45,5	22,9	32,4	39,0	46,2
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	5,9	2,7	3,9	5,1	4,6
180	Gebärmutterhals	6,1	4,3	5,5	5,9	11,9
181	Plazenta	0,2	0,0	0,1	0,1	-
182	Gebärmutter	1,6	0,6	1,0	1,3	0,7
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	13,4	5,9	8,8	11,1	8,5
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva usw.)	3,4	1,1	1,8	2,5	0,8
188	Harnblase	3,6	1,2	2,0	2,8	0,8
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	6,8	2,7	4,2	5,8	3,7
189.0	Niere	5,4	2,2	3,4	4,7	2,9
190	Auge	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,3	4,5	5,3	5,6	8,5
193	Schilddrüse	1,3	0,5	0,8	1,0	0,8
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	20,6	6,9	11,1	16,0	6,0
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	5,5	3,1	3,9	4,6	4,6
201	Lymphogranulomatose	0,9	0,6	0,8	1,0	1,4
203	Multiples Myelom	5,4	2,0	3,2	4,4	1,4
204	Lymphatische Leukämie	0,9	0,3	0,5	0,7	0,4
205	Myeloische Leukämie	2,0	1,0	1,5	1,9	1,0
206 - 208	Sonstige Leukämien	2,0	0,7	1,1	1,5	0,3
	Insgesamt ohne ICD 173	256,1	109,7	162,2	210,1	164,6
	Bösartige Neubildungen insgesamt	256,3	109,8	162,2	210,2	164,5

9. "Kumulative") Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 - 14		35 - 64		0 - 74	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	-	-	0,06	-	0,19	-
141	Zunge	-	-	0,26	0,05	0,44	0,06
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	0,03	0,03	0,10	0,03
144	Mundboden	-	-	0,24	0,06	0,26	0,09
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	0,02	0,33	0,06	0,35	0,11
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	0,02	0,48	0,16	0,57	0,23
150	Speiseröhre	-	-	0,40	0,04	0,64	0,09
151	Magen	-	-	0,63	0,37	1,50	0,92
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	0,03	-	0,05	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	1,10	1,09	2,91	2,43
154	Mastdarm	-	-	0,82	0,66	1,93	1,17
155	Leber	-	-	0,19	0,10	0,56	0,15
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	0,22	0,23	0,42	0,66
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	0,39	0,17	0,86	0,61
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	0,01	0,02	0,01	0,05
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	0,04	0,02	0,11	0,03
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	0,01	0,04	0,01	0,04
161	Kehlkopf	-	-	0,50	0,06	0,95	0,08
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	3,01	0,59	7,43	1,28
163	Rippenfell	-	-	0,05	-	0,07	0,02
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	0,01	-	0,01	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	0,02	-	-	0,03	0,07	0,05
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,02	-	0,09	0,04	0,18	0,10
172	Melanome der Haut	-	-	0,29	0,33	0,60	0,53
173	Sonstige Haut	-	-	2,71	1,93	6,69	4,20
174	weibliche Brustdrüse	-	-	-	3,98	-	6,58
175	männliche Brustdrüse	-	-	0,03	-	0,07	-
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	-	0,04	-	0,09
180	Gebärmutterhals	-	-	-	0,72	-	0,97
181	Plazenta	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutter	-	-	-	0,77	-	1,64
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	-	0,54	-	1,09
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	-	0,10	-	0,24
185	Prostata	-	-	1,40	-	4,88	-
186	Hoden	-	-	0,18	-	0,43	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	0,02	-	0,10	-
188	Harnblase	-	-	0,48	0,09	1,53	0,30
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	0,03	-	0,69	0,33	1,75	0,58
189.0	Niere	0,03	-	0,60	0,32	1,55	0,54
190	Auge	-	-	0,01	0,01	0,10	0,07
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,11	0,09	0,30	0,28	0,68	0,50
193	Schilddrüse	0,02	-	0,17	0,39	0,32	0,49
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	0,02	0,01	-	0,01	0,06
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	0,77	0,35	1,73	0,83
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	0,53	0,29	0,89	0,58
201	Lymphogranulomatose	-	0,02	0,13	0,05	0,15	0,13
203	Multiples Myelom	-	-	0,12	0,15	0,21	0,32
204	Lymphatische Leukämie	-	0,04	0,11	0,05	0,42	0,12
205	Myeloische Leukämie	-	0,02	0,10	0,11	0,27	0,34
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	0,01	0,02	0,03	0,03
	Insgesamt ohne ICD 173	0,16	0,21	16,13	12,93	36,40	24,65
	Bösartige Neubildungen insgesamt	0,20	0,23	16,95	14,35	40,50	27,88

*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung

10. "Kumulative" Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1993

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 - 14		35 - 64		0 - 74	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	0,21	-	0,31	-
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	0,08	0,01
144	Mundboden	-	-	0,13	0,03	0,22	0,05
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	0,01	0,03	0,01
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	0,47	0,06	0,54	0,11
150	Speiseröhre	-	-	0,44	0,03	0,78	0,11
151	Magen	-	-	0,46	0,20	1,06	0,57
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	0,44	0,38	1,44	1,05
154	Mastdarm	-	-	0,28	0,15	0,66	0,42
155	Leber	-	-	0,19	0,12	0,40	0,22
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	0,13	0,12	0,28	0,41
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	0,40	0,17	1,01	0,70
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	0,03	0,02	0,03	0,06
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	0,05	0,03	0,15	0,09
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	0,01	0,02	0,01
161	Kehlkopf	-	-	0,25	0,03	0,49	0,03
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	3,14	0,62	8,64	1,17
163	Rippenfell	-	-	0,04	0,02	0,08	0,02
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	0,03	-	0,06	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	-	0,02
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	0,03	0,04	0,08
172	Melanome der Haut	-	-	0,15	0,08	0,25	0,15
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	0,06	-
174	weibliche Brustdrüse	-	-	-	1,48	-	2,63
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	-	-	-	0,15	-	0,27
180	Gebärmutterhals	-	-	-	0,35	-	0,40
181	Plazenta	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutter	-	-	-	0,03	-	0,08
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	-	-	-	0,30	-	0,76
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	-	-	-	0,03	-	0,11
185	Prostata	-	-	0,20	-	1,45	-
186	Hoden	-	-	0,03	-	0,06	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	0,03	-	0,05	-
188	Harnblase	-	-	0,15	0,03	0,62	0,17
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	0,39	0,12	1,01	0,30
189.0	Niere	-	-	0,35	0,10	0,89	0,23
190	Auge	-	-	-	-	0,02	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	-	0,04	0,24	0,27	0,42	0,42
193	Schilddrüse	-	-	0,07	0,03	0,09	0,06
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	0,01	-	0,03
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	0,58	0,21	1,56	0,70
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	0,02	0,17	0,15	0,41	0,30
201	Lymphogranulomatose	-	-	0,04	0,04	0,04	0,07
203	Multipl. Myelom	-	-	0,03	0,05	0,20	0,25
204	Lymphatische Leukämie	-	-	0,05	0,01	0,18	0,03
205	Myeloische Leukämie	0,02	-	0,15	0,03	0,30	0,10
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	0,01	0,01	0,13	0,04
	Insgesamt ohne ICD 173	0,02	0,05	8,96	5,39	23,08	12,02
	Bösartige Neubildungen insgesamt	0,02	0,06	8,96	5,39	23,13	12,02

*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung

11a) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1993 (männlich)

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	2,1	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	9,2
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	2,3
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	2,3
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	2,3
151	Magen	-	-	-	-	-	-	-	2,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	2,8	4,2	-	2,3
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	6,9
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	2,3
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	4,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	4,2	-	4,6
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	3,6	-	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3,4	-	-	3,9	-	2,1	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	5,5	4,2	8,3	9,2
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	2,8	6,3	4,1	18,4
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Hoden	-	-	-	-	-	39,7	10,3	18,4
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	2,3
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	3,4	3,5	-	-	-	-	2,1	-
189.0	Niere	3,4	3,5	-	-	-	-	2,1	-
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,4	3,5	14,5	3,9	5,5	2,1	4,1	4,6
193	Schilddrüse	-	-	3,6	-	2,8	-	2,1	11,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	-	-	-	2,3
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	-	-	-	2,1	-	6,9
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	-	2,8	-	2,1	6,9
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	-	-	-	3,9	-	-	-	-
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	-	-	2,3
	Insgesamt ohne ICD 173	10,3	7,1	21,7	11,6	19,3	58,4	31,0	103,4
	Bösartige Neubildungen insgesamt	10,3	7,1	21,7	11,6	22,1	64,7	35,2	121,8

noch 11a) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1993 (männlich)

ICD Code	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	-	-	-	5,3	6,5	12,1	11,6	-	-	-	1,9
141	7,3	13,7	7,8	13,2	9,7	24,2	11,6	-	-	28,1	5,1
142	-	3,4	-	-	3,2	8,1	5,8	-	-	-	1,0
144	7,3	3,4	13,0	7,9	6,5	4,0	-	11,2	-	28,1	4,0
143 + 145	2,4	23,9	26,1	7,9	3,2	4,0	-	22,4	14,5	-	5,1
146 - 149	4,9	30,7	20,8	18,5	19,4	12,1	5,8	-	14,5	-	7,2
150	9,8	-	20,8	21,1	25,8	36,3	11,6	55,9	14,5	28,1	8,9
151	14,6	6,8	13,0	23,8	64,5	52,4	122,2	156,6	159,6	365,3	21,9
152	-	-	2,6	-	3,2	4,0	-	-	-	-	0,6
153	7,3	17,1	28,7	76,6	87,1	153,1	203,6	212,6	348,3	393,4	39,7
154	4,9	17,1	33,9	42,3	58,1	100,7	122,2	145,4	145,1	112,4	24,7
155	4,9	3,4	2,6	10,6	16,1	44,3	29,1	-	72,6	56,2	6,8
156	-	-	7,8	5,3	29,0	16,1	23,3	67,1	29,0	28,1	6,1
157	4,9	3,4	-	15,9	48,4	36,3	58,2	33,6	58,0	28,1	10,1
158	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	0,2
159	2,4	-	2,6	-	3,2	8,1	5,8	-	29,0	-	1,5
160	-	-	2,6	-	-	-	-	-	14,5	-	0,4
161	7,3	13,7	15,6	18,5	45,2	36,3	52,4	11,2	29,0	56,2	10,8
162	12,2	51,2	96,4	163,8	274,3	402,9	477,1	503,5	377,3	393,4	90,3
163	-	-	2,6	-	6,5	4,0	-	-	29,0	-	1,1
164	-	-	-	2,6	-	-	-	11,2	-	-	0,4
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	4,0	5,8	-	-	28,1	0,8
171	2,4	6,8	2,6	2,6	3,2	8,1	-	22,4	14,5	28,1	2,9
172	4,9	10,2	13,0	13,2	6,5	16,1	29,1	33,6	14,5	-	8,0
173	39,0	75,2	86,0	126,8	196,9	346,5	436,4	637,7	580,5	533,9	89,6
175	-	-	-	2,6	3,2	8,1	-	11,2	-	28,1	1,1
185	-	6,8	18,2	58,1	196,9	253,9	442,2	593,0	682,0	393,4	65,6
186	7,3	3,4	5,2	2,6	-	-	-	-	-	-	7,4
187	-	3,4	-	-	-	4,0	11,6	-	14,5	-	1,0
188	4,9	10,2	15,6	23,8	38,7	100,7	110,5	156,6	174,1	252,9	21,3
189	14,6	13,7	20,8	31,7	58,1	56,4	145,5	44,8	58,0	140,5	19,6
189.0	14,6	13,7	20,8	29,1	42,0	52,4	128,0	22,4	43,5	112,4	16,9
190	-	-	-	2,6	-	12,1	5,8	11,2	-	-	1,1
191 + 192	4,9	3,4	7,8	26,4	12,9	16,1	23,3	11,2	-	-	8,2
193	7,3	3,4	2,6	2,6	6,5	4,0	17,5	11,2	-	-	4,0
194	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
195 - 199	9,8	13,7	18,2	42,3	67,8	64,5	128,0	78,3	174,1	140,5	21,9
200 + 202	9,8	20,5	18,2	21,1	29,0	24,2	46,5	22,4	87,1	-	11,4
201	4,9	-	7,8	2,6	3,2	-	-	-	-	-	2,3
203	-	6,8	7,8	5,3	3,2	8,1	11,6	22,4	29,0	28,1	3,2
204	2,4	-	2,6	7,9	9,7	44,3	17,5	22,4	14,5	-	4,8
205	7,3	-	-	2,6	9,7	8,1	23,3	11,2	58,0	-	3,6
206 - 208	-	-	-	-	-	4,0	-	-	29,0	28,1	1,0
Insg. ohne ICD 173	173,1	290,4	437,8	684,4	1 158,6	1 595,7	2 158,5	2 282,4	2 684,7	2 585,0	437,2
Insgesamt	212,1	365,6	523,7	811,2	1 355,4	1 942,2	2 594,8	2 920,1	3 265,1	3 118,9	526,8

11b) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1993 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	2,5
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	3,8	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	3,8	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magen	-	-	-	-	-	2,2	4,5	9,8
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	-	-	4,5	2,5
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	2,5
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	2,5
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	2,5
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	2,2	4,9
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	4,1	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	4,1	-	2,2	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	8,8	2,2	6,7	9,8
173	Sonstige Haut	-	-	-	4,1	-	2,2	6,7	14,8
174	Weibliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	24,5	51,6
179	N. n. bez. Teile der Gebärmutter	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Gebärmutterhals	-	-	-	-	-	4,5	17,8	36,9
181	Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)	-	-	-	-	-	-	4,5	2,5
183	Eierstock, Eileiter und Ligam. Latum	-	-	-	4,1	-	2,2	2,2	4,9
184	Sonst. u.n.n. bez. weibl. Geschl. Organe	-	-	-	-	-	-	-	2,5
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	-	4,1	-	2,2	-	-
189.0	Niere	-	-	-	4,1	-	2,2	-	-
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,7	3,8	11,4	-	2,9	2,2	2,2	2,5
193	Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	4,5	14,8
194	Sonstige endokrine Drüsen	3,7	-	-	-	-	-	4,5	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	-	-	2,2	2,5
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	-	-	2,9	2,2	4,5	2,5
201	Lymphogranulomatose	-	-	3,8	-	2,9	-	2,2	2,5
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	3,8	3,8	-	2,9	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	-	-	3,8	-	2,9	-	4,5	-
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	2,2	-	-
	Insgesamt ohne ICD 173	7,3	11,3	26,6	16,3	23,4	22,4	91,2	159,8
	Bösartige Neubildungen insgesamt	7,3	11,3	26,6	20,4	23,4	24,7	97,9	174,6

noch 11b) An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Inzidenzen je 100 000 der Bevölkerung 1993 (weiblich)

ICD Code	Durchschnittliche Inzidenzen nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	-	-	-	-	-	-	-	5,3	-	-	0,2
141	-	7,1	-	-	-	2,9	-	-	-	8,3	0,9
142	-	-	2,6	-	3,0	-	-	-	-	-	0,4
144	-	-	2,6	2,6	6,1	2,9	3,3	-	-	-	1,1
143 + 145	-	3,6	5,2	2,6	-	2,9	3,3	-	-	8,3	1,4
146 - 149	2,6	7,1	10,4	2,6	9,1	2,9	6,7	10,7	5,5	-	3,2
150	-	3,6	2,6	2,6	-	5,8	3,3	5,3	-	16,6	1,6
151	5,2	14,3	13,0	25,8	6,1	52,4	50,2	90,6	153,4	158,1	22,7
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	0,2
153	7,8	14,3	41,6	54,3	97,3	99,0	164,1	208,0	334,2	249,6	52,3
154	-	25,0	18,2	43,9	42,6	37,8	63,6	53,3	109,6	99,8	21,5
155	5,2	3,6	-	-	9,1	-	10,0	16,0	54,8	25,0	4,7
156	-	7,1	-	12,9	24,3	37,8	46,9	26,7	43,8	108,2	12,3
157	2,6	3,6	5,2	7,8	15,2	37,8	50,2	37,3	109,6	41,6	12,9
158	-	-	-	-	3,0	-	6,7	-	-	-	0,5
159	-	3,6	-	-	-	-	3,3	5,3	21,9	33,3	2,0
160	-	-	-	2,6	6,1	-	-	-	5,5	-	0,7
161	2,6	7,1	2,6	-	-	-	3,3	-	-	-	0,9
162	18,2	21,4	10,4	25,8	36,5	67,0	70,3	80,0	32,9	33,3	19,9
163	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	0,2
164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	2,6	-	-	-	3,0	-	-	-	11,0	-	0,9
171	-	-	-	5,2	3,0	2,9	3,3	-	-	-	1,3
172	13,0	14,3	10,4	10,3	9,1	8,7	13,4	10,7	16,4	16,6	8,1
173	31,2	39,2	70,2	85,3	146,0	218,4	221,0	303,9	334,2	357,8	79,5
174	98,9	114,1	168,9	168,0	194,6	203,8	291,3	229,3	257,5	241,3	102,4
179	2,6	3,6	2,6	-	-	-	10,0	10,7	-	8,3	1,6
180	33,8	7,1	23,4	18,1	24,3	11,6	16,7	26,7	27,4	8,3	15,0
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	5,2	25,0	31,2	41,4	48,7	99,0	70,3	58,7	54,8	49,9	24,7
183	5,2	-	28,6	36,2	33,5	46,6	53,6	64,0	49,3	25,0	17,7
184	-	3,6	7,8	2,6	3,0	11,6	16,7	16,0	27,4	66,6	5,7
188	-	3,6	2,6	2,6	9,1	8,7	33,5	32,0	43,8	33,3	6,6
189	-	3,6	13,0	12,9	36,5	17,5	26,8	26,7	54,8	16,6	10,0
189.0	-	3,6	13,0	12,9	33,5	14,6	23,4	21,3	49,3	8,3	8,9
190	-	-	-	2,6	-	8,7	3,3	-	-	-	0,9
191 + 192	10,4	3,6	7,8	12,9	18,2	5,8	13,4	10,7	5,5	16,6	7,0
193	18,2	10,7	13,0	5,2	15,2	5,8	10,0	5,3	5,5	25,0	7,2
194	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	0,7
195 - 199	2,6	10,7	7,8	10,3	36,5	46,6	46,9	101,3	137,0	166,4	21,3
200 + 202	13,0	7,1	5,2	12,9	18,2	11,6	36,8	26,7	21,9	66,6	10,2
201	-	-	2,6	2,6	3,0	5,8	-	-	5,5	-	1,8
203	-	7,1	2,6	5,2	15,2	17,5	16,7	10,7	16,4	16,6	5,0
204	-	3,6	-	2,6	3,0	-	3,3	10,7	11,0	33,3	2,7
205	2,6	7,1	2,6	2,6	6,1	11,6	23,4	16,0	5,5	25,0	5,2
206 - 208	-	-	-	-	3,0	-	-	5,3	11,0	16,6	1,3
Insg. ohne ICD 173	252,5	346,0	444,4	537,6	742,1	873,4	1 182,1	1 199,7	1 632,8	1 622,4	416,6
Insgesamt	283,7	385,2	514,6	622,9	888,1	1 091,8	1 403,2	1 503,7	1 967,0	1 980,2	496,1

**12a) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1993 (männlich)**

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	2,3
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	2,3
151	Magen	-	-	-	-	-	-	-	2,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	-	-	-	4,6
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	2,3
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	-	9,2
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	-	-	-	2,3
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	-	-	-	-
175	männliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Hoden	-	-	-	-	-	2,1	4,1	-
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis usw.)	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	-	-	-	-	2,1	2,3
189.0	Niere	-	-	-	-	-	-	2,1	2,3
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	-	-	-	-	-	-	2,1	-
193	Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	-	2,3
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntes Sitzes	-	-	-	-	-	2,1	-	-
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	-	-	-	-	-	-	2,1	-
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	2,1	-	-
205	Myeloische Leukämie	3,4	-	-	-	-	-	-	2,3
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	3,9	-	-	-	-
	Insgesamt ohne ICD 173	3,4	-	-	3,9	-	6,3	10,3	32,2
	Bösartige Neubildungen insgesamt	3,4	-	-	3,9	-	6,3	10,3	32,2

noch 12a) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1993 (männlich)

ICD Code	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	7,3	6,8	13,0	7,9	6,5	8,1	11,6	-	-	28,1	3,8
142	-	-	-	-	-	4,0	11,6	11,2	-	28,1	1,0
144	-	-	7,8	7,9	9,7	12,1	5,8	11,2	-	28,1	2,9
143 + 145	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,2
146 - 149	4,9	23,9	20,8	18,5	22,6	4,0	11,6	-	-	-	6,7
150	14,6	10,2	13,0	29,1	19,4	44,3	23,3	22,4	14,5	56,2	9,9
151	7,3	10,2	10,4	13,2	48,4	32,2	87,3	223,8	145,1	196,7	17,3
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	4,9	3,4	13,0	23,8	38,7	76,6	122,2	190,2	290,2	196,7	21,9
154	2,4	3,4	10,4	21,1	19,4	28,2	46,5	123,1	87,1	196,7	11,2
155	2,4	-	-	15,9	19,4	24,2	17,5	33,6	72,6	28,1	5,9
156	-	3,4	-	2,6	19,4	12,1	17,5	22,4	43,5	140,5	4,6
157	2,4	6,8	10,4	10,6	48,4	40,3	81,5	100,7	87,1	112,4	13,3
158	-	-	2,6	-	3,2	-	-	-	-	-	0,4
159	-	-	2,6	-	6,5	4,0	17,5	11,2	43,5	-	2,1
160	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	0,2
161	2,4	3,4	10,4	10,6	22,6	20,1	29,1	33,6	72,6	28,1	6,8
162	17,1	47,8	86,0	161,2	306,6	459,4	640,0	559,4	435,4	618,2	102,7
163	-	-	2,6	2,6	3,2	8,1	-	-	-	-	1,0
164	-	-	-	-	6,5	-	5,8	11,2	-	-	0,8
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	-	-	-	-	-	8,1	-	11,2	14,5	-	0,8
172	4,9	-	2,6	10,6	9,7	8,1	11,6	-	14,5	28,1	3,2
173	-	-	-	-	-	-	11,6	11,2	-	-	0,6
175	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	0,2
185	-	-	-	10,6	29,0	76,6	174,5	279,7	319,3	365,3	23,2
186	2,4	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	1,0
187	2,4	3,4	-	-	-	4,0	-	11,2	14,5	-	1,0
188	-	3,4	-	-	25,8	24,2	69,8	123,1	145,1	224,8	10,7
189	12,2	-	10,4	18,5	35,5	40,3	81,5	78,3	58,0	28,1	12,4
189.0	9,8	-	10,4	15,9	32,3	36,3	69,8	44,8	29,0	28,1	10,3
190	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	0,2
191 + 192	2,4	3,4	7,8	21,1	12,9	16,1	17,5	-	14,5	-	4,9
193	4,9	-	-	2,6	3,2	-	5,8	11,2	-	-	1,3
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	7,3	17,1	26,1	23,8	42,0	76,6	116,4	67,1	217,7	168,6	20,4
200 + 202	2,4	-	7,8	10,6	12,9	16,1	29,1	33,6	72,6	112,4	6,5
201	-	-	2,6	2,6	3,2	-	-	-	14,5	-	0,8
203	-	-	2,6	-	3,2	16,1	17,5	11,2	43,5	28,1	2,7
204	-	3,4	2,6	-	3,2	12,1	11,6	55,9	14,5	56,2	3,2
205	7,3	3,4	5,2	5,3	6,5	8,1	17,5	11,2	43,5	28,1	4,2
206 - 208	-	-	-	2,6	-	8,1	11,6	22,4	58,0	28,1	2,5
Insg. ohne ICD	112,1	153,7	273,6	433,4	787,4	1 100,1	1 698,9	2 081,0	2 336,4	2 725,5	311,3
Insgesamt	112,1	153,7	273,6	433,4	787,4	1 100,1	1 710,5	2 092,2	2 336,4	2 725,5	311,9

12b) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1993 (weiblich)

ICD Code	Lokalisation	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen							
		von ... bis unter ... Jahren							
		00 - 05	05 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
140	Lippe	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Hauptspeicheldrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Mundboden	-	-	-	-	-	-	-	-
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	-	-	-	-	-	-	-	-
146 - 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Speiseröhre	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Magen	-	-	-	-	-	-	-	4,9
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Mastdarm	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Leber	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Gallenblase und Gallenwege	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Bauchspeicheldrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	-	-	-	-	-	2,2	-	-
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Kehlkopf	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	-	-	-	-	-	-	-	2,5
163	Rippenfell	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Thymus, Herz und Mediastinum	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Knochen	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	-	-	-	-	-	2,2	-	-
172	Melanome der Haut	-	-	-	-	2,9	-	-	2,5
173	Sonstige Haut	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Weibliche Brustdrüse	-	-	-	-	-	-	-	9,8
179	N. n. bez. Teile der Gebärmutter	-	-	-	-	-	-	2,2	-
180	Gebärmutterhals	-	-	-	-	-	2,2	-	9,8
181	Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Eierstock, Eileiter und Ligam. Latum	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Sonst. u.n.n. bez. weibl. Geschl. Organe	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Harnblase	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	-	-	-	-	-	-	-	-
189.0	Niere	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Auge	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	7,3	-	-	-	-	-	2,2	-
193	Schilddrüse	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Sonstige endokrine Drüsen	-	-	-	-	-	-	-	-
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekanntem Sitzes	-	-	-	-	-	-	-	-
200 + 202	Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)	3,7	-	-	-	-	2,2	-	-
201	Lymphogranulomatose	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Multiples Myelom	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Lymphatische Leukämie	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Myeloische Leukämie	-	-	-	-	-	-	4,5	-
206 - 208	Sonstige Leukämien	-	-	-	-	-	2,2	-	-
	Insgesamt ohne ICD 173	11,0	-	-	-	2,9	11,2	8,9	29,5
	Bösartige Neubildungen insgesamt	11,0	-	-	-	2,9	11,2	8,9	29,5

noch 12b) An bösartigen Neubildungen verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
Durchschnittliche Mortalitäten je 100 000 der Bevölkerung 1993 (weiblich)

ICD Code	Durchschnittliche Mortalitäten nach Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren										
	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 u. mehr	zus.
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	0,2
142	-	-	-	-	-	2,9	-	5,3	5,5	-	0,5
144	-	3,6	-	-	3,0	-	3,3	-	-	-	0,5
143 + 145	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2
146 - 149	-	3,6	5,2	-	3,0	2,9	6,7	-	-	-	1,3
150	-	-	-	-	6,1	5,8	10,0	10,7	11,0	16,6	2,3
151	2,6	3,6	5,2	18,1	6,1	17,5	56,9	85,3	131,5	166,4	17,5
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	0,2
153	5,2	7,1	15,6	20,7	27,4	64,1	70,3	149,3	257,5	357,8	33,6
154	5,2	7,1	-	7,8	9,1	14,6	40,2	48,0	60,3	66,6	9,8
155	2,6	3,6	2,6	2,6	12,2	-	20,1	10,7	49,3	25,0	5,0
156	-	3,6	-	5,2	15,2	17,5	40,2	32,0	32,9	66,6	8,2
157	2,6	-	10,4	5,2	15,2	43,7	63,6	58,7	137,0	74,9	16,3
158	-	-	-	-	3,0	2,9	3,3	-	5,5	-	0,9
159	-	-	-	2,6	3,0	2,9	10,0	16,0	27,4	49,9	3,6
160	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2
161	2,6	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	0,4
162	10,4	17,8	15,6	23,3	54,7	46,6	63,6	85,3	54,8	41,6	19,5
163	-	-	-	-	3,0	-	-	5,3	-	-	0,4
164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	3,3	-	5,5	-	0,4
171	-	3,6	-	2,6	-	-	6,7	-	-	-	0,9
172	2,6	-	2,6	5,2	3,0	8,7	3,3	5,3	11,0	8,3	2,7
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	0,2
174	33,8	57,1	44,2	72,4	79,1	93,2	137,3	133,3	164,4	183,0	45,5
179	2,6	7,1	5,2	5,2	9,1	5,8	16,7	26,7	32,9	33,3	5,9
180	15,6	14,3	13,0	10,3	6,1	5,8	3,3	10,7	16,4	-	6,1
181	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	0,2
182	-	-	-	2,6	3,0	2,9	6,7	10,7	5,5	8,3	1,6
183	5,2	-	13,0	20,7	21,3	34,9	56,9	69,3	38,4	33,3	13,4
184	-	-	2,6	-	3,0	8,7	6,7	10,7	16,4	58,2	3,4
188	-	-	2,6	2,6	-	8,7	20,1	16,0	27,4	8,3	3,6
189	-	3,6	7,8	10,3	3,0	11,6	23,4	48,0	38,4	16,6	6,8
189.0	-	3,6	5,2	7,8	3,0	8,7	16,7	48,0	27,4	8,3	5,4
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191 + 192	15,6	7,1	2,6	10,3	18,2	11,6	10,0	16,0	5,5	16,6	6,3
193	-	-	2,6	-	3,0	2,9	3,3	5,3	5,5	8,3	1,3
194	-	-	2,6	-	-	-	3,3	-	-	-	0,4
195 - 199	5,2	-	7,8	7,8	21,3	37,8	60,3	106,6	169,9	149,8	20,6
200 + 202	2,6	7,1	7,8	2,6	9,1	11,6	13,4	5,3	27,4	41,6	5,5
201	-	7,1	-	-	-	2,9	3,3	5,3	-	-	0,9
203	-	3,6	-	2,6	3,0	14,6	26,8	37,3	16,4	33,3	5,4
204	-	-	2,6	-	-	-	3,3	5,3	5,5	8,3	0,9
205	-	3,6	-	2,6	-	5,8	3,3	21,3	-	-	2,0
206 - 208	-	-	-	2,6	-	-	3,3	10,7	11,0	33,3	2,0
Insg. ohne ICD 173	114,5	164,1	176,7	245,5	346,7	489,1	803,7	1 050,4	1 375,3	1 522,6	256,1
	114,5	164,1	176,7	245,5	346,7	489,1	803,7	1 050,4	1 375,3	1 530,9	256,3

TABELLEN UND SCHAUBILDER

TEIL II


Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	-	2,2	-	-
30 - 35	-	2	-	4,5	-	-
35 - 40	1	4	2,3	9,8	2,3	4,9
40 - 45	6	2	14,6	5,2	7,3	2,6
45 - 50	2	4	6,8	14,3	10,2	3,6
50 - 55	5	5	13,0	13,0	10,4	5,2
55 - 60	9	10	23,8	25,8	13,2	18,1
60 - 65	20	2	64,5	6,1	48,4	6,1
65 - 70	13	18	52,4	52,4	32,2	17,5
70 - 75	21	15	122,2	50,2	87,3	56,9
75 - 80	14	17	156,6	90,6	223,8	85,3
80 - 85	11	28	159,6	153,4	145,1	131,5
85+	13	19	365,3	158,1	196,7	166,4
Insgesamt	115	127	21,9	22,7	17,3	17,5
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			1,0		1,0	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	13,8	9,2	10,8	5,9
Europastandard	21,4	13,8	17,1	9,6
BRD-87	28,2	18,3	24,2	13,6
Truncated	18,1	11,9	13,5	6,1


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,63	0,37	0,46	0,20
0 - 74	1,50	0,92	1,06	0,57

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.2
	HV %	DCO %		
männlich	93,9	4,3	70	-
weiblich	81,9	12,6	75	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen



Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	2,8	-	-	-
25 - 30	2	-	4,2	-	-	-
30 - 35	-	2	-	4,5	-	-
35 - 40	1	1	2,3	2,5	4,6	-
40 - 45	3	3	7,3	7,8	4,9	5,2
45 - 50	5	4	17,1	14,3	3,4	7,1
50 - 55	11	16	28,7	41,6	13,0	15,6
55 - 60	29	21	76,6	54,3	23,8	20,7
60 - 65	27	32	87,1	97,3	38,7	27,4
65 - 70	38	34	153,1	99,0	76,6	64,1
70 - 75	35	49	203,6	164,1	122,2	70,3
75 - 80	19	39	212,6	208,0	190,2	149,3
80 - 85	24	61	348,3	334,2	290,2	257,5
85+	14	30	393,4	249,6	196,7	357,8
Insgesamt	209	292	39,7	52,3	21,9	33,6

Geschlechtsrelation männlich / weiblich

0,8


0,7

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	24,6	21,1	13,0	11,3
Europastandard	37,2	32,0	20,6	18,4
BRD-87	48,7	42,2	29,2	25,9
Truncated	30,9	31,0	12,7	11,1


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	1,10	1,09	0,44	0,38
0 - 74	2,91	2,43	1,44	1,05

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.3
	HV %	DCO %		
männlich	91,4	3,8	69	4
weiblich	87,7	8,2	72	2


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	3	1	6,9	2,5	-	-
40 - 45	2	-	4,9	-	2,4	5,2
45 - 50	5	7	17,1	25,0	3,4	7,1
50 - 55	13	7	33,9	18,2	10,4	-
55 - 60	16	17	42,3	43,9	21,1	7,8
60 - 65	18	14	58,1	42,6	19,4	9,1
65 - 70	25	13	100,7	37,8	28,2	14,6
70 - 75	21	19	122,2	63,6	46,5	40,2
75 - 80	13	10	145,4	53,3	123,1	48,0
80 - 85	10	20	145,1	109,6	87,1	60,3
85+	4	12	112,4	99,8	196,7	66,6
Insgesamt	130	120	24,7	21,5	11,2	9,8
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			1,1		1,1	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	15,7	10,0	6,9	3,8
Europastandard	23,0	14,5	11,2	5,8
BRD-87	29,1	18,0	15,4	8,0
Truncated	24,0	19,4	8,0	4,6


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,82	0,66	0,28	0,15
0 - 74	1,93	1,17	0,66	0,42

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.4
	HV %	DCO %		
männlich	95,4	3,1	67	2
weiblich	90,8	5,0	70	2


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	1	1	2,3	2,5	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	2	-	7,1	3,4	3,6
50 - 55	3	-	7,8	-	-	-
55 - 60	2	5	5,3	12,9	2,6	5,2
60 - 65	9	8	29,0	24,3	19,4	15,2
65 - 70	4	13	16,1	37,8	12,1	17,5
70 - 75	4	14	23,3	46,9	17,5	40,2
75 - 80	6	5	67,1	26,7	22,4	32,0
80 - 85	2	8	29,0	43,8	43,5	32,9
85+	1	13	28,1	108,2	140,5	66,6
Insgesamt	32	69	6,1	12,3	4,6	8,2
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			0,5		0,6	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	3,8	5,2	2,9	3,2
Europastandard	5,7	7,6	4,7	4,9
BRD-87	7,6	9,6	6,3	6,5
Truncated	6,1	6,7	3,5	3,3


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,22	0,23	0,13	0,12
0 - 74	0,42	0,66	0,28	0,41

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.8
	HV %	DCO %		
männlich	71,9	9,4	66	-
weiblich	69,6	17,4	72	3


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen



Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	2	-	4,6	-	2,3	-
40 - 45	2	1	4,9	2,6	2,4	2,6
45 - 50	1	1	3,4	3,6	6,8	-
50 - 55	-	2	-	5,2	10,4	10,4
55 - 60	6	3	15,9	7,8	10,6	5,2
60 - 65	15	5	48,4	15,2	48,4	15,2
65 - 70	9	13	36,3	37,8	40,3	43,7
70 - 75	10	15	58,2	50,2	81,5	63,6
75 - 80	3	7	33,6	37,3	100,7	58,7
80 - 85	4	20	58,0	109,6	87,1	137,0
85+	1	5	28,1	41,6	112,4	74,9
Insgesamt	53	72	10,1	12,9	13,3	16,3

Geschlechtsrelation männlich / weiblich

0,8


0,8

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	6,4	4,8	8,4	5,7
Europastandard	9,0	7,3	12,7	8,9
BRD-87	11,1	10,0	16,7	12,5
Truncated	10,8	5,0	11,5	4,8


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,39	0,17	0,40	0,17
0 - 74	0,86	0,61	1,01	0,70

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 230.9
	HV %	DCO %		
männlich	49,1	22,6	65	-
weiblich	31,9	33,3	73	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	3	1	7,3	2,6	2,4	2,6
45 - 50	4	2	13,7	7,1	3,4	-
50 - 55	6	1	15,6	2,6	10,4	-
55 - 60	7	-	18,5	-	10,6	-
60 - 65	14	-	45,2	-	22,6	3,0
65 - 70	9	-	36,3	-	20,1	-
70 - 75	9	1	52,4	3,3	29,1	-
75 - 80	1	-	11,2	-	33,6	-
80 - 85	2	-	29,0	-	72,6	-
85+	2	-	56,2	-	28,1	-
Insgesamt	57	5	10,8	0,9	6,8	0,4
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			12,0		17,0	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	7,3	0,8	4,2	0,3
Europastandard	10,0	1,0	6,3	0,3
BRD-87	11,5	1,0	8,2	0,3
Truncated	14,8	2,3	7,1	0,9


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,50	0,06	0,25	0,03
0 - 74	0,95	0,08	0,49	0,03

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 231.0
	HV %	DCO %		
männlich	91,2	7,0	63	4
weiblich	100,0	-	49	2


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	4,2	-	-	-
30 - 35	-	1	-	2,2	-	-
35 - 40	2	2	4,6	4,9	9,2	2,5
40 - 45	5	7	12,2	18,2	17,1	10,4
45 - 50	15	6	51,2	21,4	48,8	17,8
50 - 55	37	4	96,4	10,4	86,0	15,6
55 - 60	62	10	163,8	25,8	161,2	23,3
60 - 65	85	12	274,3	36,5	306,6	54,7
65 - 70	100	23	402,9	67,0	459,4	46,6
70 - 75	82	21	477,1	70,3	640,0	63,6
75 - 80	45	15	503,5	80,0	559,4	85,3
80 - 85	26	6	377,3	32,9	435,4	54,8
85+	14	4	393,4	33,3	618,2	41,6
Insgesamt	475	111	90,3	19,9	102,7	19,5
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			4,5		5,3	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	57,3	10,4	64,9	9,7
Europastandard	83,6	14,4	95,5	13,8
BRD-87	104,0	17,2	119,8	16,9
Truncated	85,2	18,3	88,6	18,5


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	3,01	0,59	3,14	0,62
0 - 74	7,43	1,28	8,64	1,17

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 231.2
	HV %	DCO %		
männlich	74,7	16,4	66	-
weiblich	75,7	12,6	68	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2	3	5,5	8,8	-	2,9
25 - 30	2	1	4,2	2,2	-	-
30 - 35	4	3	8,3	6,7	-	-
35 - 40	4	4	9,2	9,8	2,3	2,5
40 - 45	2	5	4,9	13,0	4,9	2,6
45 - 50	3	4	10,2	14,3	-	-
50 - 55	5	4	13,0	10,4	2,6	2,6
55 - 60	5	4	13,2	10,3	10,6	5,2
60 - 65	2	3	6,5	9,1	9,7	3,0
65 - 70	4	3	16,1	8,7	8,1	8,7
70 - 75	5	4	29,1	13,4	11,6	3,3
75 - 80	3	2	33,6	10,7	-	5,3
80 - 85	1	3	14,5	16,4	14,5	11,0
85+	-	2	-	16,6	28,1	8,3
Insgesamt	42	45	8,0	8,1	3,2	2,7
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			1,0		1,2	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weitstandard	5,6	5,6	2,1	1,5
Europastandard	7,3	6,9	2,9	2,0
BRD-87	8,5	7,7	3,3	2,3
Truncated	9,3	11,4	4,4	2,5


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,29	0,33	0,15	0,08
0 - 74	0,60	0,53	0,25	0,15

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.:
	HV %	DCO %		
männlich	95,2	4,8	54	Diese Fälle sind in Pos.: 173 enthalten
weiblich	97,8	2,2	54	


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	-	4,1	-	-
20 - 25	1	-	2,8	-	-	-
25 - 30	3	1	6,3	2,2	-	-
30 - 35	2	3	4,1	6,7	-	-
35 - 40	8	6	18,4	14,8	-	-
40 - 45	16	12	39,0	31,2	-	-
45 - 50	22	11	75,2	39,2	-	-
50 - 55	33	27	86,0	70,2	-	-
55 - 60	48	33	126,8	85,3	-	-
60 - 65	61	48	196,9	146,0	-	-
65 - 70	86	75	346,5	318,4	-	-
70 - 75	75	66	436,4	221,0	11,6	-
75 - 80	57	57	637,7	303,9	11,2	-
80 - 85	40	61	580,5	334,2	-	-
85+	19	43	533,9	357,8	-	8,3
Insgesamt	471	444	89,6	79,5	0,6	0,2
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			1,1		3,0	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	57,3	36,3	0,3	0,0
Europastandard	84,5	52,6	0,6	0,1
BRD-87	109,4	65,7	0,8	0,1
Truncated	81,3	57,7	-	-


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	2,71	1,93	-	-
0 - 74	6,69	4,20	0,06	-

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 232.0-9
	HV %	DCO %		
männlich	99,6	0,0	67	30
weiblich	99,5	0,2	70	56


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	2,3	-	-	-
40 - 45	2	-	4,9	-	-	-
45 - 50	3	1	10,2	3,6	3,4	-
50 - 55	6	1	15,6	2,6	-	2,6
55 - 60	9	1	23,8	2,6	-	2,6
60 - 65	12	3	38,7	9,1	25,8	-
65 - 70	25	3	100,7	8,7	24,2	8,7
70 - 75	19	10	110,5	33,5	69,8	20,1
75 - 80	14	6	156,6	32,0	123,1	16,0
80 - 85	12	8	174,1	43,8	145,1	27,4
85+	9	4	252,9	33,3	224,8	8,3
Insgesamt	112	37	21,3	6,6	10,7	3,6
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			3,2		3,0	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	13,3	2,5	6,4	1,2
Europastandard	20,4	3,8	10,8	2,0
BRD-87	27,2	5,3	16,0	2,8
Truncated	13,9	2,6	4,0	0,8


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,48	0,09	0,15	0,03
0 - 74	1,53	0,30	0,62	0,17

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.7
	HV %	DCO %		
männlich	90,2	6,3	69	77
weiblich	81,1	16,2	74	34


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	1	-	3,4	-	-	-
05 - 10	1	-	3,5	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	-	4,1	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	-	2,2	-	-
30 - 35	1	-	2,1	-	2,1	-
35 - 40	-	-	-	-	2,3	-
40 - 45	6	-	14,6	-	9,8	-
45 - 50	4	1	13,7	3,6	-	3,6
50 - 55	8	5	20,8	13,0	10,4	5,2
55 - 60	11	5	29,1	12,9	15,9	7,8
60 - 65	13	11	42,0	33,5	32,3	3,0
65 - 70	13	5	52,4	14,6	36,3	8,7
70 - 75	22	7	128,0	23,4	69,8	16,7
75 - 80	2	4	22,4	21,3	44,8	48,0
80 - 85	3	9	43,5	49,3	29,0	27,4
85+	4	1	112,4	8,3	28,1	8,3
Insgesamt	89	50	16,9	8,9	10,3	5,4
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			1,9		1,9	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	11,6	4,7	6,5	2,2
Europastandard	15,9	6,3	9,3	3,4
BRD-87	18,2	7,7	11,2	4,7
Truncated	18,0	8,8	10,2	2,9


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	0,03	-	-	-
35 - 64	0,60	0,32	0,35	0,10
0 - 74	1,55	0,54	0,89	0,23

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.9
	HV %	DCO %		
männlich	87,6	9,0	64	2
weiblich	80,0	8,0	66	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	2	-	6,8	-	-	-
50 - 55	7	-	18,2	-	-	-
55 - 60	22	-	58,1	-	10,6	-
60 - 65	61	-	196,9	-	29,0	-
65 - 70	63	-	253,9	-	76,6	-
70 - 75	76	-	442,2	-	174,5	-
75 - 80	53	-	593,0	-	279,7	-
80 - 85	47	-	682,0	-	319,3	-
85+	14	-	393,4	-	365,3	-
Insgesamt	345	-	65,6	-	23,2	-
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	2,3	-	13,6	-
Europastandard	3,5	-	22,8	-
BRD-87	4,5	-	34,2	-
Truncated	3,2	-	5,1	-


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	1,40	-	0,20	-
0 - 74	4,88	-	1,45	-

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.4
	HV %	DCO %		
männlich	96,2	2,6	71	2
weiblich	-	-	-	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	19	-	39,7	-	2,1	-
30 - 35	5	-	10,3	-	4,1	-
35 - 40	8	-	18,4	-	-	-
40 - 45	3	-	7,3	-	2,4	-
45 - 50	1	-	3,4	-	-	-
50 - 55	2	-	5,2	-	2,6	-
55 - 60	1	-	2,6	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85+	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	39	-	7,4	-	1,0	-
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	5,9	-	0,7	-
Europastandard	6,1	-	0,8	-
BRD-87	6,4	-	0,8	-
Truncated	6,8	-	0,9	-


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	0,18	-	0,03	-
0 - 74	0,43	-	0,06	-

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.6
	HV %	DCO %		
männlich	-	100,0	31	-
weiblich	-	-	-	-


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Männer




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	11	-	24,5	-	-
35 - 40	-	21	-	51,6	-	9,8
40 - 45	-	38	-	98,9	-	33,8
45 - 50	-	32	-	114,1	-	57,1
50 - 55	-	65	-	168,9	-	44,2
55 - 60	-	65	-	168,0	-	72,4
60 - 65	-	64	-	194,6	-	79,1
65 - 70	-	70	-	203,8	-	93,2
70 - 75	-	87	-	291,3	-	137,3
75 - 80	-	43	-	229,3	-	133,3
80 - 85	-	47	-	257,5	-	164,4
85+	-	29	-	241,3	-	183,0
Insgesamt	-	572	-	102,4	-	45,5
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	57,0	-	22,9
Europastandard	-	78,3	-	32,4
BRD-87	-	89,5	-	39,0
Truncated	-	125,2	-	46,2


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	3,98	-	1,48
0 - 74	-	6,58	-	2,63

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.0
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	94,6	3,5	64	21


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	-	4,5	-	2,2
30 - 35	-	8	-	17,8	-	-
35 - 40	-	15	-	36,9	-	9,8
40 - 45	-	13	-	33,8	-	15,6
45 - 50	-	2	-	7,1	-	14,3
50 - 55	-	9	-	23,4	-	13,0
55 - 60	-	7	-	18,1	-	10,3
60 - 65	-	8	-	24,3	-	6,1
65 - 70	-	4	-	11,6	-	5,8
70 - 75	-	5	-	16,7	-	3,3
75 - 80	-	5	-	26,7	-	10,7
80 - 85	-	5	-	27,4	-	16,4
85+	-	1	-	8,3	-	-
Insgesamt	-	84	-	15,0	-	6,1
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	10,1	-	4,3
Europastandard	-	12,8	-	5,5
BRD-87	-	13,6	-	5,9
Truncated	-	24,3	-	11,9


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	0,72	-	0,35
0 - 74	-	0,97	-	0,40

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.1
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	98,8	1,2	52	137


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	2	-	4,5	-	2,2
35 - 40	-	1	-	2,5	-	-
40 - 45	-	3	-	7,8	-	2,6
45 - 50	-	8	-	28,5	-	7,1
50 - 55	-	13	-	33,8	-	5,2
55 - 60	-	16	-	41,4	-	7,8
60 - 65	-	16	-	48,7	-	12,2
65 - 70	-	34	-	99,0	-	8,7
70 - 75	-	24	-	80,4	-	23,4
75 - 80	-	13	-	69,3	-	37,3
80 - 85	-	10	-	54,8	-	38,4
85+	-	7	-	58,2	-	41,6
Insgesamt	-	147	-	26,3	-	7,5
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	13,7	-	3,3
Europastandard	-	19,2	-	4,9
BRD-87	-	22,5	-	6,4
Truncated	-	24,6	-	5,3


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	0,81	-	0,17
0 - 74	-	1,73	-	0,35

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.2
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	95,2	4,1	67	5


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen




Alter von ... bis unter ...	Fallzahl		Inzidenz		Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
00 - 05	-	-	-	-	-	-
05 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	-	4,1	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	-	2,2	-	-
30 - 35	-	1	-	2,2	-	-
35 - 40	-	2	-	4,9	-	-
40 - 45	-	2	-	5,2	-	5,2
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	11	-	28,6	-	13,0
55 - 60	-	14	-	36,2	-	20,7
60 - 65	-	11	-	33,5	-	21,3
65 - 70	-	16	-	46,6	-	34,9
70 - 75	-	16	-	53,6	-	56,9
75 - 80	-	12	-	64,0	-	69,3
80 - 85	-	9	-	49,3	-	38,4
85+	-	3	-	25,0	-	33,3
Insgesamt	-	99	-	17,7	-	13,4
Geschlechtsrelation männlich / weiblich			-		-	

	Standardisierte Inzidenz		Standardisierte Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Weltstandard	-	9,0	-	5,9
Europastandard	-	12,6	-	8,8
BRD-87	-	15,0	-	11,1
Truncated	-	15,6	-	8,5


	Kumulative Inzidenz		Kumulative Mortalität	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
0 - 14	-	-	-	-
35 - 64	-	0,54	-	0,30
0 - 74	-	1,09	-	0,76

Geschlecht	Diagnosesicherung Vollständigkeit		Mittleres Erkrankungs- alter (Median)	"in-situ-Fälle" ICD-Pos.: 233.3
	HV %	DCO %		
männlich	-	-	-	-
weiblich	87,9	8,1	67	8


Häufigkeitsverteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993




Rohe und Standardisierte Inzidenz 1971 - 1993




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 0 bis 74 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Kumulative Inzidenz und Mortalität von 35 bis 64 Jahren nach Geschlecht 1970-72 und 1990-93




Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen nach Alter und Geschlecht 1993



Prozentuale Verteilung der Sterbefälle nach Alter und Geschlecht 1993



Geburtskohortenspezifische Inzidenz 1968-1993 Frauen



TABELLEN

TEIL III

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

140 = Lippe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	10,0	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	2	-	2	20,0	-
60 - 65	2	-	2	20,0	-
65 - 70	3	-	3	30,0	-
70 - 75	2	-	2	20,0	-
75 - 80	-	1	1	-	100,0
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	10	1	11	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

141 = Zunge

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	20,0
40 - 45	3	-	3	11,1	-
45 - 50	4	2	6	14,8	40,0
50 - 55	3	-	3	11,1	-
55 - 60	5	-	5	18,5	-
60 - 65	3	-	3	11,1	-
65 - 70	6	1	7	22,2	20,0
70 - 75	2	-	2	7,4	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	1	1	2	3,7	20,0
Zus	27	5	32	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

142 = Hauptspeicheldrüsen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	20,0	-
50 - 55	-	1	1	-	50,0
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	1	2	20,0	50,0
65 - 70	2	-	2	40,0	-
70 - 75	1	-	1	20,0	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	5	2	7	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

143 + 145 = Sonstige Teile des Mundes

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	12,5
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	3,7	-
40 - 45	1	-	1	3,7	-
45 - 50	7	1	8	25,9	12,5
50 - 55	10	2	12	37,0	25,0
55 - 60	3	1	4	11,1	12,5
60 - 65	1	-	1	3,7	-
65 - 70	1	1	2	3,7	12,5
70 - 75	-	1	1	-	12,5
75 - 80	2	-	2	7,4	-
80 - 85	1	-	1	3,7	-
85 u.m.	-	1	1	-	12,5
Zus	27	8	35	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

144 = Mundboden

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	4	-	4	19,0	-
40 - 45	3	-	3	14,3	-
45 - 50	1	-	1	4,8	-
50 - 55	5	1	6	23,8	16,7
55 - 60	3	1	4	14,3	16,7
60 - 65	2	2	4	9,5	33,3
65 - 70	1	1	2	4,8	16,7
70 - 75	-	1	1	-	16,7
75 - 80	1	-	1	4,8	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	1	-	1	4,8	-
Zus	21	6	27	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

146 - 149 = Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx, Rachen o.n.A

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	1	1	-	5,6
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	2,6	-
40 - 45	2	1	3	5,3	5,6
45 - 50	9	2	11	23,7	11,1
50 - 55	8	4	12	21,1	22,2
55 - 60	7	1	8	18,4	5,6
60 - 65	6	3	9	15,8	16,7
65 - 70	3	1	4	7,9	5,6
70 - 75	1	2	3	2,6	11,1
75 - 80	-	2	2	-	11,1
80 - 85	1	1	2	2,6	5,6
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	38	18	56	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

140 - 149 = Mundhöhle und Rachen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	2,5
10 - 15	-	1	1	-	2,5
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	0,8	-
35 - 40	6	1	7	4,7	2,5
40 - 45	9	1	10	7,0	2,5
45 - 50	22	5	27	17,2	12,5
50 - 55	26	8	34	20,3	20,0
55 - 60	20	3	23	15,6	7,5
60 - 65	15	6	21	11,7	15,0
65 - 70	16	4	20	12,5	10,0
70 - 75	6	4	10	4,7	10,0
75 - 80	3	3	6	2,3	7,5
80 - 85	2	1	3	1,6	2,5
85 u.m.	2	2	4	1,6	5,0
Zus	128	40	168	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

150 = Speiseröhre

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	2,1	-
40 - 45	4	-	4	8,5	-
45 - 50	-	1	1	-	11,1
50 - 55	8	1	9	17,0	11,1
55 - 60	8	1	9	17,0	11,1
60 - 65	8	-	8	17,0	-
65 - 70	9	2	11	19,1	22,2
70 - 75	2	1	3	4,3	11,1
75 - 80	5	1	6	10,6	11,1
80 - 85	1	-	1	2,1	-
85 u.m.	1	2	3	2,1	22,2
Zus	47	9	56	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

151 = Magen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	0,8
30 - 35	-	2	2	-	1,6
35 - 40	1	4	5	0,9	3,1
40 - 45	6	2	8	5,2	1,6
45 - 50	2	4	6	1,7	3,1
50 - 55	5	5	10	4,3	3,9
55 - 60	9	10	19	7,8	7,9
60 - 65	20	2	22	17,4	1,6
65 - 70	13	18	31	11,3	14,2
70 - 75	21	15	36	18,3	11,8
75 - 80	14	17	31	12,2	13,4
80 - 85	11	28	39	9,6	22,0
85 u.m.	13	19	32	11,3	15,0
Zus	115	127	242	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

152 = Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	33,3	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	33,3	-
65 - 70	1	-	1	33,3	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	1	1	-	100,0
Zus	3	1	4	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

153 = Dickdarm (ausgen. Mastdarm)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	1	0,5	-
25 - 30	2	-	2	1,0	-
30 - 35	-	2	2	-	0,7
35 - 40	1	1	2	0,5	0,3
40 - 45	3	3	6	1,4	1,0
45 - 50	5	4	9	2,4	1,4
50 - 55	11	16	27	5,3	5,5
55 - 60	29	21	50	13,9	7,2
60 - 65	27	32	59	12,9	11,0
65 - 70	38	34	72	18,2	11,6
70 - 75	35	49	84	16,7	16,8
75 - 80	19	39	58	9,1	13,4
80 - 85	24	61	85	11,5	20,9
85 u.m.	14	30	44	6,7	10,3
Zus	209	292	501	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

154 = Mastdarm

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	3	1	4	2,3	0,8
40 - 45	2	-	2	1,5	-
45 - 50	5	7	12	3,8	5,8
50 - 55	13	7	20	10,0	5,8
55 - 60	16	17	33	12,3	14,2
60 - 65	18	14	32	13,8	11,7
65 - 70	25	13	38	19,2	10,8
70 - 75	21	19	40	16,2	15,8
75 - 80	13	10	23	10,0	8,3
80 - 85	10	20	30	7,7	16,7
85 u.m.	4	12	16	3,1	10,0
Zus	130	120	250	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
155 = Leber

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	3,8
40 - 45	2	2	4	5,6	7,7
45 - 50	1	1	2	2,8	3,8
50 - 55	1	-	1	2,8	-
55 - 60	4	-	4	11,1	-
60 - 65	5	3	8	13,9	11,5
65 - 70	11	-	11	30,6	-
70 - 75	5	3	8	13,9	11,5
75 - 80	-	3	3	-	11,5
80 - 85	5	10	15	13,9	38,5
85 u.m.	2	3	5	5,6	11,5
Zus	36	26	62	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
156 = Gallenblase und Gallenwege

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	1	2	3,1	1,4
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	2	2	-	2,9
50 - 55	3	-	3	9,4	-
55 - 60	2	5	7	6,3	7,2
60 - 65	9	8	17	28,1	11,6
65 - 70	4	13	17	12,5	18,8
70 - 75	4	14	18	12,5	20,3
75 - 80	6	5	11	18,8	7,2
80 - 85	2	8	10	6,3	11,6
85 u.m.	1	13	14	3,1	18,8
Zus	32	69	101	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
157 = Bauchspeicheldrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	2	-	2	3,8	-
40 - 45	2	1	3	3,8	1,4
45 - 50	1	1	2	1,9	1,4
50 - 55	-	2	2	-	2,8
55 - 60	6	3	9	11,3	4,2
60 - 65	15	5	20	28,3	6,9
65 - 70	9	13	22	17,0	18,1
70 - 75	10	15	25	18,9	20,8
75 - 80	3	7	10	5,7	9,7
80 - 85	4	20	24	7,5	27,8
85 u.m.	1	5	6	1,9	6,9
Zus	53	72	125	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
158 = Bauchfell und retroperitoneales Gewebe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	100,0	-
60 - 65	-	1	1	-	33,3
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	2	2	-	66,7
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	1	3	4	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
159 = Sonstige und nicht näher bez. Verdauungsorgane

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	12,5	-
45 - 50	-	1	1	-	9,1
50 - 55	1	-	1	12,5	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	12,5	-
65 - 70	2	-	2	25,0	-
70 - 75	1	1	2	12,5	9,1
75 - 80	-	1	1	-	9,1
80 - 85	2	4	6	25,0	36,4
85 u.m.	-	4	4	-	36,4
Zus	8	11	19	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
150 - 159 = Verdauungsorgane und Bauchfell

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	1	0,2	-
25 - 30	2	1	3	0,3	0,1
30 - 35	-	4	4	-	0,5
35 - 40	9	8	17	1,4	1,1
40 - 45	20	8	28	3,2	1,1
45 - 50	14	21	35	2,2	2,9
50 - 55	43	31	74	6,8	4,2
55 - 60	75	57	132	11,8	7,8
60 - 65	104	65	169	16,4	8,9
65 - 70	112	93	205	17,7	12,7
70 - 75	99	119	218	15,6	16,3
75 - 80	60	83	143	9,5	11,4
80 - 85	59	151	210	9,3	20,7
85 u.m.	36	89	125	5,7	12,2
Zus	634	730	1 364	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

160 = Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugeh. Nebenhöhlen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	50,0	-
55 - 60	-	1	1	-	25,0
60 - 65	-	2	2	-	50,0
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	1	2	50,0	25,0
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	2	4	6	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

161 = Kehlkopf

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	3	1	4	5,3	20,0
45 - 50	4	2	6	7,0	40,0
50 - 55	6	1	7	10,5	20,0
55 - 60	7	-	7	12,3	-
60 - 65	14	-	14	24,6	-
65 - 70	9	-	9	15,8	-
70 - 75	9	1	10	15,8	20,0
75 - 80	1	-	1	1,8	-
80 - 85	2	-	2	3,5	-
85 u.m.	2	-	2	3,5	-
Zus	57	5	62	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

162 = Luftröhre, Bronchien und Lunge

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	2	0,4	-
30 - 35	-	1	1	-	0,9
35 - 40	2	2	4	0,4	1,8
40 - 45	5	7	12	1,1	6,3
45 - 50	15	6	21	3,2	5,4
50 - 55	37	4	41	7,8	3,6
55 - 60	62	10	72	13,1	9,0
60 - 65	85	12	97	17,9	10,8
65 - 70	100	23	123	21,1	20,7
70 - 75	82	21	103	17,3	18,9
75 - 80	45	15	60	9,5	13,5
80 - 85	26	6	32	5,5	5,4
85 u.m.	14	4	18	2,9	3,6
Zus	475	111	586	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

163 = Rippenfell

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	16,7	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	2	-	2	33,3	-
65 - 70	1	-	1	16,7	-
70 - 75	-	1	1	-	100,0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	2	-	2	33,3	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	6	1	7	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

164 = Thymus, Herz und Mediastinum

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	50,0	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	1	-	1	50,0	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	2	-	2	100,0	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

165 = Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	-	-	-	-	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
160 - 165 = Atmungs- und intrathorakale Organe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	2	0,4	-
30 - 35	-	1	1	-	0,8
35 - 40	2	2	4	0,4	1,7
40 - 45	8	8	16	1,5	6,6
45 - 50	19	8	27	3,5	6,6
50 - 55	45	5	50	8,3	4,1
55 - 60	70	11	81	12,9	9,1
60 - 65	101	14	115	18,6	11,6
65 - 70	110	23	133	20,3	19,0
70 - 75	91	23	114	16,8	19,0
75 - 80	47	15	62	8,7	12,4
80 - 85	31	7	38	5,7	5,8
85 u.m.	16	4	20	3,0	3,3
Zus	542	121	663	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
170 = Knochen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	25,0	-
15 - 20	-	1	1	-	20,0
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	20,0
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	1	1	-	20,0
65 - 70	1	-	1	25,0	-
70 - 75	1	-	1	25,0	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	2	2	-	40,0
85 u.m.	1	-	1	25,0	-
Zus	4	5	9	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
171 = Bindegewebe und sonstige Weichteile

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	6,7	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	1	2	6,7	14,3
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	1	2	6,7	14,3
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	6,7	-
45 - 50	2	-	2	13,3	-
50 - 55	1	-	1	6,7	-
55 - 60	1	2	3	6,7	28,6
60 - 65	1	1	2	6,7	14,3
65 - 70	2	1	3	13,3	14,3
70 - 75	-	1	1	-	14,3
75 - 80	2	-	2	13,3	-
80 - 85	1	-	1	6,7	-
85 u.m.	1	-	1	6,7	-
Zus	15	7	22	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
172 = Melanome der Haut

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	2	3	5	4,8	6,7
25 - 30	2	1	3	4,8	2,2
30 - 35	4	3	7	9,5	6,7
35 - 40	4	4	8	9,5	8,9
40 - 45	2	5	7	4,8	11,1
45 - 50	3	4	7	7,1	8,9
50 - 55	5	4	9	11,9	8,9
55 - 60	5	4	9	11,9	8,9
60 - 65	2	3	5	4,8	6,7
65 - 70	4	3	7	9,5	6,7
70 - 75	5	4	9	11,9	8,9
75 - 80	3	2	5	7,1	4,4
80 - 85	1	3	4	2,4	6,7
85 u.m.	-	2	2	-	4,4
Zus	42	45	87	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
173 = Sonstige Haut

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	0,2
20 - 25	1	-	1	0,2	-
25 - 30	3	1	4	0,6	0,2
30 - 35	2	3	5	0,4	0,7
35 - 40	8	6	14	1,7	1,4
40 - 45	16	12	28	3,4	2,7
45 - 50	22	11	33	4,7	2,5
50 - 55	33	27	60	7,0	6,1
55 - 60	48	33	81	10,2	7,4
60 - 65	61	48	109	13,0	10,8
65 - 70	86	75	161	18,3	16,9
70 - 75	75	66	141	15,9	14,9
75 - 80	57	57	114	12,1	12,8
80 - 85	40	61	101	8,5	13,7
85 u.m.	19	43	62	4,0	9,7
Zus	471	444	915	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
174 = Weibliche Brustdrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	11	11	-	1,9
35 - 40	-	21	21	-	3,7
40 - 45	-	38	38	-	6,6
45 - 50	-	32	32	-	5,6
50 - 55	-	65	65	-	11,4
55 - 60	-	65	65	-	11,4
60 - 65	-	64	64	-	11,2
65 - 70	-	70	70	-	12,2
70 - 75	-	87	87	-	15,2
75 - 80	-	43	43	-	7,5
80 - 85	-	47	47	-	8,2
85 u.m.	-	29	29	-	5,1
Zus	-	572	572	-	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
175 = Männliche Brustdrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	16,7	-
60 - 65	1	-	1	16,7	-
65 - 70	2	-	2	33,3	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	1	-	1	16,7	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	1	-	1	16,7	-
Zus	6	-	6	100,0	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
170 - 175 = Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	0,2	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	0,2	-
15 - 20	1	3	4	0,2	0,3
20 - 25	3	3	6	0,6	0,3
25 - 30	6	3	9	1,1	0,3
30 - 35	6	17	23	1,1	1,6
35 - 40	12	31	43	2,2	2,9
40 - 45	19	56	75	3,5	5,2
45 - 50	27	47	74	5,0	4,4
50 - 55	39	96	135	7,2	8,9
55 - 60	55	104	159	10,2	9,7
60 - 65	65	117	182	12,1	10,9
65 - 70	95	149	244	17,7	13,9
70 - 75	81	158	239	15,1	14,7
75 - 80	63	102	165	11,7	9,5
80 - 85	42	113	155	7,8	10,5
85 u.m.	22	74	96	4,1	6,9
Zus	538	1 073	1 611	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
179 = Nicht näher bez. Teile der Gebärmutter

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	11,1
45 - 50	-	1	1	-	11,1
50 - 55	-	1	1	-	11,1
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	3	3	-	33,3
75 - 80	-	2	2	-	22,2
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	1	1	-	11,1
Zus	-	9	9	-	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
180 = Gebärmutterhals

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	2	-	2,4
30 - 35	-	8	8	-	9,5
35 - 40	-	15	15	-	17,9
40 - 45	-	13	13	-	15,5
45 - 50	-	2	2	-	2,4
50 - 55	-	9	9	-	10,7
55 - 60	-	7	7	-	8,3
60 - 65	-	8	8	-	9,5
65 - 70	-	4	4	-	4,8
70 - 75	-	5	5	-	6,0
75 - 80	-	5	5	-	6,0
80 - 85	-	5	5	-	6,0
85 u.m.	-	1	1	-	1,2
Zus	-	84	84	-	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
181 = Plazenta

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	-	-	-	-	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
182 = Gebärmutterkörper (Corpus Uteri)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	2	2	-	1,4
35 - 40	-	1	1	-	0,7
40 - 45	-	2	2	-	1,4
45 - 50	-	7	7	-	5,1
50 - 55	-	12	12	-	8,7
55 - 60	-	16	16	-	11,6
60 - 65	-	16	16	-	11,6
65 - 70	-	34	34	-	24,6
70 - 75	-	21	21	-	15,2
75 - 80	-	11	11	-	8,0
80 - 85	-	10	10	-	7,2
85 u.m.	-	6	6	-	4,3
Zus	-	138	138	-	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
183 = Eierstock, Eileiter und Ligamentum Latum

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	1,0
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	1,0
30 - 35	-	1	1	-	1,0
35 - 40	-	2	2	-	2,0
40 - 45	-	2	2	-	2,0
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	11	11	-	11,1
55 - 60	-	14	14	-	14,1
60 - 65	-	11	11	-	11,1
65 - 70	-	16	16	-	16,2
70 - 75	-	16	16	-	16,2
75 - 80	-	12	12	-	12,1
80 - 85	-	9	9	-	9,1
85 u.m.	-	3	3	-	3,0
Zus	-	99	99	-	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
184 = Sonstige und nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	3,1
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	1	1	-	3,1
50 - 55	-	3	3	-	9,4
55 - 60	-	1	1	-	3,1
60 - 65	-	1	1	-	3,1
65 - 70	-	4	4	-	12,5
70 - 75	-	5	5	-	15,6
75 - 80	-	3	3	-	9,4
80 - 85	-	5	5	-	15,6
85 u.m.	-	8	8	-	25,0
Zus	-	32	32	-	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
185 = Prostata

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	2	-	2	0,6	-
50 - 55	7	-	7	2,0	-
55 - 60	22	-	22	6,4	-
60 - 65	61	-	61	17,7	-
65 - 70	63	-	63	18,3	-
70 - 75	76	-	76	22,0	-
75 - 80	53	-	53	15,4	-
80 - 85	47	-	47	13,6	-
85 u.m.	14	-	14	4,1	-
Zus	345	-	345	100,0	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
186 = Hoden

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	19	-	19	48,7	-
30 - 35	5	-	5	12,8	-
35 - 40	8	-	8	20,5	-
40 - 45	3	-	3	7,7	-
45 - 50	1	-	1	2,6	-
50 - 55	2	-	2	5,1	-
55 - 60	1	-	1	2,6	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	39	-	39	100,0	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
187 = Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	20,0	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	1	-	1	20,0	-
70 - 75	2	-	2	40,0	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	1	-	1	20,0	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	5	-	5	100,0	-

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
188 = Harnblase

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	0,9	-
40 - 45	2	-	2	1,8	-
45 - 50	3	1	4	2,7	2,7
50 - 55	6	1	7	5,4	2,7
55 - 60	9	1	10	8,0	2,7
60 - 65	12	3	15	10,7	8,1
65 - 70	25	3	28	22,3	8,1
70 - 75	19	10	29	17,0	27,0
75 - 80	14	6	20	12,5	16,2
80 - 85	12	8	20	10,7	21,6
85 u.m.	9	4	13	8,0	10,8
Zus	112	37	149	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

189 = Sonstige und nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	1,0	-
5 - 10	1	-	1	1,0	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	1,8
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	1,8
30 - 35	1	-	1	1,0	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	6	-	6	5,8	-
45 - 50	4	1	5	3,9	1,8
50 - 55	8	5	13	7,8	8,9
55 - 60	12	5	17	11,7	8,9
60 - 65	18	12	30	17,5	21,4
65 - 70	14	6	20	13,6	10,7
70 - 75	25	8	33	24,3	14,3
75 - 80	4	5	9	3,9	8,9
80 - 85	4	10	14	3,9	17,9
85 u.m.	5	2	7	4,9	3,6
Zus	103	56	159	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

189.0 = Nieren

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	1,1	-
5 - 10	1	-	1	1,1	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	2,0
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	2,0
30 - 35	1	-	1	1,1	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	6	-	6	6,7	-
45 - 50	4	1	5	4,5	2,0
50 - 55	8	5	13	9,0	10,0
55 - 60	11	5	16	12,4	10,0
60 - 65	13	11	24	14,6	22,0
65 - 70	13	5	18	14,6	10,0
70 - 75	22	7	29	24,7	14,0
75 - 80	2	4	6	2,2	8,0
80 - 85	3	9	12	3,4	18,0
85 u.m.	4	1	5	4,5	2,0
Zus	89	50	139	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

179 - 189 = Harn- und Geschlechtsorgane

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	-	1	0,2	-
5 - 10	1	-	1	0,2	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	2	2	-	0,4
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	19	4	23	3,1	0,9
30 - 35	6	11	17	1,0	2,4
35 - 40	9	19	28	1,5	4,2
40 - 45	11	18	29	1,8	4,0
45 - 50	11	13	24	1,8	2,9
50 - 55	23	42	65	3,8	9,2
55 - 60	44	44	88	7,3	9,7
60 - 65	91	51	142	15,1	11,2
65 - 70	103	67	170	17,1	14,7
70 - 75	122	68	190	20,2	14,9
75 - 80	71	44	115	11,8	9,7
80 - 85	64	47	111	10,6	10,3
85 u.m.	28	25	53	4,6	5,5
Zus	604	455	1 059	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

190 = Auge

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	1	2	16,7	20,0
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	3	3	6	50,0	60,0
70 - 75	1	1	2	16,7	20,0
75 - 80	1	-	1	16,7	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	6	5	11	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

191 + 192 = Gehirn und Nervensystem

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	1	2	2,3	2,6
5 - 10	1	1	2	2,3	2,6
10 - 15	4	3	7	9,3	7,7
15 - 20	1	-	1	2,3	-
20 - 25	2	1	3	4,7	2,6
25 - 30	1	1	2	2,3	2,6
30 - 35	2	1	3	4,7	2,6
35 - 40	2	1	3	4,7	2,6
40 - 45	2	4	6	4,7	10,3
45 - 50	1	1	2	2,3	2,6
50 - 55	3	3	6	7,0	7,7
55 - 60	10	5	15	23,3	12,8
60 - 65	4	6	10	9,3	15,4
65 - 70	4	2	6	9,3	5,1
70 - 75	4	4	8	9,3	10,3
75 - 80	1	2	3	2,3	5,1
80 - 85	-	1	1	-	2,6
85 u.m.	-	2	2	-	5,1
Zus	43	39	82	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

193 = Schilddrüse

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	4,8	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	1	4,8	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	2	3	4,8	5,0
35 - 40	5	6	11	23,8	15,0
40 - 45	3	7	10	14,3	17,5
45 - 50	1	3	4	4,8	7,5
50 - 55	1	5	6	4,8	12,5
55 - 60	1	2	3	4,8	5,0
60 - 65	2	5	7	9,5	12,5
65 - 70	1	2	3	4,8	5,0
70 - 75	3	3	6	14,3	7,5
75 - 80	1	1	2	4,8	2,5
80 - 85	-	1	1	-	2,5
85 u.m.	-	3	3	-	7,5
Zus	21	40	61	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

194 = Sonstige endokrine Drüsen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	1	1	-	25,0
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	2	2	-	50,0
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	100,0	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	1	1	-	25,0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	1	4	5	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

195 - 199 = Sek. bösartige Neubildungen und sonst. Neubildungen unbek. Sitzes

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	0,8
35 - 40	1	1	2	0,9	0,8
40 - 45	4	1	5	3,5	0,8
45 - 50	4	3	7	3,5	2,5
50 - 55	7	3	10	6,1	2,5
55 - 60	16	4	20	13,9	3,4
60 - 65	21	12	33	18,3	10,1
65 - 70	16	16	32	13,9	13,4
70 - 75	22	14	36	19,1	11,8
75 - 80	7	19	26	6,1	16,0
80 - 85	12	25	37	10,4	21,0
85 u.m.	5	20	25	4,3	16,8
Zus	115	119	234	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

190 - 199 = Bösartige Neubildungen sonstiger u. n. näher bez. Sitzes

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	1	2	3	0,5	1,0
5 - 10	1	1	2	0,5	0,5
10 - 15	5	3	8	2,7	1,4
15 - 20	1	-	1	0,5	-
20 - 25	3	1	4	1,6	0,5
25 - 30	1	1	2	0,5	0,5
30 - 35	3	6	9	1,6	2,9
35 - 40	8	8	16	4,3	3,9
40 - 45	10	12	22	5,4	5,8
45 - 50	6	7	13	3,2	3,4
50 - 55	11	11	22	5,9	5,3
55 - 60	28	12	40	15,1	5,8
60 - 65	27	23	50	14,5	11,1
65 - 70	24	23	47	12,9	11,1
70 - 75	30	23	53	16,1	11,1
75 - 80	10	22	32	5,4	10,6
80 - 85	12	27	39	6,5	13,0
85 u.m.	5	25	30	2,7	12,1
Zus	186	207	393	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

200 + 202 = Maligne Lymphome (außer Lymphogranulomatose)

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	1,8
25 - 30	1	1	2	1,7	1,8
30 - 35	-	2	2	-	3,5
35 - 40	3	1	4	5,0	1,8
40 - 45	4	5	9	6,7	8,8
45 - 50	6	2	8	10,0	3,5
50 - 55	7	2	9	11,7	3,5
55 - 60	8	5	13	13,3	8,8
60 - 65	9	6	15	15,0	10,5
65 - 70	6	4	10	10,0	7,0
70 - 75	8	11	19	13,3	19,3
75 - 80	2	5	7	3,3	8,8
80 - 85	6	4	10	10,0	7,0
85 u.m.	-	8	8	-	14,0
Zus	60	57	117	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

201 = Lymphogranulomatose

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	1	1	-	10,0
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	1	1	2	8,3	10,0
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	1	2	8,3	10,0
35 - 40	3	1	4	25,0	10,0
40 - 45	2	-	2	16,7	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	3	1	4	25,0	10,0
55 - 60	1	1	2	8,3	10,0
60 - 65	1	1	2	8,3	10,0
65 - 70	-	2	2	-	20,0
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	1	1	-	10,0
85 u.m.	-	-	-	-	-
Zus	12	10	22	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt

203 = Multiples Myelom

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	2	2	4	11,8	7,1
50 - 55	3	1	4	17,6	3,6
55 - 60	2	2	4	11,8	7,1
60 - 65	1	5	6	5,9	17,9
65 - 70	2	6	8	11,8	21,4
70 - 75	2	5	7	11,8	17,9
75 - 80	2	2	4	11,8	7,1
80 - 85	2	3	5	11,8	10,7
85 u.m.	1	2	3	5,9	7,1
Zus	17	28	45	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
204 = Lymphatische Leukämie

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	6,7
10 - 15	-	1	1	-	6,7
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	1	-	6,7
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	4,0	-
45 - 50	-	1	1	-	6,7
50 - 55	1	-	1	4,0	-
55 - 60	3	1	4	12,0	6,7
60 - 65	3	1	4	12,0	6,7
65 - 70	11	-	11	44,0	-
70 - 75	3	1	4	12,0	6,7
75 - 80	2	2	4	8,0	13,3
80 - 85	1	2	3	4,0	13,3
85 u.m.	-	4	4	-	26,7
Zus	25	15	40	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
205 = Myeloische Leukämie

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	1	1	-	3,4
15 - 20	1	-	1	5,3	-
20 - 25	-	1	1	-	3,4
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	2	2	-	6,9
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	3	1	4	15,8	3,4
45 - 50	-	2	2	-	6,9
50 - 55	-	1	1	-	3,4
55 - 60	1	1	2	5,3	3,4
60 - 65	3	2	5	15,8	6,9
65 - 70	2	4	6	10,5	13,8
70 - 75	4	7	11	21,1	24,1
75 - 80	1	3	4	5,3	10,3
80 - 85	4	1	5	21,1	3,4
85 u.m.	-	3	3	-	10,3
Zus	19	29	48	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
206 - 208 = Sonstige Leukämien

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	14,3
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	-	1	20,0	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	-	1	1	-	14,3
65 - 70	1	-	1	20,0	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	1	1	-	14,3
80 - 85	2	2	4	40,0	28,6
85 u.m.	1	2	3	20,0	28,6
Zus	5	7	12	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
200 - 208 = Lymphatisches und Hämatopoetisches Gewebe

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	1	1	-	0,7
10 - 15	-	3	3	-	2,1
15 - 20	1	-	1	0,7	-
20 - 25	1	4	5	0,7	2,7
25 - 30	1	2	3	0,7	1,4
30 - 35	1	5	6	0,7	3,4
35 - 40	7	2	9	5,1	1,4
40 - 45	10	6	16	7,2	4,1
45 - 50	8	7	15	5,8	4,8
50 - 55	14	5	19	10,1	3,4
55 - 60	15	10	25	10,9	6,8
60 - 65	17	16	33	12,3	11,0
65 - 70	22	16	38	15,9	11,0
70 - 75	17	24	41	12,3	16,4
75 - 80	7	13	20	5,1	8,9
80 - 85	15	13	28	10,9	8,9
85 u.m.	2	19	21	1,4	13,0
Zus	138	146	284	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
Alle Lokalisationen ohne ICD 173

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	3	2	5	0,1	0,1
5 - 10	2	3	5	0,1	0,1
10 - 15	6	7	13	0,3	0,3
15 - 20	3	4	7	0,1	0,2
20 - 25	7	8	15	0,3	0,3
25 - 30	28	10	38	1,2	0,4
30 - 35	15	41	56	0,7	1,8
35 - 40	45	65	110	2,0	2,8
40 - 45	71	97	168	3,1	4,2
45 - 50	85	97	182	3,7	4,2
50 - 55	168	171	339	7,3	7,3
55 - 60	259	208	467	11,3	8,9
60 - 65	359	244	603	15,6	10,5
65 - 70	396	300	696	17,2	12,9
70 - 75	371	353	724	16,1	15,2
75 - 80	204	225	429	8,9	9,7
80 - 85	185	298	483	8,0	12,8
85 u.m, 92	195	287	482	8,4	-
Zus	2299	2328	4627	100,0	100,0

1993 erfaßte Personen - Saarland insgesamt
Alle Lokalisationen

Von ... bis unter ... Jahren	absolut			Prozent	
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
0 - 5	3	2	5	0,1	0,1
5 - 10	2	3	5	0,1	0,1
10 - 15	6	7	13	0,2	0,3
15 - 20	3	5	8	0,1	0,2
20 - 25	8	8	16	0,3	0,3
25 - 30	31	11	42	1,1	0,4
30 - 35	17	44	61	0,6	1,6
35 - 40	53	71	124	1,9	2,6
40 - 45	87	109	196	3,1	3,9
45 - 50	107	108	215	3,9	3,9
50 - 55	201	198	399	7,3	7,1
55 - 60	307	241	548	11,1	8,7
60 - 65	420	292	712	15,2	10,5
65 - 70	482	375	857	17,4	13,5
70 - 75	446	419	865	16,1	15,1
75 - 80	261	282	543	9,4	10,2
80 - 85	225	359	584	8,1	13,0
85 u.m.	111	238	349	4,0	8,6
Zus	2 770	2 772	5 542	100,0	100,0

Anhang

Zur Standardisierung der Inzidenzzahlen verwendete Standardpopulationen

Altersklassen	Weltstandard- population	Europastandard- population	BRD - Standard- population 1987	Truncated population
0-4	12 000	8 000	4 887	-
5-9	10 000	7 000	4 796	-
10-14	9 000	7 000	4 894	-
15-19	9 000	7 000	7 189	-
20-24	8 000	7 000	8 721	-
25-29	8 000	7 000	8 044	-
30-34	6 000	7 000	7 062	-
35-39	6 000	7 000	6 886	6 000
40-44	6 000	7 000	6 161	6 000
45-49	6 000	7 000	8 043	6 000
50-54	5 000	7 000	6 654	5 000
55-59	4 000	6 000	5 920	4 000
60-64	4 000	5 000	5 438	4 000
65-69	3 000	4 000	4 338	-
70-74	2 000	3 000	3 801	-
75-79	1 000	2 000	3 646	-
80-84	500	1 000	2 251	-
85 und mehr	500	1 000	1 269	-
zusammen	100 000	100 000	100 000	31 000

* Aus "Cancer Incidence in Five Continents-Volume IV".

Durchschnittliche Bevölkerung 1993 nach Altersjahren und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Bevölkerung			Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliche Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	10 684	5 471	5 213	50 - 51	12 408	6 235	6 173
1 - 2	11 091	5 714	5 377	51 - 52	14 142	7 110	7 032
2 - 3	11 532	5 981	5 551	52 - 53	16 393	8 217	8 176
3 - 4	11 581	5 989	5 592	53 - 54	17 080	8 450	8 630
4 - 5	11 447	5 884	5 563	54 - 55	16 833	8 366	8 467
zusammen	56 335	29 039	27 296	zusammen	76 856	38 378	38 478
5 - 6	11 459	5 896	5 563	55 - 56	16 367	8 121	8 246
6 - 7	11 327	5 845	5 482	56 - 57	16 603	8 147	8 456
7 - 8	10 921	5 646	5 275	57 - 58	16 075	7 931	8 144
8 - 9	10 564	5 464	5 100	58 - 59	14 553	7 220	7 333
9 - 10	10 563	5 464	5 109	59 - 60	12 935	6 425	6 510
zusammen	54 834	28 305	26 529	zusammen	76 533	37 844	38 689
10 - 11	10 817	5 584	5 233	60 - 61	12 256	6 053	6 203
11 - 12	11 047	5 709	5 338	61 - 62	12 633	6 119	6 514
12 - 13	11 049	5 709	5 343	62 - 63	13 059	6 363	6 696
13 - 14	10 732	5 443	5 289	63 - 64	13 052	6 324	6 728
14 - 15	10 232	5 155	5 077	64 - 65	12 867	6 128	6 739
zusammen	53 877	27 597	26 280	zusammen	63 867	30 987	32 880
15 - 16	10 135	5 182	4 953	65 - 66	12 508	5 823	6 685
16 - 17	10 066	5 184	4 882	66 - 67	11 935	5 319	6 616
17 - 18	9 927	5 139	4 788	67 - 68	11 603	4 858	6 745
18 - 19	10 073	5 192	4 881	68 - 69	11 474	4 447	7 027
19 - 20	10 321	5 275	5 046	69 - 70	11 644	4 370	7 274
zusammen	50 522	25 972	24 550	zusammen	59 164	24 817	34 347
20 - 21	11 137	5 608	5 449	70 - 71	11 464	4 284	7 180
21 - 22	12 887	6 515	6 312	71 - 72	10 917	4 025	6 892
22 - 23	14 123	7 245	6 878	72 - 73	10 214	3 710	6 504
23 - 24	15 423	7 980	7 443	73 - 74	8 349	3 003	5 346
24 - 25	16 901	8 753	8 148	74 - 75	6 105	2 166	3 939
zusammen	70 471	36 241	34 230	zusammen	47 049	17 188	29 861
25 - 26	17 662	9 245	8 417	75 - 76	4 934	1 702	3 232
26 - 27	18 233	9 546	8 687	76 - 77	4 762	1 593	3 169
27 - 28	18 566	9 609	8 957	77 - 78	5 180	1 686	3 494
28 - 29	18 566	9 645	9 221	78 - 79	6 233	1 959	4 274
29 - 30	19 157	9 861	9 296	79 - 80	6 583	1 998	4 585
zusammen	92 484	47 906	44 578	zusammen	27 692	8 938	18 754
30 - 31	19 011	9 834	9 177	80 - 81	6 160	1 802	4 358
31 - 32	18 923	9 838	9 085	81 - 82	5 517	1 548	3 969
32 - 33	18 645	9 639	9 006	82 - 83	4 966	1 379	3 587
33 - 34	18 404	9 500	8 904	83 - 84	4 528	1 176	3 352
34 - 35	18 259	9 499	8 760	84 - 85	3 971	986	2 985
zusammen	93 242	48 310	44 932	zusammen	25 142	6 891	18 251
35 - 36	17 730	9 214	8 516	85 - 86	3 399	845	2 554
36 - 37	17 189	8 917	8 272	86 - 87	2 788	676	2 112
37 - 38	16 588	8 558	8 030	87 - 88	2 306	535	1 771
38 - 39	16 368	8 444	7 924	88 - 89	1 859	409	1 450
39 - 40	16 322	8 389	7 933	89 - 90	1 473	324	1 149
zusammen	84 197	43 522	40 675	zusammen	11 825	2 789	9 036
40 - 41	16 143	8 300	7 843	90 und älter	3 753	770	2 983
41 - 42	15 791	8 113	7 678				
42 - 43	15 747	8 107	7 640				
43 - 44	16 218	8 427	7 791				
44 - 45	15 540	8 077	7 463				
zusammen	79 439	41 024	38 415	INSGESAMT	1 084 585	525 787	558 798
45 - 46	13 294	6 897	6 397				
46 - 47	10 921	5 612	5 309				
47 - 48	9 592	4 885	4 707				
48 - 49	10 949	5 541	5 408				
49 - 50	12 547	6 334	6 213				
zusammen	57 303	29 269	28 034				

Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 21. Februar	Nr. 7
------	---	-------

Inhalt

I. Amtliche Texte	Seite
Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“. Vom 17. Januar 1979	105

I. Amtliche Texte

48 Gesetz Nr. 1094
„Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“

Vom 17. Januar 1979

Inhaltsübersicht

- § 1 Zweck
- § 2 Aufgabe
- § 3 Zuständigkeit
- § 4 Inhalt der Erhebungen
- § 5 Anonymisierung
- § 6 Übermittlung
- § 7 Kosten
- § 8 Auskunftsstellen
- § 9 Befreiung von Verschwiegenheitspflichten
- § 10 Entschädigung
- § 11 Wissenschaftlicher Beirat
- § 12 Durchführungsbestimmungen
- § 13 Einschränkung von Grundrechten
- § 14 Inkrafttreten

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Zweck

Zur Überwachung der Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung und für die Zwecke der epidemiologischen Krebsforschung wird ein Krebsregister als Landesstatistik geführt. Es ist die zentrale Registrierstelle für bösartige Geschwulsterkrankungen im Lande.

§ 2

Aufgabe

Das Krebsregister hat die Aufgabe, fortlaufend statistische Daten über das Entstehen, das Auftreten und den Verlauf bösartiger Geschwulsterkrankungen, insbesondere Karzinome, Sarkome, Leukosen, Präkanzerosen, zu erheben, zu bearbeiten, bereitzustellen und in fortlaufend erscheinenden Jahresberichten zu veröffentlichen.

§ 3

Zuständigkeit

Die Führung des Krebsregisters und die Erhebung der erforderlichen Daten obliegen ausschließlich dem Statistischen Amt des Saarlandes. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 105 zur Regelung des Statistischen Dienstes im Saarland vom 25. Juni 1949 in der Fassung des Gesetzes Nr. 982 vom 5. Dezember 1973 (Amtsbl. 1974 S. 33) findet keine Anwendung.

§ 4

Inhalt der Erhebungen

Neben der Quelle der Angaben (§ 8) dürfen ausschließlich erhoben und verarbeitet werden

a) an personenbezogenen Daten

Vor- und Familienname, Geburtsname, Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Beruf, Nationalität, bei Frauen die Zahl der Kinder, Sterbedatum;

b) an medizinischen Daten

Art der Geschwulsterkrankung, Organlokalisierung, Ausbreitung und Stadium der Krankheit im Zeitpunkt der Diagnose, Art der Diagnosesicherung, Zeitpunkt der ersten Beschwerden, Schadstoffexpositionen, Verdacht auf Berufskrebs, Beginn und Art der Behandlung, jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes, Durchführung von Krebsvorsorgeuntersuchungen, Todesursache.

§ 5

Anonymisierung

Das Statistische Amt des Saarlandes hat die Daten zu anonymisieren. Es hat die personenbezogenen Merkmale, mit deren Hilfe anonymisierte Daten derart verändert werden können, daß sie sich auf eine bestimmte Person beziehen oder eine solche erkennen lassen, gesondert zu speichern. Es darf diese mit den anonymisierten Daten nur dann zusammenführen, wenn die dadurch ermöglichte Nutzung der Daten zu statistischen Zwecken erforderlich ist. In diesem Fall ist ein Protokoll mit der Begründung des Vorgangs zu fertigen. Die Merkmale nach Satz 2 dürfen nicht an Stellen weitergegeben werden, die die anonymisierten Daten im Auftrag verarbeiten.

§ 6

Übermittlung

Aus dem Krebsregister dürfen Daten nur in anonymisierter Form und nur zu dem in § 1 bestimmten Zweck und grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftliche Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. Einzelpersonen dürfen anonymisierte Daten nur dann übermittelt werden, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

§ 7

Kosten

Die durch Zuwendungen Dritter nicht gedeckten Kosten des Krebsregisters trägt das Land nach Maßgabe des Haushalts.

§ 8

Auskunftsstellen

Auskünfte an das Krebsregister erteilen Ärzte und Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien, die im Saarland ihren Beruf ausüben. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Auskünfte werden auf einem einheitlichen Formblatt erteilt, dessen Muster der für das Gesundheitswesen zuständige Minister festlegt.

§ 9

Befreiung von Verschwiegenheitspflichten

(1) Ärzte und Zahnärzte, in ihrem Auftrag handelnde Angehörige anderer Heilberufe, berufsmäßig tätige Gehilfen, bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätige Personen sowie Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien handeln auch ohne Einwilligung der Betroffenen weder rechts- noch standeswidrig, wenn sie dem Krebsregister unter Verwendung des in § 8 genannten Formblattes die für die Erhebung nach § 4 dieses Gesetzes erforderlichen Tatsachen mitteilen.

(2) Standesrechtliche Vorschriften, die einer Tatsachenmitteilung an das Krebsregister nach Absatz 1 entgegenstehen, finden keine Anwendung.

§ 10

Entschädigung

Für die Erstattung jeder Meldung wird vom Statistischen Amt ohne Aufforderung eine Gebühr nach Buchst. A Nr. II Ziff. 17 des Gebührenverzeichnisses nach der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte vom 18. März 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 89) zuzüglich der Portokosten für einen Standardbrief im Briefverkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gezahlt. Nehmen in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätige Melder für die Meldungen Personal und Sachmittel des Trägers der Organisation in Anspruch, so kann dieser einen Betrag in Höhe von 20 vom Hundert der gezahlten Entschädigung verlangen.

§ 11

Wissenschaftlicher Beirat

(1) Zur fachlichen und wissenschaftlichen Beratung der das Krebsregister führenden Stelle und zur Durchführung dieses Gesetzes beruft der Chef der Staatskanzlei im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister einen wissenschaftlichen Beirat.

(2) Dem Beirat gehören an:

1. Ein Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministers,
2. ein ärztlicher Vertreter der Staatlichen Gesundheitsämter,
3. ein Vertreter des Statistischen Amtes des Saarlandes,
4. ein Vertreter der Ärztekammer des Saarlandes,
5. fünf ärztliche Vertreter der Universität des Saarlandes,

6. ein ärztlicher Vertreter kommunaler Krankenhäuser,
7. ein ärztlicher Vertreter freigemeinnütziger Krankenhäuser,
8. ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Krebsforschung und Krebsbekämpfung, Landesverband Saar,
9. ein Vertreter der Krebsliga Saarland,
10. der Landesbeauftragte für Datenschutz.

Die Berufung der unter Nr. 4, 5, 8 und 9 genannten Mitglieder des Beirats erfolgt auf Vorschlag der nach Gesetz oder Satzung zuständigen Organe, die Berufung der unter Nr. 6 und 7 genannten Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Die ärztlichen Mitglieder des Beirats sollen unterschiedliche berufliche Gebiete und Teilgebiete vertreten.

(3) Zu den Beratungen des Beirats können Vertreter weiterer Behörden, Anstalten oder Vereinigungen sowie andere fachkundige Personen hinzugezogen werden.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich für die Dauer von fünf Jahren aus. Mitglieder, deren Zugehörigkeit zu den von ihnen vertretenen Körperschaften und Anstalten vorzeitig endet, scheidern aus. Für die restliche Zeit wird ein neues Mitglied berufen.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister hat den Vorsitz im Beirat. Er erläßt die Geschäftsordnung. Die laufenden Geschäfte des Beirats führt das Statistische Amt des Saarlandes.

§ 12

Durchführungsbestimmungen

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister im Benehmen mit dem Chef der Staatskanzlei. Der Landesbeauftragte für Datenschutz ist zu hören.

§ 13

Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht auf Achtung des privaten Bereichs (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird den aus den vorstehenden Bestimmungen sich ergebenden Beschränkungen unterworfen.

§ 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 7. Februar 1979

Der Ministerpräsident

Dr. Franz Josef Röder

Der Minister des Innern

Alfred Wilhelm

Der Minister der Finanzen

Ferdi Behles

Der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung

Dr. Rosemarie Scheurlen

Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 7. Mai	Nr. 18*
------	--------------------------------------	---------

Inhalt

I. Amtliche Texte	Seite
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen. Vom 23. März 1979	417

I. Amtliche Texte

110 **Verordnung
über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen**

Vom 23. März 1979

Auf Grund des § 8 Satz 3 des Gesetzes Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S. 105) wird verordnet:

§ 1

Inhalt, Form und Farbe des einheitlichen Formblattes, auf dem Ärzte, Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizini-

schen Instituten und Laboratorien Auskünfte an das Krebsregister erteilen (§ 8 Satz 1 und 3 SKRG), richten sich nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Muster.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. März 1979

**Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung**

Dr. Rosemarie Scheurlen

Anlage zu § 1 der Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen

Muster

An das
 Statistische Amt des Saarlandes
 Krebsregister
 Hardenbergstraße 3
 6600 Saarbrücken

Mitteilung über Geschwulsterkrankung

Die Mitteilung, Erhebung und Verarbeitung der nachstehenden Daten richten sich nach dem Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S. 105). Das Statistische Landesamt hat die Daten zu anonymisieren. Anonymisierte Daten dürfen grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftl. Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. An Einzelpersonen erfolgt eine Übermittlung anonymisierter Daten nur dann, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

PERSONENBEZOGENE DATEN

Reg.-Nr.: _____

Vor- und Familienname: _____
 Geburtsname: _____
 Geschlecht: männl., weibl. _____
 Geburtstag, -monat, -jahr: _____
 Familienstand: led., verh., früher verh. _____
 Wohnort: _____
 Beruf jetzt: _____
 früher: _____
 Nationalität: _____
 Bei Frauen: Zahl der geborenen Kinder (ohne Fehlgeburten): _____
 Sterbedatum: _____

Hier abtrennen!

MEDIZINISCHE DATEN

Reg.-Nr.: _____

Art der Geschwulsterkrankung: Ca., Sa., Leu., Präkanz., and.: _____
 Organlokalisation: _____
 Lokale Ausbreitung: T _____
 Lymphknotenmetastasen: N _____
 Fernmetastasen: M _____
 Zusammengefaßte histologische Diagnose: _____
 Diagnose gestellt am: _____
 Art der Diagnosesicherung: hist., röntg., op., Autopsie, and.: _____
 Zeitpunkt der ersten Beschwerden: wann: _____ wie: _____
 Schadstoffexpositionen: ja nein welche: _____
 Verdacht auf Berufskrebs: ja nein welcher: _____
 Beginn der Behandlung: _____
 Art der Behandlung: Op., ja nein
 Strahlenbehandlung: Röntgen Radium Gammatron Betatron
 Behandlung mit: Hormonen ja nein ; Cytostatika ja nein
 Jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes: Heil., Recidiv ja nein ; Metastasen ja nein ; and.: _____
 Krebsvorsorgeuntersuchung: wann: _____ welche: _____
 Todesursache lt. Totenschein: _____
 lt. Obduktion: _____
 Anschrift der berichtenden Stelle: _____
 (Name des Arztes, Zahnarztes, Leiters der Krankenanstalt, medizinischen Instituts bzw. medizinischen Laboratoriums)
 Bankverbindung: _____ Kro.-Nr. _____

Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod erfordert internationale Systematiken für eine einheitliche Erfassung von Krankheiten und Todesursachen. Bereits 1893 wurde eine internationale Klassifikation der Todesursachen entwickelt, die seit her etwa alle zehn Jahre einer Revision unterlag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) baute die Systematik in der 6. Revision zu einer Klassifikation aus, die nicht nur Todesursachen, sondern auch Krankheiten und Verletzungen umfasste. Nach Billigung der 9. Revision durch die XXIX. Vollversammlung der WHO im Mai 1976 wurde die revidierte Klassifikation ab 1. Januar 1979 in den Gesundheitsstatistiken der Mitgliedstaaten eingeführt.

Im saarländischen Krebsregister wird ab dem Jahrgang 1979 die vierstellige ausführliche Systematik dieser 9. Revision angewandt; die Positionsnummern in den Tabellen dieser Veröffentlichung sind jedoch nach der dreistelligen allgemeinen Systematik ausgewiesen.

Dreistellige Allgemeine Systematik der Neubildungen

140-149 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens

- 140 Bösartige Neubildung der Lippe
- 141 Bösartige Neubildung der Zunge
- 142 Bösartige Neubildung der Hauptspeicheldrüsen
- 143 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches
- 144 Bösartige Neubildung des Mundbodens
- 145 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes
- 146 Bösartige Neubildung des Rachenringes
- 147 Bösartige Neubildung des Nasenrachenraumes
- 148 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes innerhalb der Lippe, der Mundhöhle und des Rachenraumes

150-159 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

- 150 Bösartige Neubildung der Speiseröhre
- 151 Bösartige Neubildung des Magens
- 152 Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschließlich des Zwölffingerdarmes
- 153 Bösartige Neubildung des Dickdarmes ausgen. Mastdarm
- 154 Bösartige Neubildung des Mastdarmes und der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum und des Anus
- 155 Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegende Gallenwege mit der Angabe primärer Sitz
- 156 Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallenwege
- 157 Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse
- 158 Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retroperitonealraumes
- 159 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Verdauungsorgane und des Bauchfells

160-165 Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe

- 160 Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen, der -nebenhöhlen, des Mittelohres
- 161 Bösartige Neubildung des Kehlkopfes
- 162 Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge
- 163 Bösartige Neubildung des Rippenfells
- 164 Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum
- 165 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Atmungs- und intrathorakalen Organe

170-175 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse

- 170 Bösartige Neubildungen der Knochen und Gelenkknorpel
- 171 Bösartige Neubildungen des Bindegewebes und sonstiger Weichteile
- 172 Bösartiges Melanom der Haut
- 173 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
- 174 Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse
- 175 Bösartige Neubildung der männlichen Brustdrüse

179-189 Bösartige Neubildung der Harn- und Geschlechtsorgane

- 179 Bösartige Neubildung der Gebärmutter n. n. bez. Teil
- 180 Bösartige Neubildung der Zervix uteri
- 181 Bösartige Neubildung der Plazenta
- 182 Bösartige Neubildung des Corpus uteri
- 183 Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adenexe
- 184 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane
- 185 Bösartige Neubildung der Prostata
- 186 Bösartige Neubildung des Hodens
- 187 Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane
- 188 Bösartige Neubildung der Harnblase
- 189 Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n. n. bez. Harnorgane

190-199 Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. Sitze

- 190 Bösartige Neubildung des Auges
- 191 Bösartige Neubildung des Gehirns
- 192 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Nervensystems
- 193 Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- 194 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen
- 195 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes
- 196 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten
- 197 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane
- 198 Sekundäre Neubildung sonstiger näher bez. Sitze
- 199 Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes

200-208 Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes

- 200 Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom
- 201 Morbus Hodgkin
- 202 Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems
- 203 Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen
- 204 Lymphatische Leukämie
- 205 Myeloische Leukämie
- 206 Monozytäre Leukämie
- 207 Sonstige näher bez. Formen der Leukämie
- 208 Leukämie n. n. bez. Zellart



Mehr als 74 000 Schriften

Über 600 laufende Zeitschriften und Zeitungen


Statistiken des In- und Auslandes,
der deutschen Bundesländer,
des Deutschen Reiches,
der ehemaligen deutschen Länder

Statistisches
Landesamt  Saarland

Virchowstr. 7, 66119 Saarbrücken, Tel. (0681) 501-5901/5903

Öffnungszeiten:


Mo. - Fr. 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr



**Das Statistische Landesamt
SAARLAND
stellt sich vor.**

Stand: Juli 1996

So finden Sie uns



..... vom Flughafen Saarbrücken-Ensheim

Busverbindungen bis zum Hauptbahnhof Saarbrücken



..... vom Hauptbahnhof Saarbrücken

BUS - Linie 36

Abfahrtszeiten alle 60 Minuten, zur vollen Stunde (Fahrzeit 15 Minuten)

bis Haltestelle **Klinik Rotes Kreuz**, nach 150 m finden Sie uns in der **Virchowstr. 7**



..... mit dem PKW

Autobahn A 620

Abfahrt St. Annual - Krankenanstalten - nach der ersten Ampel der Beschilderung **-Klinik Rotes Kreuz-** folgen

Wir befinden uns neben der Klinik, Parkplätze finden Sie im Innenhof.

Das Statistische Landesamt Saarland versteht sich als ein modernes Dienstleistungs- und Informationszentrum, das zu allen Fragen aus dem Bereich der amtlichen Statistik eine individuelle Beratung anbietet.

Um unseren Kunden den Zugang zu unserem Informationsangebot weiter zu erleichtern, haben wir einen kleinen Wegweiser herausgegeben, der darüber informiert, welche/r Mitarbeiter/in für welche Statistiken zuständig ist.

Der Wegweiser ist kostenlos erhältlich und kann unter Tel. Nr. (0681) 501-5925/5927 bzw. postalisch (Statistisches Landesamt Saarland, Vertriebsstelle, Postfach 103044, 66030 Saarbrücken) angefordert werden.

Zu diesem Thema bereits erschienene Sonderhefte:

125	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1982 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)	157	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1988 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	12,— DM
129	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1983 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)	166	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1989 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)
133	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1984 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	10,— DM	167	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1990 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	12,— DM
137	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1985 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	(vergriffen)	175	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1991 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	15,— DM
143	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1986 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	10,— DM	180	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1992 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters	15,— DM
151	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1987 - Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters -	12,— DM			

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland (14. Ausgabe 1992, Preis 40,00 DM)

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reichhaltiges Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland (11. Ausgabe 1993, Preis 14,00 DM)

Das Statistische Taschenbuch füllt die durch die zweijährliche Erscheinungsweise des "Handbuchs" entstehende Lücke durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik aus. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

Saarland heute - Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich, kostenlos)

II. Fachstatistische Schriften

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

Bildung - Kurzinformationen (erscheint jährlich, kostenlos)

III. Reihen

Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute über 90 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2-Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystems SAPLIS usw. Werden jährlich aktualisiert herausgegeben.