

Statistische Berichte

des Statistischen Amtes des Saarlandes



Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 6 4911

A IV 5 - 1963/67

Ausgegeben am 23.8.1968

Tuberkulose im Saarland

Im Rahmen der nach bundeseinheitlichen Richtlinien durchgeführten Morbiditätsstatistik wurde im Saarland 1956 erstmals der Bestand der aktiv Tuberkulosekranken ermittelt. Neben den Bestandszahlen werden seither auch die Neuzugänge an Tuberkulösen gesondert ausgewiesen; die Veröffentlichung erfolgt vierteljährlich. In vorliegendem Bericht, der die jüngste Entwicklung der Tuberkulose, der am häufigsten auftretenden übertragbaren Krankheit, veranschaulichen soll, sind Bestand und Neuzugänge der aktiv Tuberkulosekranken für die Jahre 1956 bzw. 1957 und 1963 bis 1967 sowie der Bestand am 31.12.1967 nach Altersgruppen und Geschlecht zusammengestellt.

Nach den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter im Saarland waren am 31.12.1956 insgesamt 7 078 Personen an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankt und den Gesundheitsämtern bekannt. Trotz einer Bevölkerungszunahme von rund 145 000 Personen verringerte sich die Zahl der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den folgenden elf Jahren um 42 %; sie wurde am 31.12.1967 mit 4 127 angegeben. Auf 100 000 Einwohner kamen 1956 mehr als 700 Tuberkulöse, 1967 waren es nur noch 365. Den stärksten Rückgang um rund 2 000 Personen oder fast die Hälfte hatte der Bestand der an nicht ansteckender (aktiv geschlossener) Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten aufzuweisen.

Von den am 31.12.1967 erfaßten 4 127 Personen waren 36 % an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, 52 % an einer nicht ansteckenden aber aktiven Tuberkulose der Atmungsorgane und 12 % an aktiver Tuberkulose anderer Organe erkrankt. Eine fast gleiche prozentuale Verteilung ergibt sich auch bei den Neuzugängen, deren Zahl seit 1963 jährlich zwischen 1 000 und 1 200 schwankt, nachdem sie 1957 noch 1889 betragen hatte.

In der Gesamtzahl der Tuberkulosekranken am 31.12.1967 sind die Frauen mit etwa 31 % vertreten. Dabei liegt der Anteil des weiblichen Geschlechts an der ansteckungsfähigen Tuberkulose der Atmungsorgane mit 21 % wesentlich niedriger als der an der aktiv geschlossenen Lungentuberkulose (33 %). Bei den extrapulmonalen Tuberkulösen überwiegen dagegen leicht die Frauen. Mehr als drei Fünftel der an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankten Männer stehen im Alter von über 50 Jahren.

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
am 31. Dezember des Jahres

Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe
		ansteckend (offen)	nicht ansteckend (aktiv geschl.)	
Grundzahlen				
1956	7 078	2 009	4 125	944
1963	5 142	1 644	2 813	685
1964	5 065	1 603	2 773	689
1965	5 139	1 683	2 733	723
1966	4 487	1 535	2 377	575
1967	4 127	1 461	2 157	509
Verhältniszahlen 1)				
1956	704,2	199,8	410,4	93,9
1963	464,9	148,6	254,3	61,9
1964	453,4	143,5	248,2	61,7
1965	455,8	149,3	242,4	64,1
1966	396,3	135,6	210,0	50,8
1967	364,8	129,1	190,7	45,0

1) auf 100 000 der Bevölkerung

Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

Jahr	Tuberkulose			
	insgesamt	der Atmungsorgane		anderer Organe
		ansteckend (offen)	nicht ansteckend (aktiv geschl.)	
Grundzahlen				
1957	1 889	520	1 135	234
1963	1 252	347	725	180
1964	1 126	326	629	171
1965	1 202	374	686	142
1966	1 000	337	509	154
1967	1 194	426	602	166
Verhältniszahlen 1)				
1957	186,6	51,4	112,1	23,1
1963	113,2	31,4	65,5	16,3
1964	100,8	29,2	56,3	15,3
1965	106,6	33,2	60,9	12,6
1966	88,3	29,8	45,0	13,6
1967	105,5	37,7	53,2	14,7

1) auf 100 000 der Bevölkerung

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht
am 31. 12 1967

Altersgruppe	Aktive Tuberkulose															
	Absolute Zahlen							Verhältniszahlen auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe								
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe			insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane			Tuberkulose anderer Organe		insgesamt	
	ansteckend (offen)		nicht ansteckend (geschlossen)		Tuberkulose anderer Organe		insgesamt	ansteckend (offen)		nicht ansteckend (aktiv geschlossen)		Tuberkulose anderer Organe		insgesamt		
männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.		weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.		
unter 1 Jahr	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1,1	-	-	-	1,1	-	
1 bis unter 5 Jahren	-	1	27	23	-	-	27	24	0,2	6,7	5,9	-	-	6,7	6,1	
5 bis unter 10 Jahren	2	1	95	81	5	3	102	85	0,4	18,2	16,5	1,0	0,6	19,6	17,3	
10 bis unter 15 Jahren	2	5	60	57	7	10	68	72	0,2	12,9	12,7	1,5	2,2	14,6	16,0	
15 bis unter 20 Jahren	17	19	89	78	13	17	119	114	3,9	20,3	18,5	3,0	4,0	27,2	27,1	
20 bis unter 25 Jahren	31	16	85	56	10	13	126	85	10,5	28,8	18,2	3,4	4,2	42,6	27,7	
25 bis unter 30 Jahren	62	24	95	76	16	24	173	124	14,7	22,5	17,8	3,8	5,6	41,0	29,1	
30 bis unter 35 Jahren	63	29	89	52	15	34	167	115	15,3	21,7	13,0	3,6	8,4	40,7	28,6	
35 bis unter 40 Jahren	83	25	104	38	34	30	221	93	21,5	26,9	10,3	8,8	8,1	57,2	25,2	
40 bis unter 45 Jahren	83	37	102	55	39	36	224	128	24,3	29,9	13,4	11,4	8,7	65,6	31,1	
45 bis unter 50 Jahren	81	39	97	39	25	21	203	99	28,8	34,4	10,5	8,9	5,6	72,1	26,6	
50 bis unter 55 Jahren	72	25	103	32	18	16	198	73	30,9	44,1	10,2	7,7	5,1	82,7	23,2	
55 bis unter 60 Jahren	169	20	153	45	23	19	345	84	55,8	50,4	11,0	7,6	4,6	113,8	20,6	
60 bis unter 65 Jahren	202	23	151	24	14	10	367	57	67,9	50,7	6,5	4,7	2,7	123,3	15,4	
65 bis unter 70 Jahren	146	16	102	20	18	10	266	46	64,2	44,9	6,7	8,0	3,4	117,0	15,5	
70 bis unter 75 Jahren	69	16	46	22	8	10	123	48	53,8	35,9	10,7	6,2	4,8	95,9	23,2	
75 bis unter 80 Jahren	44	11	28	17	2	5	74	33	59,4	37,8	13,8	2,7	4,0	99,8	26,8	
80 und mehr Jahre	23	6	13	2	4	-	40	8	39,4	22,3	2,3	6,9	-	68,6	9,1	
Insgesamt	1 148	313	1 440	717	251	258	2 839	1 288	21,3	26,8	12,1	4,7	4,3	52,8	21,7	