

Statistische Berichte



Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3. Postfach 409, Fernsprecher 0681/505-1

A IV 5 - j / 79

Ausgegeben am 23. März 1981

Tuberkulose im Saarland 1979

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

INHALTSVERZEICHNIS

Gesamtüberblick	3
Schaubilder	4

Tabellenteil

1. Zugänge an aktiv Tuberkulosekranken 1975 bis 1979	5
2. Bestand an aktiv Tuberkulosekranken 1975 bis 1979	6
3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1979 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht	7
4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1979 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht	7
5. Zugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1979 nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen	8
6. Bestand der an Tuberkulose erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht am 31. 12. 1979	9
7. Zugänge an Tuberkulosekranken im Jahre 1979 nach Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen	10
8. Bestand an Tuberkulosekranken am 31. 12. 1979 nach Kreisen und Geschlecht	11

Gesamtüberblick

1. Bestand (Prävalenz)

Am 31.12.1979 waren bei den Gesundheitsämtern des Saarlandes insgesamt 1 634 Tuberkulosekranke registriert, 155 oder 8,7 % weniger als im Vorjahr. Von den erfaßten Personen litten 394 (24 %) an einer ansteckenden, d.h. durch Nachweis von Bakterien bestätigten Form der Lungentuberkulose. Eine bakteriologisch nicht nachweisbare, aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane konnte in 998 oder 61 % der Fälle festgestellt werden. Bei 15 % (242) aller Erkrankten lag eine sogenannte extrapulmonale Tuberkuloseerkrankung (Tuberkulose anderer Organe) vor.

An der Gesamtzahl der Erkrankungen hatten mit rund 71 % die Männer den größten Anteil. Auf 100 000 männliche Einwohner entfielen im Durchschnitt 228 Tuberkulosekranke, 17 weniger als ein Jahr zuvor. Die Erkrankungshäufigkeit der Frauen ist mit 85 Erkrankungen pro 100 000 gegenüber dem Vorjahr (95 Erkrankungen) merklich zurückgegangen.

2. Zugänge (Inzidenz)


Im Jahre 1979 wurden im Saarland insgesamt 575 Neuerkrankungen an Tuberkulose gemeldet; dies waren 5,1 % mehr als ein Jahr zuvor. Die Erkrankungshäufigkeit bezogen auf 100 000 Einwohner lag im Berichtsjahr bei 54 Erkrankungen gegenüber 51 im Jahre 1978. 466 Personen erkrankten erstmalig an Tuberkulose. Die verbleibenden 109 Patienten waren Wiedererkrankte, von denen über die Hälfte (61 %) zuvor bereits gesundheitsbehördlich überwacht wurde.

Bei 41 % (237) der Neuzugänge des Jahres 1979 wurde eine ansteckende Tuberkuloseerkrankung der Atmungsorgane diagnostiziert. Bei 45 % (257) der Erkrankungen handelte es sich um eine aktive Lungentuberkulose ohne Nachweis von Bakterien. In 14 % (81) der Fälle waren andere als die Atmungsorgane von Tuberkulose befallen.


3. Tuberkulosesterblichkeit

Im Berichtsjahr 1979 starben im Saarland 59 Menschen an Tuberkulose, 9 % weniger als im Jahr zuvor. Fast alle Sterbefälle (97 %) waren auf tuberkulöse Erkrankungen der Atmungsorgane zurückzuführen. Auf 100 000 Einwohner entfielen im Berichtsjahr 1979 sechs an Tuberkulose gestorbene Personen, was dem Vorjahresstand entsprach. 82 % aller Tuberkuloseerkrankungen mit Todesfolge entfielen auf das männliche Geschlecht.

BESTAND AN TUBERKULOSE KRANKEN IM SAARLAND AM 31. DEZEMBER 1979 NACH ALTER UND GESCHLECHT
AUF 10000 PERSONEN GLEICHEN ALTERS UND GESCHLECHTS



-	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	5	10	15	20	25	30	bis unter	35	40	45	50	55	60	65	70
1															Jahre u. mehr



ZUGÄNGE AN TUBERKULOSE KRANKEN IM SAARLAND 1979 NACH ALTERSGRUPPEN UND GESCHLECHT
AUF 10000 PERSONEN GLEICHEN ALTERS UND GESCHLECHTS

1. Zugänge an aktiv Tuberkulosekranken 1974 – 1979

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1974	475	90,5	212	40,4	204	38,9	59	11,2
1975	371	71,0	164	31,4	176	33,7	31	5,9
1976	332	64,0	142	27,4	157	30,3	33	6,4
1977	365	70,9	160	31,1	166	32,3	39	7,6
1978	363	71,2	157	30,8	169	33,2	37	7,3
1979	387	76,4	180	35,5	178	35,2	29	5,7
weiblich								
1974	231	40,0	55	9,5	115	19,9	61	10,5
1975	221	38,3	59	10,2	106	18,4	56	9,7
1976	133	23,2	42	7,3	62	10,8	29	5,1
1977	191	33,5	62	10,9	78	13,7	51	9,0
1978	184	32,4	56	9,9	91	16,0	37	6,5
1979	188	33,3	57	10,1	79	14,0	52	9,2
insgesamt								
1974	706	63,7	267	24,1	319	28,8	120	10,8
1975	592	53,8	223	20,3	282	25,6	87	7,9
1976	465	42,6	184	16,8	219	20,0	62	5,7
1977	556	51,2	222	20,5	244	22,5	90	8,3
1978	547	50,8	213	19,8	260	24,1	74	6,9
1979	575	53,7	237	22,1	257	24,0	81	7,6

2. Bestand¹⁾ an aktiv Tuberkulosekranken 1974 – 1979

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Zahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1974	1 803	343,7	423	80,6	1 209	230,5	171	32,6
1975	1 606	307,3	368	70,4	1 107	211,8	131	25,1
1976	1 351	260,4	331	63,8	895	172,5	125	24,1
1977	1 344	260,1	325	63,1	883	171,5	136	26,4
1978	1 248	244,9	317	62,2	812	159,3	119	23,4
1979	1 155	228,1	297	58,7	755	149,1	103	20,3
weiblich								
1974	725	125,3	95	16,4	439	75,9	191	33,0
1975	678	117,6	106	18,4	400	69,3	172	29,8
1976	530	92,3	87	15,2	305	53,1	138	24,0
1977	548	96,0	95	16,6	300	52,6	153	26,8
1978	541	95,4	96	16,9	299	52,7	146	25,7
1979	479	84,9	97	17,2	243	43,1	139	24,6
insgesamt								
1974	2 528	228,2	518	46,8	1 648	148,7	362	32,7
1975	2 284	207,7	474	43,1	1 507	137,0	303	27,5
1976	1 881	172,1	418	38,2	1 200	109,8	263	24,1
1977	1 892	174,3	420	38,7	1 183	100,0	289	26,6
1978	1 789	166,1	413	38,4	1 111	103,2	265	24,6
1979	1 634	152,7	394	36,8	998	93,3	242	22,6

**3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1979
nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht**

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Nachweis von TBK-Bakterien			ohne Nachweis von TBK-Bakterien					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	20	8	12	2	—	2	15	6	9	3	2	1
15 bis unter 25	62	38	24	19	10	9	36	23	13	7	5	2
25 bis unter 40	105	67	38	35	24	11	56	38	18	14	5	9
40 bis unter 65	253	174	79	100	81	19	113	81	32	40	12	28
65 und mehr	135	100	35	81	65	16	37	30	7	17	5	12
Insgesamt	575	387	188	237	180	57	257	178	79	81	29	52
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	10,4	8,2	12,7	1,0	—	2,1	7,8	6,1	9,5	1,6	2,0	1,1
15 bis unter 25	34,0	40,6	27,0	10,4	10,7	10,1	19,7	24,6	14,6	3,8	5,3	2,2
25 bis unter 40	50,7	64,2	37,1	16,9	23,0	10,7	27,1	36,4	17,6	6,8	4,8	8,8
40 bis unter 65	87,3	126,8	51,7	34,5	59,0	12,4	39,0	59,0	21,0	13,8	8,7	7,9
65 und mehr	67,9	136,1	27,9	40,7	88,5	12,8	18,6	40,8	5,6	8,6	6,8	9,6
Insgesamt	53,7	76,4	33,3	22,1	35,5	10,1	24,0	35,2	14,0	7,6	5,7	9,2

**4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1979
nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht**

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Nachweis von TBK-Bakterien			ohne Nachweis von TBK-Bakterien					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	31	16	15	2	—	2	28	15	13	1	1	—
15 bis unter 25	145	89	56	28	15	13	104	64	40	13	10	3
25 bis unter 40	283	188	95	67	49	18	174	124	50	42	15	27
40 bis unter 65	721	519	202	158	124	34	430	334	96	133	61	72
65 und mehr	454	343	111	139	109	30	262	218	44	53	16	37
Insgesamt	1 634	1 155	479	394	297	97	998	755	243	242	103	139
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	16,1	16,4	15,9	1,0	—	2,1	14,6	15,3	13,8	0,5	1,0	—
15 bis unter 25	79,4	95,2	62,9	15,3	16,0	14,6	57,0	68,4	44,9	7,1	10,7	3,4
25 bis unter 40	136,8	180,1	92,6	32,4	46,9	17,6	84,1	118,8	48,8	20,3	14,4	26,3
40 bis unter 65	248,7	378,3	132,3	54,5	90,4	22,3	148,3	243,5	62,9	45,9	44,5	47,2
65 und mehr	228,4	466,7	88,6	69,9	148,3	23,9	131,8	296,7	35,1	26,7	21,8	29,5
Insgesamt	152,7	228,1	84,9	36,8	58,7	17,2	93,3	149,1	43,1	22,6	20,3	24,6

5. Zugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1979 nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Altersgruppe	Aktive Tuberkulose															
	Alle Formen								der Atmungsorgane							
	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien				mit Nachweis von Tuberkulosebakterien				ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien			
	männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte	männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte	männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte	männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte
unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5 Jahre	5	6	11	11	—	—	—	4	5	9	9	—	1	1	—	—
5 bis unter 10 Jahre	—	4	4	4	—	—	—	—	2	2	2	—	—	1	1	—
10 bis unter 15 Jahre	3	2	5	5	—	—	—	—	2	2	4	—	—	1	1	—
15 bis unter 20 Jahre	11	11	22	18	4	4	7	2	6	11	9	2	1	2	2	—
20 bis unter 25 Jahre	27	13	40	40	—	—	—	—	7	25	25	—	4	5	5	—
25 bis unter 30 Jahre	24	15	39	37	2	2	14	2	8	14	12	2	1	2	2	—
30 bis unter 35 Jahre	21	13	34	30	4	4	10	—	13	18	15	3	2	6	5	1
35 bis unter 40 Jahre	22	10	32	28	4	4	11	1	10	15	13	2	2	6	5	1
40 bis unter 45 Jahre	44	17	61	48	13	13	24	3	20	28	19	9	4	9	8	1
45 bis unter 50 Jahre	32	20	52	38	14	14	19	5	16	25	18	7	2	8	6	2
50 bis unter 55 Jahre	33	18	51	41	10	11	12	9	18	24	20	4	4	15	12	3
55 bis unter 60 Jahre	33	11	44	31	13	16	20	15	16	21	13	8	1	3	3	—
60 bis unter 65 Jahre	32	13	45	33	12	20	25	22	11	15	9	6	1	5	2	3
65 bis unter 70 Jahre	68	24	92	71	21	44	56	46	23	28	17	11	1	8	8	—
70 und mehr Jahre	32	11	43	31	12	21	19	6	7	9	4	5	4	9	8	1
Insgesamt	337	188	575	466	109	180	237	197	40	178	79	257	200	81	69	12

6. Bestand der an Tuberkulose erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht am 31. 12. 1979

Altersgruppe	Aktive Tuberkulose															
	Absolute Zahlen							Verhältniszahlen auf 100 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe								
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe		Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
	männlich	weiblich	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	mit Nachweis von Tuberkulosebakterien	ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 1 Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 — 5	7	6	1	6	1	5	1	36,2	32,6	—	5,4	31,1	27,2	—	5,2	—
5 — 10	5	7	1	5	—	6	—	17,1	24,7	—	3,5	17,1	21,2	—	—	—
10 — 15	4	2	—	4	—	2	—	9,0	4,7	—	—	9,0	4,7	—	—	—
15 — 20	22	20	6	14	3	13	1	43,7	42,0	9,9	12,6	27,8	27,3	6,0	2,1	—
20 — 25	67	36	7	50	7	27	2	155,0	86,9	23,1	16,9	115,6	65,2	16,2	4,8	—
25 — 30	64	36	8	46	5	20	8	166,0	96,2	33,7	21,4	119,3	53,4	13,0	21,4	—
30 — 35	45	34	8	28	6	19	7	151,2	118,9	36,9	28,0	94,1	66,5	20,2	24,4	—
35 — 40	79	25	2	50	4	11	12	219,2	68,4	69,4	5,5	138,7	30,1	11,1	32,8	—
40 — 45	114	43	10	71	17	20	13	275,3	103,4	62,8	24,0	171,4	48,1	41,0	31,3	—
45 — 50	90	34	4	57	10	16	14	257,3	99,0	65,7	11,6	162,9	46,6	28,6	40,8	—
50 — 55	127	38	5	87	18	18	15	387,4	101,8	67,1	13,4	265,4	48,2	54,9	40,2	—
55 — 60	92	46	8	62	9	22	16	328,6	116,7	75,0	20,3	221,4	55,8	32,1	40,6	—
60 — 65	96	41	7	57	7	20	14	572,9	165,1	191,0	28,2	340,2	80,5	41,8	56,4	—
65 — 70	235	63	14	157	8	23	26	1 096,9	182,2	326,7	40,5	732,8	66,5	37,3	75,2	—
70 und mehr	108	48	16	61	8	21	11	305,9	72,9	110,5	24,3	172,8	31,9	22,7	16,7	—
Insgesamt	1 155	479	97	755	103	243	139	228,1	84,9	58,7	17,2	149,1	43,1	20,3	24,6	

7. Zugänge an Tuberkulosekranken im Jahre 1979 nach Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen				Tuberkulose der Atmungsorgane								Tuberkulose anderer Organe							
	männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte	mit Nachweis von TBK-Bakterien				ohne Nachweis von TBK-Bakterien				männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte				
					männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte	männlich	weiblich	insgesamt	davon Erst- erkrankte								
Saarbrücken	156	70	226	167	59	63	25	88	69	19	83	32	115	78	37	10	13	23	20	3
Merzig-Wadern	25	14	39	34	5	15	8	23	20	3	7	3	10	9	1	3	3	6	5	1
Neunkirchen	61	30	91	81	10	34	9	43	42	1	23	6	29	24	5	4	15	19	15	4
Saarlouis	81	43	124	99	25	37	8	45	35	10	38	25	63	52	11	6	10	16	12	4
Saar-Pfalz-Kreis	32	17	49	41	8	14	4	18	13	5	13	8	21	18	3	5	5	10	10	—
St. Wendel	32	14	46	44	2	17	3	20	18	2	14	5	19	19	—	1	6	7	7	—
SAARLAND	387	188	575	466	109	180	57	237	197	40	178	79	257	200	57	29	52	81	69	12

8. Bestand an Tuberkulosekranken am 31.12.1979 nach Kreisen und Geschlecht

Stadtverband Landkreis LAND	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe								
	Alle Formen					mit Nachweis von TBK-Bakterien					ohne Nachweis von TBK-Bakterien								
	männlich		weiblich		Ins-gesamt	männlich		weiblich		Ins-gesamt	männlich		weiblich		Ins-gesamt	männlich		weiblich	
	darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt		darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt		darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt		darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt
Saarbrücken	398	25	158	6	3	86	42	1	276	20	85	3	36	2	31	2			
Merzig-Wadern	125	2	56	2	1	29	17	1	83	1	25	1	13	-	14	-			
Neunkirchen	167	5	55	1	-	37	8	-	120	4	31	1	10	1	16	-			
Saarlouis	177	12	91	3	3	51	13	-	108	6	50	2	18	3	28	1			
Saar-Pfalz-Kreis	113	6	66	5	1	41	9	1	57	4	31	3	15	1	26	1			
St. Wendel	175	-	53	-	-	53	8	-	111	-	21	-	11	-	24	-			
SAARLAND	1 155	50	479	17	8	297	97	3	755	35	243	10	103	7	139	4			