



Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1,

Hardenbergstraße 3.

Postfach 409,

Fernsprecher 0681/505-1

A IV 5 — j./1982

Ausgegeben am 14. November 1983

Tuberkulose im Saarland 1982

Gesamtüberblick

1. Bestand (Prävalenz)

Am 31. 12. 1982 waren bei den Gesundheitsämtern des Saarlandes insgesamt 1276 Tuberkulosekranke registriert, 127 oder 9 % weniger als im Vorjahr. Von den erfaßten Personen litten 304 (24 %) an einer ansteckenden, d.h. durch Nachweis von Bakterien bestätigten Form der Tuberkulose der Atmungsorgane. Eine bakteriologisch nicht nachweisbare, aber aktive Tuberkulose der Atmungsorgane konnte in 760 Fällen (59 %) festgestellt werden. Bei 212 (17 %) der Erkrankten lag eine extrapulmonale Tuberkuloseerkrankung (Tuberkulose anderer Organe) vor.

An der Gesamtzahl der Erkrankungen hatten die Männer mit 70 % den größten Anteil. Auf 100 000 männliche Einwohner entfielen im Durchschnitt 179 Tuberkulosekranke, 13 weniger als im Jahr zuvor. Die Erkrankungshäufigkeit der Frauen ist mit 68 Erkrankungen pro 100 000 gegenüber dem Vorjahr (78 Erkrankungen) ebenfalls zurückgegangen.

2. Zugänge (Inzidenz)

Im Jahre 1982 lag die Zahl der Neuerkrankungen an Tuberkulose mit 370 um 85 (19 %) deutlich unter der des Vorjahres. Die Erkrankungshäufigkeit, bezogen auf 100 000 Einwohner, reduzierte sich von 43 auf 35. 324 Personen erkrankten erstmals an Tuberkulose; 46 Patienten waren Wiedererkrankte.

Bei 51 % (187) der Neuzugänge des Jahres 1982 wurde eine ansteckende Tuberkuloseerkrankung der Atmungsorgane diagnostiziert. Zu 31 % (115) handelte es sich um eine aktive Lungentuberkulose ohne Nachweis von Bakterien. In 68 Fällen, das sind 18 %, waren andere Organe von Tuberkulose befallen.

3. Tuberkulosesterblichkeit

Nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik starben 1982 im Saarland 55 Personen an Tuberkulose, 14 oder 34 % mehr als im Jahr zuvor. Fast alle Sterbefälle (98 %) waren auf Erkrankungen der Atmungsorgane zurückzuführen. Auf 100 000 Einwohner kamen im Berichtsjahr fünf an Tuberkulose gestorbene Personen. 87 % aller Tuberkuloseerkrankungen mit Todesfolge entfielen auf das männliche Geschlecht.

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

1. Zugänge an aktiv Tuberkulosekranken 1978 bis 1982

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1978	363	71,2	157	30,8	169	33,2	37	7,3
1979	387	76,4	180	35,5	178	35,2	29	5,7
1980	310	61,3	139	27,5	138	27,3	33	6,5
1981	292	57,8	143	28,3	121	24,0	28	5,5
1982	245	48,7	129	25,6	77	15,3	39	7,8
weiblich								
1978	184	32,4	56	9,9	91	16,0	37	6,5
1979	188	33,3	57	10,1	79	14,0	52	9,2
1980	150	26,7	51	9,1	70	12,5	29	5,2
1981	163	29,1	57	10,2	63	11,2	43	7,7
1982	125	22,4	58	10,4	38	6,8	29	5,2
INSGESAMT								
1978	547	50,8	213	19,8	260	24,1	74	6,9
1979	575	53,7	237	22,1	257	24,0	81	7,6
1980	460	43,1	190	17,8	208	19,5	62	5,8
1981	455	42,7	200	18,8	184	17,3	71	6,6
1982	370	34,9	187	17,6	115	10,8	68	6,4

2. Bestand* an aktiv Tuberkulosekranken 1978 bis 1982

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1978	1 248	244,9	317	62,2	812	159,3	119	23,4
1979	1 155	228,1	297	58,7	755	149,1	103	20,3
1980	1 056	208,9	263	52,0	703	139,1	90	17,8
1981	969	191,9	244	48,3	636	126,0	89	17,6
1982	898	178,5	235	46,7	567	112,7	96	19,1
weiblich								
1978	541	95,4	96	16,9	299	52,7	146	25,7
1979	479	84,9	97	17,2	243	43,1	139	24,6
1980	454	81,0	77	13,7	248	44,2	129	23,0
1981	434	77,5	74	13,2	226	40,4	134	23,9
1982	378	67,8	69	12,4	193	34,6	116	20,8
INSGESAMT								
1978	1 789	166,1	413	38,4	1 111	103,2	265	24,6
1979	1 634	152,7	394	36,8	998	93,3	242	22,6
1980	1 510	141,6	340	31,9	951	89,2	219	20,5
1981	1 403	131,8	318	29,9	862	81,0	223	20,9
1982	1 276	120,3	304	28,7	760	71,7	212	20,0

*) Jeweils am 31. Dezember.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1982 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Nachweis von TBK-Bakterien			ohne Nachweis von TBK-Bakterien					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	19	11	8	—	—	—	19	11	8	—	—	—
15 bis unter 25	26	9	17	8	1	7	12	5	7	6	3	3
25 bis unter 40	65	47	18	29	24	5	21	13	8	15	10	5
40 bis unter 65	181	130	51	99	72	27	44	38	6	38	20	18
65 und mehr	79	48	31	51	32	19	19	10	9	9	6	3
Insgesamt	370	245	125	187	129	58	115	77	38	68	39	29
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	11,3	12,8	9,7	—	—	—	11,3	12,8	9,7	—	—	—
15 bis unter 25	14,0	9,4	18,8	4,3	1,1	7,8	6,5	5,2	7,8	3,2	3,1	3,3
25 bis unter 40	31,5	44,7	17,7	14,0	22,8	4,9	10,2	12,4	7,9	7,3	9,5	4,9
40 bis unter 65	52,2	79,6	27,8	28,5	44,1	14,7	12,7	23,3	3,3	11,0	12,3	9,8
65 und mehr	51,6	90,2	31,1	33,3	60,1	19,1	12,4	18,8	9,0	5,9	11,3	3,0
Insgesamt	34,9	48,7	22,4	17,6	25,7	10,4	10,8	15,3	6,8	6,4	7,8	5,2

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1982 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Nachweis von TBK-Bakterien			ohne Nachweis von TBK-Bakterien					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	43	18	25	1	—	1	40	17	23	2	1	1
15 bis unter 25	89	47	42	13	3	10	64	36	28	12	8	4
25 bis unter 40	231	160	71	46	38	8	138	98	40	47	24	23
40 bis unter 65	531	395	136	113	93	20	315	255	60	103	47	56
65 und mehr	382	278	104	131	101	30	203	161	42	48	16	32
Insgesamt	1 276	898	378	304	235	69	760	567	193	212	96	116
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	25,5	20,9	30,3	0,6	—	1,2	23,8	19,8	27,9	1,2	1,2	1,2
15 bis unter 25	47,9	49,2	46,5	7,0	3,1	11,1	34,4	37,7	31,0	6,5	8,4	4,4
25 bis unter 40	111,8	152,1	70,0	22,3	36,1	7,9	66,8	93,2	39,5	22,8	22,8	22,7
40 bis unter 65	153,1	242,0	74,1	32,6	57,0	10,9	90,8	156,2	32,7	29,7	28,8	30,5
65 und mehr	249,7	522,5	104,3	85,6	189,8	30,1	132,7	302,6	42,1	31,4	30,1	32,1
Insgesamt	120,3	178,5	67,8	28,7	46,7	12,4	71,7	112,7	34,6	20,0	19,1	20,8

5. Zugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1982

Altersgruppe in Jahren	Aktive						
	Alle Formen					der	
						mit Nachweis Tuberkulose	
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich
Erst- erkrankte				Wieder- erkrankte			
unter 1	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	5	4	9	9	—	—	—
5 bis unter 10	6	4	10	10	—	—	—
10 bis unter 15	—	—	—	—	—	—	—
15 bis unter 20	1	4	5	5	—	2	2
20 bis unter 25	8	13	21	20	1	5	6
25 bis unter 30	16	9	25	25	—	3	15
30 bis unter 35	17	6	23	23	—	2	9
35 bis unter 40	14	3	17	16	1	—	5
40 bis unter 45	28	9	37	34	3	4	19
45 bis unter 50	21	12	33	27	6	7	19
50 bis unter 55	27	7	34	23	11	1	13
55 bis unter 60	22	9	31	25	6	6	19
60 bis unter 65	32	14	46	39	7	9	29
65 bis unter 70	28	25	53	46	7	14	35
70 und mehr	20	6	26	22	4	5	16
INSGESAMT	245	125	370	324	46	129	187

6. Bestand der an Tuberkulose erkrankten Personen

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Absolute Zahlen							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien			
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	6	8	—	1	5	7	1	—
5 bis unter 10	10	12	—	—	10	11	—	1
10 bis unter 15	2	5	—	—	2	5	—	—
15 bis unter 20	8	6	—	2	5	4	3	—
20 bis unter 25	39	36	3	8	31	24	5	4
25 bis unter 30	47	32	13	5	31	19	3	8
30 bis unter 35	57	22	11	3	33	11	13	8
35 bis unter 40	56	17	14	—	34	10	8	7
40 bis unter 45	84	18	20	4	56	11	8	3
45 bis unter 50	86	39	21	5	57	19	8	15
50 bis unter 55	78	31	15	5	51	11	12	15
55 bis unter 60	83	25	22	1	48	12	13	12
60 bis unter 65	64	23	15	5	43	7	6	11
65 bis unter 70	46	20	18	4	22	10	6	6
70 und mehr	232	84	83	26	139	32	10	26
INSGESAMT	898	378	235	69	567	193	96	116

nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
von bakterien		ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	4	9	9	—	—	—	—	—	—
—	—	6	4	10	10	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	2	2	2	—	1	—	1	1	—
6	—	5	5	10	9	1	2	3	5	5	—
15	—	4	4	8	8	—	—	2	2	2	—
9	—	4	2	6	6	—	6	2	8	8	—
5	—	5	2	7	7	—	4	1	5	4	1
19	—	10	2	12	9	3	3	3	6	6	—
14	5	7	2	9	8	1	2	3	5	5	—
9	4	10	1	11	4	7	5	5	10	10	—
15	4	4	1	5	3	2	5	2	7	7	—
27	2	7	—	7	3	4	5	5	10	9	1
32	3	4	8	12	9	3	3	3	6	5	1
15	1	6	1	7	4	3	3	—	3	3	—
168	19	77	38	115	91	24	39	29	68	65	3

am 31. 12. 1982 nach Alter und Geschlecht

Tuberkulose							
Verhältniszahlen auf 100 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe							
Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
		mit Nachweis von Tuberkulosebakterien		ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien			
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
—	—	—	—	—	—	—	—
23,5	32,6	—	4,1	19,6	28,5	3,9	—
41,1	52,0	—	—	41,1	47,7	—	4,3
5,9	15,1	—	—	5,9	15,1	—	—
16,9	13,2	—	4,4	10,6	8,8	6,3	—
81,7	80,7	6,3	17,9	65,0	53,8	10,5	9,0
115,9	82,3	32,1	12,9	76,4	48,9	7,4	20,6
150,8	60,9	29,1	8,3	87,3	30,5	34,4	22,1
202,1	62,6	50,5	—	122,7	36,8	28,9	25,8
215,8	45,3	51,4	10,1	143,8	27,7	20,5	7,6
224,0	101,3	54,7	13,0	148,4	49,4	20,8	39,0
224,2	88,7	43,1	14,3	146,6	31,5	34,5	42,9
283,0	65,8	75,0	2,6	163,7	31,6	44,3	31,6
284,4	69,5	66,7	15,1	191,1	21,2	26,7	33,3
282,6	75,1	110,6	15,0	135,1	37,5	36,9	22,5
642,6	116,0	230,0	35,9	385,0	44,2	27,7	35,9
179,1	68,0	46,9	12,4	113,1	34,7	19,1	20,9

7. Zugänge an Tuberkulosekranken im Jahre 1982 nach

STADTVERBAND Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Nachweis von		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
SAARBRÜCKEN	88	44	132	111	21	39	25	64
Merzig-Wadern	23	7	30	29	1	18	3	21
Neunkirchen	51	25	76	58	18	26	11	37
Saarlouis	39	27	66	63	3	23	13	36
Saar-Pfalz-Kreis	28	15	43	41	2	14	5	19
St. Wendel	16	7	23	22	1	9	1	10
SAARLAND	245	125	370	324	46	129	58	187

8. Bestand an Tuberkulosekranken am 31. 12.

STADTVERBAND Landkreis LAND	Alle Formen				Tuber- mit Nachweis von	
	männlich		weiblich		männlich	
	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer
SAARBRÜCKEN	233	30	88	10	52	6
Merzig-Wadern	103	1	45	5	32	—
Neunkirchen	155	12	62	4	28	2
Saarlouis	136	11	68	5	41	1
Saar-Pfalz-Kreis	111	12	61	3	37	5
St. Wendel	160	2	54	2	45	—
SAARLAND	898	68	378	29	235	14

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Kulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe					
TBK-Bakterien		ohne Nachweis von TBK-Bakterien										
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte	
55	9	32	10	42	32	10	17	9	26	24	2	
20	1	—	2	2	2	—	5	2	7	7	—	
30	7	22	7	29	19	10	3	7	10	9	1	
35	1	14	10	24	22	2	2	4	6	6	—	
19	—	6	5	11	9	2	8	5	13	13	—	
9	1	3	4	7	7	—	4	2	6	6	—	
168	19	77	38	115	91	24	39	29	68	65	3	

1982 nach Kreisen und Geschlecht

Kulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe			
TBK-Bakterien		ohne Nachweis von TBK-Bakterien							
weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer	Ins-gesamt	darunter Ausländer
20	1	148	19	46	6	33	5	22	3
7	1	60	1	25	3	11	—	13	1
10	—	116	7	36	4	11	3	16	—
13	1	82	9	36	4	13	1	19	—
12	1	60	1	24	1	14	6	25	1
7	—	101	2	26	1	14	—	21	1
69	4	567	39	193	19	96	15	116	6