

Statistische Berichte



Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1,

Hardenbergstraße 3,

Postfach 409,

Fernsprecher 0681/505-1

A IV 5 – j 1983

Ausgegeben am 14. Januar 1985

Tuberkulose im Saarland 1983

Überblick

1. Bestand (Prävalenz)

Die saarländischen Gesundheitsämter registrierten am 31.12.1983 insgesamt 1 047 Tuberkuloseerkrankte, damit 229 oder fast 18 % weniger als im Vorjahr. Bakteriologisch nachweisbare Erkrankungen der Atmungsorgane lagen in 242 (23 %) aller Fälle vor, während auf bakteriologisch nicht nachweisbare, aber aktive tuberkulöse Erkrankungen der Atmungsorgane 618 Fälle oder 59 % entfielen. Bei 187 Befallenen lag eine Tuberkulose anderer Organe vor.

Etwas mehr als zwei Drittel der Erkrankten waren Männer.

2. Zugänge (Inzidenz)

Binnen Jahresfrist 1983 traten 325 Neuerkrankungen zutage, davon 272 Erst- und 53 Wiedererkrankungen. Rund 52 % davon kamen auf bakteriologisch nachweisbare und 28 % auf nicht nachweisbare Erkrankungen der Atmungsorgane. Bei 20 % der Betroffenen wurden andere Organe befallen.

Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1980 bis 1983

Alter von ... bis unter ... Jahren	1980		1981		1982		1983	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	25	5,4	28	6,2	19	5,1	14	4,3
15 bis unter 25	63	13,7	41	9,0	26	7,0	24	7,4
25 bis unter 40	102	22,2	92	20,2	65	17,6	61	18,8
40 bis unter 65	192	41,7	188	41,3	181	48,9	163	50,1
65 und mehr	78	17,0	106	23,3	79	21,4	63	19,4
INSGESAMT	460	100,0	455	100,0	370	100,0	325	100,0

3. Sterblichkeit (Mortalität)

Innerhalb des Jahres 1983 verstarben im Saarland an Tuberkulose 34 Personen, also 21 weniger als 1982. Allein 30 Sterbefälle darunter wurden durch Lungentuberkulose verursacht.

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

1. Zugänge an aktiv Tuberkulosekranken 1979 bis 1983

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	
männlich								
1979	387	76,4	180	35,5	178	35,2	29	5,7
1980	310	61,3	139	27,5	138	27,3	33	6,5
1981	292	57,8	143	28,3	121	24,0	28	5,5
1982	245	48,7	129	25,6	77	15,3	39	7,8
1983	209	41,8	123	24,6	57	11,4	29	5,8
weiblich								
1979	188	33,3	57	10,1	79	14,0	52	9,2
1980	150	26,7	51	9,1	70	12,5	29	5,2
1981	163	29,1	57	10,2	63	11,2	43	7,7
1982	125	22,4	58	10,4	38	6,8	29	5,2
1983	116	20,9	46	8,3	33	6,0	37	6,7
INSGESAMT								
1979	575	53,7	237	22,1	257	24,0	81	7,6
1980	460	43,1	190	17,8	208	19,5	62	5,8
1981	455	42,7	200	18,8	184	17,3	71	6,6
1982	370	34,9	187	17,6	115	10,8	68	6,4
1983	325	30,8	169	16,0	90	8,5	66	6,3

2. Bestand* an aktiv Tuberkulosekranken 1979 bis 1983

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	
männlich								
1979	1 155	228,1	297	58,7	755	149,1	103	20,3
1980	1 056	208,9	263	52,0	703	139,1	90	17,8
1981	969	191,9	244	48,3	636	126,0	89	17,6
1982	898	178,5	235	46,7	567	112,7	96	19,1
1983	712	142,5	184	36,8	443	88,7	85	17,0
weiblich								
1979	479	84,9	97	17,2	243	43,1	139	24,6
1980	454	81,0	77	13,7	248	44,2	129	23,0
1981	434	77,5	74	13,2	226	40,4	134	23,9
1982	378	67,8	69	12,4	193	34,6	116	20,8
1983	335	60,6	58	10,5	175	31,6	102	18,4
INSGESAMT								
1979	1 634	152,7	394	36,8	998	93,3	242	22,6
1980	1 510	141,6	340	31,9	951	89,2	219	20,5
1981	1 403	131,8	318	29,9	862	81,0	223	20,9
1982	1 276	120,3	304	28,7	760	71,7	212	20,0
1983	1 047	99,4	242	23,0	618	58,7	187	17,8

*1) Jeweils am 31. Dezember.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1983 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	14	6	8	—	—	—	13	5	8	1	1	—
15 bis unter 25	24	13	11	11	5	6	9	6	3	4	2	2
25 bis unter 40	61	38	23	29	19	10	19	13	6	13	6	7
40 bis unter 65	163	114	49	87	68	19	41	29	12	35	17	18
65 und mehr	63	38	25	42	31	11	8	4	4	13	3	10
Insgesamt	325	209	116	169	123	46	90	57	33	66	29	37
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	8,7	7,3	10,1	—	—	—	8,1	6,1	10,1	0,6	1,2	—
15 bis unter 25	13,0	13,7	12,3	6,0	5,3	6,7	4,9	6,3	3,3	2,2	2,1	2,2
25 bis unter 40	29,0	35,5	22,3	13,8	17,7	9,7	9,0	12,1	5,8	6,2	5,6	6,8
40 bis unter 65	46,7	69,3	26,6	24,9	41,3	10,3	11,7	17,6	6,5	10,0	10,3	9,8
65 und mehr	42,0	73,7	25,4	28,0	60,2	11,2	5,3	7,8	4,1	8,7	5,8	10,2
Insgesamt	30,8	41,8	20,9	16,0	24,6	8,3	8,5	11,4	6,0	6,3	5,8	6,7

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1983 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	39	19	20	1	—	1	37	18	19	1	1	—
15 bis unter 25	64	29	35	13	4	9	40	17	23	11	8	3
25 bis unter 40	175	117	58	29	23	6	108	76	32	38	18	20
40 bis unter 65	453	329	124	97	75	22	266	212	54	90	42	48
65 und mehr	316	218	98	102	82	20	167	120	47	47	16	31
Insgesamt	1 047	712	335	242	184	58	618	443	175	187	85	102
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	24,7	23,6	25,9	0,6	—	1,3	23,4	22,3	24,6	0,6	1,2	—
15 bis unter 25	34,8	30,7	39,2	7,1	4,2	10,1	21,8	18,0	25,8	6,0	8,5	3,4
25 bis unter 40	82,4	108,0	55,8	13,7	21,2	5,8	50,9	70,2	30,8	17,9	16,6	19,2
40 bis unter 65	129,2	198,8	67,0	27,7	45,3	11,9	75,9	128,1	29,2	25,7	25,4	25,9
65 und mehr	212,8	429,3	100,3	68,7	161,5	20,5	112,5	236,3	48,1	31,7	31,5	31,7
Insgesamt	99,4	142,5	60,6	23,0	36,8	10,5	58,7	88,7	31,6	17,8	17,0	18,4

5. Zugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1983

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Alle Formen					der		
						mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
Erst- erkrankte				Wieder-				
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	4	2	6	6	—	—	—	—
5 bis unter 10	2	4	6	5	1	—	—	—
10 bis unter 15	—	2	2	2	—	—	—	—
15 bis unter 20	4	2	6	6	—	1	—	1
20 bis unter 25	9	9	18	18	—	4	6	10
25 bis unter 30	8	12	20	18	2	4	6	10
30 bis unter 35	15	6	21	17	4	10	3	13
35 bis unter 40	15	5	20	15	5	5	1	6
40 bis unter 45	20	10	30	28	2	15	4	19
45 bis unter 50	16	9	25	21	4	10	3	13
50 bis unter 55	29	7	36	28	8	15	1	16
55 bis unter 60	19	10	29	21	8	10	5	15
60 bis unter 65	30	13	43	35	8	18	6	24
65 bis unter 70	25	20	45	35	10	20	10	30
70 und mehr	13	5	18	17	1	11	1	12
INSGESAMT	209	116	325	272	53	123	46	169

6. Bestand der an Tuberkulose erkrankten Personen

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Absolute Zahlen							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	5	5	—	—	5	5	—	—
5 bis unter 10	13	13	—	1	12	12	1	—
10 bis unter 15	1	2	—	—	1	2	—	—
15 bis unter 20	6	6	1	1	4	4	1	1
20 bis unter 25	23	29	3	8	13	19	7	2
25 bis unter 30	33	20	5	2	24	12	4	6
30 bis unter 35	41	25	8	1	27	15	6	9
35 bis unter 40	43	13	10	3	25	5	8	5
40 bis unter 45	63	18	17	6	40	6	6	6
45 bis unter 50	63	33	15	6	42	16	6	11
50 bis unter 55	76	27	18	1	49	13	9	13
55 bis unter 60	69	27	12	6	44	10	13	11
60 bis unter 65	58	19	13	3	37	9	8	7
65 bis unter 70	37	17	13	3	22	7	2	7
70 und mehr	181	81	69	17	98	40	14	24
INSGESAMT	712	335	184	58	443	175	85	102

nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
riennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	2	5	5	—	1	—	1	1	—
—	—	2	4	6	5	1	—	—	—	—	—
—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—
1	—	3	1	4	4	—	—	1	1	1	—
10	—	3	2	5	5	—	2	1	3	3	—
9	1	4	1	5	4	1	—	5	5	5	—
10	3	4	2	6	5	1	1	1	2	2	—
5	1	5	3	8	5	3	5	1	6	5	1
19	—	3	4	7	7	—	2	2	4	2	2
11	2	5	2	7	6	1	1	4	5	4	1
13	3	9	2	11	7	4	5	4	9	8	1
12	3	4	1	5	1	4	5	4	9	8	1
22	2	8	3	11	6	5	4	4	8	7	1
26	4	2	3	5	2	3	3	7	10	7	3
12	—	2	1	3	2	1	—	3	3	3	—
150	19	57	33	90	66	24	29	37	66	56	10

am 31. 12. 1983 nach Alter und Geschlecht

Tuberkulose								
Verhältniszahlen auf 100 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe								
Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe		
		mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis				
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
—	—	—	—	—	—	—	—	
24,2	25,2	—	—	24,2	25,2	—	—	
54,0	56,5	—	4,3	49,9	52,2	4,2	—	
3,3	6,7	—	—	3,3	6,7	—	—	
13,2	13,7	2,2	2,3	8,8	9,1	2,2	2,3	
47,1	63,8	6,1	17,6	26,6	41,8	14,3	4,4	
79,0	50,6	12,0	5,1	57,5	30,4	9,6	15,2	
107,6	67,9	21,0	2,7	70,8	40,7	15,7	24,4	
151,3	47,0	35,2	10,9	88,0	18,1	28,1	18,1	
171,5	48,0	46,3	16,0	108,9	16,0	16,3	16,0	
158,1	81,8	37,6	14,9	105,4	39,7	15,1	27,3	
224,9	80,0	53,3	3,0	145,0	38,5	26,6	38,5	
227,5	73,5	39,6	16,3	145,1	27,2	42,9	29,9	
233,9	51,8	52,4	8,2	149,2	24,5	32,3	19,1	
252,4	71,3	88,7	12,6	150,1	29,4	13,6	29,4	
501,1	109,7	191,0	23,0	271,3	54,2	38,8	32,5	
142,5	60,6	36,8	10,5	88,7	31,6	17,0	18,4	

7. Zugänge an Tuberkulosekranken im Jahre 1983 nach

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
Saarbrücken	70	35	105	82	23	41	13	54
Merzig-Wadern	18	10	28	24	4	13	3	16
Neunkirchen	45	22	67	56	11	21	9	30
Saarlouis	38	21	59	56	3	26	9	35
Saar-Pfalz-Kreis	16	16	32	27	5	8	7	15
St. Wendel	22	12	34	27	7	14	5	19
SAARLAND	209	116	325	272	53	123	46	169

8. Bestand an Tuberkulosekranken am 31. 12.

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen				Tuber- mit Bakte-	
	männlich		weiblich		männlich	
	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer
Saarbrücken	147	18	57	3	43	4
Merzig-Wadern	89	3	35	2	28	—
Neunkirchen	143	9	68	4	18	—
Saarlouis	139	9	70	7	36	3
Saar-Pfalz-Kreis	88	10	56	3	32	3
St. Wendel	106	3	49	2	27	—
SAARLAND	712	52	335	21	184	10

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe					
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis					männlich		weiblich		insgesamt	
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
44	10	21	14	35	25	10	8	8	16	13	3	
15	1	2	—	2	1	1	3	7	10	8	2	
29	1	18	5	23	15	8	6	8	14	12	2	
33	2	6	4	10	10	—	6	8	14	13	1	
14	1	6	6	12	9	3	2	3	5	4	1	
15	4	4	4	8	6	2	4	3	7	6	1	
150	19	57	33	90	66	24	29	37	66	56	10	

1983 nach Kreisen und Geschlecht

Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe			
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis				männlich		weiblich	
weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer
10	—	81	10	32	2	23	4	15	1
4	—	50	2	17	2	11	1	14	—
10	—	113	7	38	4	12	2	20	—
13	—	88	5	37	6	15	1	20	1
15	1	42	1	23	1	14	6	18	1
6	—	69	2	28	1	10	1	15	1
58	1	443	27	175	16	85	15	102	4