


Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3. Postfach 409, ☎ 0681/505-1 Telefax 0681/505 921 Btx * 2039560

A IV 5 – j 1988

Ausgegeben am 20. Juni 1990



Tuberkulose im Saarland 1988

Überblick

Im Jahr 1988 erkrankten im Saarland 216 Personen an Tuberkulose. Das waren 10 % weniger als im Vorjahr.

In der überwiegenden Zahl der Fälle (184) handelte es sich um eine Lungentuberkulose, andere Organe waren nur in 32 Fällen betroffen.

Die Erkrankungsziffer (Erkrankte je 100 000 Einwohner) sank von 22,9 auf 20,5. Sie lag wie in den Vorjahren für Männer (30,1) erheblich über der für Frauen (11,7).

Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1985 bis 1988

Alter von ... bis unter ... Jahren	1985		1986		1987		1988	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	5	1,8	5	1,7	3	1,3	3	1,4
15 bis unter 25	24	8,6	17	5,9	19	7,9	15	6,9
25 bis unter 40	56	20,1	60	20,9	49	20,5	39	18,1
40 bis unter 65	132	47,3	152	53,0	92	38,5	82	38,0
65 und mehr	62	22,2	53	18,5	76	31,8	77	35,6
INSGESAMT	279	100	287	100	239	100	216	100

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1988

Altersgruppe in Jahren	Aktive der							
	Alle Formen					mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	1	—	1	1	—	—	—	—
5 bis unter 10	—	1	1	1	—	—	—	—
10 bis unter 15	1	—	1	1	—	—	—	—
15 bis unter 20	—	2	2	2	—	—	1	1
20 bis unter 25	10	3	13	13	—	5	—	5
25 bis unter 30	5	4	9	8	1	4	2	6
30 bis unter 35	10	3	13	10	3	8	—	8
35 bis unter 40	13	4	17	15	2	10	2	12
40 bis unter 45	7	6	13	9	4	3	5	8
45 bis unter 50	11	—	11	11	—	8	—	8
50 bis unter 55	17	4	21	17	4	10	—	10
55 bis unter 60	11	4	15	15	—	9	1	10
60 bis unter 65	19	3	22	19	3	14	1	15
65 bis unter 70	17	6	23	20	3	17	3	20
70 und mehr	30	24	54	45	9	20	11	31
INSGESAMT	152	64	216	187	29	108	26	134

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1988 nach

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
Saarbrücken	56	28	84	70	14	42	8	50
Merzig-Wadern	12	3	15	14	1	8	2	10
Neunkirchen	27	12	39	36	3	20	5	25
Saarlouis	29	7	36	31	5	19	4	23
Saarpfalz-Kreis	8	6	14	11	3	4	4	8
St. Wendel	20	8	28	25	3	15	3	18
SAARLAND	152	64	216	187	29	108	26	134

nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
riennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
5	—	4	1	5	5	—	1	2	3	3	—
5	1	1	1	2	2	—	—	1	1	1	—
7	1	1	3	4	2	2	1	—	1	1	—
11	1	2	2	4	3	1	1	—	1	1	—
6	2	3	1	4	2	2	1	—	1	1	—
8	—	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—
10	—	6	—	6	4	2	1	4	5	3	2
10	—	1	—	1	1	—	1	3	4	4	—
12	3	2	1	3	3	—	3	1	4	4	—
18	2	—	2	2	1	1	—	1	1	1	—
27	4	8	5	13	8	5	2	8	10	10	—
120	14	32	18	50	37	13	12	20	32	30	2

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe				
riennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte				Erst-erkrankte	Wieder-erkrankte
42	8	12	14	26	20	6	2	6	8	8	—
9	1	2	—	2	2	—	2	1	3	3	—
23	2	5	2	7	6	1	2	5	7	7	—
22	1	8	—	8	4	4	2	3	5	5	—
7	1	2	—	2	1	1	2	2	4	3	1
17	1	3	2	5	4	1	2	3	5	4	1
120	14	32	18	50	37	13	12	20	32	30	2

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1984 bis 1988

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1984	162	32,5	93	18,6	54	10,8	15	3,0
1985	184	36,9	103	20,7	62	12,4	19	3,8
1986	175	35,3	104	20,9	45	9,1	26	5,2
1987	153	30,9	87	17,5	49	9,9	17	3,4
1988	152	30,1	108	21,4	32	6,3	12	2,4
weiblich								
1984	99	17,9	28	5,1	43	7,8	28	5,1
1985	95	17,3	44	8,0	26	4,7	25	4,5
1986	112	20,5	53	9,7	30	5,5	29	5,3
1987	86	15,8	42	7,7	22	4,0	22	4,0
1988	64	11,7	26	4,7	18	3,3	20	3,6
INSGESAMT								
1984	261	24,8	121	11,5	97	9,2	43	4,1
1985	279	26,6	147	14,0	88	8,4	44	4,2
1986	287	27,5	157	15,0	75	7,2	55	5,3
1987	239	22,9	129	12,4	71	6,8	39	3,7
1988	216	20,5	134	12,7	50	4,7	32	3,0

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1988 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	3	2	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—
15 bis unter 25	15	10	5	6	5	1	6	4	2	3	1	2
25 bis unter 40	39	28	11	26	22	4	10	4	6	3	2	1
40 bis unter 65	82	65	17	51	44	7	17	15	2	14	6	8
65 und mehr	77	47	30	51	37	14	15	8	7	11	2	9
INSGESAMT	216	152	64	134	108	26	50	32	18	32	12	20
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	2,0	2,6	1,4	—	—	—	1,4	1,3	1,4	0,7	1,3	—
15 bis unter 25	9,9	12,9	6,7	3,9	6,4	1,3	3,9	5,1	2,7	2,0	1,3	2,7
25 bis unter 40	15,6	21,8	9,1	10,4	17,1	3,3	4,0	3,1	5,0	1,2	1,6	0,8
40 bis unter 65	23,8	38,5	9,7	14,8	26,1	4,0	4,9	8,9	1,1	4,1	3,6	4,6
65 und mehr	48,1	86,3	28,4	31,9	68,0	13,3	9,4	14,7	6,6	6,9	3,7	8,5
INSGESAMT	20,5	30,1	11,7	12,7	21,4	4,7	4,7	6,3	3,3	3,0	2,4	3,6