



Statistischer Bericht



Weinmosternte im Weinanbaugebiet Sachsen

2011

C II 4 – j/11

Zeichenerklärung

- Nichts vorhanden (genau Null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- ... Angabe fällt später an
- / Zahlenwert nicht sicher genug
- . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- () Aussagewert ist eingeschränkt
- p vorläufige Zahl
- r berichtigte Zahl
- s geschätzte Zahl

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
Erläuterungen	3
Ergebnisdarstellung	5
Tabellen	
1. Erntevorschätzungen und Weinmosternte	6
2. Weinmosternte nach Qualitätsstufen	7
3. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und weißen Rebsorten	8
4. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und roten Rebsorten	11
Abbildungen	
Abb. 1 Weinmosternte 2002 bis 2011 nach Qualitätsstufen	13
Abb. 2 Weinmosternte 2011 nach Weiß- und Rotmost	13
Abb. 3 Weinmosternte 2011 nach Rebsorten	13

Vorbemerkungen

Das Weinanbaugebiet Sachsen ist eines der kleinsten und nordöstlichsten Weingebiete in Deutschland. Es liegt fast ausschließlich im Elbtal des Ballungsraumes Dresden. Hier erstreckt es sich über ca. 50 km Länge von Seußlitz, Meißen über Radebeul und Dresden bis nach Pillnitz. Die Lagen befinden sich in Sachsen und in kleinen Teilen auch bei Jessen in Sachsen-Anhalt sowie in Brandenburg.

Wie in ganz Deutschland bestimmen traditionelle Weiß- und Rotweinsorten die Weinlandschaft. Bei Weißwein sind es die Sorten Müller-Thurgau, Weißer Riesling, Weißburgunder, Traminer und Ruländer; bei Rotwein Blauer Spätburgunder, Dornfelder, Regent und Blauer Portugieser. Als kaum spätfrostgefährdete und frühreife Rebsorte ist der „Goldriesling“ eine sächsische Besonderheit, die man sonst nirgendwo in Deutschland findet. Die Weine gedeihen auf relativ kalkarmen Böden, auf Steillagen und schwer zugänglichen Weinbergen. Hoch über der Elbe wachsen die anerkannten Meißener Weine, die auf Grund ihrer Frische und Fruchtigkeit als Rarität unter den deutschen Weinen gelten. Bedingt durch die Weinbergterrassen wird die Produktionsweise im Weinberg noch überwiegend von schwerer Handarbeit bestimmt.

Der Weinbau in Sachsen wird begünstigt durch das milde Klima im Flusstal der Elbe mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von 9,1°C, einer mittleren Jahresniederschlagsmenge von 600 bis 640 mm, reichlich Sonne und der geologischen Struktur der Landschaft. Zeitig beginnt im Elbtal der Frühling, jedoch ist im April und Mai häufig mit Spätfrösten zu rechnen.

Im vorliegenden Bericht werden Ergebnisse aus den Erntemeldungen der Jahre 2002 bis 2011 aufgezeigt.

Rechtsgrundlagen

- Verordnung (EG) Nr. 1282/2001 der Kommission vom 28. Juni 2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 hinsichtlich der Sammlung von Informationen zur Identifizierung der Weinbauerzeugnisse und zur Überwachung des Weinmarktes und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1623/2000 (ABl. EG Nr. L 176 S. 14),
- Verordnung (EWG) Nr. 2393/86 des Rates vom 24. Juli 1986 zur Einführung der gemeinschaftlichen Weinbaukartei,
- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934, 1944),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246),
- Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66),
- Wein-Überwachungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 2002 (BGBl. I S. 1625), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 7. November 2008 (BGBl. I S. 2166, 2173).

Methodische Hinweise

Die Ernte von Trauben und die Erzeugung von Wein unterliegen aufgrund weinrechtlicher Vorschriften bestimmten Meldeverpflichtungen. Bis zum 15. Januar des Folgejahres hat der Winzer seine Ertragsrebläche, die Erntemengen nach Rebsorten und die vorgesehenen Qualitätsstufen bei der zuständigen Behörde zu melden. Diese Angaben werden in die Weinbaukartei eingetragen. Bei der Erfassung der Daten für die endgültigen Ernteergebnisse der Weinmosternte und Weinerzeugung nach Qualitätsstufen entfällt somit eine direkte Befragung der Winzer durch das Statistische Landesamt. Die erforderlichen Daten werden aus der Weinbaukartei entnommen. In der Weinbaukartei sind gemäß EU-Recht alle Wein anbauenden Betriebe und ihre strukturelevanten Merkmale enthalten, sofern ihr Weinanbau marktwirksam wird. Die Weinbaukartei stellt mit ihrem Informationsmaterial ein wichtiges Verwaltungs- und Kontrollinstrument dar. Durch die sekundärstatistische Nutzung dieser Verwaltungsdaten konnte die Belastung für die Auskunftspflichtigen verringert werden.

Erläuterungen

Weinbaukartei

Die Weinbaukartei ist ein Fachkataster, das Anbauflächen (Katasterflächen), Rebsorten, Erträge und weitere Daten zu Angelegenheiten des Weinbaus aller weinbauenden Betriebe nach EU-einheitlichen Kriterien enthält. Sie wird für das Weinanbaugebiet Sachsen zentral im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Außenstelle Großenhain, geführt.

Mostgewicht (Grad Oechsle, ° Oechsle)

Das Mostgewicht ist die Maßeinheit für den Reifegrad der Trauben, gemessen in Oechslegraden. Es wird anhand der im Most gelösten Inhaltsstoffe bestimmt, die zu 90 Prozent aus vergärbarem Zucker bestehen. Es gibt an, wie hoch der potenzielle Alkoholgehalt des Weines ist. 16 Gramm Zucker pro Liter ergeben etwa ein Prozent Alkohol. Für einen durchgegoorenen Wein mit zehn Prozent Alkohol müssen die Trauben also 160 g Zucker pro Liter enthalten.

Güteklassen

Deutscher Wein ohne Herkunftsbezeichnung

- ohne Rebsorten- und Jahrgangsangabe oder
- mit Rebsorten- und Jahrgangsangabe

Deutscher Wein muss

- ausschließlich aus im Inland geernteten Weintrauben hergestellt sein,
- ausschließlich von zugelassenen Rebsorten stammen,
- einen natürlichen Mindestalkoholgehalt in der Weinbauzone A ¹⁾ von 5% vol. (44° Oechsle) und in Weinbauzone B ¹⁾ von 6% vol. (50° Oechsle) aufweisen,

- nach etwaiger Anreicherung einen vorhandenen Alkoholgehalt von mind. 8,5% vol. in den Weinbauzonen A und B aufweisen,
- einen in Weinsäure ausgedrückten Gesamtsäuregehalt von mind. 3,5 g/l aufweisen.

Wein mit geschützter geografischer Angabe (Landwein)

Der Begriff „Wein mit geschützter geografischer Angabe“ darf erst seit 01. Januar 2012 verwendet werden. Für einen Wein mit der Bezeichnung „Landwein“ bzw. „Wein mit geografischer Angabe“ gelten folgende Voraussetzungen:

- Ein Landwein ist mit dem Namen eines der festgelegten Landweingebiete zu kennzeichnen.
- Der Wein muss in einem abgegrenzten Gebiet hergestellt sein, das innerhalb eines festgelegten Landweingebietes liegt.
- Die Trauben müssen zu mindestens 85% aus dem Landweingebiet stammen. Die restlichen 15%, einschließlich zur Süßung verwendete Erzeugnisse, können aus anderen Landweingebieten stammen.
- Konzentrierter Traubenmost darf zum Anreichern zugesetzt werden.
- Zur Süßung von Landwein darf ausschließlich Traubenmost (Süßreserve) verwendet werden.
- Landweine müssen mit Ausnahme der im Juli 2009 neu eingeführten Landweine „Landwein Rhein“, „Landwein Oberrhein“, „Landwein Rhein-Neckar“ und Landwein „Neckar“ der Geschmacksrichtung „trocken“ oder halbtrocken“ entsprechen.

Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (Qualitäts- und Prädikatswein)

Der Begriff „Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung“ darf erst seit 01. Januar 2012 verwendet werden. Inländischer Wein darf nur als „Qualitätswein“ bezeichnet werden, wenn für ihn auf Antrag eine Prüfungsnummer zugeteilt worden ist. Voraussetzung für die Zuteilung der Prüfungsnummer ist, dass:

- der Wein innerhalb eines bestimmten Anbaugebietes hergestellt worden ist,
- die für die Herstellung verwendeten Trauben zu einer Rebsorte oder mehreren Rebsorten gehören, die für das bestimmte Anbaugebiet zugelassen sind oder ist,
- der Hektarertrag den für das jeweilige bestimmte Anbaugebiet geltenden Hektarertrag nicht übersteigt,
- das entsprechende Mindestmostgewicht (natürlicher Alkoholgehalt) für jedes bestimmte Anbaugebiet und für jede Rebsorte erreicht worden ist,
- konzentrierter Traubenmost nicht zugesetzt und eine Konzentrierung durch Kälte nicht vorgenommen worden ist,
- der Wein die für ihn typischen Bewertungsmerkmale aufweist und in Aussehen, Geruch und Geschmack frei von Fehlern ist,
- der Wein im Übrigen den weinrechtlichen Bestimmungen entspricht.

Zusätzliche Anforderungen für Prädikatswein:

- eine Erhöhung des Alkoholgehaltes (anreichern) darf nicht vorgenommen werden,
- der Wein darf nicht mit Eichenholzstücken („Chips“) behandelt werden,
- eine Entalkoholisierung ist nicht erlaubt.

Prädikatsstufen:

- Kabinett: Lese von reifen Trauben,
- Spätlese: Lese von vollreifen Trauben zu einem späteren Lesetermin,
- Auslese: Lese von vollreifen Trauben, wobei kranke oder unreife Trauben ausgesondert werden,
- Beerenauslese: Lese von edelfaulen oder wenigstens überreifen Trauben,
- Eiswein: Lese von am Rebstock gefrorenen Trauben, die im gefrorenem Zustand gekeltert werden,
- Trockenbeerenauslese: Lese von weitgehend eingeschrumpften edelfaulen bzw. überreifen Beeren.

Sortenbeschreibung

Die Rebsorten zeigen unabhängig von Standort, Gütestufe, Jahrgang und individueller Ausbaugebung ihre biologischen, angeborenen, typischen Geschmacksmerkmale, wie dies auch von Obstsorten bekannt ist. Elbtalweine stellen dem Charakter nach unter der Fülle deutscher Qualitätsweine einen eigenen Typ dar. Sie sind je nach Rebsorte reintönig, mild, blumig, voll und würzig. Dazu einige hervortretende Geschmacks- und Bukettmerkmale der häufigsten Rebsorten im Weinanbaugebiet Sachsen:

Weißwein

- *Müller-Thurgau*: feinblumig mit milder Säure und zartem Muskatgeschmack, der den Duft des Weines bestimmt und den Geschmack vortrefflich abrundet.
- *Weißer Riesling*: feine rassige Eleganz, zartes, an Pfirsich erinnerndes, blumiges Bukett; höherer Säuregehalt, der wesentlicher Bestandteil der Qualität ist.
- *Weißburgunder*: ergibt einen vorzüglichen rassigen Qualitätswein mit einem lieblichen Charakter und zartblumigen Bukett, sowie eine abgerundete weiche und füllige Geschmacksnote.
- *Traminer*: würziger, kräftiger, rassiger, an Rosenduft erinnernder Wein von anhaltender Geschmacksnote und ausgeprägter Blume, gehört zu den qualitativ besten Sorten des Elbtales.
- *Ruländer*: vollmundiger, kräftiger Wein mit einem sortentypischen, an Honig erinnernden Bukett und elegantem und feurigem Geschmack; gehört wie der Traminer auch zu den besten Sorten des sächsischen Weinbaus.
- *Kerner*: charakteristisch sind die frische rassige Art sowie eine rieslingsähnliche Säure; er stellt eine gute Ergänzungssorte zum Riesling dar.
- *Elbling*: frisch, fruchtiger anregender Wein ohne ausgeprägtes Bukett.
- *Goldriesling*: ergibt einen leichten fruchtigen Wein mit neutralem Bukett und kleiner Säure und ist ein hervorragender Kneipwein.

- *Scheurebe*: besitzt ein volles Bukett mit einem typischen Charakter, der an schwarze Johannisbeeren erinnert; aus den voll ausgereiften Trauben gewinnt man einen körperreichen würzigen Wein, der sich durch eine rieslinghafte Säure auszeichnet.
- *Bacchus*: ein Wein mit typischem, arteigenem Bukett, an schwarze Johannisbeere und Muskat erinnernd, weich und harmonisch.

Rotwein

- *Blauer Spätburgunder*: samtig, vollmundig mit einem an Brombeere und Bittermandel erinnernden Bukett mit etwas mehr Säure und hellroter, frischer Farbe.
- *Dornfelder*: typisches Merkmal ist die intensive dunkelrote Farbe, er ist von milder Säure, fruchtig und hat ein nachhaltig an Sauerkirsche erinnerndes Aroma.
- *Blauer Portugieser*: ein leichter, frischer feinfruchtiger Wein von schöner kräftiger Farbe und milder Säure.

Ergebnisdarstellung

Nachdem die Winzer im Weinanbaugebiet Sachsen 2009 und 2010 auf Grund der widrigen Witterungsbedingungen nur wenig Wein geerntet hatten, konnte im zurückliegenden Weinjahr endlich wieder eine sehr gute Ernte eingebracht werden. Das endgültige Ergebnis lag mit 24 028 Hektolitern nicht nur annähernd doppelt so hoch wie in den zwei Jahren zuvor, sondern auch fast ein Viertel über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Der Hektarertrag lag bei 53,7 Hektolitern, das durchschnittliche Mostgewicht bei 83,5 Grad Oechsle.

Das Weinjahr 2011 mit einem zeitigen Frühjahr führte bei den Reben zu einem frühen Vegetationsschub. Es folgte ein durchwachsender Sommer mit einigen intensiven Sonnenstunden im August. Der schöne Spätherbst entschädigte die Winzer für den kühlen Sommer und bildete die Grundlage für eine sehr gute Weinernte, auch wenn diese nicht ganz an die Rekordernten von 2007 und 2008 heranreichte.

Die Schätzungen der zu erwartenden Ernte, die jährlich von August bis Oktober vorgenommen werden, lagen anfänglich bei 23 800 Hektolitern Weinmost und fielen später leicht auf 23 000 Hektoliter ab. Die endgültige Erntemenge übertraf die letzte Schätzung und damit die Erwartungen der Weinberichtersteller noch einmal.

Weißer Rebsorten wurden auf insgesamt 362 Hektar angebaut. Die am häufigsten angebauten Sorten waren Müller-Thurgau (76 Hektar bzw. 21 Prozent der Ertragsreblfläche bei weißen Sorten) und Weißer Riesling (66 Hektar bzw. 18 Prozent). Insgesamt erbrachten weiße Weine eine Erntemenge von 19 452 Hektolitern und damit einen Ertrag von 53,7 Hektolitern je Hektar. Der höchste Hektarertrag wurde für die Sorte Elbling mit 108,6 Hektolitern gemeldet. Aber auch Müller-Thurgau (65,7 Hektoliter) und Kerner (60,6 Hektoliter) erbrachten weit über dem Durchschnitt liegende Erträge. Das höchste Mostgewicht wurde

bei der Sorte Traminer (97,3 Grad Oechsle) gemessen (vgl. Tab. 2 und 3).

Bei den roten Rebsorten wurde eine Erntemenge von 4 576 Hektolitern erzielt, was ebenfalls einem Ertrag von 53,7 Hektolitern je Hektar entspricht. Die im Weinanbaugebiet Sachsen am weitesten verbreiteten Rotweinsorten waren wie bereits in den Vorjahren Blauer Spätburgunder (37 ha bzw. 43 Prozent der Ertragsreblfläche roter Sorten) und Dornfelder (23 ha bzw. 27 Prozent). Den höchsten Ertrag brachte die Sorte Regent mit 77,4 Hektolitern je Hektar. Der Blaue Spätburgunder erreichte mit 92,6 Grad Oechsle das höchste Mostgewicht (vgl. Tab. 2 und 4). Die Qualität des Jahrgangs war sehr gut. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) des Weines konnte der höchsten Qualitätsstufe Prädikatswein (z. B. Kabinett, Spätlese, Auslese) zugeordnet werden und 48 Prozent dem Qualitätswein. Das Mostgewicht von durchschnittlich 83,4 Grad Oechsle lag jedoch etwas unter dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre (85,3 Grad Oechsle) (vgl. Tab. 2).

Sortenspiegel 2011:

Rebsorte	Ertragsreblfläche ha	Anteil an	
		insgesamt %	weißen bzw. roten Rebsorten %
Weißer Rebsorten	362	80,8	100,0
davon			
Müller-Thurgau	76	17,0	21,0
Weißer Riesling	66	14,7	18,2
Weißburgunder	52	11,6	14,3
Ruländer	43	9,6	11,9
Traminer	27	6,0	7,5
Kerner	26	5,8	7,2
Goldriesling	20	4,5	5,5
Scheurebe	18	4,0	5,0
Bacchus	9	2,0	2,5
Elbling	8	1,8	2,2
Übrige weiße Rebsorten	17	3,8	4,7
Rote Rebsorten	85	19,0	100,0
davon			
Blauer Spätburgunder	37	8,3	43,0
Dornfelder	23	5,1	26,7
Regent	9	2,0	10,5
Blauer Portugieser	3	0,7	3,5
Übrige rote Rebsorten	14	3,1	16,3

1) Die gesamte Reblfläche in den Weinbaugebieten der Europäischen Union ist nach EU-Verordnung entsprechend klimatischer Kriterien in sieben Weinbauzonen gegliedert. Außer Baden (Hauptzone B) gehören alle deutschen Weinanbaugebiete zur Hauptzone A.

1. Erntevorschätzungen und Weinmosternte

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	Rebfläche im Ertrag ¹⁾	Ertrag je ha	Ernte- menge	Rebfläche im Ertrag ¹⁾	Ertrag je ha	Ernte- menge	Rebfläche im Ertrag ¹⁾	Ertrag je ha	Ernte- menge
	ha	hl		ha	hl		ha	hl	

Vorläufige Weinmosternte

1. Vorschätzung im August

2002	423	54,6	23 101	367	55,3	20 283	56	50,3	2 818
2003	421	61,7	25 983	365	61,9	22 616	56	60,1	3 367
2004	410	43,9	18 031	353	44,1	15 586	57	42,9	2 445
2005	407	50,2	20 429	344	50,8	17 474	63	46,8	2 955
2006	397	53,6	21 258	329	54,3	17 867	67	50,3	3 391
2007	409	55,9	22 840	335	56,2	18 855	73	54,2	3 985
2008	426	57,9	24 679	345	58,8	20 259	81	54,3	4 420
2009	447	36,2	16 213	361	37,0	13 373	86	33,0	2 839
2010	432	47,7	20 607	346	47,9	16 578	86	46,9	4 059
2011	434	55,0	23 847	349	55,5	19 356	85	52,8	4 491

2. Vorschätzung im September

2002	423	55,4	23 438	367	56,6	20 770	56	47,7	2 668
2003	421	49,1	20 676	365	50,0	18 264	56	43,1	2 412
2004	410	45,5	18 667	353	45,8	16 186	57	43,7	2 491
2005	407	50,2	20 425	344	50,8	17 475	63	46,7	2 950
2006	397	57,4	22 774	329	58,1	19 148	67	53,8	3 626
2007	409	55,7	22 787	335	55,7	18 664	73	56,1	4 124
2008	426	59,7	25 443	345	61,4	21 177	81	52,5	4 266
2009	447	31,1	13 905	361	32,1	11 586	86	27,0	2 320
2010	432	33,7	14 566	346	34,6	11 985	86	30,1	2 581
2011	434	53,2	23 081	349	53,1	18 500	85	53,9	4 581

3. Vorschätzung im Oktober

2002	423	48,0	20 256	367	48,0	17 654	56	46,0	2 602
2003	421	41,8	17 577	365	40,0	14 616	56	52,9	2 961
2004	410	40,7	16 713	353	40,2	14 214	57	43,9	2 499
2005	407	47,1	19 141	344	49,2	16 915	63	35,2	2 226
2006	397	59,0	23 400	329	60,3	19 870	67	52,4	3 529
2007	409	54,4	22 244	335	53,5	17 938	73	58,6	4 305
2008	426	61,3	26 142	345	61,0	21 025	81	62,9	5 118
2009	447	31,2	13 935	361	31,3	11 308	86	30,5	2 627
2010	432	31,2	13 455	346	32,1	11 094	86	27,5	2 361
2011	434	53,1	23 041	349	52,6	18 348	85	55,2	4 693

Endgültige Weinmosternte

2002	421	44,3	18 647	365	42,7	15 585	56	54,7	3 062
2003	410	41,0	16 806	353	40,1	14 152	57	46,6	2 655
2004	407	42,1	17 141	344	40,4	13 871	63	51,8	3 271
2005	397	48,6	19 329	329	48,4	15 944	67	50,2	3 385
2006	409	54,3	22 195	335	55,5	18 605	73	48,9	3 590
2007	426	62,1	26 464	345	61,3	21 127	81	65,6	5 338
2008	447	63,6	28 433	361	62,6	22 627	86	67,5	5 806
2009	432	22,9	9 890	346	22,6	7 828	86	24,0	2 062
2010	434	29,0	12 571	349	28,9	10 076	85	29,4	2 495
2011	448	53,7	24 028	362	53,7	19 452	85	53,7	4 576

1) Die Rebfläche im Ertrag der endgültigen Weinmosternte ergibt sich aus der am Jahresende erhobenen Rebflächenstatistik, die Vorschätzung wird mit der Vorjahresfläche durchgeführt.

2. Weinmosternte nach Qualitätsstufen

Jahr	Rebfläche im Ertrag	Erntemenge			Davon bestimmt für die Herstellung von					
		ins- gesamt	Most- ertrag	Ø Most- gewicht	Wein/Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht
		ha	hl	hl/ha	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl
Weißmost										
2002	365	15 585	42,7	79,0	538	63,0	8 090	74,0	6 957	86,4
2003	353	14 152	40,1	91,0	62	80,2	4 227	83,1	9 863	94,5
2004	344	13 871	40,4	86,0	61	73,5	6 985	79,9	6 825	92,5
2005	329	15 944	48,4	85,2	182	85,3	7 682	77,1	8 080	92,8
2006	335	18 605	55,5	91,6	262	96,4	2 965	87,9	15 377	92,2
2007	345	21 127	61,3	85,1	342	87,6	11 393	80,9	9 391	90,1
2008	361	22 627	62,6	83,4	513	72,9	13 266	79,8	8 848	89,6
2009	346	7 828	22,6	89,7	225	87,7	1 150	81,4	6 453	91,2
2010	349	10 076	28,9	76,5	391	78,3	7 298	73,2	2 387	86,6
2011	362	19 452	53,7	83,4	530	85,6	9 333	77,1	9 589	89,4
Rotmost										
2002	56	3 062	54,7	83,3	-	-	1 882	78,4	1 180	91,0
2003	57	2 655	46,6	90,9	4	80,0	1 032	82,9	1 619	96,0
2004	63	3 271	51,8	83,8	3	71,1	2 066	79,8	1 202	90,8
2005	67	3 385	50,2	88,5	21	82,2	1 151	84,1	2 213	90,8
2006	73	3 590	48,9	93,8	34	90,9	1 308	94,9	2 248	93,2
2007	81	5 338	65,6	85,1	113	67,3	3 208	82,1	2 017	90,1
2008	86	5 806	67,5	85,6	77	91,6	3 780	82,9	1 950	90,7
2009	86	2 062	24,0	86,5	34	69,9	652	79,2	1 376	90,3
2010	85	2 495	29,4	79,1	46	86,3	2 115	78,2	334	83,9
2011	85	4 576	53,7	84,0	61	86,6	1 840	81,7	2 674	85,6
Insgesamt										
2002	421	18 647	44,3	79,8	538	63,0	9 972	74,8	8 137	87,1
2003	410	16 806	41,0	91,0	66	80,1	5 259	83,0	11 482	94,7
2004	407	17 141	42,1	85,6	63	74,0	9 051	79,9	8 027	92,2
2005	397	19 329	48,6	85,8	203	85,0	8 833	78,1	10 293	92,4
2006	409	22 195	54,3	91,9	296	95,7	4 273	90,0	17 625	92,3
2007	426	26 464	62,1	85,0	455	83,2	14 601	81,2	11 408	90,1
2008	447	28 433	63,6	83,9	589	75,3	17 046	80,5	10 797	89,8
2009	432	9 890	22,9	89,0	260	85,4	1 802	80,6	7 828	91,0
2010	434	12 571	29,0	77,0	437	79,2	9 413	74,3	2 721	86,3
2011	448	24 028	53,7	83,5	591	85,7	11 173	77,8	12 264	88,6

3. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und weißen Rebsorten

Jahr	Rebfläche im Ertrag	Erntemenge			Davon bestimmt für die Herstellung von					
		ins- gesamt	Most- ertrag	Ø Most- gewicht	Wein/Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht
		ha	hl	hl/ha	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl
Müller-Thurgau										
2002	91	3 883	42,7	74,7	6	60,0	3 018	73,0	859	81,0
2003	86	4 051	47,3	84,6	13	67,0	2 588	81,4	1 450	90,6
2004	85	4 022	47,5	78,1	20	72,0	3 458	77,5	544	82,1
2005	81	4 330	53,4	78,5	19	78,0	3 127	76,8	1 184	83,1
2006	81	4 654	57,5	87,1	47	90,0	1 705	85,8	2 902	87,8
2007	80	5 162	64,6	79,2	64	78,0	4 555	79,1	544	80,0
2008	79	5 880	74,6	75,5	100	80,0	5 166	75,0	614	79,0
2009	72	980	13,7	86,4	63	82,0	523	83,4	394	91,0
2010	74	1 885	25,4	72,0	47	77,0	1 814	71,8	24	80,1
2011	76	5 011	65,7	74,7	85	73,0	3 977	73,9	950	78,0
Weißer Riesling										
2002	68	2 537	37,3	80,5	3	64,0	988	75,2	1 546	84,0
2003	67	2 566	38,4	95,8	6	85,0	351	88,0	2 209	97,1
2004	66	2 888	43,6	86,9	4	75,0	1 567	84,4	1 316	90,0
2005	62	3 088	50,0	90,9	16	95,0	1 591	77,4	1 481	105,3
2006	62	3 524	56,9	90,1	24	94,0	210	84,4	3 290	90,4
2007	62	3 817	61,4	89,0	42	91,7	1 268	87,2	2 507	89,9
2008	67	4 220	63,1	86,7	17	86,0	1 582	84,1	2 620	88,2
2009	66	2 660	40,5	90,2	37	93,0	45	86,3	2 577	90,2
2010	66	2 088	31,7	76,6	44	90,0	1 497	70,3	547	92,9
2011	66	3 392	51,7	87,4	72	92,0	842	81,7	2 478	89,2
Weißburgunder										
2002	55	2 310	42,0	83,1	-	-	1 310	79,1	1 000	88,4
2003	52	1 966	38,2	95,0	10	87,0	96	90,6	1 860	95,3
2004	52	1 822	35,2	93,3	5	81,0	618	86,8	1 199	96,7
2005	51	2 509	49,6	85,6	20	93,0	1 255	79,1	1 234	92,2
2006	52	2 853	55,1	97,0	43	99,0	226	93,8	2 584	97,3
2007	52	3 141	60,8	87,4	44	89,5	1 879	83,2	1 219	93,7
2008	53	3 527	67,0	89,9	45	88,0	2 048	88,1	1 435	92,6
2009	51	720	14,1	95,9	24	92,0	26	85,7	670	96,4
2010	50	1 622	32,2	78,0	58	86,0	1 314	76,4	250	84,8
2011	52	2 657	51,3	86,4	77	97,0	1 424	81,5	1 157	91,7
Ruländer										
2002	38	1 568	41,3	86,2	2	61,7	133	74,5	1 433	87,3
2003	37	1 215	32,5	97,7	13	78,0	84	86,0	1 118	98,8
2004	37	1 165	31,9	96,4	11	75,0	28	78,9	1 126	97,0
2005	33	1 408	42,1	91,5	10	75,0	81	87,4	1 317	91,8
2006	35	1 790	50,7	98,4	17	100,7	132	94,6	1 641	98,7
2007	40	1 835	45,7	91,7	14	95,0	442	85,0	1 379	93,8
2008	43	2 098	48,7	93,4	18	96,0	819	92,2	1 261	94,1
2009	42	791	18,7	96,4	17	92,0	15	85,0	760	96,7
2010	42	973	23,4	81,7	22	77,0	341	79,4	610	83,2
2011	43	1 830	42,2	93,3	30	94,0	286	89,2	1 514	94,1

Noch: 3. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und weißen Rebsorten

Jahr	Rebfläche im Ertrag	Erntemenge			Davon bestimmt für die Herstellung von					
		ins- gesamt	Most- ertrag	Ø Most- gewicht	Wein/Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht
		ha	hl	hl/ha	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl
Traminer										
2002	28	922	32,9	91,9	1	62,0	7	73,7	914	92,1
2003	28	1 086	38,6	103,2	2	90,0	16	98,0	1 067	103,3
2004	28	629	22,4	100,1	2	81,0	7	87,4	620	100,2
2005	28	833	30,1	98,2	7	114,0	16	87,4	810	98,2
2006	28	1 188	42,5	102,5	21	105,0	18	96,9	1 149	102,5
2007	27	1 350	49,3	94,3	27	95,1	47	82,0	1 276	94,7
2008	28	1 078	37,9	97,0	33	75,0	49	86,4	996	98,2
2009	27	359	13,2	95,1	17	97,0	6	92,0	336	95,1
2010	27	392	14,6	88,6	26	88,0	107	83,1	260	90,9
2011	27	978	36,4	97,3	49	85,8	195	98,0	734	97,9
Kerner										
2002	27	980	36,3	82,9	-	-	524	79,5	456	86,9
2003	25	1 096	43,4	86,6	4	82,0	126	85,0	966	86,8
2004	23	1 043	45,0	93,9	3	89,0	67	84,7	973	94,6
2005	24	1 273	53,7	90,6	27	94,0	248	83,6	998	92,2
2006	24	1 574	66,4	92,3	28	109,2	66	101,8	1 480	91,6
2007	26	2 044	79,2	90,0	63	87,8	824	91,8	1 156	88,8
2008	27	1 605	58,7	86,8	2	100,0	712	86,2	890	87,3
2009	26	499	19,5	91,3	24	90,0	21	88,8	454	91,5
2010	25	985	39,3	79,7	89	82,0	545	75,9	351	84,9
2011	26	1 558	60,6	92,0	98	96,9	311	85,9	1 148	93,2
Goldriesling										
2002	11	592	53,8	75,8	-	-	378	70,5	214	85,1
2003	12	602	51,6	79,4	-	-	324	78,8	277	80,2
2004	13	693	55,3	78,0	-	-	429	75,7	264	81,8
2005	12	743	60,0	71,4	7	73,0	499	69,5	237	75,4
2006	12	922	74,3	78,6	4	90,0	270	86,8	647	75,1
2007	12	970	77,9	73,7	4	66,0	740	73,1	226	76,0
2008	16	1 034	64,1	73,1	2	80,0	860	72,5	171	76,0
2009	16	519	32,3	80,3	7	75,0	212	78,0	300	82,0
2010	16	635	38,9	69,8	9	62,0	627	69,9	-	-
2011	20	1 102	54,6	73,6	17	73,0	630	72,5	456	75,2
Scheurebe										
2002	9	645	71,7	80,9	-	-	365	77,6	280	85,1
2003	8	414	49,5	88,4	-	-	147	84,5	267	90,5
2004	8	506	59,9	89,5	-	-	232	84,7	274	93,7
2005	10	347	36,3	90,7	-	-	48	90,3	299	90,9
2006	12	571	49,0	92,1	-	-	23	89,8	548	92,2
2007	12	791	66,8	81,5	1	80,0	449	77,1	340	87,3
2008	14	763	53,4	84,3	6	90,0	259	83,1	498	84,9
2009	14	322	23,2	93,0	1	81,0	25	84,0	296	93,8
2010	15	455	30,4	81,1	4	90,0	185	78,0	267	83,1
2011	18	923	50,2	83,0	6	85,0	391	75,7	526	88,4

Noch: 3. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und weißen Rebsorten

Jahr	Rebfläche im Ertrag	Erntemenge			Davon bestimmt für die Herstellung von					
		ins- gesamt	Most- ertrag	Ø Most- gewicht	Wein/Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht
		ha	hl	hl/ha	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl
Elbling										
2002	18	847	47,1	70,2	-	-	672	65,8	175	87,0
2003	18	456	26,0	84,9	-	-	165	86,0	291	84,2
2004	8	420	54,1	78,1	-	-	161	75,0	259	80,0
2005	6	367	57,3	79,5	-	-	32	81,5	335	79,3
2006	6	387	60,5	83,1	-	-	2	78,0	386	83,1
2007	8	680	83,3	71,4	-	-	334	68,7	346	74,0
2008	8	686	84,0	73,8	1	59,0	544	72,4	142	79,0
2009	8	377	46,2	75,7	-	-	167	72,8	211	78,0
2010	8	280	34,6	66,9	-	-	280	66,9	-	-
2011	8	881	108,6	71,6	1	68,0	880	71,6	-	-
Bacchus										
2002	8	358	44,8	73,8	-	-	345	73,8	13	74,8
2003	8	361	45,9	85,9	-	-	167	81,2	194	89,9
2004	8	389	50,3	76,7	-	-	198	72,6	191	81,0
2005	8	618	80,9	72,5	15	78,0	548	71,0	55	85,8
2006	8	527	69,1	93,2	13	92,0	61	87,2	453	94,0
2007	8	576	75,5	76,4	11	76,0	505	75,0	60	88,0
2008	8	673	85,3	74,0	-	-	589	73,2	84	80,0
2009	8	367	46,2	83,6	16	82,0	37	81,3	314	84,0
2010	9	363	38,9	70,9	6	72,0	356	70,9	-	-
2011	9	579	64,4	78,5	23	71,0	213	81,6	343	77,0
übrige Rebsorten										
2002	12	943	78,6	66,6	526	63,0	350	68,3	67	86,2
2003	13	338	25,9	96,8	13	86,0	161	96,0	164	98,4
2004	17	295	17,6	78,7	15	67,0	221	77,0	59	88,0
2005	15	428	28,5	89,9	62	80,0	236	85,8	130	101,9
2006	16	615	39,1	88,1	65	92,0	252	92,6	298	83,4
2007	18	760	43,2	88,7	72	91,4	350	80,7	338	96,5
2008	18	1 064	60,6	76,2	289	65,0	638	78,0	137	91,8
2009	17	235	14,2	91,9	21	86,0	73	87,3	141	95,2
2010	16	398	24,7	76,4	86	63,0	232	79,4	80	82,0
2011	17	540	32,0	85,7	73	71,0	185	74,2	283	96,9

4. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und roten Rebsorten

Jahr	Rebfläche im Ertrag	Erntemenge			Davon bestimmt für die Herstellung von					
		ins- gesamt	Most- ertrag	Ø Most- gewicht	Wein/Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht
		ha	hl	hl/ha	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl
Blauer Spätburgunder										
2002	28	1 427	51,0	89,6	-	-	744	85,3	683	94,3
2003	28	1 203	42,8	97,0	-	-	404	86,9	799	102,1
2004	29	1 108	38,0	91,8	1	75,0	584	86,8	523	97,5
2005	28	1 414	49,9	91,7	9	85,0	614	89,0	790	93,9
2006	31	1 002	32,3	101,4	6	110,0	310	98,4	686	102,7
2007	34	1 822	53,6	94,7	11	92,0	848	92,4	962	96,7
2008	37	2 188	58,4	94,3	48	100,0	1 293	89,9	847	100,7
2009	37	399	10,8	93,5	5	83,0	9	84,6	386	93,8
2010	37	878	23,9	84,9	31	96,0	763	84,6	83	83,2
2011	37	1 491	40,4	92,6	41	93,0	330	92,0	1 120	92,8
Dornfelder										
2002	17	1 263	74,3	76,9	-	-	896	72,8	367	87,0
2003	17	1 005	57,8	85,8	-	-	432	81,1	573	89,3
2004	18	1 600	89,4	77,4	-	-	1 124	75,8	475	81,4
2005	18	1 208	67,3	85,6	-	-	219	79,2	990	87,0
2006	20	1 425	70,7	92,4	6	93,0	690	97,1	730	88,0
2007	21	2 132	100,6	77,5	84	64,0	1 435	78,1	613	77,9
2008	23	2 121	93,5	80,0	13	81,0	1 435	78,6	673	83,0
2009	23	1 071	47,3	80,5	22	62,0	509	77,5	540	84,0
2010	23	737	32,5	73,8	8	66,0	655	73,2	74	80,0
2011	23	1 747	77,4	77,2	18	75,0	807	76,4	922	78,0
Regent										
2002	2	114	57,0	80,6	-	-	102	80,6	12	80,4
2003	3	125	41,0	85,0	-	-	57	84,9	68	85,0
2004	4	164	38,5	84,0	-	-	102	86,7	61	80,0
2005	7	206	28,6	105,9	-	-	50	83,8	156	113,0
2006	7	329	44,3	102,1	1	85,0	110	92,5	218	107,0
2007	9	621	71,3	87,0	-	-	346	83,5	276	91,4
2008	9	651	72,8	83,1	-	-	408	81,0	243	86,7
2009	9	290	32,4	93,3	3	85,0	55	86,0	233	95,1
2010	9	473	52,3	78,9	4	64,0	341	76,9	129	84,5
2011	9	631	68,9	84,7	1	69,0	285	81,9	345	87,1
Blauer Portugieser										
2002	3	77	25,7	72,3	-	-	69	71,2	8	82,0
2003	3	80	26,4	69,8	-	-	76	69,0	5	83,0
2004	3	94	29,5	76,3	2	70,0	89	76,0	3	84,0
2005	3	133	42,2	66,9	-	-	123	66,0	10	76,3
2006	3	148	46,6	83,7	1	89,0	109	78,0	38	100,0
2007	3	228	69,0	65,9	0	64,0	219	65,7	9	70,0
2008	3	189	58,6	77,8	0	59,0	180	77,7	8	80,0
2009	3	50	16,1	83,1	1	78,0	38	82,0	11	87,0
2010	3	88	31,1	71,1	1	67,0	85	71,0	2	80,2
2011	3	80	31,3	80,3	0	-	75	80,0	5	88,0

Noch: 4. Weinmosternte nach Qualitätsstufen und roten Rebsorten

Jahr	Rebfläche im Ertrag	Erntemenge			Davon bestimmt für die Herstellung von					
		ins- gesamt	Most- ertrag	Ø Most- gewicht	Wein/Landwein		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht	Ernte- menge	Ø Most- gewicht
		ha	hl	hl/ha	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl	° Oechsle	hl
übrige Rebsorten										
2002	6	181	30,2	83,6	-	-	71	80,0	110	85,9
2003	5	241	44,5	91,9	4	80,0	62	85,0	175	94,6
2004	9	306	35,1	90,4	-	-	166	80,0	140	103,0
2005	11	424	39,8	84,1	12	80,0	145	86,0	268	83,3
2006	12	686	58,1	84,0	21	85,0	89	90,0	577	83,0
2007	14	535	37,9	83,9	17	.	360	82,5	158	96,0
2008	14	657	47,8	79,6	15	74,6	463	80,4	178	78,0
2009	14	252	17,9	93,7	4	87,0	42	88,0	206	95,0
2010	14	319	23,2	78,0	2	67,0	270	76,0	47	90,0
2011	14	627	44,6	82,4	1	71,0	344	84,5	282	80,0

Abb. 1 Weinmosternte 2002 bis 2011 nach Qualitätsstufen in Hektoliter



Abb. 2 Weinmosternte 2011 nach Weiß- und Rotmost in Hektoliter





Abb. 3 Weinmosternte 2011 nach Rebsorten in Hektoliter



Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Redaktion:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Gestaltung und Satz:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Druck:

Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste

Redaktionsschluss:

April 2012

Bezug:

Diese Druckschrift kann bezogen werden bei:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Hausanschrift: Macherstraße 63, 01917 Kamenz

Postanschrift: Postfach 11 05, 01911 Kamenz

Telefon: +49 3578 33-1424

Telefax: +49 3578 33-1499

E-Mail: vertrieb@statistik.sachsen.de

www.statistik.sachsen.de/shop

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.

Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

Copyright

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2012

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

ISSN 1435-8697