

STATISTISCHE BERICHTE

A IV
j/06

Bestellnummer:
3A402



Gesundheitswesen

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2006



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Herausgabemonat: April 2008

Zu beziehen durch das
Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)

Preis: 6,00 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar – Bestellnummer: 6A402)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Wirtschaftsrechnungen, Soziales, Wohngeld, Gesundheitswesen
Herr Gödicke
Telefon: 0345 2318-401

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777
Telefon: 0345 2318-715
Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>
E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2008

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Donnerstag: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr } möglichst nach Vereinbarung

Telefon: 0345 2318-714
E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Gestorbene nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2006

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2006	6
Sterbefälle 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
Sterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	8
Grafik: Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	9
Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	10
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	11
Grafik: Sterbefälle 2006 nach Todesursachen und Altersgruppen	12
Nichtnatürliche Todesursachen 2006 nach der äußeren Ursache	13
Grafik: Suizide 2006 nach der äußeren Ursache und Geschlecht	14
Unfalltote 2006 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	15
Grafik: Unfalltote 2006 nach Unfallkategorien und Geschlecht	16
Sterbefälle in den Kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	17
Mittleres Sterbealter 2003 bis 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	21
Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2006	23
Säuglingssterbefälle 2005 und 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht	23
Säuglingssterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	24
Grafik: Säuglingssterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	25
Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2006	26
Kindersterbefälle 2005 und 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht	26
Kindersterblichkeit je 10 000 Kinder 2005 und 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht	26
Kindersterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	27
Grafik: Kindersterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	28

Zeitreihen:

Sterbefälle 1970 - 2006 nach Geschlecht	29
Grafik: Sterblichkeit 1970 - 2006 nach Geschlecht	31
Sterbefälle 1996 - 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht	32
Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	34
Grafik: Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	38
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1996 - 2006 nach Geschlecht	39
Grafik: Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1996 - 2006 nach Geschlecht	41
Unfälle 1996 - 2006 nach Unfallkategorien und Geschlecht	42
Säuglingssterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	43
Grafik: Säuglingssterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	45
Säuglingssterblichkeit 1996 - 2006 nach Geschlecht	46
Grafik: Säuglingssterblichkeit 1986 - 2006 nach Geschlecht	47
Kindersterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	48
Grafik: Kindersterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	50
Kindersterbefälle und -sterblichkeit 1996 - 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht	51
Grafik: Kindersterblichkeit 1986 - 2006 nach Geschlecht	52

Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik ist mangels umfassender Morbiditätsstatistiken die am weitesten verbreitete Statistik zur Analyse der quantitativen Bedeutung einzelner Krankheiten. Sie ermöglicht einen Einblick in die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung.

Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen einer Region zu geben. Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, unabhängig vom Sterbeort.

Begriffserläuterungen

Gestorbene: Die Begriffe Gestorbene und Sterbefälle sind inhaltlich identisch. Nicht berücksichtigt werden Totgeborene, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Allgemeine Sterbeziffern: Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die beim Vergleich von Absolutzahlen auftreten können, lassen sich mit Hilfe der mittleren Jahresbevölkerung nach den Formeln

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Männer im Alter } a}{\text{Mittlere männliche Bevölkerung im Alter } a} \times 1000$$

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Frauen im Alter } a}{\text{Mittlere weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 1000$$

geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 1 000 Lebenden gleichen Geschlechts und Alters) für jede Todesursache einzeln und insgesamt berechnen.

Lebendgeborene: Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Die Begriffe Lebendgeborene und Lebendgeburten unterscheiden sich inhaltlich nicht.

Totgeborene: Geborene, bei denen sich keines der oben genannten Lebenszeichen gezeigt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 Gramm beträgt.

Fehlgeburten (Totgeborene mit weniger als 500 g Körpergewicht) werden in die Statistik nicht einbezogen.

Gestorbene in den ersten 7 Lebenstagen: Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen, die natürliche Lungenatmung eingesetzt oder die Nabelschnur pulsiert hat, die aber innerhalb von bis zu 7 Tagen nach der Geburt gestorben sind.

Frühsterblichkeit: In den ersten 7 Lebenstagen gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene.

Säuglinge: Kinder im Alter von 0 bis unter 1 Jahr, d.h. Kinder von der Geburt bis vor Vollendung des 1. Lebensjahres.

Säuglingssterblichkeit: findet ihren Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene des gleichen Zeitraumes bezieht. Für die jährliche Säuglingssterbeziffer bliebe dabei unberücksichtigt, dass nur ein Teil der gestorbenen Säuglinge in demselben Berichtszeitraum geboren wurde. Da die Zahl der Geborenen jährlichen Schwankungen unterliegt, entsteht so ein Fehler. Deshalb wird die jährliche Sterbeziffer unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung berechnet. Die Höhe der Säuglingssterblichkeit ist abhängig von zahlreichen biologischen, medizinischen und sozialen Faktoren, die bei einer Analyse als Merkmal benutzt werden, z.B. Geschlecht, Alter, Geburtsgewicht, Todesursache, Legitimität der Mutter.

Totgeborenenrate: Totgeborene je 1 000 Geborene (Lebend- und Totgeborene).

Perinatale Mortalität: Sterblichkeit der Neugeborenen vor, während und in den ersten 7 Tagen nach der Geburt nach der Formel berechnet

$$\frac{\text{Anzahl der Totgeborenen und Zahl der in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen}}{\text{Anzahl der Lebend- und Totgeborenen}} \times 1000$$

Die perinatale Sterblichkeit ist eindeutig eine Sterbeziffer. Systematisch steht sie allerdings zwischen Geburten- und Sterbestatistik, da die Totgeborenen definitionsgemäß zu den Geburten und nicht zu den Sterbefällen zählen.

Kindersterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Kinder im Alter von 1 bis unter 15 Jahren angibt.

Erfassungsgrundlage

Erfassungsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind der vom Leichenschauarzt ausgestellte Totenschein sowie die vom Standesbeamten aufgrund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Angaben zur Todesursache im Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen und signiert.

Um überregionale Vergleiche der Sterblichkeit zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Aus diesem Grund erfolgt die Signierung der Todesursachen anhand der von der WHO verabschiedeten "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", in der Bundesrepublik Deutschland seit dem 01.01.1998 in der Fassung der 10. Revision (ICD-10).

In der amtlichen Todesursachenstatistik wurden in den Jahren 1980 bis 1997 Todesursachen nach der 9. Revision der ICD signiert. Das bedeutet, dass Zeitreihen nicht (bzw. noch nicht) problemlos fortgesetzt werden können - aus den ehemals 17 Todesursachenklassen wurden jetzt 20 - zumal ein praktikabler „Umsteiger“ noch nicht vorliegt. Wenn hier trotzdem der Versuch unternommen wird, Zeitreihen beginnend ab dem Jahr 1990 anzubieten, muss man sich der o.g. Unzulänglichkeiten bewusst sein.

Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt hat Todesursachenergebnisse in einer Sonderreihe veröffentlicht: Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen, 1980 - 1999, Land Sachsen-Anhalt – 3A403.

Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen erfasst, bei Unfällen und sonstigen Gewalteinwirkungen (nichtnatürliche Todesursachen) zusätzlich die äußeren Ursachen und bei Unfällen außerdem die Unfallkategorie (z.B. häuslicher Unfall, Verkehrsunfall usw.).

Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Januar 1996 (BGBl. I S. 34) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308). Zu berücksichtigen sind das Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 11. August 2004 (GVBl. LSA S. 506), das Personenstandsgesetz in der im BGBl. III, Gliederungsnr. 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, einschließlich späterer Änderungen, das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05. Februar 2002 (GVBl. LSA Nr. 8 S. 45) und die Bestattungsverordnung vom 26. Januar 2005 (GVBl. LSA Nr. 6 S. 35).

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden (genau Null)
(Das Zeichen " - " steht für den mathematisch exakten Wert Null)
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2006

Im Jahr 2006 starben in Sachsen-Anhalt insgesamt 29 151 Personen (13 980 männliche sowie 15 171 weibliche Personen).

Im aktuellen Berichtsjahr starben insgesamt 126 Personen weniger (22 männliche, 104 weibliche) als im Vorjahr. Das bedeutet wieder einen leichten Rückgang der Sterblichkeit gegenüber 2005.

Je 100 000 Einwohner Sachsen-Anhalts verstarben im Berichtsjahr 1 187 Personen, im Vorjahr waren es insgesamt 1 179 Personen.

Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, so starben 1996 noch 1 174 Männer bzw. 1 214 Frauen je 100 000 der Bevölkerung. Im Berichtsjahr waren es 1 165 Männer bzw. 1 208 Frauen.

Insgesamt war auch 2006 - wie in den vergangenen Jahren - die Sterblichkeit der weiblichen Personen höher als die der männlichen Personen. Bedingt durch die Altersstruktur und einen Frauenüberschuss von 2,4 % verstarben 4,0 % mehr Frauen als Männer.

Die Haupttodesursachenklasse stellte 2006 - wie auch in den vergangenen Jahren - mit fast der Hälfte aller Todesfälle (48,2 %) die **Krankheiten des Kreislaufsystems**. Daran starben insgesamt 5 861 Männer und 8 191 Frauen. Je 100 000 der Bevölkerung waren im Jahr 2006 insgesamt 572 Personen einem Herz-Kreislaufleiden erlegen (Vorjahr: 568 Personen je 100 000 der Bevölkerung).

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die **Neubildungen** mit 25,9 % vertreten, darunter mit 25,2 % die bösartigen Neubildungen (BN). Bezogen auf 100 000 Einwohner starben im Berichtsjahr 299 Personen (im Vorjahr 302 Personen) an Krebserkrankungen.

An dritter Stelle der Todesursachenklassen folgten 2006 die **Krankheiten des Verdauungssystems** mit 6,0 % aller Sterbefälle. Hier fielen wiederum die Leberkrankheiten auf, wobei der Anteil der männlichen Verstorbenen im Berichtsjahr mehr als doppelt so hoch war wie der weibliche Personenanteil. Von den Krankheiten der Leber waren 66,1 % alkoholbedingt. Das entsprach 1,8 % der Gesamtsterbefälle bzw. 22 je 100 000 der Bevölkerung im Berichtsjahr.

Die weitere Reihenfolge der Todesursachen bestimmten die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** mit 1 542 Sterbefällen (5,3 %). Diese Todesursachengruppe wurde insbesondere vom Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") geprägt. Gegenüber dem Vorjahr sank die Sterbeziffer hier.

Verletzungen und Vergiftungen folgten an der fünften Stelle mit 3,7 %. Insgesamt starben 1 086 Personen, darunter 715 männliche Personen, eines nichtnatürlichen Todes. Im Vergleich zum Vorjahr waren das insgesamt 146 Personen weniger, die bei Unfällen und durch andere Gewalteinwirkungen ihr Leben verloren. Im Berichtsjahr waren gegenüber dem Vorjahr 99 Unfälle weniger zu dokumentieren.

Suizid (Selbsttötung) begingen im Berichtsjahr 148 Männer und 45 Frauen. Damit sank die Suizidrate. Starben im Jahr 1996 noch insgesamt 20 (27 Männer, 10 Frauen) je 100 000 Einwohner an einem Suizid, waren es 2006 insgesamt 8, davon 12 Männer und 4 Frauen je 100 000 Einwohner.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag Getöteten betrug im Berichtsjahr 13, davon 7 männliche und 6 weibliche Personen.

An sechster Stelle folgten im Jahr 2006 mit 3,5 % aller Sterbefälle die **Krankheiten des Atmungssystems** mit 1 012 Sterbefällen. Dabei waren insbesondere die chronischen Krankheiten der unteren Atemwege auffällig.

Den größten Anteil an den Gesamtsterbefällen stellte die Altersgruppe der über 55-Jährigen. Seit 1996 liegt dieser Anteil bei etwa 90,0 %.

Im aktuellen Berichtsjahr war gegenüber 2005 eine leicht steigende Tendenz um 0,5 % auf 90,5 % festzustellen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der seit 1990 beobachtete Trend der sinkenden Sterblichkeit insgesamt ab 1998 nicht in dem Umfang fortgesetzt hat wie in der Vergangenheit. Die über den Zeitraum der letzten zehn Jahre betrachtete Sterblichkeit der hauptsächlichen Todesursachenklassen bietet ebenfalls ein differenziertes Bild, näheres dazu s. Tabellen auf den Seiten 34 ff. und 39 ff.

Sterbefälle 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht


Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Unter 1	58	24	34	3,41	2,74	4,11
1 - 5	8	3	5	0,12	0,08	0,15
5 - 10	2	-	2	0,02	0,00	0,05
10 - 15	12	6	6	0,16	0,15	0,16
15 - 20	66	54	12	0,42	0,67	0,16
20 - 25	89	63	26	0,56	0,74	0,35
25 - 30	72	56	16	0,52	0,74	0,25
30 - 35	83	60	23	0,68	0,92	0,40
35 - 40	194	135	59	1,11	1,49	0,71
40 - 45	438	308	130	2,08	2,86	1,27
45 - 50	714	502	212	3,54	4,92	2,13
50 - 55	1 020	740	280	5,19	7,48	2,87
55 - 60	1 094	784	310	7,00	10,16	3,92
60 - 65	1 580	1 063	517	10,37	14,46	6,56
65 - 70	2 973	1 993	980	15,69	22,41	9,75
70 - 75	3 568	2 159	1 409	26,33	36,53	18,44
75 - 80	4 549	2 304	2 245	43,73	58,63	34,69
80 - 85	4 974	1 798	3 176	73,26	94,08	65,11
85 - 90	3 810	1 113	2 697	126,87	158,64	117,19
90 und mehr	3 847	815	3 032	247,05	280,84	239,32
2006 insgesamt	29 151	13 980	15 171	11,87	11,65	12,08
2005 insgesamt	29 277	14 002	15 275	11,79	11,56	12,02
2004 insgesamt	29 008	13 892	15 116	11,56	11,34	11,76
2003 insgesamt	29 632	14 062	15 570	11,69	11,38	11,98
2002 insgesamt	30 159	14 250	15 909	11,76	11,41	12,09
2001 insgesamt	29 621	13 954	15 667	11,40	11,04	11,74
2000 insgesamt	30 175	14 298	15 877	11,46	11,17	11,73
1999 insgesamt	30 059	14 076	15 983	11,29	10,88	11,67
1998 insgesamt	31 011	14 496	16 515	11,53	11,10	11,94
1997 insgesamt	30 892	14 294	16 598	11,38	10,85	11,88
1996 insgesamt	32 639	15 539	17 100	11,95	11,74	12,14
1995 insgesamt	33 519	15 816	17 703	12,19	11,89	12,46
1994 insgesamt	33 816	15 929	17 887	12,21	11,93	12,48
1993 insgesamt	34 838	16 546	18 292	12,49	12,34	12,64
1992 insgesamt	35 754	16 726	19 028	12,73	12,43	13,00
1991 insgesamt	38 203	17 859	20 344	13,41	13,13	13,66
1990 insgesamt	38 711	18 118	20 593	13,39	13,14	13,62

Sterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	127	0,5	63	0,5	64	0,4
II Neubildungen (C00-D48)	7 548	25,9	4 140	29,6	3 408	22,5
dar. Bösartige Neubildungen (C00-C97)	7 337	25,2	4 060	29,0	3 277	21,6
... der Verdauungsorgane (C15-C26)	2 510	8,6	1 358	9,7	1 152	7,6
... der Atmungsorgane (C30-C39)	1 549	5,3	1 178	8,4	371	2,5
III Krankheiten des Blutes ... (D50-D89)	67	0,2	23	0,2	44	0,3
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	1 542	5,3	577	4,1	965	6,4
dar. Diabetes mellitus (E10-E14)	1 419	4,9	527	3,8	892	5,9
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	220	0,8	176	1,3	44	0,3
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00-H95)	625	2,1	305	2,2	320	2,1
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	14 052	48,2	5 861	41,9	8 191	54,0
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	2 717	9,3	1 536	11,0	1 181	7,8
Chron. Ischäm. Herzkrankheit (I25)	3 494	12,0	1 393	10,0	2 101	13,9
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	2 762	9,5	1 045	7,5	1 717	11,3
X Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	1 012	3,5	532	3,8	480	3,2
dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	530	1,8	304	2,2	226	1,5
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	1 742	6,0	965	6,9	777	5,1
dar. Krankheiten der Leber (K70-K77)	797	2,7	565	4,0	232	1,5
XIII Krankheiten d. Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	60	0,2	24	0,2	36	0,2
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	558	1,9	270	1,9	288	1,9
XVIII Symptome ... (R00-R99)	442	1,5	298	2,1	144	0,9
XIX Verletzungen, Vergiftungen ... (S00-T98)	1 086	3,7	715	5,1	371	2,4
dar. Verletzungen des Kopfes (S00-S09)	215	0,7	150	1,1	65	0,4
... des Brustkorbes (S20-S29)	33	0,1	23	0,2	10	0,1
... der Hüfte und des Oberschenkels (S70-S79)	162	0,6	50	0,4	112	0,7
Multiple Verletzungen (T00 - T07)	156	0,5	113	0,8	43	0,3
XX Äußere Ursachen ... (V01-Y98)	1 086	3,7	715	5,1	371	2,5
dar. Transportmittelunfälle (V01-V99)	220	0,8	169	1,2	51	0,3
Unfälle durch Sturz (W00-W19)	163	0,6	84	0,6	79	0,5
Suizide (X60-X84)	193	0,7	148	1,1	45	0,3
Übrige	70	0,2	31	0,2	39	0,3
Insgesamt (A00-T98)	29 151	100	13 980	100	15 171	100

Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Männer



Frauen



Sterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle						
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
			1 – 15	15 – 35	35 – 55	55 – 75	75 und mehr	
I A00 - B99	i	127	-	6	19	46	56	
	m	63	-	2	15	31	15	
	w	64	-	4	4	15	41	
II C00 - D48	i	7 548	4	24	733	3 561	3 226	
	m	4 140	1	12	414	2 233	1 480	
	w	3 408	3	12	319	1 328	1 746	
dar. C00 - C97	i	7 337	4	21	725	3 490	3 097	
	m	4 060	1	10	410	2 198	1 441	
	w	3 277	3	11	315	1 292	1 656	
C15 - C26	i	2 510	-	3	181	1 199	1 127	
	m	1 358	-	-	128	773	457	
	w	1 152	-	3	53	426	670	
C30 - C39	i	1 549	-	-	185	890	474	
	m	1 178	-	-	126	714	338	
	w	371	-	-	59	176	136	
IV E00 - E90	i	1 542	2	7	93	449	990	
	m	577	1	5	64	243	264	
	w	965	1	2	29	206	726	
V F00 - F99	i	220	-	10	95	92	23	
	m	176	-	7	80	78	11	
	w	44	-	3	15	14	12	
VI-VIII G00 - H95	i	625	4	21	66	188	343	
	m	305	2	16	45	116	126	
	w	320	2	5	21	72	217	
IX I00 - I99	i	14 052	-	28	509	3 340	10 172	
	m	5 861	-	20	391	2 252	3 197	
	w	8 191	-	8	118	1 088	6 975	
dar. I21, I22	i	2 717	-	4	199	1 031	1 483	
	m	1 536	-	3	160	764	609	
	w	1 181	-	1	39	267	874	
I60 - I69	i	2 762	-	5	62	585	2 110	
	m	1 042	-	3	47	366	629	
	w	1 717	-	2	15	219	1 481	
X J00 - J99	i	1 012	1	7	42	294	663	
	m	532	1	5	33	201	291	
	w	480	-	2	9	93	372	
dar. J40 - J47	i	530	-	1	21	189	319	
	m	304	-	1	15	130	158	
	w	226	-	-	6	59	161	
XI K00 - K93	i	1 742	-	13	360	627	741	
	m	965	-	9	279	428	249	
	w	777	-	4	81	199	492	
dar. K70 - K77	i	797	-	9	283	374	131	
	m	565	-	6	219	277	63	
	w	232	-	3	64	97	68	
XIV N00 - N99	i	558	-	3	13	139	402	
	m	270	-	3	10	86	171	
	w	288	-	-	3	53	231	
XIX S00 - T98	i	1 086	5	165	284	272	357	
	m	715	3	138	233	195	145	
	w	371	2	27	51	77	212	
Insgesamt A00 - T98	i	29 151	22	310	2 366	9 215	17 180	
	m	13 980	9	233	1 685	5 999	6 030	
	w	15 171	13	77	681	3 216	11 150	

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 – 15	15 – 35	35 – 55	55 – 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	5,2	-	1,0	2,4	7,3	25,7
	m	5,3	-	0,7	3,8	10,4	22,0
	w	5,1	-	1,5	1,0	4,5	27,5
II C00 - D48	i	307,4	1,7	4,2	93,7	562,1	1 483,2
	m	345,1	0,8	3,9	103,8	747,6	2 166,1
	w	271,3	2,7	4,5	83,2	396,7	1 170,4
dar. C00 - C97	i	298,8	1,7	3,6	92,7	550,9	1 423,9
	m	338,5	0,8	3,3	102,8	735,8	2 109,0
	w	260,9	2,7	4,1	82,1	386,0	1 110,1
C15 - C26	i	102,2	-	0,5	23,1	189,3	518,1
	m	113,2	-	-	32,1	258,8	668,8
	w	91,7	-	1,1	13,8	127,3	449,1
C30 - C39	i	63,1	-	-	23,6	140,5	217,9
	m	98,2	-	-	31,6	239,0	494,7
	w	29,5	-	-	15,4	52,6	91,2
IV E00 - E90	i	62,8	0,9	1,2	11,9	70,9	455,2
	m	48,1	0,8	1,6	16,0	81,4	386,4
	w	76,8	0,9	0,7	7,6	61,5	486,7
V F00 - F99	i	9,0	-	1,7	12,1	14,5	10,6
	m	14,7	-	2,3	20,1	26,1	16,1
	w	3,5	-	1,1	3,9	4,2	8,0
VI-VIII G00 - H95	i	25,5	1,7	3,6	8,4	29,7	157,7
	m	25,4	1,7	5,2	11,3	38,8	184,4
	w	25,5	1,8	1,9	5,5	21,5	145,5
IX I00 - I99	i	572,2	-	4,9	65,1	527,3	4 676,6
	m	488,6	-	6,5	98,0	753,9	4 679,0
	w	652,0	-	3,0	30,8	325,0	4 675,5
dar. I21, I22	i	110,6	-	0,7	25,4	162,8	681,8
	m	128,0	-	1,0	40,1	255,8	891,3
	w	94,0	-	0,4	10,2	79,8	585,9
I60 - I69	i	112,5	-	0,9	7,9	92,3	970,0
	m	87,1	-	1,9	11,8	122,5	920,6
	w	136,7	-	0,7	3,9	65,4	992,8
X J00 - J99	i	41,2	0,4	1,2	5,4	46,4	304,8
	m	44,3	0,8	1,6	8,3	67,3	425,9
	w	38,2	-	0,7	2,3	27,8	249,4
dar. J40 - J47	i	21,6	-	0,2	2,7	29,8	146,7
	m	25,3	-	0,3	3,8	43,5	231,2
	w	18,0	-	-	1,6	17,6	107,9
XI K00 - K93	i	70,9	-	2,3	46,0	99,0	340,7
	m	80,4	-	2,9	69,9	143,3	364,4
	w	61,9	-	1,9	21,1	59,4	329,8
dar. K70 - K77	i	32,5	-	1,6	36,2	59,0	60,2
	m	47,1	-	2,0	54,9	92,7	92,2
	w	18,5	-	1,1	16,7	29,0	45,6
XIV N00 - N99	i	22,7	-	0,5	1,7	21,9	184,8
	m	22,5	-	1,0	2,5	28,8	250,3
	w	22,9	-	-	0,8	15,8	154,8
XIX S00 - T98	i	44,2	2,2	28,6	36,3	42,9	164,1
	m	59,6	2,5	44,9	58,4	65,3	212,2
	w	29,5	1,8	10,0	13,3	23,0	142,1
Insgesamt A00 - T98	i	1 187,0	9,6	53,8	302,4	1 454,7	7 898,6
	m	1 165,4	7,6	75,9	422,4	2 008,3	8 825,2
	w	1 207,7	11,7	28,6	177,6	960,7	7 474,1

**Sterbefälle 2006
nach Todesursachen und Altersgruppen
in %**


1 bis unter 15




15 bis unter 35




35 bis unter 55



55 bis unter 75



75 und mehr



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> I Infektiöse und parasitäre Krankheiten II Neubildungen IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten V Psychische Störungen ¹⁾,
bis Krankheiten des Nervensystems
VIII und der Sinnesorgane IX Krankheiten des Kreislaufsystems | <ul style="list-style-type: none"> X Krankheiten des Atmungssystems XI Krankheiten des Verdauungssystems XIV Krankheiten des Urogenitalsystems XIX Verletzungen und Vergiftungen Übrige |
|---|--|


1) Psychische Störungen nicht in der Altersgruppe von 1 bis unter 15 Jahren vertreten

Anmerkung: Damit die Grafik übersichtlich bleibt, sind die Anteile der Todesursachenklassen, deren berechnete Werte weniger als 1 ergeben, der Rubrik "Übrige" zugeordnet worden. In der Rubrik "Übrige" sind ebenfalls die hier nicht aufgeführten Todesursachenklassen III, XII, XIII, XV, XVI, XVII und XVIII enthalten. Die Todesursachenklassen V-VIII sind in der Grafik zusammengefasst worden.

Nichtnatürliche Todesursachen 2006 nach der äußeren Ursache

Äußere Ursache	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.
Transportmittelunfälle (V01- V99)	220	20,3	9,0	169	23,6	14,1	51	13,7	4,1
dar. Fußgänger (V01 - V09)	20	1,8	0,8	15	2,1	1,3	5	1,3	0,4
Radfahrer (V10 - V19)	8	0,7	0,3	7	1,0	0,6	1	0,3	0,1
PKW-Benutzer (V40-V49)	51	4,7	2,1	37	5,2	3,1	14	3,8	1,1
Stürze (Unfälle) (W00 - W19)	163	15,0	6,6	84	11,7	7,0	79	21,3	6,3
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	15	1,4	0,6	9	1,3	0,8	6	1,6	0,5
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	16	1,5	0,7	9	1,3	0,8	7	1,9	0,6
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	10	0,9	0,4	8	1,1	0,7	2	0,5	0,2
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	10	0,9	0,4	6	0,8	0,5	4	1,1	0,3
Akzidentelle Vergiftungen (Unfälle) (X40 - X49)	14	1,3	0,6	11	1,5	0,9	3	0,8	0,2
Suizide (X60 - X84)	193	17,8	7,9	148	20,7	12,3	45	12,1	3,6
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	13	1,2	0,5	7	1,0	0,6	6	1,6	0,5
Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	282	26,0	11,5	191	26,7	15,9	91	24,5	5,5
Übrige	150	13,8	6,1	73	10,2	6,1	77	20,8	6,1
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	1 086	100	44,2	715	100	59,6	371	100	29,5
dar. Unfälle insgesamt (V01-X59, Y40-Y86, Y88)	598	55,1	24,4	369	51,6	30,8	229	61,7	18,2

Suizide 2006 nach der äußeren Ursache und Geschlecht



Männer
 Frauen

X60-X69 durch Vergiftung
 X70 durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken
 X71 durch Ertrinken
 X72-X75 durch Feuerwaffen oder Explosivstoffe
 X78 durch scharfen Gegenstand
 X80 durch Sturz in die Tiefe
 Übrige


Unfalltote 2006 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Unfallkategorie	Geschlecht	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	33	-	13	15	5	-
	m	30	-	11	14	5	-
	w	3	-	2	1	-	-
Verkehrsunfall	i	207	2	82	64	40	19
	m	156	2	70	50	28	6
	w	51	-	12	14	12	13
Häuslicher Unfall	i	216	2	7	29	43	135
	m	96	1	7	24	28	36
	w	120	1	-	5	15	99
Sport-/Spielunfall	i	1	-	-	1	-	-
	m	1	-	-	1	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Unfall	i	141	-	17	26	39	59
	m	86	-	15	23	28	20
	w	55	-	2	3	11	39
Insgesamt	i	598	4	119	135	127	213
	m	369	3	103	112	89	62
	w	229	1	16	23	38	151


Unfallkategorie	Geschlecht	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	1,3	-	2,3	1,9	0,8	-
	m	2,5	-	3,6	3,5	1,7	-
	w	0,2	-	0,7	0,3	-	-
Verkehrsunfall	i	8,4	0,9	14,2	8,2	6,3	8,7
	m	13,0	1,7	22,8	12,5	9,4	8,8
	w	4,1	-	4,5	3,7	3,6	8,7
Häuslicher Unfall	i	8,8	0,9	1,2	3,7	6,8	62,1
	m	8,0	0,8	2,3	6,0	9,4	52,7
	w	9,6	0,9	-	1,3	4,5	66,4
Sport-/Spielunfall	i	0,0	-	-	0,1	-	-
	m	0,1	-	-	0,3	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Unfall	i	5,7	-	2,9	3,3	6,2	27,1
	m	7,2	-	4,9	5,8	9,4	29,3
	w	4,4	-	0,7	0,8	3,3	26,1
Insgesamt	i	24,4	1,7	20,6	17,3	20,0	97,9
	m	30,8	2,5	33,5	28,1	29,8	90,7
	w	18,2	0,9	5,9	6,0	11,4	101,2

Unfalltote 2006 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Männer



Frauen



Sterbefälle in den Kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt/ Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)							
	II (C00 - D48)		IV (E00 - E90)		IX (I00 - I99)		X (J00 - J99)	
	Sterbefälle							
Land	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau, Stadt	130	115	13	16	188	264	12	19
Anhalt-Zerbst	132	88	19	47	175	298	17	10
Bernburg	105	112	21	25	196	271	10	12
Bitterfeld	192	137	17	30	265	331	18	11
Köthen	125	99	13	30	173	222	18	17
Wittenberg	189	153	32	44	275	391	22	20
Halle (Saale), Stadt	368	315	40	82	481	752	47	48
Burgenlandkreis	210	212	41	82	347	418	33	32
Mansfelder Land	206	129	30	52	270	412	16	14
Merseburg-Querfurt	204	177	33	46	345	406	28	27
Saalkreis	104	86	14	26	134	178	15	9
Sangerhausen	105	85	16	23	166	238	11	4
Weißenfels	129	100	18	26	197	265	27	5
Magdeburg, Stadt	390	330	45	68	461	641	38	46
Aschersleben-Staßfurt	160	126	18	29	271	316	26	17
Bördekreis	124	102	27	33	197	255	18	10
Halberstadt	143	96	24	42	164	253	20	17
Jerichower Land	173	122	23	47	230	324	29	18
Ohrekreis	175	127	24	44	268	364	11	19
Stendal	217	198	34	56	267	404	33	39
Quedlinburg	130	134	14	28	188	318	21	21
Schönebeck	128	105	17	18	194	259	21	26
Wernigerode	153	141	20	23	222	315	17	27
Altmarkkreis Salzwedel	148	119	24	48	187	296	24	12
Sachsen-Anhalt	4 140	3 408	577	965	5 861	8 191	532	480

Noch: Sterbefälle in den Kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt/ Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XI (K00 - K93)		XIX (S00 - T98)		insgesamt	
Land	Sterbefälle					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau, Stadt	24	27	14	15	421	488
Anhalt-Zerbst	41	23	24	18	443	514
Bernburg	21	15	20	6	424	470
Bitterfeld	43	20	33	17	606	568
Köthen	19	18	20	15	398	428
Wittenberg	46	34	46	23	663	710
Halle (Saale), Stadt	92	74	50	44	1 226	1 418
Burgenlandkreis	57	53	49	9	805	861
Mansfelder Land	44	26	23	24	628	687
Merseburg-Querfurt	51	47	46	18	778	770
Saalkreis	28	19	20	12	343	349
Sangerhausen	32	17	29	7	394	396
Weißenfels	23	32	21	13	442	471
Magdeburg, Stadt	70	77	43	24	1 163	1 274
Aschersleben-Staßfurt	41	25	31	14	601	574
Bördekreis	32	20	26	8	451	447
Halberstadt	23	24	21	8	438	477
Jerichower Land	35	34	30	14	578	622
Ohrekreis	37	25	27	13	577	620
Stendal	58	42	45	18	706	811
Quedlinburg	33	34	15	21	440	597
Schönebeck	37	30	22	8	442	469
Wernigerode	40	25	18	11	507	576
Altmarkkreis Salzwedel	38	36	42	11	506	574
Sachsen-Anhalt	965	777	715	371	13 980	15 171

Noch: Sterbefälle in den Kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt/ Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)							
	II (C00 - D48)		IV (E00 - E90)		IX (I00 - I99)		X (J00 - J99)	
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau, Stadt	347,0	284,3	34,7	39,6	501,8	652,7	32,0	47,0
Anhalt-Zerbst	391,4	252,2	56,3	134,7	518,9	854,1	50,4	28,7
Bernburg	331,6	337,4	66,3	75,3	619,0	816,3	31,6	36,1
Bitterfeld	399,2	268,8	35,3	58,9	551,0	649,4	37,4	21,6
Köthen	393,2	297,0	40,9	90,0	544,2	665,9	56,6	51,0
Wittenberg	317,1	246,5	53,7	70,9	461,4	629,9	36,9	32,2
Halle (Saale), Stadt	328,1	253,2	35,7	65,9	428,9	604,4	41,9	38,6
Burgenlandkreis	324,9	311,1	63,4	120,3	536,9	613,5	51,1	47,0
Mansfelder Land	421,0	255,6	61,3	103,0	551,8	816,4	32,7	27,7
Merseburg-Querfurt	317,4	265,6	51,3	69,0	536,8	609,3	43,6	40,5
Saalkreis	273,8	225,5	36,9	68,2	352,8	466,7	39,5	23,6
Sangerhausen	339,3	265,3	51,7	71,8	536,5	742,8	35,5	12,5
Weißenfels	357,4	266,5	49,9	69,3	545,8	706,1	74,8	13,3
Magdeburg, Stadt	352,7	277,9	40,7	57,3	416,9	539,7	34,4	38,7
Aschersleben-Staßfurt	346,7	260,7	39,0	60,0	587,2	653,7	56,3	35,2
Bördekreis	333,2	270,6	72,6	87,5	529,4	676,5	48,4	26,5
Halberstadt	388,1	249,0	65,1	109,0	445,1	656,3	54,3	44,1
Jerichower Land	363,4	249,4	48,3	96,1	483,2	662,5	60,9	36,8
Ohrekreis	308,1	222,0	42,2	76,9	471,8	636,2	19,4	33,2
Stendal	335,7	300,9	52,6	85,1	413,1	614,0	51,1	59,3
Quedlinburg	367,0	360,1	39,5	75,2	530,7	854,6	59,3	56,4
Schönebeck	365,7	287,2	48,6	49,2	554,2	708,5	60,0	71,1
Wernigerode	344,3	299,2	45,0	48,8	499,5	668,5	38,3	57,3
Altmarkkreis Salzwedel	311,3	249,1	50,5	100,5	393,3	619,6	50,5	25,1
Sachsen-Anhalt	345,1	271,3	48,1	76,8	488,6	652,0	44,3	38,2

Noch: Sterbefälle in den Kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt/ Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XI (K00 - K93)		XIX (S00 - T98)		insgesamt	
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau, Stadt	64,1	66,7	37,4	37,1	1 123,7	1 206,4
Anhalt-Zerbst	121,6	65,9	71,2	51,6	1 313,6	1 473,2
Bernburg	66,3	45,2	63,2	18,1	1 339,1	1 415,8
Bitterfeld	89,4	39,2	68,6	33,4	1 260,0	1 114,4
Köthen	59,8	54,0	62,9	45,0	1 252,1	1 283,8
Wittenberg	77,2	54,8	77,2	37,1	1 112,4	1 243,9
Halle (Saale), Stadt	82,0	59,5	44,6	35,4	1 093,2	1 139,6
Burgenlandkreis	88,2	77,8	75,8	13,2	1 245,6	1 263,6
Mansfelder Land	89,9	51,5	47,0	47,6	1 283,5	1 361,3
Merseburg-Querfurt	79,4	70,5	71,6	27,0	1 210,5	1 155,6
Saalkreis	73,7	49,8	52,7	31,5	903,1	915,1
Sangerhausen	103,4	53,1	93,7	21,8	1 273,3	1 235,9
Weißenfels	63,7	85,3	58,2	34,6	1 224,5	1 255,1
Magdeburg, Stadt	63,3	64,8	38,9	20,2	1 051,7	1 072,7
Aschersleben-Staßfurt	88,8	51,7	67,2	29,0	1 302,2	1 187,5
Bördekreis	86,0	53,1	69,9	21,2	1 211,9	1 185,9
Halberstadt	62,4	62,3	57,0	20,8	1 188,7	1 237,4
Jerichower Land	73,5	69,5	63,0	28,6	1 214,3	1 271,8
Ohrekreis	65,1	43,7	47,5	22,7	1 015,7	1 083,7
Stendal	89,7	63,8	69,6	27,4	1 092,2	1 232,6
Quedlinburg	93,2	91,4	42,3	56,4	1 242,1	1 604,4
Schönebeck	105,7	82,1	62,8	21,9	1 262,7	1 282,9
Wernigerode	90,0	53,1	40,5	23,3	1 140,8	1 222,4
Altmarkkreis Salzwedel	79,9	75,4	88,3	23,0	1 064,3	1 201,6
Sachsen-Anhalt	80,4	61,9	59,6	29,5	1 165,4	1 207,7

Mittleres Sterbealter 2003 - 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren			
			2003	2004	2005	2006
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	i	68,1	70,3	70,6	69,8
		m	63,1	65,8	66,7	64,1
		w	72,9	75,0	74,7	75,5
II	Neubildungen (C00 - D48)	i	71,0	71,3	71,0	71,1
		m	69,4	69,6	69,6	69,7
		w	73,1	73,5	72,7	72,9
dar.	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	70,9	71,2	70,9	71,0
		m	69,3	69,6	69,5	69,7
		w	72,9	73,5	72,5	72,6
	... der Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	72,2	72,3	72,0	72,3
		m	69,3	69,6	69,6	69,7
		w	75,3	75,4	74,7	75,2
	... der Atmungsorgane (C30 - C39)	i	69,1	69,2	68,9	68,7
		m	68,4	68,8	68,5	68,5
		w	71,8	70,7	70,3	69,4
	... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 - C96)	i	70,8	71,6	71,7	71,6
		m	68,4	69,6	70,0	68,9
		w	73,0	74,0	73,2	73,9
III	Krankh. d. Blutes u. d. blutbild. Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50 - D89)	i	73,1	74,5	76,4	77,9
		m	72,3	64,8	71,5	79,0
		w	73,6	78,8	79,1	77,3
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	i	77,3	77,3	77,4	76,9
		m	72,2	70,8	71,5	71,7
		w	80,1	80,7	80,7	80,0
dar.	Diabetes mellitus (E10 - E14)	i	77,8	78,1	78,3	77,8
		m	73,0	71,5	72,9	72,6
		w	80,4	81,4	81,4	80,8
V	Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	i	56,8	58,2	56,4	57,0
		m	56,4	56,0	54,6	55,8
		w	59,8	68,6	64,0	61,8
dar.	... durch Alkohol (F10)	i	56,7	55,4	54,6	55,2
		m	56,5	55,1	54,1	55,5
		w	58,5	57,8	57,5	55,2
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	i	73,2	73,0	70,9	71,6
		m	67,7	68,0	67,1	67,1
		w	78,1	77,5	74,4	75,8
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	i	79,8	79,6	79,4	79,6
		m	74,5	74,6	74,4	74,5
		w	83,3	83,1	82,9	83,2
dar.	Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	78,9	78,9	78,7	78,6
		m	73,7	74,1	73,9	73,8
		w	83,2	82,9	82,8	82,8
	Akuter Myokardinfarkt (I21)	i	74,2	74,3	74,7	74,3
		m	70,0	70,3	70,9	70,4
		w	79,5	79,2	79,3	79,3
	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	81,3	80,6	80,3	80,5
		m	77,2	76,4	76,0	76,2
		w	83,5	83,0	82,6	83,2

Noch: Mittleres Sterbealter 2003 - 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren			
			2003	2004	2005	2006
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	i	77,3	76,9	77,3	76,8
		m	74,8	74,7	75,3	73,7
		w	80,5	79,6	79,8	80,3
dar.	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	i	76,7	76,1	75,8	75,8
		m	74,6	74,9	74,4	73,5
		w	79,9	77,8	78,0	78,9
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	i	67,0	68,5	67,5	69,0
		m	62,4	63,6	62,5	64,1
		w	73,9	75,2	74,6	75,2
dar.	Krankheiten der Leber (K70 - K77)	i	59,4	60,7	59,9	60,8
		m	58,8	59,5	58,4	59,4
		w	61,2	63,7	64,2	64,4
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	i	79,0	79,8	79,5	79,2
		m	76,1	78,2	77,1	76,6
		w	81,2	81,1	81,5	81,7
XVII	Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	i	30,8	38,2	41,0	30,7
		m	31,4	35,4	35,3	38,8
		w	30,2	41,4	49,0	25,3
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	55,2	56,5	57,6	59,6
		m	49,1	51,8	52,2	53,8
		w	67,2	66,0	67,9	70,6
dar.	Verletzungen des Kopfes (S00 - S09)	i	50,9	53,7	56,0	57,2
		m	46,0	50,6	51,8	53,5
		w	62,3	60,6	68,3	66,7
	... der Hüfte u. des Oberschenkels (S70 - S79)	i	85,1	85,0	82,9	84,4
		m	82,9	82,5	80,4	82,8
		w	85,9	86,3	84,1	85,7
	Multiple Verletzungen (T00 - T07)	i	42,4	42,7	43,0	47,3
		m	39,6	40,0	38,5	44,0
		w	52,6	49,1	52,9	55,9
aus XX	Transportmittelunfälle (V01 - V99)	i	41,4	40,5	42,6	42,5
		m	39,2	39,4	41,4	38,9
		w	47,8	43,3	45,9	54,5
	Unfälle durch Sturz (W00 - W19)	i	74,1	75,8	75,2	73,7
		m	64,8	69,5	66,7	66,6
		w	82,1	81,3	80,9	81,3
	Suizide (X60 - X84)	i	54,7	55,1	54,3	59,1
		m	52,1	54,0	53,2	58,0
		w	62,2	55,1	57,5	65,4
	Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	i	36,7	28,7	35,9	41,1
		m	35,4	31,2	30,7	46,3
		w	38,9	25,4	38,5	35,0
	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	i	53,3	58,6	57,7	61,5
		m	50,8	53,1	53,3	58,2
		w	58,9	73,8	70,1	68,5
Insgesamt (A00 - T98)		i	74,9	74,9	74,6	75,4
		m	69,7	70,0	69,9	70,8
		w	79,5	79,4	78,9	79,7

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2006

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 58 Säuglingssterbefälle, davon 24 männliche und 34 weibliche, registriert, das waren gegenüber dem Vorjahr 5 gestorbene Säuglinge mehr.

Dadurch sowie bedingt durch die weitere Abnahme der Anzahl der Lebendgeborenen um 239 erhöhte

sich die Säuglingssterblichkeitsrate von 2,88 Promille im Jahr 2005 auf 3,43 Promille im Berichtsjahr.

Die Säuglingssterbefälle verteilten sich wie folgt auf die 4 Altersgruppen:

Lebensdauer von ... bis unter ...	Gestorbene Säuglinge					
	2006			2005		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Unter 24 Stunden	15	6	9	17	12	5
24 Stunden - 7 Tage	7	5	2	13	5	8
7 Tage - 28 Tage	10	3	7	8	2	6
28 Tage - 1 Jahr	26	10	16	15	6	9
Insgesamt	58	24	34	53	25	28

Von den 58 gestorbenen Säuglingen starben 22 innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt, das waren 8 weniger gegenüber dem Vorjahr. Dies fand seinen Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer der Frühsterblichkeit, die von 1,96 Promille im Vorjahr auf 1,30 Promille im Berichtsjahr gesunken war.

Die Anzahl der Totgeborenen sank um 9 gegenüber dem Vorjahr auf 57 Totgeburten, so dass die Totgeborenenrate gegenüber dem Vorjahr eine leicht sinkende Tendenz aufwies. - siehe dazu auch Seite 46.

Der Anteil der verstorbenen männlichen Säuglinge betrug im Berichtsjahr 41,4 % (Vorjahr 47,2 %) an der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge.

Die hauptsächlichen Todesursachen, die die Höhe der Säuglingssterblichkeit maßgeblich beeinfluss-

ten, waren nach wie vor **Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben** mit 46,6 %.

Mit 13,8 % waren die **Angeborenen Fehlbildungen**, darunter zum überwiegenden Teil die Fehlbildungen des Kreislaufsystems (6,9 %) an den Todesursachen im Säuglingsalter beteiligt.

Der seit 1996 beobachtete rückläufige Trend der Sterblichkeit bei der Todesursache **Plötzlicher Kindstod** setzte sich seit 2001 nicht kontinuierlich fort. Seit 2004 war jedoch wieder ein Rückgang zu verzeichnen. Während im Jahr 2005 keine Säuglinge an dieser Todesursache verstarben, waren im aktuellen Berichtsjahr hier wieder 3 Sterbefälle zu verzeichnen, s. dazu auch die S. 43 ff.


Vorgang	Geschlecht		
	insgesamt	männlich	weiblich
Lebendgeborene	16 927	8 838	8 089
Totgeborene	57	25	32
Gestorbene Säuglinge dar.	58	24	34
in den ersten 7 Tagen	22	11	11
Säuglingssterblichkeit	3,43	2,72	4,20
Frühsterblichkeit	1,30	1,24	1,36
Totgeborenenrate	3,36	2,82	3,94
Perinatale Mortalität	4,65	4,06	5,29

Säuglingssterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Säuglinge					
	insgesamt	männlich	weiblich	dar. in den ersten 7 Tagen		
				insg.	männl.	weibl.
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	-	-	-	-	-	-
II Neubildungen (C00 - D48)	-	-	-	-	-	-
III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50 – D89)	1	-	1	-	-	-
IV Endokrine , Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 – E90)	1	-	1	-	-	-
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00 - H95)	3	-	3	-	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	3	1	2	-	-	-
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	5	1	4	-	-	-
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	1	-	1	-	-	-
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	1	-	1	-	-	-
XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung i. d. Perinatalperiode haben (P00 - P96)	27	15	12	18	10	8
dar. Frühgeburten (P05, P07)	9	5	4	7	3	4
XVII Angeborene Fehlbildungen ... (Q00 - Q99)	8	3	5	3	1	2
dar. ... des Kreislaufsystems (Q20 - Q28)	4	2	2	1	-	1
XVIII Symptome ... (R00-R99)	5	3	2	-	-	-
dar. Plötzlicher Kindstod (R95)	3	2	1	-	-	-
XIX Verletzungen, Vergiftungen ... (S00 - T98)	3	1	2	1	-	1
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	1	1	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	58	24	34	22	11	11

**Säuglingssterbefälle 2006
nach Todesursachen und Geschlecht**

männlich



weiblich



Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2006

Im Jahr 2006 starben 22 Kinder, davon 9 Jungen und 13 Mädchen, im Alter von 1 bis unter 15 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr waren 13 Kindersterbefälle

weniger (11 Jungen und 2 Mädchen weniger) zu dokumentieren.

Kindersterbefälle nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene Kinder 2006			Gestorbene Kinder 2005		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1 - 5	8	3	5	21	12	9
5 - 10	2	-	2	2	1	1
10 - 15	12	6	6	12	7	5
Insgesamt	22	9	13	35	20	15

Sterblichkeit je 10 000 Kinder nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterblichkeit je 10 000 Kinder 2006			Sterblichkeit je 10 000 Kinder 2005		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1 - 5	1,16	0,85	1,50	3,01	3,34	2,67
5 - 10	0,24	-	0,49	0,24	0,24	0,25
10 - 15	1,59	1,55	1,64	1,41	1,59	1,21
Insgesamt	0,96	0,76	1,17	1,48	1,64	1,30

Im Gegensatz zu den Vorjahren war die höchste Sterblichkeit in der ältesten Altersgruppe zu verzeichnen.

Insgesamt war auch im Jahr 2006 im Vergleich zum Vorjahr eine Senkung der Kindersterblichkeit zu beobachten. Zur Entwicklung der Kindersterblichkeit seit 1996 siehe auch Seite 51.

In diesem Berichtsjahr stellten die **Angeborenen Anomalien** mit 27,3 % den Hauptanteil an den Todesursachen im Kindesalter (Vorjahr 8,6 %).

Es folgten die **Nichtnatürlichen Todesursachen** mit 22,7 % (Vorjahr 31,4 %). 2006 waren hauptsächlich Transportmittelunfälle für die Sterbefälle im Kindesalter verantwortlich.

Mit jeweils 18,2 % bestimmten die **Neubildungen** (Vorjahr 8,6 %) und die **Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane** (Vorjahr 25,7 %) die weitere Reihenfolge.


Abschließend wären noch die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** mit 9,1 % und die **Krankheiten des Atmungssystems** mit 4,5 % zu erwähnen.

Kindersterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Kinder					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	%	absolut	%	absolut	%
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	-	-	-	-	-	-
II Neubildungen (C00 - D48)	4	18,2	1	11,1	3	23,0
dar. Bösartige Neubildungen des lymphatischen ... Gewebes (C81 - C96)	-	-	-	-	-	-
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	2	9,1	1	11,1	1	7,7
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00 - H95)	4	18,2	2	22,2	2	15,4
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	-	-	-	-	-	-
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	1	4,5	1	11,1	-	-
XVII Angeborene Fehlbildungen ... (Q00 - Q99)	6	27,3	1	11,1	5	38,5
XIX Verletzungen, Vergiftungen ... (S00 - T98)	5	22,7	3	33,4	2	15,4
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	3	13,6	2	22,2	1	7,7
Übrige	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	22	100	9	100	13	100

Kindersterbefälle 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

männlich



weiblich




Sterbefälle 1970 - 2006 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter im ersten Lebensjahr		
				insgesamt	männlich	weiblich
1970	44 918	21 570	23 348	861	494	367
1971	43 045	20 355	22 690	831	488	343
1972	43 683	20 712	22 971	725	435	290
1973	42 933	20 201	22 732	531	300	231
1974	42 773	20 159	22 614	578	335	243
1975	44 990	21 020	23 970	523	311	212
1976	43 226	19 999	23 227	469	268	201
1977	41 826	19 620	22 206	548	313	235
1978	43 459	20 207	23 252	592	366	226
1979	43 554	20 243	23 311	566	329	237
1980	44 448	20 623	23 825	534	315	219
1981	43 258	19 780	23 478	550	344	206
1982	42 306	19 350	22 956	486	281	205
1983	41 628	18 762	22 866	437	277	160
1984	41 595	18 766	22 829	414	234	180
1985	41 930	18 966	22 964	394	231	163
1986	41 887	18 528	23 359	400	243	157
1987	40 128	17 835	22 293	348	208	140
1988	40 009	17 998	22 011	320	187	133
1989	38 127	17 301	20 826	285	171	114
1990	38 711	18 118	20 593	254	166	88
1991	38 203	17 859	20 344	177	106	71
1992	35 754	16 726	19 028	128	77	51
1993	34 838	16 546	18 292	84	43	41
1994	33 816	15 929	17 887	91	44	47
1995	33 519	15 816	17 703	90	53	37
1996	32 639	15 539	17 100	92	49	43
1997	30 892	14 294	16 598	86	45	41
1998	31 011	14 496	16 515	93	50	43
1999	30 059	14 076	15 983	70	38	32
2000	30 175	14 298	15 877	79	45	34
2001	29 621	13 954	15 667	73	41	32
2002	30 159	14 250	15 909	87	47	40
2003	29 632	14 062	15 570	72	49	23
2004	29 008	13 892	15 116	70	38	32
2005	29 277	14 002	15 275	53	25	28
2006	29 151	13 980	15 171	58	24	34

Noch: Sterbefälle 1970 - 2006 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung			Sterbefälle im 1. Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	13,95	14,45	13,51	19,02	21,36	16,57
1971	13,39	13,65	13,17	18,20	20,73	15,51
1972	13,62	13,88	13,38	18,95	22,11	15,60
1973	13,46	13,60	13,33	15,89	17,35	14,32
1974	13,48	13,63	13,35	17,69	20,06	15,20
1975	14,28	14,28	14,27	16,24	18,64	13,66
1976	13,81	13,67	13,93	13,60	15,16	11,96
1977	13,42	13,45	13,39	13,88	15,43	12,25
1978	13,99	13,87	14,09	14,32	17,14	11,32
1979	14,07	13,93	14,20	13,66	15,39	11,81
1980	14,41	14,23	14,58	12,39	14,23	10,45
1981	14,08	13,67	14,44	13,05	15,81	10,11
1982	13,84	13,45	14,20	11,61	13,12	10,02
1983	13,65	13,05	14,19	10,52	12,93	7,95
1984	13,68	13,07	14,23	10,28	11,32	9,18
1985	13,85	13,25	14,39	9,84	11,24	8,37
1986	13,90	12,98	14,73	10,16	12,09	8,15
1987	13,34	12,48	14,12	8,73	10,19	7,20
1988	13,31	12,55	14,00	8,32	9,42	7,15
1989	12,73	12,07	13,34	8,11	9,42	6,71
1990	13,39	13,14	13,62	7,98	10,07	5,73
1991	13,41	13,13	13,66	9,10	10,64	7,48
1992	12,73	12,43	13,00	7,86	9,12	6,51
1993	12,49	12,34	12,64	5,75	5,73	5,77
1994	12,21	11,93	12,48	6,37	6,01	6,76
1995	12,19	11,89	12,46	6,18	7,04	5,26
1996	11,95	11,74	12,14	5,70	5,89	5,49
1997	11,38	10,85	11,88	5,00	5,03	4,98
1998	11,53	11,10	11,94	5,31	5,57	5,03
1999	11,29	10,88	11,67	3,85	4,03	3,66
2000	11,46	11,17	11,73	4,22	4,63	3,77
2001	11,40	11,04	11,74	4,04	4,40	3,65
2002	11,76	11,41	12,09	4,94	5,16	4,70
2003	11,69	11,38	11,98	4,26	5,63	2,81
2004	11,56	11,34	11,76	4,04	4,22	3,84
2005	11,79	11,56	12,02	3,09	2,88	3,30
2006	11,87	11,65	12,08	3,43	2,72	4,20



Sterbefälle 1996 - 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Ge- schl.	Sterbefälle										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Unter 1	i	92	86	93	70	79	73	87	72	70	53	58
	m	49	45	50	38	45	41	47	49	38	25	24
	w	43	41	43	32	34	32	40	23	32	28	34
1 - 15	i	89	74	71	82	67	58	55	41	39	35	22
	m	56	45	42	46	40	37	31	25	18	20	9
	w	33	29	29	36	27	21	24	16	21	15	13
15 - 35	i	711	641	581	498	511	454	382	387	386	372	310
	m	529	485	428	372	368	328	286	296	282	276	233
	w	182	156	153	126	143	126	96	91	104	96	77
35 - 55	i	2 689	2 500	2 371	2 262	2 351	2 379	2 557	2 500	2 361	2 461	2 366
	m	1 935	1 765	1 697	1 651	1 723	1 697	1 872	1 838	1 714	1 765	1 685
	w	754	735	674	611	628	682	685	662	647	696	681
55 - 75	i	11 816	10 914	11 035	10 605	10 729	10 306	10 222	9 751	9 623	9 344	9 215
	m	7 052	6 443	6 735	6 595	6 687	6 455	6 450	6 286	6 234	5 940	5 999
	w	4 764	4 471	4 300	4 010	4 042	3 851	3 772	3 465	3 389	3 404	3 216
75 und mehr	i	17 242	16 677	16 860	16 542	16 438	16 351	16 856	16 881	16 529	17 012	17 180
	m	5 918	5 511	5 544	5 374	5 435	5 396	5 564	5 568	5 606	5 976	6 030
	w	11 324	11 166	11 316	11 168	11 003	10 955	11 292	11 313	10 923	11 036	11 150
Insgesamt	i	32 639	30 892	31 011	30 059	30 175	29 621	30 159	29 632	29 008	29 277	29 151
	m	15 539	14 294	14 496	14 076	14 298	13 954	14 250	14 062	13 892	14 002	13 980
	w	17 100	16 598	16 515	15 983	15 877	15 667	15 909	15 570	15 116	15 275	15 171

Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
I A00-B99	i	71	114	98	113	89	80	99	115	143	132	127
	m	36	62	52	65	45	40	50	56	72	68	63
	w	35	52	46	48	44	40	49	59	71	64	64
II C00-D48	i	7 766	7 608	7 392	7 294	7 438	7 495	7 688	7 356	7 560	7 683	7 584
	m	4 125	3 843	3 845	3 882	3 935	3 967	4 130	4 047	4 232	4 199	4 140
	w	3 641	3 765	3 547	3 412	3 503	3 528	3 558	3 309	3 328	3 484	3 408
dar. C00-C97	i	7 612	7 458	7 244	7 142	7 277	7 344	7 534	7 208	7 382	7 497	7 337
	m	4 066	3 786	3 774	3 818	3 865	3 901	4 070	3 979	4 159	4 120	4 060
	w	3 546	3 672	3 470	3 324	3 412	3 443	3 464	3 229	3 223	3 377	3 277
C15-C26	i	2 757	2 742	2 513	2 472	2 484	2 625	2 684	2 499	2 493	2 532	2 510
	m	1 317	1 277	1 180	1 239	1 220	1 306	1 373	1 289	1 345	1 343	1 358
	w	1 440	1 465	1 333	1 233	1 264	1 319	1 311	1 210	1 148	1 189	1 152
C30-C39	i	1 606	1 489	1 561	1 425	1 584	1 472	1 536	1 467	1 471	1 581	1 549
	m	1 317	1 172	1 259	1 142	1 255	1 161	1 213	1 172	1 175	1 221	1 178
	w	289	317	302	283	329	311	323	295	296	360	371
C81-C96	i	547	501	499	530	575	527	581	511	586	554	566
	m	283	242	247	262	272	258	282	249	321	268	265
	w	264	259	252	268	303	269	299	262	265	286	301
III D50-D89	i	50	50	67	53	71	64	70	73	52	67	67
	m	20	20	21	24	28	25	28	28	16	24	23
	w	30	30	46	29	43	39	42	45	36	43	44
IV E00-E90	i	1 365	1 141	1 185	1 103	1 246	1 249	1 396	1 388	1 573	1 439	1 542
	m	474	384	390	372	439	436	475	497	532	522	577
	w	891	757	795	731	807	813	921	891	1 041	917	965
dar. E10-E14	i	1 249	1 042	1 080	1 013	1 108	1 124	1 267	1 273	1 430	1 319	1 419
	m	432	342	350	342	401	386	429	448	480	470	527
	w	817	700	730	671	707	738	838	825	950	849	892
V F00-F99	i	416	383	252	164	198	178	155	167	176	191	220
	m	243	225	178	124	163	132	125	132	145	155	176
	w	173	158	74	40	35	46	30	35	31	36	44
VI-VIII G00-H95	i	334	412	383	414	478	514	565	542	620	576	625
	m	160	188	198	205	226	247	283	256	293	276	305
	w	174	224	185	209	252	267	282	286	327	300	320
IX I00-I99	i	17 084	15 903	16 394	15 856	15 387	14 969	15 075	15 072	14 086	14 093	14 052
	m	7 147	6 415	6 615	6 366	6 302	6 114	6 148	6 138	5 804	5 809	5 561
	w	9 937	9 488	9 779	9 490	9 085	8 855	8 927	8 934	8 282	8 284	8 191
dar. I21, I22	i	3 668	3 367	3 319	3 261	3 211	3 092	3 085	3 002	2 790	2 906	2 717
	m	2 157	1 895	1 848	1 832	1 786	1 733	1 702	1 704	1 553	1 613	1 563
	w	1 511	1 472	1 471	1 429	1 425	1 359	1 383	1 298	1 237	1 293	1 181
I60-I69	i	4 159	3 967	4 166	3 799	3 543	3 421	3 448	3 292	2 943	2 930	2 762
	m	1 496	1 329	1 486	1 314	1 268	1 186	1 246	1 163	1 078	1 052	1 045
	w	2 663	2 638	2 680	2 485	2 275	2 235	2 202	2 129	1 865	1 878	1 717
X J00-J99	i	1 306	1 219	1 317	1 338	1 348	1 258	1 088	1 010	958	1 090	1 012
	m	733	705	765	718	752	719	608	573	521	597	532
	w	573	514	552	620	596	539	480	437	437	493	480
dar. J40-J47	i	767	764	807	787	748	730	692	680	588	602	530
	m	484	477	508	470	468	461	414	405	346	366	304
	w	283	287	299	317	280	269	278	275	242	236	226

Noch: Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
XI K00-K93	i	1 762	1 704	1 725	1 660	1 706	1 630	1 827	1 687	1 698	1 706	1 742
	m	1 059	984	1 028	1 023	1 034	970	1 067	1 006	979	1 013	965
	w	703	720	697	637	672	660	760	681	719	693	777
dar. K70-K77	i	1 035	1 044	1 007	989	975	917	999	897	878	857	797
	m	745	721	716	717	710	660	707	674	639	630	565
	w	290	323	291	272	265	257	292	223	239	227	232
XII L00-L99	i	17	18	9	9	9	6	4	3	3	3	6
	m	4	8	1	2	2	4	3	1	1	-	2
	w	13	10	8	7	7	2	1	2	2	3	4
XIII M00-M99	i	77	92	83	67	74	64	76	55	55	63	60
	m	23	29	28	22	14	19	21	15	18	20	24
	w	54	63	55	45	60	45	55	40	37	43	36
XIV N00-N99	i	269	264	287	305	366	418	440	411	416	524	558
	m	113	117	125	141	178	192	191	174	184	230	270
	w	156	147	162	164	188	226	249	237	232	294	288
XV O00-O99	i	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	1	3	-	-	1	2	2	-	2	2	2
XVI P00-P96	i	45	42	48	36	37	38	49	40	37	35	27
	m	25	22	23	15	22	20	26	29	19	14	15
	w	20	20	25	21	15	18	23	11	18	21	12
XVII Q00-Q99	i	62	46	50	54	60	45	40	43	56	48	35
	m	37	26	27	31	31	19	22	22	30	28	14
	w	25	20	23	23	29	26	18	21	26	20	21
XVIII R00-R99	i	308	251	234	267	272	295	345	392	342	393	442
	m	205	159	150	164	180	176	234	241	222	234	298
	w	103	92	84	103	92	119	111	151	120	159	144
XIX S00-T98	i	1 706	1 642	1 487	1 326	1 395	1 316	1 240	1 278	1 231	1 232	1 086
	m	1 135	1 107	1 050	922	947	874	839	847	824	813	715
	w	571	535	437	404	448	442	401	431	407	419	371
XX V01-X59, Y40-Y86, Y88	i	1 062	1 019	930	827	887	796	736	812	699	687	598
	m	662	646	630	537	574	491	455	506	440	415	369
	w	400	373	300	290	313	305	281	306	259	272	229
dar. V01-V99	i	484	478	463	368	398	343	274	330	274	259	220
	m	356	347	358	275	301	252	201	246	200	193	169
	w	128	131	105	93	97	91	73	84	74	66	51
W00-W19	i	359	345	257	257	235	232	263	264	275	252	163
	m	150	156	123	124	121	108	127	122	129	101	84
	w	209	189	134	133	114	124	136	142	146	151	79
X60-X84	i	544	497	471	436	435	432	424	382	330	258	193
	m	398	374	357	341	324	318	331	284	245	192	148
	w	146	123	114	95	111	114	93	98	85	66	45
Insgesamt A00-T98	i	32 639	30 892	31 011	30 059	30 175	29 621	30 159	29 632	29 008	29 277	29 151
	m	15 539	14 294	14 496	14 076	14 298	13 954	14 250	14 062	13 892	14 002	14 980
	w	17 100	16 598	16 515	15 983	15 877	15 667	15 909	15 570	15 116	15 275	15 171
dar. Säuglinge	i	92	86	93	70	79	73	87	72	70	53	58
	m	49	45	50	38	45	41	47	49	38	25	24
	w	43	41	43	32	34	32	40	23	32	28	34

Noch: Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
I A00-B99	i	2,6	4,2	3,6	4,2	3,4	3,1	3,9	4,5	5,7	5,3	5,2
	m	2,7	4,7	4,0	5,0	3,5	3,2	4,0	4,5	5,9	5,6	5,3
	w	2,5	3,7	3,3	3,5	3,3	3,0	3,7	4,5	5,5	5,0	5,1
II C00-D48	i	284,3	280,3	274,8	273,9	282,5	288,4	299,7	290,1	301,2	309,5	307,4
	m	311,7	291,7	294,4	300,1	307,5	313,9	330,7	327,4	345,6	346,6	345,1
	w	258,6	269,5	256,3	249,2	258,9	264,4	270,4	254,7	258,9	274,2	271,3
dar. C00-C97	i	278,7	274,8	269,3	268,2	276,4	282,6	293,7	284,3	294,1	302,0	298,8
	m	307,3	287,4	289,0	295,1	302,0	308,7	325,9	321,9	339,6	340,0	338,5
	w	251,8	262,8	250,8	242,8	252,1	258,0	263,2	248,5	250,8	265,7	260,9
C15-C26	i	100,9	101,0	93,4	92,8	94,3	101,0	104,6	98,6	99,3	102,0	102,2
	m	99,5	96,9	90,4	95,8	95,3	103,3	109,9	104,3	109,8	110,8	113,2
	w	102,3	104,9	96,3	90,1	93,4	98,8	99,6	93,1	89,3	93,6	91,7
C30-C39	i	58,8	54,9	58,0	53,5	60,2	56,7	59,9	57,9	58,6	63,7	63,1
	m	99,5	89,0	96,4	88,3	98,1	91,9	97,1	94,8	96,0	100,8	98,2
	w	20,5	22,7	21,8	20,7	24,3	23,3	24,5	22,7	23,0	28,3	29,5
C81-C96	i	20,0	18,5	18,6	19,9	21,8	20,3	22,7	20,2	23,3	22,3	23,0
	m	21,4	18,4	18,9	20,3	21,3	20,4	22,6	20,1	26,2	22,1	22,1
	w	18,7	18,5	18,2	19,6	22,4	20,2	22,7	20,2	20,6	22,5	24,0
III D50-D89	i	1,8	1,8	2,5	2,0	2,7	2,5	2,7	2,9	2,1	2,7	2,7
	m	1,5	1,5	1,6	1,9	2,2	2,0	2,2	2,3	1,3	2,0	1,9
	w	2,1	2,1	3,3	2,1	3,2	2,9	3,2	3,5	2,8	3,4	3,5
IV E00-E90	i	50,0	42,0	44,1	41,4	47,3	48,1	54,4	54,7	62,7	58,0	62,8
	m	35,8	29,2	29,9	28,8	34,3	34,5	38,0	40,2	43,4	43,1	48,1
	w	63,3	54,2	57,5	53,4	59,6	60,9	70,0	68,6	81,0	72,2	76,8
dar. E10-E14	i	45,7	38,4	40,2	38,0	42,1	43,3	49,4	50,2	57,0	53,1	57,8
	m	32,6	26,0	26,8	26,4	31,3	30,5	34,4	36,2	39,2	38,8	43,9
	w	58,0	50,1	52,8	49,0	52,2	55,3	63,7	63,5	73,9	66,8	71,0
V F00-F99	i	15,2	14,1	9,4	6,2	7,5	6,9	6,0	6,6	7,0	7,7	9,0
	m	18,4	17,1	13,6	9,6	12,7	10,4	10,0	10,7	11,8	12,8	14,7
	w	12,3	11,3	5,3	2,9	2,6	3,4	2,3	2,7	2,4	2,8	3,5
VI-VIII G00-H95	i	12,2	15,2	14,2	15,5	18,2	19,8	22,0	21,4	24,7	23,2	25,5
	m	12,1	14,3	15,2	15,8	17,7	19,5	22,7	20,7	23,9	22,8	25,4
	w	12,4	16,0	13,4	15,2	18,6	20,0	21,4	22,0	25,4	23,6	25,5
IX I00-I99	i	625,4	585,9	609,5	595,5	584,4	576,1	587,8	594,5	561,2	567,7	572,2
	m	540,1	487,0	506,5	492,1	492,4	483,8	492,3	496,6	474,0	479,4	488,6
	w	705,7	679,2	706,7	693,2	671,4	663,5	678,3	687,6	644,4	651,9	652,0
dar. I21, I22	i	134,3	124,0	123,4	122,5	122,0	119,0	120,3	118,4	111,2	117,1	110,6
	m	163,0	143,7	141,5	141,6	139,6	137,1	136,3	137,9	126,8	133,1	128,0
	w	107,3	105,4	106,3	104,4	105,3	101,8	105,1	99,9	96,2	101,7	94,0
I60-I69	i	152,3	146,2	154,9	142,7	134,6	131,7	134,4	129,8	117,3	118,0	112,5
	m	113,0	100,9	113,8	101,6	99,1	93,8	99,8	94,1	88,0	86,8	87,1
	w	189,1	188,8	193,7	181,5	168,1	167,5	167,3	163,9	145,1	147,8	136,7
X J00-J99	i	47,8	44,9	49,0	50,2	51,2	48,4	42,4	39,8	38,2	43,9	41,2
	m	55,4	53,5	58,6	55,5	58,8	56,9	48,7	46,4	42,5	49,3	44,3
	w	40,7	36,8	39,9	45,3	44,0	40,4	36,5	33,6	34,0	38,8	38,2
dar. J40-J47	i	28,1	28,1	30,0	29,6	28,4	28,1	27,0	26,8	23,4	24,3	21,6
	m	36,6	36,2	38,9	36,3	36,6	36,5	33,2	32,8	28,3	30,2	25,3
	w	20,1	20,5	21,6	23,2	20,7	20,2	21,1	21,2	18,8	18,6	18,0

Noch: Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
XI K00-K93	i	64,5	62,8	64,1	62,3	64,8	62,7	71,2	66,5	67,7	68,7	70,9
	m	80,0	74,7	78,7	79,1	80,8	76,8	85,4	81,4	79,9	83,6	80,4
	w	49,9	51,5	50,4	46,5	49,7	49,5	57,8	52,4	55,9	54,5	61,9
dar. K70-K77	i	37,9	38,5	37,4	37,1	37,0	35,3	38,9	35,4	35,0	34,5	32,5
	m	56,3	54,7	54,8	55,4	55,5	52,2	56,6	54,4	52,2	52,0	47,1
	w	20,6	23,1	21,0	19,9	19,6	19,3	22,2	17,2	18,6	17,9	18,5
XII L00-L99	i	0,6	0,7	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
	m	0,3	0,6	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	-	0,2
	w	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
XIII M00-M99	i	2,8	3,4	3,1	2,5	2,8	2,5	3,0	2,2	2,2	2,5	2,4
	m	1,7	2,2	2,1	1,7	1,1	1,5	1,7	1,2	1,5	1,7	2,0
	w	3,8	4,5	4,0	3,3	4,4	3,4	4,2	3,1	2,9	3,4	2,9
XIV N00-N99	i	9,8	9,7	10,7	11,5	13,9	16,1	17,2	16,2	16,6	21,1	22,7
	m	8,5	8,9	9,6	10,9	13,9	15,2	15,3	14,1	15,0	19,0	22,5
	w	11,1	10,5	11,7	12,0	13,9	16,9	18,9	18,2	18,1	23,1	22,9
XV O00-O99 ¹⁾	i	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	6,2	17,4	-	-	5,3	11,1	11,4	-	11,5	11,7	0,2
XVI P00-P96	i	1,6	1,5	1,8	1,4	1,4	1,5	1,9	1,6	1,5	1,4	1,1
	m	1,9	1,7	1,8	1,2	1,7	1,6	2,1	2,4	1,6	1,2	1,3
	w	1,4	1,4	1,8	1,5	1,1	1,3	1,8	0,9	1,4	1,7	1,0
XVII Q00-Q99	i	2,3	1,7	1,9	2,0	2,3	1,7	1,6	1,7	2,2	1,9	1,4
	m	2,8	2,0	2,1	2,4	2,4	1,5	1,8	1,8	2,4	2,3	1,2
	w	1,8	1,4	1,7	1,7	2,1	1,9	1,4	1,6	2,0	1,6	1,7
XVIII R00-R99	i	11,3	9,2	8,7	10,0	10,3	11,4	13,5	15,5	13,6	15,8	18,0
	m	15,5	12,1	11,5	12,7	14,1	13,9	18,7	19,5	18,1	19,3	24,8
	w	7,3	6,6	6,1	7,5	6,8	8,9	8,4	11,6	9,3	12,5	11,5
XIX S00-T98	i	62,5	60,5	55,3	49,8	53,0	50,6	48,3	50,4	49,0	49,6	44,2
	m	85,8	84,0	80,4	71,3	74,0	69,2	67,2	68,5	67,3	67,1	59,6
	w	40,5	38,3	31,6	29,5	33,1	33,1	30,5	33,2	31,7	33,0	29,5
XX V01-X59, Y40-Y86, Y88	i	38,9	37,5	34,6	31,1	33,7	30,6	28,7	32,0	27,9	27,7	24,4
	m	50,0	49,0	48,2	41,5	44,8	38,9	36,4	40,9	35,9	34,3	30,8
	w	28,4	26,7	21,7	21,2	23,1	22,9	21,4	23,6	20,2	21,4	18,2
dar. V01-V99	i	17,7	17,6	17,2	13,8	15,1	13,2	10,7	13,0	10,9	10,4	9,0
	m	26,9	26,3	27,4	21,3	23,5	19,9	16,1	19,9	16,3	15,9	14,1
	w	9,1	9,4	7,6	6,8	7,2	6,8	5,5	6,5	5,8	5,2	4,1
W00-W19	i	13,1	12,7	9,6	9,7	8,9	8,9	10,3	10,4	11,0	10,2	6,6
	m	11,3	11,8	9,4	9,6	9,5	8,5	10,2	9,9	10,5	8,3	7,0
	w	14,8	13,5	9,7	9,7	8,4	9,3	10,3	10,9	11,4	11,9	6,3
X60-X84	i	19,9	18,3	17,5	16,4	16,5	16,6	16,5	15,1	13,1	10,4	7,9
	m	30,1	28,4	27,3	26,4	25,3	25,2	26,5	23,0	20,0	15,8	12,3
	w	10,4	8,8	8,2	6,9	8,2	8,5	7,1	7,5	6,6	5,2	3,6
Insgesamt A00-T98	i	1 194,9	1 138,1	1 153,0	1 128,9	1 146,0	1 140,0	1 175,9	1 168,7	1 155,8	1 179,4	1 187,0
	m	1 174,2	1 085,2	1 110,0	1 088,1	1 117,2	1 104,1	1 141,1	1 137,6	1 134,4	1 155,6	1 165,4
	w	1 214,3	1 188,1	1 193,5	1 167,5	1 173,3	1 174,0	1 208,9	1 198,3	1 176,1	1 202,0	1 207,7
dar. Säuglinge ²⁾	i	569,6	500,2	531,0	385,1	421,9	403,9	493,8	427,3	403,8	308,7	342,6
	m	588,5	502,5	557,5	403,1	463,2	440,2	515,8	565,6	421,7	288,2	271,6
	w	549,5	497,6	503,3	365,7	377,5	365,3	470,4	281,0	384,4	329,7	420,3

1) Müttersterbefälle bezogen auf je 100 000 Lebendgeborene 2) Säuglingssterbefälle bezogen auf je 100 000 Lebendgeborene

Sterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht



- Neubildungen
- Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
- Krankheiten des Kreislaufsystems
- Krankheiten des Atmungssystems
- Krankheiten des Verdauungssystems
- Verletzungen und Vergiftungen
- Übrige


Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1996 - 2006 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
I00 - I02	i	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I05 - I09	i	44	66	114	100	87	95	82	78	65	79	87
	m	15	24	30	22	26	26	30	22	19	24	27
	w	29	42	84	78	61	69	52	56	46	55	60
I10 - I15	i	741	712	638	671	752	876	1 067	1 208	1 328	1 479	1 547
	m	245	215	221	219	253	289	337	379	431	484	475
	w	496	497	417	452	499	587	730	829	897	995	1 072
I20 - I25	i	8 535	7 812	7 989	7 779	7 555	7 403	7 519	7 344	6 804	6 653	6 379
	m	3 997	3 587	3 610	3 484	3 404	3 386	3 347	3 299	3 133	3 059	2 997
	w	4 538	4 225	4 379	4 295	4 151	4 017	4 172	4 045	3 671	3 594	3 382
dar. I21, I22	i	3 668	3 367	3 319	3 261	3 211	3 092	3 085	3 002	2 790	2 906	2 717
	m	2 157	1 895	1 848	1 832	1 786	1 733	1 702	1 704	1 553	1 613	1 536
	w	1 511	1 472	1 471	1 429	1 425	1 359	1 383	1 298	1 237	1 293	1 181
I26 - I28	i	285	258	308	304	336	285	217	175	234	189	238
	m	127	120	144	144	145	138	105	87	105	79	101
	w	158	138	164	160	191	147	112	88	129	110	137
I30 - I52	i	2 054	1 842	2 005	2 014	2 076	1 886	1 782	1 942	1 880	1 932	2 222
	m	801	688	731	729	800	709	707	796	708	768	890
	w	1 253	1 154	1 274	1 285	1 276	1 177	1 075	1 146	1 172	1 164	1 332
I60 - I69	i	4 159	3 967	4 166	3 799	3 543	3 421	3 448	3 292	2 943	2 930	2 762
	m	1 496	1 329	1 486	1 314	1 268	1 186	1 246	1 163	1 078	1 052	1 045
	w	2 663	2 638	2 680	2 485	2 275	2 235	2 202	2 129	1 865	1 878	1 717
dar. I64	i	1 877	1 803	1 785	1 647	1 451	1 333	1 212	1 137	853	858	800
	m	654	586	619	558	507	443	401	381	285	274	287
	w	1 223	1 217	1 166	1 089	944	890	811	756	568	584	513
I70 - I79	i	1 154	1 140	1 061	1 082	891	871	841	929	747	734	740
	m	419	400	356	411	343	320	327	355	305	307	293
	w	735	740	705	671	548	551	514	574	442	427	447
dar. I70	i	936	938	847	839	639	617	594	663	497	472	484
	m	307	280	248	271	213	187	198	220	179	169	159
	w	629	658	599	568	426	430	396	443	318	303	325
I80 - I99	i	110	106	113	107	147	127	119	104	85	97	76
	m	45	52	37	43	63	59	49	37	25	36	33
	w	65	54	76	64	84	68	70	67	60	61	43
Insgesamt I00-I99	i	17 084	15 903	16 394	15 856	15 387	14 969	15 075	15 072	14 086	14 093	14 052
	m	7 147	6 415	6 615	6 366	6 302	6 114	6 148	6 138	5 804	5 809	5 861
	w	9 937	9 488	9 779	9 490	9 085	8 855	8 927	8 934	8 282	8 284	8 191

Noch: Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1996 - 2006 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
I00 - I02	i	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	m	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
I05 - I09	i	1,6	2,4	4,2	3,8	3,3	3,7	3,2	3,1	2,6	3,2	3,5
	m	1,1	1,8	2,3	1,7	2,0	2,1	2,4	1,8	1,6	2,0	2,3
	w	2,1	3,0	6,1	5,7	4,5	5,2	4,0	4,3	3,6	4,3	4,8
I10 - I15	i	27,1	26,2	23,7	25,2	28,6	33,7	41,6	47,6	52,9	59,6	63,0
	m	18,5	16,3	16,9	16,9	19,8	22,9	27,0	30,7	35,2	39,9	39,6
	w	35,2	35,6	30,1	33,0	36,9	44,0	55,5	63,8	69,8	78,3	85,3
I20 - I25	i	312,5	287,8	297,0	292,1	286,9	284,9	293,2	289,7	271,1	268,0	259,8
	m	302,0	272,3	276,4	269,3	266,0	267,9	268,0	266,9	255,8	252,5	249,8
	w	322,3	302,4	316,5	313,7	306,8	301,0	317,0	311,3	285,6	282,8	269,2
dar. I21, I22	i	134,3	124,0	123,4	122,5	122,0	119,0	120,3	118,4	111,2	117,1	110,6
	m	163,0	143,9	141,5	141,6	139,6	137,1	136,3	137,9	126,8	133,1	128,0
	w	107,3	105,4	106,3	104,4	105,3	101,8	105,1	99,9	96,2	101,7	94,0
I26 - I28	i	10,4	9,5	11,5	11,4	12,8	11,0	8,5	6,9	9,3	7,6	9,7
	m	9,6	9,1	11,0	11,1	11,3	10,9	8,4	7,0	8,6	6,5	8,4
	w	11,2	9,9	11,9	11,7	14,1	11,0	8,4	6,8	10,0	8,7	10,9
I30 - I52	i	75,2	67,9	74,5	75,6	78,8	72,6	69,5	76,6	74,9	77,8	90,5
	m	60,5	52,2	56,0	56,4	62,5	56,1	56,6	64,4	57,8	63,4	74,2
	w	89,0	82,6	92,1	93,9	94,3	88,2	81,7	88,2	91,2	91,6	106,0
I60 - I69	i	152,3	146,2	154,9	142,7	134,6	131,7	134,4	129,8	117,3	118,0	112,5
	m	113,0	100,9	113,8	101,6	99,1	93,8	99,8	94,1	88,0	86,8	87,1
	w	189,1	188,8	193,7	181,5	168,1	167,5	167,3	163,9	145,1	147,8	136,7
dar. I64	i	68,7	66,4	66,4	61,9	55,1	51,3	47,3	44,8	34,0	34,6	32,6
	m	48,4	44,5	47,4	43,1	39,6	35,1	32,1	30,8	23,3	22,6	23,9
	w	86,8	87,1	84,3	79,5	69,8	66,7	61,6	58,2	44,2	46,0	40,8
I70 - I79	i	42,2	42,0	39,4	40,6	33,8	33,5	32,8	36,6	29,8	29,6	30,1
	m	31,7	30,4	27,3	31,8	26,8	25,3	26,2	28,7	24,9	25,3	24,4
	w	52,2	53,0	50,9	49,0	40,5	41,3	39,1	44,2	34,4	33,6	35,6
dar. I70	i	34,3	34,6	31,5	31,5	24,3	23,7	23,2	26,1	19,8	19,0	19,7
	m	23,2	21,3	19,0	20,9	16,6	14,8	15,9	17,8	14,6	13,9	13,3
	w	44,7	47,1	43,3	41,5	31,5	32,2	30,1	34,1	24,7	23,8	25,9
I80 - I99	i	4,0	3,9	4,2	4,0	5,6	4,9	4,6	4,1	3,4	3,9	3,1
	m	3,4	3,9	2,8	3,3	4,9	4,7	3,9	3,0	2,0	3,0	2,8
	w	4,6	3,9	5,5	4,7	6,2	5,1	5,3	5,2	4,7	4,8	3,4
Insgesamt I00-I99	i	625,4	585,9	609,5	595,5	584,4	576,1	587,8	594,5	561,2	567,7	572,2
	m	540,1	487,0	506,5	492,1	492,4	483,8	492,3	496,6	474,0	479,4	488,6
	w	705,7	679,2	706,7	693,2	671,4	663,5	678,3	687,6	644,4	651,9	652,0

Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1996 - 2006 nach Geschlecht



- Hochdruck
- Sonstige ischämische Krankheiten
- Atherosklerose
- Myokardinfarkt
- Krankheiten des zervaskulären Systems
- Übrige Herzkrankheiten

Unfälle 1996 - 2006 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Unfall- kategorie	Ge- schl.	Sterbefälle										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Arbeits- / Schulunfall	i	43	36	36	44	37	33	18	35	28	29	33
	m	42	35	33	42	36	31	17	33	28	26	30
	w	1	1	3	2	1	2	1	2	-	3	3
Verkehrs- unfall	i	481	478	451	354	382	323	267	318	259	250	207
	m	354	342	345	264	284	235	196	235	187	187	156
	w	127	136	106	90	98	88	71	83	72	63	51
Häuslicher Unfall	i	341	296	268	277	281	261	301	297	262	285	216
	m	151	141	130	139	133	115	142	137	123	126	96
	w	190	155	138	138	148	146	159	160	139	159	120
Sport- / Spielunfall	i	7	13	8	6	6	5	1	7	7	4	1
	m	4	11	6	3	5	4	1	6	5	3	1
	w	3	2	2	3	1	1	-	1	2	1	-
Sonstiger Unfall	i	190	196	167	146	181	174	154	155	143	129	141
	m	111	117	116	89	116	106	101	95	91	78	86
	w	79	79	51	57	65	68	53	60	52	51	55
Insgesamt	i	1 062	1 019	930	827	887	796	741	812	699	697	598
	m	662	646	630	537	574	491	457	506	434	420	369
	w	400	373	300	290	313	305	284	306	265	277	229

Unfall- kategorie	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Arbeits- / Schulunfall	i	1,6	1,3	1,3	1,7	1,4	1,3	0,7	1,4	1,1	1,2	1,3
	m	3,2	2,7	2,5	3,2	2,8	2,5	1,4	2,7	2,3	2,1	2,5
	w	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,2
Verkehrs- unfall	i	17,6	17,6	16,8	13,3	14,5	12,4	10,4	12,5	10,3	10,1	8,4
	m	26,8	26,0	26,4	20,4	22,2	18,6	15,7	19,0	15,3	15,4	13,0
	w	9,0	9,7	7,7	6,6	7,2	6,6	5,4	6,4	5,6	5,0	4,1
Häuslicher Unfall	i	12,5	10,9	10,0	10,4	10,7	10,0	11,7	11,7	10,4	11,5	8,8
	m	11,4	10,7	10,0	10,7	10,4	9,1	11,4	11,1	10,0	10,4	8,0
	w	13,5	11,1	10,0	10,1	10,9	10,9	12,1	12,3	10,8	12,5	9,6
Sport- / Spielunfall	i	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	x	0,3	0,3	0,2	0,0
	m	0,3	0,8	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,5	0,4	0,2	0,1
	w	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-
Sonstiger Unfall	i	7,0	7,2	6,2	5,5	6,9	6,7	6,0	6,1	5,7	5,2	5,7
	m	8,4	8,9	8,9	6,9	9,1	8,4	8,1	7,7	7,4	6,4	7,2
	w	5,6	5,7	3,7	4,2	4,8	5,1	4,0	4,6	4,0	4,0	4,4
Insgesamt	i	38,9	37,5	34,6	31,1	33,7	30,6	28,9	32,0	27,9	28,1	24,4
	m	50,0	49,0	48,2	41,5	44,8	38,9	36,6	40,9	35,4	34,7	30,8
	w	28,4	26,7	21,7	21,2	23,1	22,9	21,6	23,6	20,6	21,8	18,2


Säuglingssterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge											
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
dar.													
I A00-B99	i	1	1	3	-	1	1	2	3	2	1	-	
	m	1	-	1	-	-	-	2	2	1	1	-	
	w	-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	-	
VI- VIII G00-H95	i	1	3	2	1	2	-	3	2	-	-	3	
	m	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	-	
	w	1	2	-	1	1	-	2	-	-	-	3	
X J00-J99	i	-	4	2	1	1	2	3	3	2	2	5	
	m	-	3	1	1	1	2	1	1	1	-	1	
	w	-	1	1	-	-	-	2	2	1	2	4	
XVI P00-P96	i	44	42	47	36	37	37	49	40	37	35	27	
	m	25	22	23	15	22	19	26	29	19	14	15	
	w	19	20	24	21	15	18	23	11	18	21	12	
dar.													
P00-P04	i	7	2	6	6	11	13	12	2	4	5	2	
	m	2	1	4	3	7	8	5	1	2	2	1	
	w	5	1	2	3	4	5	7	1	2	3	1	
P05, P07	i	20	26	24	11	15	10	22	26	20	9	9	
	m	12	13	12	4	6	4	13	18	10	4	5	
	w	8	13	12	7	9	6	9	8	10	5	4	
P20-P29	i	9	8	8	6	7	4	11	6	4	-	8	
	m	6	5	3	4	5	3	8	5	4	-	5	
	w	3	3	5	2	2	1	3	1	-	-	3	
XVII Q00-Q99	i	30	21	26	21	29	17	19	12	13	11	8	
	m	16	13	14	14	16	11	12	6	10	9	3	
	w	14	8	12	7	13	6	7	6	3	2	5	
dar.													
Q20-Q28	i	20	9	17	10	20	10	9	7	8	7	4	
	m	13	5	10	6	11	7	6	4	6	6	2	
	w	7	4	7	4	9	3	3	3	2	1	2	
XVIII R95	i	10	7	6	6	6	9	6	10	8	-	3	
	m	4	3	5	5	5	5	3	7	4	-	2	
	w	6	4	1	1	1	4	3	3	4	-	1	
XIX S00-T98	i	3	3	7	3	2	4	3	2	6	1	3	
	m	2	1	4	2	-	2	1	2	2	1	1	
	w	1	2	3	1	2	2	2	-	4	-	2	
XX V01-X59, Y40-Y86, Y88	i	3	3	1	1	2	1	1	-	1	1	1	
	m	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	1	
	w	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	
dar.													
W75- W84	i	3	1	1	-	1	1	1	-	-	1	1	
	m	2	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	
	w	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
Insgesamt A00-T98	i	92	86	93	70	79	73	87	72	70	53	58	
	m	49	45	50	38	45	41	47	49	38	25	24	
	w	43	41	43	32	34	32	40	23	32	28	34	

Noch: Säuglingssterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
dar.												
I A00-B99	i	6,2	5,8	17,1	-	5,3	5,5	11,4	17,8	11,5	5,8	-
	m	12,0	-	11,1	-	-	-	21,9	23,0	11,1	11,1	-
	w	-	12,1	23,4	-	11,1	11,4	-	12,2	12,0	-	-
VI-VIII G00-H95	i	6,2	17,4	11,4	5,5	10,7	-	17,0	11,8	-	-	5,9
	m	-	11,2	22,3	-	10,3	-	11,0	23,0	-	-	-
	w	12,8	23,4	-	11,4	11,1	-	23,5	-	-	-	12,4
X J00-J99	i	-	23,3	11,4	5,5	5,3	11,1	17,0	17,8	11,5	11,5	29,5
	m	-	33,5	11,1	10,6	10,3	21,5	11,0	11,5	11,1	-	11,3
	w	-	12,1	11,7	-	-	-	23,5	24,4	12,0	24,0	49,4
XVI P00-P96	i	272,4	244,3	268,4	198,1	197,6	204,7	278,1	236,8	213,4	201,9	159,5
	m	300,3	245,7	256,4	159,1	226,4	204,0	285,3	333,5	210,8	155,3	169,7
	w	242,8	242,7	280,9	240,0	166,5	205,5	270,5	134,3	216,2	252,3	148,3
dar.												
P00-P04	i	43,3	11,6	34,3	33,0	58,8	71,9	68,1	11,8	23,1	28,8	11,8
	m	24,0	11,2	44,6	31,8	72,0	85,9	54,9	11,5	22,2	22,2	11,3
	w	63,9	12,1	23,4	34,3	44,4	57,1	82,3	12,2	24,0	36,0	12,4
P05, P07	i	123,8	151,2	137,0	60,5	80,1	55,3	124,9	153,9	115,4	51,9	53,2
	m	144,1	145,2	133,8	42,4	61,8	43,0	142,7	207,0	111,0	44,4	56,6
	w	102,2	157,8	140,4	80,0	99,9	68,5	105,8	97,6	120,1	60,1	49,4
P20-P29	i	55,7	46,5	45,7	33,0	37,4	22,1	62,4	35,5	23,1	-	47,3
	m	72,1	55,8	33,4	42,4	51,5	32,2	87,8	57,5	44,4	-	56,6
	w	38,3	36,4	58,5	22,9	22,2	11,4	35,3	12,2	-	-	37,1
XVII Q00-Q99	i	185,7	122,1	148,5	115,5	154,9	94,1	107,9	71,1	75,0	63,4	47,3
	m	192,2	145,2	156,1	148,5	164,7	118,1	131,7	69,0	111,0	99,9	33,9
	w	178,9	97,1	140,4	80,0	144,3	68,5	82,3	73,2	36,0	24,0	61,8
dar.												
Q20-Q28	i	123,8	52,3	97,1	55,0	106,8	55,3	51,1	41,4	46,1	40,4	23,6
	m	156,1	55,8	111,5	63,7	113,2	75,2	65,8	46,0	66,1	66,6	22,6
	w	89,4	48,5	81,9	45,7	99,9	34,2	35,3	36,6	24,0	12,0	24,7
XVIII R95	i	61,9	40,7	34,3	33,0	32,0	49,8	34,1	59,2	46,1	-	17,7
	m	48,0	33,5	55,7	53,0	51,5	53,7	32,9	80,5	44,4	-	22,6
	w	76,7	48,5	11,7	11,4	11,1	45,7	35,3	36,6	48,0	-	12,4
XIX S00-T98	i	18,6	17,4	40,0	16,5	10,7	22,1	17,0	11,8	34,6	5,8	17,7
	m	24,0	11,2	44,6	21,2	-	21,5	11,0	23,0	22,2	11,1	11,3
	w	12,8	24,3	35,1	11,4	22,2	22,8	23,5	-	48,0	-	24,7
XX V01-X59, dar. Y40-Y86, Y88	i	18,6	17,4	5,7	5,5	10,7	5,5	5,7	-	5,8	5,8	5,9
	m	24,0	11,2	11,1	10,6	-	10,7	11,0	-	-	11,1	11,3
	w	12,8	24,3	-	-	22,2	-	-	-	12,0	-	-
W75-W84	i	18,6	5,8	5,7	-	5,3	5,5	5,7	-	-	5,8	5,9
	m	24,0	11,2	11,1	-	-	10,7	-	-	-	11,1	11,3
	w	12,8	-	-	-	11,1	-	11,8	-	-	-	-
Insgesamt A00-T98	i	569,6	500,2	531,0	385,1	421,9	403,9	493,8	426,3	403,8	305,7	342,6
	m	588,5	502,5	557,5	403,1	463,2	440,2	515,8	563,5	421,7	277,4	271,6
	w	549,5	497,6	503,3	365,7	355,3	365,3	470,4	280,7	384,4	336,3	420,3

Säuglingssterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht




- Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
- Verletzungen und Vergiftungen
- Plötzlicher Kindstod
- Angeborene Fehlbildungen
- Krankheiten des Atmungssystems
- Übrige

Säuglingssterblichkeit 1996 - 2006 nach Geschlecht

Vorgang	Ge- schl.	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Lebend- geborene	i	16 152	17 194	17 513	18 176	18 723	18 073	17 617	16 889	17 337	17 166	16 927
	m	8 326	8 955	8 969	9 426	9 716	9 313	9 113	8 696	9 012	8 674	8 838
	w	7 826	8 239	8 544	8 750	9 007	8 760	8 504	8 193	8 325	8 492	8 089
Totgeborene	i	100	75	85	87	76	75	71	87	77	66	57
	m	66	46	46	43	39	39	40	49	40	36	25
	w	34	29	39	44	37	36	31	38	37	30	32
Gestorbene Säuglinge	i	92	86	93	70	79	73	87	72	70	53	58
	m	49	45	50	38	45	41	47	49	38	25	24
	w	43	41	43	32	34	32	40	23	32	28	34
dar. in den ersten 7 Tagen	i	39	30	40	35	43	38	48	30	46	30	22
	m	24	16	12	17	21	19	28	20	27	17	11
	w	15	14	28	18	22	19	20	10	19	13	11
Säuglings- sterblichkeit ¹⁾	i	5,78	5,05	5,33	3,87	4,24	4,02	4,94	4,26	4,04	3,09	3,43
	m	5,94	5,07	5,58	4,06	4,66	4,38	5,16	5,63	4,22	2,88	2,72
	w	5,61	5,03	5,06	3,66	3,79	3,64	4,70	2,81	3,84	3,30	4,20
Frühsterblich- keit	i	2,41	1,74	2,28	1,93	2,30	2,10	2,73	1,78	2,65	1,75	1,30
	m	2,88	1,79	1,34	1,80	2,16	2,04	3,07	2,30	3,00	1,96	1,24
	w	1,92	1,70	3,28	2,06	2,44	2,17	2,35	1,22	2,28	1,53	1,36
Totgeborenen- rate	i	6,15	4,34	4,83	4,76	4,04	4,13	4,01	5,12	4,42	3,83	3,36
	m	7,86	5,11	5,10	4,54	4,00	4,17	4,37	5,60	4,42	4,13	2,82
	w	4,33	3,51	4,54	5,00	4,09	4,09	3,63	4,62	4,43	3,52	3,94
Perinatale Mortalität	i	8,55	6,08	7,10	6,68	6,33	6,23	6,73	6,89	7,06	5,57	4,65
	m	10,72	6,89	6,43	6,34	6,15	6,20	7,43	7,89	7,40	6,08	4,06
	w	6,23	5,20	7,81	7,05	6,52	6,25	5,98	5,83	6,70	5,05	5,29

1) Auf je 1 000 Lebendgeborene unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung berechnet




Kindersterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder											
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
dar.													
I A00-B99	i	1	2	1	2	3	2	6	1	1	1	-	
	m	1	1	1	1	2	1	3	1	1	-	-	
	w	-	1	-	1	1	1	3	-	-	1	-	
II C00-D48	i	11	9	15	11	13	8	11	6	6	3	4	
	m	7	2	5	7	7	6	7	2	1	2	1	
	w	4	7	10	4	6	2	4	4	5	1	3	
dar.													
C81-C96	i	2	2	7	3	6	4	4	2	3	1	-	
	m	2	-	3	2	3	3	3	-	1	1	-	
	w	-	2	4	1	3	1	1	2	2	-	-	
VI- VIII	G00-H95	i	9	9	5	11	10	2	5	-	9	4	
	m	4	5	5	5	5	2	3	-	5	4	2	
	w	5	4	-	6	5	-	2	-	4	5	2	
IX	I00-I99	i	4	1	4	-	3	3	2	4	2	3	-
	m	4	1	1	-	1	2	-	2	1	2	-	
	w	-	-	3	-	2	1	2	2	1	1	-	
X	J00-J99	i	-	4	6	4	2	4	5	1	-	2	1
	m	-	2	2	2	2	4	5	1	-	-	1	-
	w	-	2	4	2	-	-	-	-	-	2	-	
XVII	Q00-Q99	i	10	7	7	9	8	2	5	4	7	3	6
	m	8	4	5	5	5	2	1	1	1	1	1	1
	w	2	3	2	4	3	-	4	3	6	2	5	
XIX	S00-T98	i	48	38	27	33	23	30	17	17	13	11	5
	m	30	29	18	19	16	16	11	14	8	9	3	-
	w	18	9	9	14	7	14	6	3	5	2	2	-
XX	V01-X59, Y40-Y86, Y88	i	43	34	25	27	17	27	12	13	10	10	3
	m	27	26	16	16	12	13	7	12	6	8	2	-
	w	16	8	9	11	5	14	5	1	4	2	1	-
dar.													
V01-V99	i	18	16	12	12	12	13	7	5	4	5	2	-
	m	10	13	8	8	7	7	4	4	1	4	2	-
	w	8	3	4	4	5	6	3	1	3	1	-	-
W65- W74	i	5	8	2	5	2	3	4	5	4	1	1	-
	m	4	6	1	3	2	2	3	5	4	1	-	-
	w	1	2	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-
X00-X09	i	10	4	5	3	1	4	-	1	1	-	-	-
	m	6	3	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-
	w	4	1	2	1	-	3	-	-	1	-	-	-
Insgesamt A00-T98	i	89	74	71	82	67	58	55	41	39	35	22	-
	m	56	45	42	46	40	37	31	25	18	20	9	-
	w	33	29	29	36	27	21	24	16	21	15	13	-

Noch: Kindersterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
dar.												
I A00-B99	i	0,2	0,5	0,3	0,6	0,9	0,7	2,1	0,4	0,4	0,4	-
	m	0,5	0,5	0,5	0,6	1,2	0,7	2,0	0,7	0,8	-	-
	w	-	0,5	-	0,6	0,6	0,7	2,2	-	-	0,8	-
II C00-D48	i	2,7	2,3	4,1	3,2	4,1	2,7	3,8	2,3	2,4	1,3	1,7
	m	3,3	1,0	2,6	3,9	4,3	3,9	4,7	1,5	0,8	1,6	0,8
	w	2,0	3,7	5,6	2,4	3,9	1,4	2,9	3,2	4,1	0,9	2,7
dar. C81-C96	i	0,5	0,5	1,9	0,9	1,9	1,3	1,4	0,8	1,2	0,4	-
	m	0,9	-	1,6	1,1	1,8	2,0	2,0	-	0,4	0,8	-
	w	-	1,1	2,2	0,6	1,9	0,7	0,7	1,6	1,6	-	-
VI- VIII G00-H95	i	2,2	2,3	1,4	3,2	3,1	0,7	1,7	-	3,6	3,8	1,7
	m	1,9	2,5	2,6	2,8	3,1	1,3	2,0	-	2,0	1,7	1,7
	w	2,5	2,1	-	3,5	3,2	-	1,4	-	3,3	4,3	1,8
IX I00-I99	i	1,0	0,3	1,1	-	0,9	1,0	0,7	1,5	0,8	1,3	-
	m	1,9	0,5	0,5	-	0,6	1,3	-	1,5	0,8	1,6	-
	w	-	-	1,7	-	1,3	0,7	1,4	1,6	0,8	0,9	-
X J00-J99	i	-	1,0	1,6	1,1	0,6	1,3	1,7	0,4	-	0,8	0,4
	m	-	1,0	1,1	1,1	1,2	2,6	3,4	0,7	-	-	0,8
	w	-	1,1	2,2	1,2	-	-	-	-	-	1,7	-
XVII Q00-Q99	i	2,4	1,8	1,9	2,6	2,5	0,7	1,7	1,5	2,8	2,8	2,6
	m	3,8	2,0	2,6	2,8	3,1	1,3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
	w	1,0	1,6	1,1	2,4	1,9	-	2,9	2,4	4,9	1,7	4,5
XIX S00-T98	i	11,7	9,7	7,3	9,5	7,2	10,1	5,9	6,5	5,2	4,6	2,2
	m	14,2	14,4	9,5	10,6	9,8	10,4	7,4	10,5	6,2	7,4	2,5
	w	9,0	4,7	5,0	8,3	4,5	9,7	4,3	2,4	4,1	1,7	1,8
XX V01-X59, Y40-Y86, Y88	i	10,4	8,7	6,8	7,8	5,4	9,1	4,2	5,0	4,0	4,2	1,3
	m	12,8	13,0	8,4	8,9	7,3	8,5	4,7	9,0	4,6	6,5	1,7
	w	8,0	4,2	5,0	6,5	3,2	9,7	3,6	0,8	3,3	1,7	0,9
dar. V01-V99	i	4,4	4,1	3,3	3,4	3,8	4,4	2,4	1,9	1,6	2,1	0,9
	m	4,7	6,5	4,2	4,5	4,3	4,6	2,7	3,0	0,8	3,3	1,7
	w	4,0	1,6	2,2	2,4	3,2	4,2	2,2	0,8	2,5	0,9	-
W65- W74	i	1,2	2,0	0,5	1,4	0,6	1,0	1,4	1,9	1,6	0,4	0,4
	m	1,9	3,0	0,5	1,7	1,2	1,3	2,0	3,7	3,1	0,8	-
	w	0,5	1,1	0,6	1,2	-	0,7	0,7	-	-	-	0,9
X00-X09	i	2,4	1,0	1,4	0,9	0,3	1,3	-	0,4	-	-	-
	m	2,8	1,5	1,6	1,1	0,6	0,7	-	0,7	-	-	-
	w	2,0	0,5	1,1	0,6	-	2,1	-	-	-	-	-
Insgesamt A00-T98	i	21,6	19,0	19,2	23,5	21,1	19,5	19,1	15,8	15,5	14,8	9,6
	m	26,5	22,4	22,1	25,7	24,5	24,2	20,9	18,7	13,9	16,4	7,6
	w	16,5	15,3	16,2	21,3	17,5	14,5	17,2	12,7	17,2	13,0	11,7

Kindersterbefälle 1996 - 2006 nach Todesursachen und Geschlecht



- Verletzungen und Vergiftungen
- Neubildungen
- Krankheiten des Atmungssystems
- Angeborene Fehlbildungen
- Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane
- Übrige

Kindersterbefälle 1996 - 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Geschl.	Gestorbene Kinder										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1 - 5	i	23	28	22	24	20	17	21	12	16	21	8
	m	14	14	13	13	11	13	9	6	5	12	3
	w	9	14	9	11	9	4	12	6	11	9	5
5 - 10	i	34	24	17	21	18	7	11	13	13	2	2
	m	20	20	11	10	10	3	8	6	8	1	-
	w	14	4	6	11	8	4	3	7	5	1	2
10 - 15	i	32	22	32	37	29	34	23	16	10	12	12
	m	22	11	18	23	19	21	14	13	5	7	6
	w	10	11	14	14	10	13	9	3	5	5	6
Insgesamt	i	89	74	71	82	67	58	55	41	39	35	22
	m	56	45	42	46	40	37	31	25	18	20	9
	w	33	29	29	36	27	21	24	16	21	15	13

Kindersterblichkeit 1996 - 2006 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Geschl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1 - 5	i	36,4	46,0	35,7	37,4	29,3	24,3	23,9	16,9	22,7	30,1	11,6
	m	42,9	44,6	40,9	39,3	31,3	36,0	19,8	16,3	13,7	33,4	8,5
	w	29,4	47,5	30,1	35,4	27,2	11,8	28,1	17,5	32,2	26,7	15,0
5 - 10	i	20,7	16,4	13,5	19,9	22,6	9,3	14,6	16,8	16,5	2,4	2,4
	m	23,7	26,6	17,0	18,3	24,4	7,7	20,6	15,1	19,7	2,4	-
	w	17,6	5,6	9,9	21,5	20,6	10,9	8,2	18,6	13,0	2,5	4,9
10 - 15	i	17,3	12,0	17,6	20,7	17,1	22,3	16,2	14,4	9,8	14,1	15,9
	m	23,2	11,7	19,3	25,1	21,8	26,8	19,2	22,7	9,5	15,9	15,5
	w	11,1	12,3	15,8	16,1	12,1	17,6	13,1	5,6	10,1	12,1	16,4
Insgesamt	i	21,6	19,0	19,2	23,5	21,1	19,5	19,1	15,8	15,5	14,8	9,6
	m	26,5	22,4	22,1	25,7	24,5	24,2	20,9	18,7	13,9	16,4	7,6
	w	16,5	15,3	16,2	21,3	17,5	14,5	17,2	12,7	17,2	13,0	11,7



Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat März 2008 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03 ¹⁾	Z	Statistisches Monatsheft 3/08	5,50
3 A 6 01	A VI - vj-1/07	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Stand: 31.03.2007 -	8,00
3 C 1 02 ¹⁾	C I - j/07	Bodennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben - Agrarstrukturerhebung 2007 - Stand: Mai 2007 – Endgültige Ergebnisse -	2,50
3 C 1 06 ¹⁾	C I - j/07	Bestockte Rebflächen - Zwischenerhebung - Ergebnisse 2007	1,50
3 C 2 03 ¹⁾	C II - j/07	Weinmosternte, Weinerzeugung - 2007 -	1,50
3 C 3 05 ¹⁾	C III - m-1/08	Schlachtungen und Geflügel - Januar 2008 -	1,50
3 C 4 10 ¹⁾	C IV - 2j/07	Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben - Agrarstrukturerhebung - 2007	2,50
3 E 1 02 ¹⁾	E I - m-12/07	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Dezember 2007 - Endgültige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,50
3 E 1 08	E I - m-12/07	Auftragseingangsindex und Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe Dezember 2007	5,50
3 E 1 12 ¹⁾	E I - j/07	Fachstatistik - Holz - im Verarbeitenden Gewerbe - Jahr 2007 -	1,50
3 E 2 01 ¹⁾	E II - m-1/08	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Januar 2008	2,50
3 E 2 02 ¹⁾	E II - j/07	Umsatz, Beschäftigte, Auftragseingang und Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe Jahr 2007	4,00
3 E 3 01 ¹⁾	E III - j/07	Umsatz, Tätige Personen im Ausbaugewerbe - Jahr 2007 -	2,00
3 E 5 01 ¹⁾	E V - vj-4/07	Beschäftigte, Umsatz im Handwerk - IV. Quartal 2007; Jahr 2007 -	2,00
3 F 2 01 ¹⁾	F II - m-12/07	Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau Dezember 2007	2,50
3 G 1 01 ¹⁾	G I, G IV - m-11/07	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel, Einzelhandel und Gastgewerbe - November 2007 -	3,00
3 G 1 01 ¹⁾	G I, G IV - m-12/07	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel, Einzelhandel und Gastgewerbe - Dezember 2007 -	3,00
3 G 1 02 ¹⁾	G I - vj-4/07	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten in der Handelsvermittlung und im Großhandel - IV. Quartal 2007 -	1,50
3 G 3 01	G III - m-12/07	Aus- und Einfuhr - Dezember 2007 - Vorläufige Ergebnisse	5,00
3 G 4 01 ¹⁾	G IV - m-12/07	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Dezember 2007; Januar bis Dezember 2007 - Endgültige Ergebnisse -	6,00
3 H 2 01 ¹⁾	H II - m-12/07	Binnenschifffahrt - Dezember 2007 -	2,50
3 L 2 02 ¹⁾	L II - j/06	Gemeindefinanzen - Einnahmen und Ausgaben - Jahresrechnung 2006	5,50

1) als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.