

STATISTISCHE BERICHTE

A IV
j/08

Bestellnummer:
3A402



Gesundheitswesen

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2008



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Herausgabemonat: November 2009

Zu beziehen durch das
Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)

Preis: 6,00 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar – Bestellnummer: 6A402)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Wirtschaftsrechnungen, Soziales, Wohngeld, Gesundheitswesen
Herr Gödicke
Telefon: 0345 2318-401

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777
Telefon: 0345 2318-715
Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>
E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2009

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Donnerstag: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr } möglichst nach Vereinbarung

Telefon: 0345 2318-714
E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Gestorbene nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2008

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	4
Ziel der Statistik	4
Erfassungsgrundlage	4
Rechtsgrundlage	4
Begriffserläuterungen	5
Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2008	6
Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2008 nach Geschlecht	7
Sterbefälle 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
Sterbefälle 1970 bis 2008 nach Geschlecht	8
Sterbefälle 1998 bis 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	10
Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2008	11
Sterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	12
Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	14
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	15
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen	17
Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	18
Sterbefälle 1998 bis 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	20
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 1998 bis 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	22
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	25
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 bis 2008 nach Geschlecht	26
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 bis 2008 nach Geschlecht	27
Sterbefälle durch Neubildungen 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	29
Nichtnatürliche Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht	31
Unfalltote 2008 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2008 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	32
Unfälle 1998 bis 2008 nach Unfallkategorien und Geschlecht	34
Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 1998 bis 2008 nach Unfallkategorien und Geschlecht	34
Nichtnatürliche Sterbefälle 2008 nach äußerer Ursache und Geschlecht	35
Alkoholbedingte Sterbefälle 2003 und 2008 im Vergleich	38
Alkoholbedingte Sterbefälle 2003 und 2008 nach Altersgruppen im Vergleich	38
Mittleres Sterbealter 2002 bis 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	40
Mittleres Sterbealter 1990 bis 2008 nach Geschlecht	42
Vermeidbare Sterbefälle 2003 und 2008 im Vergleich	42

	Seite
Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2008	42
Säuglingssterbefälle und Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer	43
Säuglingssterbefälle nach Geburtsgewicht	43
Säuglingssterbefälle 1970 bis 2008 nach Geschlecht	44
Säuglingssterblichkeit 1998 bis 2008 nach Geschlecht	46
Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2008	46
Säuglingssterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	47
Säuglingssterbefälle 1998 bis 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	49
Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 1998 bis 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	50
Müttersterbefälle 1998 bis 2008	52
Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2008	52
Kindersterbefälle nach Altersgruppen und Geschlecht	52
Kindersterblichkeit je 10 000 Kinder nach Altersgruppen und Geschlecht	52
Kindersterbefälle 1998 bis 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	55
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 1998 bis 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht	55
Zu den Todesursachen bei den Kindern	55
Kindersterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	57
Kindersterbefälle 1998 bis 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	58
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 1998 bis 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	59
Grafiken:	
Grafik: Sterblichkeit 1970 - 2008	9
Grafik: Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	13
Grafik: Sterbefälle 2008 nach Todesursachen und Altersgruppen	16
Grafik: Sterbefälle 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	24
Grafik: Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2008 nach Geschlecht	28
Grafik: Sterbefälle durch Neubildungen 1998 - 2008 nach Geschlecht	30
Grafik: Unfalltote 2008 nach Unfallkategorien und Geschlecht	33
Grafik: Suizide 2008 nach äußerer Ursache, Geschlecht und Altersgruppen	36
Grafik: Suizide je 100 000 der Bevölkerung 1980 - 2008	37
Grafik: Alkoholbedingte Sterblichkeit 1980 - 2008 nach Geschlecht	39
Grafik: Säuglingssterblichkeit 1970 - 2008 nach Geschlecht	45
Grafik: Säuglingssterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	48
Grafik: Säuglingssterbefälle 1997 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	51
Grafik: Kindersterblichkeit 1981 - 2008 nach Geschlecht	53
Grafik: Kindersterbefälle und Kindersterblichkeit 1981 - 2008	54
Grafik: Kindersterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	56
Grafik: Kindersterbefälle 1997 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht	60

Vorbemerkungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik ist mangels umfassender Morbiditätsstatistiken die am weitesten verbreitete Statistik zur Analyse der quantitativen Bedeutung einzelner Krankheiten. Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen einer Region zu geben.

Diese Statistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung.

Sie ermöglicht eine fundierte Todesursachenforschung, die die Einflussfaktoren der todesursachenspezifischen Sterblichkeit, ihre regionalen Besonderheiten und Veränderungen im Laufe der Zeit untersucht.

Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z.B. für die Gesundheitspolitik und die epidemiologische Forschung abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Erfassungsgrundlage

Erfassungsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind die vom Leichenschauarzt ausgestellte Todesbescheinigung sowie die vom Standesbeamten aufgrund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte. Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Angaben zur Todesursache im Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen und signiert. Dies bedarf jedoch großer Genauigkeit und Korrektheit des Leichenschauarztes bei der Ausstellung der Todesbescheinigung.

Um überregionale Vergleiche der Sterblichkeit zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Aus diesem Grund erfolgt die Signierung der Todesursachen anhand der von der WHO verabschiedeten "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", in der Bundesrepublik

Deutschland seit dem 01.01.1998 in der Fassung der 10. Revision (ICD-10).

In der amtlichen Todesursachenstatistik wurden in den Jahren 1980 bis 1997 Todesursachen nach der 9. Revision der ICD signiert. Das bedeutet, dass Zeitreihen nicht (bzw. noch nicht) problemlos fortgesetzt werden können - aus den ehemals 17 Todesursachenklassen wurden jetzt 20 - zumal ein praktikabler „Umsteiger“ nicht vorliegt. Wenn hier trotzdem der Versuch unternommen wird, Zeitreihen beginnend ab dem Jahr 1980 anzubieten, muss man sich der o.g. Unzulänglichkeiten bewusst sein.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität", das in den vorangegangenen Revisionen der ICD als ergänzende Klassifikation bestand, ermöglicht die Klassifizierung von Umweltereignissen und Umständen als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. Dieser Zustand wird mit einer Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)" klassifiziert.

Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen sowie bei nichtnatürlichen Todesursachen außerdem die äußeren Ursachen (Unfälle und sonstige Gewaltwirkungen) erfasst. Bei Unfällen werden zusätzlich die Unfallkategorie (z.B. häuslicher Unfall, Verkehrsunfall usw.) registriert.

Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, unabhängig vom Sterbeort.

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. September 2007 (BGBl. I S. 2246) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308). Zu berücksichtigen sind das Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 11. August 2004 (GVBl. LSA S. 506), das Personenstandsgesetz in der im BGBl. III, Gliederungsnr. 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, einschließlich späterer Änderungen, das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05. Februar 2002 (GVBl. LSA

Nr. 8 S. 45) und die Bestattungsverordnung vom 26. Januar 2005 (GVBl. LSA Nr. 6 S. 35).

Begriffserläuterungen

Allgemeine Sterbeziffern: Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die beim Vergleich von Absolutzahlen auftreten können, lassen sich mit Hilfe der mittleren Jahresbevölkerung nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Männer bzw. Frauen im Alter } a}{\text{Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 100\,000$$

geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden gleichen Geschlechts und Alters) für jede Todesursache einzeln und insgesamt berechnen.

Fehlgeburt: Eine Fehlgeburt, auch Abort genannt, ist als eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft mit oder ohne Ausstoßung der abgestorbenen Frucht mit einem Gewicht unter 500 g und vor Beginn der 24. Schwangerschaftswoche definiert. Eine Fehlgeburt unterliegt, anders als die Totgeburt, nicht der standesamtlichen Meldepflicht.

Frühsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene in den ersten 7 Lebenstagen angibt. Sie betrifft vor allem Kinder, die frühgeboren und untergewichtig sind, mit Fehlbildungen zur Welt kommen oder unter den Folgen von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen leiden.

Gestorbene: Die Begriffe Gestorbene und Sterbefälle sind inhaltlich identisch. Nicht berücksichtigt werden Totgeborene, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Kindersterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Kinder im Alter von 1 bis unter 15 Jahren angibt.

Lebendgeborene: Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Die Begriffe Lebendgeborene und Lebendgeburten unterscheiden sich inhaltlich nicht.

Mittleres Sterbealter: Zur Errechnung des mittleren Sterbealters wurde, beginnend mit dem Berichtsjahr 2004, eine neue Berechnungsmethode angewandt. Bis dahin erfolgte die Berechnung über die fiktiven Altersgruppenmitten mit Ausnahme der unter 1-Jährigen und über 90-Jährigen. Für diese beiden

Flügelgruppen wurden die Werte 0,188 bzw. 93,653 definiert. Bei dieser Methode wird von einer Gleichverteilung innerhalb der Altersgruppen ausgegangen. Das errechnete mittlere Sterbealter ist dadurch in geringem Maße ungenau. Beginnend ab dem Berichtsjahr 2004 erfolgt deshalb die Berechnung über die Summierung der Altersjahre pro Fall in der jeweils gewünschten Altersgruppe mit Ausnahme der unter 1-Jährigen (= 0,188). Auf eine nachträgliche Neuberechnung bis einschließlich 2003 wurde hier verzichtet.

Müttersterbefall: Als Müttersterbefall gilt der Tod jeder Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Dabei gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse.

Nachsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von 28 bis 364 Tagen angibt.

Perinatale Mortalität: Die perinatale Mortalität oder perinatale Sterblichkeit gibt die Anzahl der Todesfälle in der Perinatalperiode an, also dem Zeitraum zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und dem 7. Tag nach der Geburt. Diese Zahl wird dabei auf die Gesamtzahl von 1000 Lebend- und Totgeborenen bezogen und nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der Totgeborenen und Zahl der in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen}}{\text{Anzahl der Lebend- und Totgeborenen}} \times 1\,000$$

berechnet. Die perinatale Sterblichkeit ist eindeutig eine Sterbeziffer. Systematisch steht sie allerdings zwischen Geburten- und Sterbestatistik, da die Totgeborenen definitionsgemäß zu den Geburten und nicht zu den Sterbefällen zählen.

Säuglinge: Kinder im Alter von 0 bis unter 1 Jahr, d.h. Kinder von der Geburt bis vor Vollendung des 1. Lebensjahres.

Säuglingssterblichkeit: Findet ihren Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene des gleichen Zeitraumes bezieht. Die Höhe der Säuglingssterblichkeit ist abhängig von zahlreichen biologischen, medizinischen und sozialen Faktoren, die bei einer Analyse als Merkmal benutzt werden, z.B. Geschlecht, Alter, Geburtsgewicht, Todesursache, Legitimität der Mutter.

Spätsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von sieben bis 27 Tagen angibt.

Totgeborene: Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 g betrug.

Totgeborenenrate: Totgeborene je 1 000 Geborene (Lebend- und Totgeborene).

Vermeidbare Sterbefälle: Als vermeidbare Sterbefälle werden Sterbefälle bezeichnet, die bei angemessener Krankheitsprävention oder Therapie hätten verhindert werden können. Die Kennziffer der vermeidbaren Sterbefälle richtet sich im Wesentlichen nach einem Konzept des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Danach gelten spezifische Todesursachen in bestimmten Altersgruppen als vermeidbar. Die vermeidbaren Sterbefälle werden je 100.000 Einwohner angegeben.

Arbeitsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z.B. Busfahren) so ist dieser Unfall als "Arbeitsunfall" anzusehen.

Schulunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten, innerhalb der Schule oder Hochschule oder bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Schule.

Verkehrsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet

Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Häuslicher Unfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet die Unfälle im häuslichen Bereich, die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (siehe Definition „Arbeitsunfall“). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Sport- oder Spielunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder bei einer sonstigen Freizeitbeschäftigung ereignen, sofern diese nicht als Arbeits-, Schul- oder als häuslicher Unfall anzusehen sind.

Sonstiger Unfall: Diese Kategorie umfasst alle sonst nicht einzuordnenden Unfälle bzw. Unfälle unbekannter Kategorie.

Zeichenerklärung:

- Nichts vorhanden, das Zeichen " - " steht für den mathematisch exakten Wert Null.
- 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.

Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2008

Im Jahr 2008 starben bundesweit insgesamt 29 905 Personen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, davon waren 14 344 männlichen sowie 15 561 weiblichen Geschlechts.

Damit starben im aktuellen Berichtsjahr insgesamt 513 Personen bzw. 1,8 % mehr als im Vorjahr, davon 285 männliche und 228 weibliche Personen. Das bedeutet eine leichte Zunahme der Sterblichkeit gegenüber dem Jahr 2007.

Je 100 000 Einwohner Sachsen-Anhalts verstarben im Berichtsjahr 1 247 Personen, im Vorjahr 1 211 Personen und vor zehn Jahren 1 153 Personen. Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, so stellt man eine Zunahme der Sterblichkeit fest. Dabei gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Starben 1998 noch 1 110 Männer bzw. 1 194 Frauen je 100 000 der Bevölkerung, so waren es in diesem Berichtsjahr schon 1 223 Männer bzw. 1 271 Frauen.

Insgesamt war auch 2008 - wie in den vergangenen Jahren - die Sterblichkeit der weiblichen Personen höher als die der männlichen Personen. Bedingt durch die Altersstruktur und einen Frauenüberschuss von 2,1 % verstarben 4,1 % mehr Frauen als Männer.

Die Entwicklung der Altersstruktur in Sachsen-Anhalt beeinflusst auch die Anteile an den Gesamtsterbefällen in den Altersgruppen. So stellte die Altersgruppe der über 75-jährigen mit 60,1 % die meisten Sterbefälle, 1998 lag deren Anteil noch bei 54,4 % aller Sterbefälle. Seit Jahren ist in allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 75-jährigen eine wesentlich höhere Zahl an männlichen Verstorbenen zu beobachten.

Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2008 nach Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	61	0,2	37	0,3	24	0,1
1 - 15	35	0,1	21	0,2	14	0,1
15 - 35	267	0,9	201	1,4	66	0,4
35 - 55	2 216	7,4	1 583	11,0	633	4,1
55 - 75	9 368	31,3	6 030	42,0	3 338	21,5
75 und mehr	17 958	60,1	6 472	45,1	11 486	73,8
insgesamt	29 905	100	14 344	100	15 561	100

Sterbefälle 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	61	37	24	3,49	4,12	2,82
1 - 2	4	1	3	0,23	0,11	0,36
2 - 3	5	5	-	0,30	0,58	-
3 - 4	3	2	1	0,18	0,23	0,12
4 - 5	4	2	2	0,24	0,23	0,25
5 - 10	10	6	4	0,12	0,14	0,10
10 - 15	9	5	4	0,12	0,13	0,11
15 - 18	19	13	6	0,34	0,45	0,22
18 - 20	24	17	7	0,39	0,53	0,24
20 - 25	81	65	16	0,52	0,78	0,22
25 - 30	64	52	12	0,45	0,68	0,19
30 - 35	79	54	25	0,68	0,87	0,46
35 - 40	172	122	50	1,12	1,52	0,69
40 - 45	364	257	107	1,87	2,57	1,13
45 - 50	653	455	198	3,14	4,30	1,93
50 - 55	1 027	749	278	5,32	7,71	2,90
55 - 60	1 245	841	404	6,98	9,53	4,48
60 - 65	1 424	964	460	10,73	15,02	6,72
65 - 70	2 804	1 839	965	15,19	21,16	9,88
70 - 75	3 895	2 386	1 509	25,82	35,82	17,92
75 - 80	4 586	2 449	2 137	44,00	59,34	33,95
80 - 85	5 025	1 927	3 098	71,25	88,72	63,48
85 - 90	4 857	1 382	3 475	127,37	153,28	119,35
90 - 95	2 201	484	1 717	238,31	283,87	228,02
95 und mehr	1 289	230	1 059	307,56	299,09	309,74
insgesamt	29 905	14 344	15 561	12,47	12,23	12,71

Sterbefälle 1970 - 2008 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	44 918	21 570	23 348	13,95	14,45	13,51
1971	43 045	20 355	22 690	13,39	13,65	13,17
1972	43 683	20 712	22 971	13,62	13,88	13,38
1973	42 933	20 201	22 732	13,46	13,60	13,33
1974	42 773	20 159	22 614	13,48	13,63	13,35
1975	44 990	21 020	23 970	14,28	14,28	14,27
1976	43 226	19 999	23 227	13,81	13,67	13,93
1977	41 826	19 620	22 206	13,42	13,45	13,39
1978	43 459	20 207	23 252	13,99	13,87	14,09
1979	43 554	20 243	23 311	14,07	13,93	14,20
1980	44 448	20 623	23 825	14,41	14,23	14,58
1981	43 258	19 780	23 478	14,08	13,67	14,44
1982	42 306	19 350	22 956	13,84	13,45	14,20
1983	41 628	18 762	22 866	13,65	13,05	14,19
1984	41 595	18 766	22 829	13,68	13,07	14,23
1985	41 930	18 966	22 964	13,85	13,25	14,39
1986	41 887	18 528	23 359	13,90	12,98	14,73
1987	40 128	17 835	22 293	13,34	12,48	14,12
1988	40 009	17 998	22 011	13,31	12,55	14,00
1989	38 127	17 301	20 826	12,73	12,07	13,34
1990	38 711	18 118	20 593	13,39	13,14	13,62
1991	38 203	17 859	20 344	13,41	13,13	13,66
1992	35 754	16 726	19 028	12,73	12,43	13,00
1993	34 838	16 546	18 292	12,49	12,34	12,64
1994	33 816	15 929	17 887	12,21	11,93	12,48
1995	33 519	15 816	17 703	12,19	11,89	12,46
1996	32 639	15 539	17 100	11,95	11,74	12,14
1997	30 892	14 294	16 598	11,38	10,85	11,88
1998	31 011	14 496	16 515	11,53	11,10	11,94
1999	30 059	14 076	15 983	11,29	10,88	11,67
2000	30 175	14 298	15 877	11,46	11,17	11,73
2001	29 621	13 954	15 667	11,40	11,04	11,74
2002	30 159	14 250	15 909	11,76	11,41	12,09
2003	29 632	14 062	15 570	11,69	11,38	11,98
2004	29 008	13 892	15 116	11,56	11,34	11,76
2005	29 277	14 002	15 275	11,79	11,56	12,02
2006	29 151	13 980	15 171	11,87	11,65	12,08
2007	29 392	14 059	15 333	12,11	11,84	12,36
2008	29 905	14 344	15 561	12,47	12,23	12,71



Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2008

Die Haupttodesursachenklasse stellte 2008 - wie auch in den vergangenen Jahren - mit fast der Hälfte aller Todesfälle (46,7 %) die **Krankheiten des Kreislaufsystems**. Daran starben insgesamt 5 797 Männer und 8 186 Frauen. Bezogen auf 100 000 Einwohner waren im Jahr 2008 insgesamt 583 Personen einem Herz-Kreislaufleiden erlegen. Im Vorjahr verstarben 552 Personen je 100 000 Einwohner an diesem Leiden. Allein an ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt, verstarben 5 974 Personen. Herzinfarkt führte bei wesentlich mehr Männern (1 543 Sterbefälle) als Frauen (1 179 Sterbefälle) zum Tode. Dagegen waren vom Schlaganfall fast doppelt soviel Frauen (495 Sterbefälle) wie Männer (251 Sterbefälle) betroffen. Im Gegensatz zum rückläufigen Trend der Vorjahre sind die Sterbefälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 2008 wieder angestiegen.

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die **Neubildungen** mit 26,5 % vertreten, darunter mit 25,8 % die bösartigen Neubildungen („Krebs“). Bezogen auf 100 000 Einwohner starben im Berichtsjahr 331 Personen an Krebserkrankungen. Im Vorjahr waren das noch 311 Personen. Am häufigsten traten hier bösartige Neubildungen im Bereich der Verdauungsorgane mit 32,8 % aller an Krebs Verstorbenen auf, gefolgt vom Lungenkrebs mit 19,2 %. Bei 14,1 % der im Jahr 2008 an Krebs verstorbenen Frauen wurde Brustkrebs als Todesursache festgestellt.

An dritter Stelle der Todesursachenklassen folgten 2008 die **Krankheiten des Verdauungssystems** mit 5,5 % aller Sterbefälle. Hier fielen wiederum die Leberkrankheiten auf, wobei der männliche Personenanteil aller an diesem Leiden Verstorbenen im Berichtsjahr mehr als zwei Drittel ausmacht. Von den Krankheiten der Leber waren 64,9 % alkoholbedingt. Das entsprach 1,7 % der Gesamtsterbefälle bzw. 21 Personen je 100 000 Einwohner im Berichtsjahr.

Die weitere Reihenfolge der Todesursachen bestimmten die **Krankheiten des Atmungssystems** mit 1 488 Sterbefällen bzw. 5,0 %. Dabei waren insbesondere die chronischen Krankheiten der unteren Atemwege auffällig, die mit 47,5 % aller Atemwegserkrankungen fast die Hälfte ausmachten.

Verletzungen und Vergiftungen folgten an fünfter Stelle mit 3,9 %. Insgesamt starben 1 158 Personen, davon 735 männliche und 423 weibliche Personen, eines nichtnatürlichen Todes. Im Vergleich zum Vorjahr waren das insgesamt 156 Personen mehr, die bei Unfällen und durch andere Gewalteinwirkungen ihr Leben verloren.

Durch Verkehrsunfälle verstarben im Berichtsjahr 228 Personen, davon 169 Männer und 59 Frauen. Gegenüber dem Vorjahr waren das 48 Verkehrstote mehr. Einem Arbeits- oder Schulunfall mit Todesfolge erlagen im Berichtsjahr 24 Männer und lediglich eine Frau. 37,8 % aller tödlichen Unfälle konnten den häuslichen Unfällen zugerechnet werden, überwiegend als Folge eines Sturzes älterer Menschen.

Suizid (Selbsttötung) begingen im Berichtsjahr 211 Männer und 77 Frauen. Damit stieg die Suizidrate, nachdem diese über mehrere Jahre rückläufig war. Dennoch ist die Suizidrate im Vergleich zu 1998 niedriger. Begingen im Jahr 1998 noch insgesamt 18 Personen (27 Männer, 8 Frauen) je 100 000 Einwohner einen Suizid, waren es 2008 rund 12 Personen (18 Männer, 6 Frauen) je 100 000 Einwohner.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag Getöteten betrug im Berichtsjahr 22, davon 11 männliche und 11 weibliche Personen. Damit ist auch hier ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr festzustellen.

An sechster Stelle folgten mit 1 146 Sterbefällen bzw. 3,8 % die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**. Diese Klasse wurde insbesondere vom Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") geprägt. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der an diesem Leiden verstorbenen Personen und erreichte damit etwa das Niveau von vor zehn Jahren. Knapp zwei Drittel der an Diabetes mellitus Verstorbenen waren Frauen.

Die Haupttodesursache in der Altersgruppe der über 75-jährigen Männer und Frauen waren die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 57,3 %, gefolgt von den Neubildungen mit 18,1 % und den Krankheiten der Atmungsorgane mit 5,7 %. Bei den unter 75-Jährigen sind hingegen die Neubildungen mit 38,0 % die Haupttodesursache. Erst an zweiter Stelle folgen hier mit 30,9 % die Krankheiten des Kreislaufsystems. Verletzungen und Vergiftungen sind mit 44,6 % die häufigste Todesursache bei den unter 35-Jährigen, zum überwiegenden Teil infolge eines Verkehrsunfalls.

Das mittlere Sterbealter betrug im Jahr 2008 insgesamt 75,5 Jahre (71,0 Jahre bei Männern bzw. 79,7 Jahre bei Frauen). Im Jahr 2004 lag dieses noch bei 74,4 Jahren.


Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der seit 1990 beobachtete Trend der sinkenden Sterblichkeit seit 1998 nicht mehr fortgesetzt hat. Seit 2004 kann sogar hier wieder von einer Zunahme gesprochen werden.

Sterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	270	0,9	134	0,9	136	0,9
II Neubildungen (C00 - D48)	7 931	26,5	4 403	30,7	3 528	22,7
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	7 721	25,8	4 301	30,0	3 420	22,0
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	64	0,2	22	0,2	42	0,3
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 146	3,8	453	3,1	693	4,5
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	999	3,3	376	2,6	623	4,0
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	380	1,3	186	1,3	194	1,2
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	607	2,0	282	2,0	325	2,1
VII- VIII Krankheiten des Auges und des Ohres (H00 - H95)	1	0,0	1	0,0	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	13 983	46,7	5 797	40,4	8 186	52,6
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	2 722	9,1	1 543	10,8	1 179	7,6
Chron. ischäm. Herzkrankheit (I25)	2 953	9,9	1 212	8,4	1 741	11,2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	2 692	9,0	1 014	7,1	1 678	10,8
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	1 488	5,0	798	5,6	690	4,4
dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	707	2,4	417	2,9	290	1,9
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	1 648	5,5	905	6,3	743	4,8
dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	780	2,6	550	3,8	230	1,5
XII- XIII Krankheiten der Haut, des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (L00 - M99)	79	0,3	38	0,3	41	0,3
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	620	2,1	242	1,7	378	2,4
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	3	0,0	x	x	3	0,0
XVI Perinatalperiode (P00 - P96)	31	0,1	22	0,2	9	0,0
XVII Angeb. Fehlbildungen (Q00 - Q99)	52	0,2	20	0,1	32	0,2
XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	444	1,5	306	2,1	138	0,9
XIX Verletzungen, Vergiftungen, Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	1 158	3,9	735	5,1	423	2,7
Insgesamt (A00 - T98)	29 905	100	14 344	100	15 561	100

**Sterbefälle 2008
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Männer



Frauen



Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	270	-	4	28	98	137
	m	134	-	2	24	50	57
	w	136	-	2	4	48	80
II C00 - D48	i	7 931	12	42	704	3 783	3 390
	m	4 403	7	23	418	2 372	1 583
	w	3 528	5	19	286	1 411	1 807
dar. C00 - C97	i	7 721	9	40	695	3 720	3 257
	m	4 301	5	22	412	2 335	1 527
	w	3 420	4	18	283	1 385	1 730
dar. C15 - C26	i	2 532	-	6	186	1 187	1 153
	m	1 378	-	4	136	777	461
	w	1 154	-	2	50	410	692
C30 - C39	i	1 562	-	2	154	896	510
	m	1 170	-	1	104	715	350
	w	392	-	1	50	181	160
IV E00 - E90	i	1 146	2	4	65	325	749
	m	453	1	3	45	177	227
	w	693	1	1	20	148	522
V F00 - F99	i	380	-	4	62	77	237
	m	186	-	4	55	61	66
	w	194	-	-	7	16	171
VI G00 - G99	i	607	4	10	56	209	326
	m	282	2	8	34	128	109
	w	325	2	2	22	81	217
IX I00 - I99	i	13 983	2	18	512	3 160	10 291
	m	5 797	1	13	402	2 075	3 306
	w	8 186	1	5	110	1 085	6 985
dar. I21, I22	i	2 722	-	2	203	976	1 541
	m	1 543	-	2	176	692	673
	w	1 179	-	-	27	284	868
I60 - I69	i	2 692	-	4	77	543	2 068
	m	1 014	-	3	52	331	628
	w	1 678	-	1	25	212	1 440
X J00 - J99	i	1 488	3	3	62	395	1 022
	m	798	2	2	41	271	481
	w	690	1	1	21	124	541
dar. J40 - J47	i	707	1	-	21	222	463
	m	417	1	-	15	155	246
	w	290	-	-	6	67	217
XI K00 - K93	i	1 648	-	10	282	649	706
	m	905	-	8	212	447	237
	w	743	-	2	70	202	469
dar. K70 - K77	i	780	-	6	223	404	147
	m	550	-	5	169	302	74
	w	230	-	1	54	102	73
XIV N00 - N99	i	620	-	3	12	112	492
	m	242	-	1	9	62	170
	w	378	-	2	3	50	322
XIX S00 - T98	i	1 158	8	151	291	311	394
	m	735	5	126	229	222	152
	w	423	3	25	62	89	242
Insgesamt A00 - T98	i	29 905	35	267	2 216	9 368	17 958
	m	14 344	21	201	1 583	6 030	6 472
	w	15 561	14	66	633	3 338	11 486

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2008 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung						
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren					
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr	
I A00 - B99	i	11,3	-	0,8	3,7	15,2	60,5	
	m	11,4	-	0,7	6,3	16,3	76,5	
	w	11,1	-	0,8	1,1	14,1	52,7	
II C00 - D48	i	330,8	4,9	7,9	94,0	585,1	1 497,9	
	m	375,3	5,5	8,1	109,1	775,2	2 125,3	
	w	288,1	4,2	7,7	78,2	414,3	1 190,2	
dar. C00 - C97	i	322,1	3,7	7,5	92,8	575,4	1 439,2	
	m	366,7	3,9	7,8	107,5	763,1	2 050,2	
	w	279,3	3,4	7,3	77,3	406,7	1 139,5	
dar. C15 - C26	i	105,6	-	1,1	24,8	183,6	509,5	
	m	117,5	-	1,4	35,5	253,9	618,9	
	w	94,3	-	0,8	13,7	120,4	455,8	
C30 - C39	i	65,2	-	0,4	20,6	138,6	225,4	
	m	99,7	-	0,4	27,1	233,7	469,9	
	w	32,0	-	0,4	13,7	53,2	105,4	
IV E00 - E90	i	47,8	0,8	0,8	8,7	50,3	331,0	
	m	38,6	0,8	1,1	11,7	57,8	304,8	
	w	56,6	0,8	0,4	5,5	43,5	343,8	
V F00 - F99	i	15,9	-	0,8	8,3	11,9	104,7	
	m	15,9	-	1,4	14,4	19,9	88,6	
	w	15,8	-	-	1,9	4,7	112,6	
VI G00 - G99	i	25,3	1,6	1,9	7,5	32,3	144,0	
	m	24,0	1,6	2,8	8,9	41,8	146,3	
	w	26,5	1,7	0,8	6,0	23,8	142,9	
IX I00 - I99	i	583,3	0,8	3,4	68,3	488,8	4 547,3	
	m	494,2	0,8	4,6	104,9	678,2	4 438,7	
	w	668,6	0,8	2,0	30,1	318,6	4 600,8	
dar. I21, I22	i	113,5	-	0,4	27,1	151,0	680,9	
	m	131,5	-	0,7	45,9	226,2	903,6	
	w	96,3	-	-	7,4	83,4	571,7	
I60 - I69	i	112,3	-	0,8	10,3	84,0	913,8	
	m	86,4	-	1,1	13,6	108,2	843,2	
	w	137,0	-	0,4	6,8	62,3	948,5	
X J00 - J99	i	62,1	1,2	0,6	8,3	61,1	451,6	
	m	68,0	1,6	0,7	10,7	88,6	645,8	
	w	56,4	0,8	0,4	5,7	36,4	356,3	
dar. J40 - J47	i	29,5	0,4	-	2,8	34,3	204,6	
	m	35,5	0,8	-	3,9	50,7	330,3	
	w	23,7	-	-	1,6	19,7	142,9	
XI K00 - K93	i	68,7	-	1,9	37,6	100,4	312,0	
	m	77,1	-	2,8	55,3	146,1	318,2	
	w	60,7	-	0,8	19,1	59,3	308,9	
dar. K70 - K77	i	32,5	-	1,1	29,8	62,5	65,0	
	m	46,9	-	1,8	44,1	98,7	99,4	
	w	18,8	-	0,4	14,8	30,0	48,1	
XIV N00 - N99	i	25,9	-	0,6	1,6	17,3	217,4	
	m	20,6	-	0,4	2,3	20,3	228,2	
	w	30,9	-	0,8	0,8	14,7	212,1	
XIX S00 - T98	i	48,3	3,3	28,5	38,8	48,1	174,1	
	m	62,7	3,9	44,5	59,8	72,6	204,1	
	w	34,5	2,5	10,1	16,9	26,1	159,4	
Insgesamt	i	1 247,4	14,3	50,4	295,8	1 449,0	7 935,1	
A00 - T98	m	1 222,8	16,6	71,1	413,2	1 970,7	8 689,3	
	w	1 270,9	11,8	26,7	173,0	980,2	7 565,4	

Sterbefälle 2008 nach Todesursachen und Altersgruppen in %


1 bis unter 15 Jahre




15 bis unter 35 Jahre




35 bis unter 55 Jahre



55 bis unter 75 Jahre



75 und mehr Jahre



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> I Infektiöse und parasitäre Krankheiten II Neubildungen IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten V bis VIII Psychische Störungen ¹⁾, Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren IX Krankheiten des Kreislaufsystems | <ul style="list-style-type: none"> X Krankheiten des Atmungssystems XI Krankheiten des Verdauungssystems XIV Krankheiten des Urogenitalsystems XIX Verletzungen und Vergiftungen Übrige |
|---|--|

1) Psychische Störungen nicht in der Altersgruppe von 1 bis unter 15 Jahren vertreten

Anmerkung: Damit die Grafik übersichtlich bleibt, sind die Anteile der Todesursachenklassen, deren berechnete Werte weniger als 1 ergeben, der Rubrik "Übrige" zugeordnet worden. In der Rubrik "Übrige" sind ebenfalls die hier nicht aufgeführten Todesursachenklassen III, XII, XIII, XV, XVI, XVII und XVIII enthalten. Die Todesursachenklassen V-VIII sind in der Grafik zusammengefasst worden.

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)			
	II (C00 - D48)	IV (E00 - E90)	IX (I00 - I99)	X (J00 - J99)
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung			
Dessau-Roßlau, Stadt	367,2	34,7	583,3	78,4
Halle (Saale), Stadt	316,5	35,1	537,1	63,0
Magdeburg, Stadt	313,2	47,9	495,5	45,7
Altmarkkreis Salzwedel	293,6	47,5	519,2	71,2
Anhalt-Bitterfeld	358,1	45,2	639,8	63,2
Börde	299,7	51,0	563,0	57,6
Burgenlandkreis	321,4	50,3	631,9	63,8
Harz	370,0	49,3	624,8	60,6
Jerichower Land	332,4	85,9	597,1	53,5
Mansfeld-Südharz	339,9	48,5	653,0	59,9
Saalekreis	318,4	36,0	508,4	58,2
Salzlandkreis	368,4	52,0	684,9	83,3
Stendal	312,9	46,6	532,6	52,2
Wittenberg	299,3	54,2	566,9	65,5
Sachsen-Anhalt	330,8	47,8	583,3	62,1

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)			
	XI (K00 - K93)	XIV (N00 - N99)	XIX (S00 - T98)	insges. (A00 - T98)
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung			
Dessau-Roßlau, Stadt	75,0	39,2	54,9	1 321,1
Halle (Saale), Stadt	65,1	31,3	42,8	1 187,3
Magdeburg, Stadt	73,5	23,5	40,0	1 126,8
Altmarkkreis Salzwedel	49,7	24,8	58,3	1 135,5
Anhalt-Bitterfeld	72,5	28,3	61,6	1 342,9
Börde	55,9	18,5	48,3	1 161,9
Burgenlandkreis	81,7	18,9	46,3	1 299,1
Harz	66,4	47,2	38,4	1 341,5
Jerichower Land	86,9	21,2	67,7	1 332,6
Mansfeld-Südharz	76,5	12,8	53,6	1 321,3
Saalekreis	64,7	22,2	46,4	1 127,4
Salzlandkreis	63,0	19,3	35,9	1 380,3
Stendal	63,2	22,9	52,9	1 165,5
Wittenberg	71,1	28,9	60,6	1 223,2
Sachsen-Anhalt	68,7	25,9	48,3	1 247,4

Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)							
	II (C00 - D48)		IV (E00 - E90)		IX (I00 - I99)		X (J00 - J99)	
Land	Sterbefälle							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	174	154	15	16	230	291	35	35
Halle (Saale), Stadt	391	348	32	50	481	773	81	66
Magdeburg, Stadt	400	320	42	68	495	644	53	52
Altmarkkreis Salzwedel	154	118	18	26	212	269	35	31
Anhalt-Bitterfeld	380	277	36	47	465	709	65	51
Börde	327	225	45	49	437	600	52	54
Burgenlandkreis	359	286	33	68	518	750	70	58
Harz	476	410	39	79	583	913	76	69
Jerichower Land	186	143	35	50	252	339	27	26
Mansfeld-Südharz	296	237	27	49	475	549	53	41
Saalekreis	342	303	31	42	434	596	73	45
Salzlandkreis	464	337	49	64	600	889	90	91
Stendal	213	183	20	39	280	394	36	30
Wittenberg	238	187	31	46	335	470	52	41
Sachsen-Anhalt	4 403	3 528	453	693	5 797	8 186	798	690

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)							
	II (C00 - D48)		IV (E00 - E90)		IX (I00 - I99)		X (J00 - J99)	
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	404,8	332,4	34,9	34,5	535,1	628,1	81,4	75,5
Halle (Saale), Stadt	352,8	283,8	28,9	40,8	434,0	630,3	73,1	53,8
Magdeburg, Stadt	360,1	269,4	37,8	57,2	445,6	542,2	47,7	43,8
Altmarkkreis Salzwedel	332,5	254,7	38,9	56,1	457,7	580,6	75,6	66,9
Anhalt-Bitterfeld	424,7	294,7	40,2	50,0	519,7	754,2	72,6	54,3
Börde	356,3	243,5	49,0	53,0	476,1	649,4	56,7	58,4
Burgenlandkreis	365,9	278,9	33,6	66,3	527,9	731,3	71,3	56,6
Harz	406,6	335,0	33,3	64,6	498,0	746,0	64,9	56,4
Jerichower Land	379,2	286,4	71,4	100,1	513,8	678,9	55,1	52,1
Mansfeld-Südharz	383,3	297,8	35,0	61,6	615,0	689,8	68,6	51,5
Saalekreis	341,1	296,1	30,9	41,0	432,9	582,4	72,8	44,0
Salzlandkreis	436,6	303,3	46,1	57,6	564,5	800,0	84,7	81,9
Stendal	339,1	287,1	31,8	61,2	445,8	618,2	57,3	47,1
Wittenberg	341,1	258,9	44,4	63,7	480,1	650,7	74,5	56,8
Sachsen-Anhalt	375,3	288,1	38,6	56,6	494,2	668,6	68,0	56,4

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)							
	XI (K00 - K93)		XIV (N00 - N99)		XIX (S00 - T98)		insges. (A00 - T98)	
Land	Sterbefälle							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	37	30	11	24	24	25	568	612
Halle (Saale), Stadt	89	63	27	46	59	41	1 272	1 500
Magdeburg, Stadt	90	79	19	35	50	42	1 255	1 335
Altmarkkreis Salzwedel	28	18	10	13	38	16	530	522
Anhalt-Bitterfeld	61	72	24	28	72	41	1 170	1 294
Börde	46	57	20	14	57	32	1 056	1 084
Burgenlandkreis	89	75	19	19	56	37	1 233	1 374
Harz	98	61	34	79	66	26	1 465	1 747
Jerichower Land	39	47	7	14	44	23	636	683
Mansfeld-Südharz	74	46	14	6	50	34	1 056	1 016
Saalekreis	69	62	17	28	58	36	1 106	1 178
Salzlandkreis	80	57	16	26	58	20	1 444	1 557
Stendal	46	34	12	17	47	20	712	763
Wittenberg	59	42	12	29	56	30	841	896
Sachsen-Anhalt	905	743	242	378	735	423	14 344	15 561

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)							
	XI (K00 - K93)		XIV (N00 - N99)		XIX (S00 - T98)		insgesamt (A00 - T98)	
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	86,1	64,7	25,6	51,8	55,8	54,0	1 321,4	1 320,9
Halle (Saale), Stadt	80,3	51,4	24,4	37,5	53,2	33,4	1 147,8	1 223,1
Magdeburg, Stadt	81,0	66,5	17,1	29,5	45,0	35,4	1 129,9	1 123,9
Altmarkkreis Salzwedel	60,5	38,9	21,6	28,1	82,0	34,5	1 144,3	1 126,7
Anhalt-Bitterfeld	68,2	76,6	26,8	29,8	80,5	43,6	1 307,5	1 376,6
Börde	50,1	61,7	21,8	15,2	62,1	34,6	1 150,6	1 173,2
Burgenlandkreis	90,7	73,1	19,4	18,5	57,1	36,1	1 256,5	1 339,8
Harz	83,7	49,8	29,0	64,6	56,4	21,2	1 251,5	1 427,5
Jerichower Land	79,5	94,1	14,3	28,0	89,7	46,1	1 296,7	1 367,7
Mansfeld-Südharz	95,8	57,8	18,1	7,5	64,7	42,7	1 367,3	1 276,6
Saalekreis	68,8	60,6	17,0	27,4	57,9	35,2	1 103,2	1 151,1
Salzlandkreis	75,3	51,3	15,1	23,4	54,6	18,0	1 358,6	1 401,1
Stendal	73,2	53,3	19,1	26,7	74,8	31,4	1 133,5	1 197,1
Wittenberg	84,6	58,2	17,2	40,2	80,3	41,5	1 205,3	1 240,6
Sachsen-Anhalt	77,1	60,7	20,6	30,9	62,7	34,5	1 222,8	1 270,9

Sterbefälle 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I A00 - B99	i	98	113	89	80	99	115	143	132	127	182	270
	m	52	65	45	40	50	56	72	68	63	78	134
	w	46	48	44	40	49	59	71	64	64	104	136
II C00 - D48	i	7 392	7 294	7 438	7 495	7 688	7 356	7 560	7 683	7 584	7 747	7 931
	m	3 845	3 882	3 935	3 967	4 130	4 047	4 232	4 199	4 140	4 351	4 403
	w	3 547	3 412	3 503	3 528	3 558	3 309	3 328	3 484	3 408	3 396	3 528
dar. C00 - C97	i	7 244	7 142	7 277	7 344	7 534	7 208	7 382	7 497	7 337	7 546	7 721
	m	3 774	3 818	3 865	3 901	4 070	3 979	4 159	4 120	4 060	4 268	4 301
	w	3 470	3 324	3 412	3 443	3 464	3 229	3 223	3 377	3 277	3 278	3 420
dar. C15 - C26	i	2 513	2 472	2 484	2 625	2 684	2 499	2 493	2 532	2 510	2 544	2 532
	m	1 180	1 239	1 220	1 306	1 373	1 289	1 345	1 343	1 358	1 382	1 378
	w	1 333	1 233	1 264	1 319	1 311	1 210	1 148	1 189	1 152	1 162	1 154
C30 - C39	i	1 561	1 425	1 584	1 472	1 536	1 467	1 471	1 581	1 549	1 637	1 562
	m	1 259	1 142	1 255	1 161	1 213	1 172	1 175	1 221	1 178	1 249	1 170
	w	302	283	329	311	323	295	296	360	371	388	392
C81 - C96	i	499	530	575	527	581	511	586	554	566	584	614
	m	247	262	272	258	282	249	321	268	265	298	333
	w	252	268	303	269	299	262	265	286	301	286	281
III D50 - D89	i	67	53	71	64	70	73	52	67	67	109	64
	m	21	24	28	25	28	28	16	24	23	46	22
	w	46	29	43	39	42	45	36	43	44	63	42
IV E00 - E90	i	1 185	1 103	1 246	1 249	1 396	1 388	1 573	1 439	1 542	1 613	1 146
	m	390	372	439	436	475	497	532	522	577	592	453
	w	795	731	807	813	921	891	1 041	917	965	1 021	693
dar. E10 - E14	i	1 080	1 013	1 108	1 124	1 267	1 273	1 430	1 319	1 419	1 457	999
	m	350	342	401	386	429	448	480	470	527	528	376
	w	730	671	707	738	838	825	950	849	892	929	623
V F00 - F99	i	252	164	198	178	155	167	176	191	220	216	380
	m	178	124	163	132	125	132	145	155	176	160	186
	w	74	40	35	46	30	35	31	36	44	56	194
dar. F10	i	184	135	157	131	126	136	144	161	181	147	110
	m	153	119	140	115	107	121	129	137	156	130	94
	w	31	16	17	16	19	15	15	24	25	17	16
VI G00 - G99	i	382	413	478	513	565	542	620	576	624	664	607
	m	198	205	226	247	283	256	293	276	304	303	282
	w	184	208	252	266	282	286	327	300	320	361	325
VII - VIII H00 - H95	i	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
	m	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	w	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IX I00 - I99	i	16 394	15 856	15 387	14 969	15 075	15 072	14 086	14 093	14 052	13 388	13 983
	m	6 615	6 366	6 302	6 114	6 148	6 138	5 804	5 809	5 561	5 503	5 797
	w	9 779	9 490	9 085	8 855	8 927	8 934	8 282	8 284	8 191	7 885	8 186

Noch: Sterbefälle 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
X J00 - J99	i	1 317	1 338	1 348	1 258	1 088	1 010	958	1 090	1 012	1 186	1 488
	m	765	718	752	719	608	573	521	597	532	621	798
	w	552	620	596	539	480	437	437	493	480	565	690
dar. J40 - J47	i	807	787	748	730	692	680	588	602	530	608	707
	m	508	470	468	461	414	405	346	366	304	352	417
	w	299	317	280	269	278	275	242	236	226	256	290
XI K00 - K93	i	1 725	1 660	1 706	1 630	1 827	1 687	1 698	1 706	1 742	1 679	1 648
	m	1 028	1 023	1 034	970	1 067	1 006	979	1 013	965	949	905
	w	697	637	672	660	760	681	719	693	777	730	743
dar. K70 - K77	i	1 007	989	975	917	999	897	878	857	797	732	780
	m	716	717	710	660	707	674	639	630	565	545	550
	w	291	272	265	257	292	223	239	227	232	187	230
XII L00 - L99	i	9	9	9	6	4	3	3	3	6	2	11
	m	1	2	2	4	3	1	1	-	2	-	6
	w	8	7	7	2	1	2	2	3	4	2	5
XIII M00 - M99	i	83	67	74	64	76	55	55	63	60	58	68
	m	28	22	14	19	21	15	18	20	24	16	32
	w	55	45	60	45	55	40	37	43	36	42	36
XIV N00 - N99	i	287	305	366	418	440	411	416	524	558	646	620
	m	125	141	178	192	191	174	184	230	270	265	242
	w	162	164	188	226	249	237	232	294	288	381	378
XV O00 - O99	i	-	-	1	2	2	-	2	2	2	-	3
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	-	-	1	2	2	-	2	2	2	-	3
XVI P00 - P96	i	48	36	37	38	49	40	37	35	27	31	31
	m	23	15	22	20	26	29	19	14	15	20	22
	w	25	21	15	18	23	11	18	21	12	11	9
XVII Q00 - Q99	i	50	54	60	45	40	43	56	48	35	58	52
	m	27	31	31	19	22	22	30	28	14	26	20
	w	23	23	29	26	18	21	26	20	21	32	32
XVIII R00 - R99	i	234	267	272	295	345	392	342	393	442	811	444
	m	150	164	180	176	234	241	222	234	298	478	306
	w	84	103	92	119	111	151	120	159	144	333	138
XIX S00 - T98	i	1 487	1 326	1 395	1 316	1 240	1 278	1 231	1 232	1 086	1 002	1 158
	m	1 050	922	947	874	839	847	824	813	715	651	735
	w	437	404	448	442	401	431	407	419	371	351	423
Insgesamt A00 - T98	i	31 011	30 059	30 175	29 621	30 159	29 632	29 008	29 277	29 151	29 392	29 905
	m	14 496	14 076	14 298	13 954	14 250	14 062	13 892	14 002	14 980	14 059	14 344
	w	16 515	15 983	15 877	15 667	15 909	15 570	15 116	15 275	15 171	15 333	15 561


Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I A00 - B99	i	3,6	4,2	3,4	3,1	3,9	4,5	5,7	5,3	5,2	7,5	11,3
	m	4,0	5,0	3,5	3,2	4,0	4,5	5,9	5,6	5,3	6,6	11,4
	w	3,3	3,5	3,3	3,0	3,7	4,5	5,5	5,0	5,1	8,4	11,1
II C00 - D48	i	274,8	273,9	282,5	288,4	299,7	290,1	301,2	309,5	307,4	319,1	330,8
	m	294,4	300,1	307,5	313,9	330,7	327,4	345,6	346,6	345,1	366,6	375,3
	w	256,3	249,2	258,9	264,4	270,4	254,7	258,9	274,2	271,3	273,7	288,1
dar. C00 - C97	i	269,3	268,2	276,4	282,6	293,7	284,3	294,1	302,0	298,8	310,8	322,1
	m	289,0	295,1	302,0	308,7	325,9	321,9	339,6	340,0	338,5	359,6	366,7
	w	250,8	242,8	252,1	258,0	263,2	248,5	250,8	265,7	260,9	264,2	279,3
dar. C15 - C26	i	93,4	92,8	94,3	101,0	104,6	98,6	99,3	102,0	102,2	104,8	105,6
	m	90,4	95,8	95,3	103,3	109,9	104,3	109,8	110,8	113,2	116,4	117,5
	w	96,3	90,1	93,4	98,8	99,6	93,1	89,3	93,6	91,7	93,7	94,3
C30 - C39	i	58,0	53,5	60,2	56,7	59,9	57,9	58,6	63,7	63,1	67,4	65,2
	m	96,4	88,3	98,1	91,9	97,1	94,8	96,0	100,8	98,2	105,2	99,7
	w	21,8	20,7	24,3	23,3	24,5	22,7	23,0	28,3	29,5	31,3	32,0
C81 - C96	i	18,6	19,9	21,8	20,3	22,7	20,2	23,3	22,3	23,0	24,1	25,6
	m	18,9	20,3	21,3	20,4	22,6	20,1	26,2	22,1	22,1	25,1	28,4
	w	18,2	19,6	22,4	20,2	22,7	20,2	20,6	22,5	24,0	23,1	23,0
III D50 - D89	i	2,5	2,0	2,7	2,5	2,7	2,9	2,1	2,7	2,7	4,5	2,7
	m	1,6	1,9	2,2	2,0	2,2	2,3	1,3	2,0	1,9	3,9	1,9
	w	3,3	2,1	3,2	2,9	3,2	3,5	2,8	3,4	3,5	5,1	3,4
IV E00 - E90	i	44,1	41,4	47,3	48,1	54,4	54,7	62,7	58,0	62,8	66,4	47,8
	m	29,9	28,8	34,3	34,5	38,0	40,2	43,4	43,1	48,1	49,9	38,6
	w	57,5	53,4	59,6	60,9	70,0	68,6	81,0	72,2	76,8	82,3	56,6
dar. E10 - E14	i	40,2	38,0	42,1	43,3	49,4	50,2	57,0	53,1	57,8	60,0	41,7
	m	26,8	26,4	31,3	30,5	34,4	36,2	39,2	38,8	43,9	44,5	32,1
	w	52,8	49,0	52,2	55,3	63,7	63,5	73,9	66,8	71,0	74,9	50,9
V F00 - F99	i	9,4	6,2	7,5	6,9	6,0	6,6	7,0	7,7	9,0	8,9	15,9
	m	13,6	9,6	12,7	10,4	10,0	10,7	11,8	12,8	14,7	13,5	15,9
	w	5,3	2,9	2,6	3,4	2,3	2,7	2,4	2,8	3,5	4,5	15,8
dar. F10	i	6,8	5,1	6,0	5,0	4,9	5,4	5,7	6,5	7,4	6,1	4,6
	m	11,7	9,2	10,9	9,1	8,6	9,8	10,5	11,3	13,0	11,0	8,0
	w	2,2	1,2	1,3	1,2	1,4	1,2	1,2	1,9	2,0	1,4	1,3
VI G00 - G99	i	14,2	15,5	18,2	19,7	22,0	21,4	24,7	23,2	25,4	27,4	25,3
	m	15,2	15,8	17,7	19,5	22,7	20,7	23,9	22,8	25,3	25,5	24,0
	w	13,3	15,2	18,6	19,9	21,4	22,0	25,4	23,6	25,5	29,1	26,5
VII-VIII H00 - H95	i	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	-	0,0
	m	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1
	w	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
IX I00 - I99	i	609,5	595,5	584,4	576,1	587,8	594,5	561,2	567,7	572,2	551,5	583,3
	m	506,5	492,1	492,4	483,8	492,3	496,6	474,0	479,4	488,6	463,6	494,2
	w	706,7	693,2	671,4	663,5	678,3	687,6	644,4	651,9	652,0	635,6	668,6

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
X J00 - J99	i	49,0	50,2	51,2	48,4	42,4	39,8	38,2	43,9	41,2	48,9	62,1
	m	58,6	55,5	58,8	56,9	48,7	46,4	42,5	49,3	44,3	52,3	68,0
	w	39,9	45,3	44,0	40,4	36,5	33,6	34,0	38,8	38,2	45,5	56,4
dar. J40 - J47	i	30,0	29,6	28,4	28,1	27,0	26,8	23,4	24,3	21,6	25,0	29,5
	m	38,9	36,3	36,6	36,5	33,2	32,8	28,3	30,2	25,3	29,7	35,5
	w	21,6	23,2	20,7	20,2	21,1	21,2	18,8	18,6	18,0	20,6	23,7
XI K00 - K93	i	64,1	62,3	64,8	62,7	71,2	66,5	67,7	68,7	70,9	69,2	68,7
	m	78,7	79,1	80,8	76,8	85,4	81,4	79,9	83,6	80,4	79,9	77,1
	w	50,4	46,5	49,7	49,5	57,8	52,4	55,9	54,5	61,9	58,8	60,7
dar. K70 - K77	i	37,4	37,1	37,0	35,3	38,9	35,4	35,0	34,5	32,5	30,2	32,5
	m	54,8	55,4	55,5	52,2	56,6	54,4	52,2	52,0	47,1	45,9	46,9
	w	21,0	19,9	19,6	19,3	22,2	17,2	18,6	17,9	18,5	15,1	18,8
XII L00 - L99	i	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5
	m	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	-	0,2	-	0,5
	w	0,6	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4
XIII M00 - M99	i	3,1	2,5	2,8	2,5	3,0	2,2	2,2	2,5	2,4	2,4	2,8
	m	2,1	1,7	1,1	1,5	1,7	1,2	1,5	1,7	2,0	1,3	2,7
	w	4,0	3,3	4,4	3,4	4,2	3,1	2,9	3,4	2,9	3,4	2,9
XIV N00 - N99	i	10,7	11,5	13,9	16,1	17,2	16,2	16,6	21,1	22,7	26,6	25,9
	m	9,6	10,9	13,9	15,2	15,3	14,1	15,0	19,0	22,5	22,3	20,6
	w	11,7	12,0	13,9	16,9	18,9	18,2	18,1	23,1	22,9	30,7	30,9
XV O00 - O99	i	-	-	0,0	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	-	-	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2
XVI P00 - P96	i	1,8	1,4	1,4	1,5	1,9	1,6	1,5	1,4	1,1	1,3	1,3
	m	1,8	1,2	1,7	1,6	2,1	2,4	1,6	1,2	1,3	1,7	1,9
	w	1,8	1,5	1,1	1,3	1,8	0,9	1,4	1,7	1,0	0,9	0,7
XVII Q00 - Q99	i	1,9	2,0	2,3	1,7	1,6	1,7	2,2	1,9	1,4	2,4	2,2
	m	2,1	2,4	2,4	1,5	1,8	1,8	2,4	2,3	1,2	2,2	1,7
	w	1,7	1,7	2,1	1,9	1,4	1,6	2,0	1,6	1,7	2,6	2,6
XVIII R00 - R99	i	8,7	10,0	10,3	11,4	13,5	15,5	13,6	15,8	18,0	33,4	18,5
	m	11,5	12,7	14,1	13,9	18,7	19,5	18,1	19,3	24,8	40,3	26,1
	w	6,1	7,5	6,8	8,9	8,4	11,6	9,3	12,5	11,5	26,8	11,3
XIX S00 - T98	i	55,3	49,8	53,0	50,6	48,3	50,4	49,0	49,6	44,2	41,3	48,3
	m	80,4	71,3	74,0	69,2	67,2	68,5	67,3	67,1	59,6	54,8	62,7
	w	31,6	29,5	33,1	33,1	30,5	33,2	31,7	33,0	29,5	28,3	34,5
Insgesamt A00 - T98	i	1 153,0	1 128,9	1 146,0	1 140,0	1 175,9	1 168,7	1 155,8	1 179,4	1 187,0	1 210,7	1 247,4
	m	1 110,0	1 088,1	1 117,2	1 104,1	1 141,1	1 137,6	1 134,4	1 155,6	1 165,4	1 184,4	1 222,8
	w	1 193,5	1 167,5	1 173,3	1 174,0	1 208,9	1 198,3	1 176,1	1 202,0	1 207,7	1 235,9	1 270,9

Sterbefälle 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht



Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Geschl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Akutes rheumatisches Fieber (I00 - I02)	i	2	-	-	-	1	1
	m	1	-	-	-	1	-
	w	1	-	-	-	-	1
Chronische rheuma- tische Herzkrank- heiten (I05 - I09)	i	47	-	-	1	13	33
	m	12	-	-	1	4	7
	w	35	-	-	-	9	26
Hypertonie (I10 - I15)	i	1 416	-	1	32	211	1 172
	m	409	-	1	24	115	269
	w	1 007	-	-	8	96	903
Ischämische Herzkrank- heiten (I20 - I25)	i	5 974	-	4	254	1 559	4 157
	m	2 871	-	4	219	1 086	1 562
	w	3 103	-	-	35	473	2 595
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	i	2 722	-	2	203	976	1 541
	m	1 543	-	2	176	692	673
	w	1 179	-	-	27	284	868
Pulmonale Herzkrankheiten (I26 - I28)	i	404	-	1	28	141	234
	m	171	-	-	21	77	73
	w	233	-	1	7	64	161
Sonstige Formen der Herz- krankheit (I30 - I52)	i	2 746	2	7	102	526	2 109
	m	1 038	1	5	76	352	604
	w	1 708	1	2	26	174	1 505
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	2 692	-	4	77	543	2 068
	m	1 014	-	3	52	331	628
	w	1 678	-	1	25	212	1 440
dar. Schlaganfall nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet (I64)	i	746	-	-	5	123	618
	m	251	-	-	4	69	178
	w	495	-	-	1	54	440
Krankheiten d. Arterien, Arteriolen u. Kapillaren (I70 - I79)	i	609	-	-	10	135	464
	m	250	-	-	6	93	151
	w	359	-	-	4	42	313
dar. Atherosklerose (I70)	i	349	-	-	3	52	294
	m	124	-	-	2	36	86
	w	225	-	-	1	16	208
Krankheiten d. Venen, Lymphgefäße u. -knoten, n. anders klassifiziert (I80 - I89)	i	91	-	1	8	31	51
	m	31	-	-	3	16	12
	w	60	-	1	5	15	39
Sonstige Krankheiten d. Kreislaufsystems (I95 - I99)	i	2	-	-	-	-	2
	m	-	-	-	-	-	-
	w	2	-	-	-	-	2
Krankheiten d. Kreislauf- systems insgesamt (I00 - I99)	i	13 983	2	18	512	3 160	10 291
	m	5 797	1	13	402	2 075	3 306
	w	8 186	1	5	110	1 085	6 985


Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2008 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I00 - I02	i	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
I05 - I09	i	114	100	87	95	82	78	65	79	87	69	47
	m	30	22	26	26	30	22	19	24	27	16	12
	w	84	78	61	69	52	56	46	55	60	53	35
I10 - I15	i	638	671	752	876	1 067	1 208	1 328	1 479	1 547	1 507	1 416
	m	221	219	253	289	337	379	431	484	475	493	409
	w	417	452	499	587	730	829	897	995	1 072	1 014	1 007
I20 - I25	i	7 989	7 779	7 555	7 403	7 519	7 344	6 804	6 653	6 379	5 986	5 974
	m	3 610	3 484	3 404	3 386	3 347	3 299	3 133	3 059	2 997	2 809	2 871
	w	4 379	4 295	4 151	4 017	4 172	4 045	3 671	3 594	3 382	3 177	3 103
dar. I21, I22	i	3 319	3 261	3 211	3 092	3 085	3 002	2 790	2 906	2 717	2 653	2 722
	m	1 848	1 832	1 786	1 733	1 702	1 704	1 553	1 613	1 536	1 478	1 543
	w	1 471	1 429	1 425	1 359	1 383	1 298	1 237	1 293	1 181	1 175	1 179
I26 - I28	i	308	304	336	285	217	175	234	189	238	225	404
	m	144	144	145	138	105	87	105	79	101	90	171
	w	164	160	191	147	112	88	129	110	137	135	233
I30 - I52	i	2 005	2 014	2 076	1 886	1 782	1 942	1 880	1 932	2 222	2 216	2 746
	m	731	729	800	709	707	796	708	768	890	843	1 038
	w	1 274	1 285	1 276	1 177	1 075	1 146	1 172	1 164	1 332	1 373	1 708
I60 - I69	i	4 166	3 799	3 543	3 421	3 448	3 292	2 943	2 930	2 762	2 657	2 692
	m	1 486	1 314	1 268	1 186	1 246	1 163	1 078	1 052	1 045	972	1 014
	w	2 680	2 485	2 275	2 235	2 202	2 129	1 865	1 878	1 717	1 685	1 678
dar. I64	i	1 785	1 647	1 451	1 333	1 212	1 137	853	858	800	782	746
	m	619	558	507	443	401	381	285	274	287	269	251
	w	1 166	1 089	944	890	811	756	568	584	513	513	495
I70 - I79	i	1 061	1 082	891	871	841	929	747	734	740	668	609
	m	356	411	343	320	327	355	305	307	293	258	250
	w	705	671	548	551	514	574	442	427	447	410	359
dar. I70	i	847	839	639	617	594	663	497	472	484	406	349
	m	248	271	213	187	198	220	179	169	159	135	124
	w	599	568	426	430	396	443	318	303	325	271	225
I80 - I99	i	113	107	147	127	119	104	85	97	76	58	93
	m	37	43	63	59	49	37	25	36	33	21	31
	w	76	64	84	68	70	67	60	61	43	37	62
Insgesamt I00 - I99	i	16 394	15 856	15 387	14 969	15 075	15 072	14 086	14 093	14 052	13 388	13 983
	m	6 615	6 366	6 302	6 114	6 148	6 138	5 804	5 809	5 861	5 503	5 797
	w	9 779	9 490	9 085	8 855	8 927	8 934	8 282	8 284	8 191	7 885	8 186

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2008 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I00 - I02	i	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1
I05 - I09	i	4,2	3,8	3,3	3,7	3,2	3,1	2,6	3,2	3,5	2,8	2,0
	m	2,3	1,7	2,0	2,1	2,4	1,8	1,6	2,0	2,3	1,3	1,0
	w	6,1	5,7	4,5	5,2	4,0	4,3	3,6	4,3	4,8	4,3	2,9
I10 - I15	i	23,7	25,2	28,6	33,7	41,6	47,6	52,9	59,6	63,0	62,1	59,1
	m	16,9	16,9	19,8	22,9	27,0	30,7	35,2	39,9	39,6	41,5	34,9
	w	30,1	33,0	36,9	44,0	55,5	63,8	69,8	78,3	85,3	81,7	82,2
I20 - I25	i	297,0	292,1	286,9	284,9	293,2	289,7	271,1	268,0	259,8	246,6	249,2
	m	276,4	269,3	266,0	267,9	268,0	266,9	255,8	252,5	249,8	236,6	244,7
	w	316,5	313,7	306,8	301,0	317,0	311,3	285,6	282,8	269,2	256,1	253,4
dar. I21, I22	i	123,4	122,5	122,0	119,0	120,3	118,4	111,2	117,1	110,6	109,3	113,5
	m	141,5	141,6	139,6	137,1	136,3	137,9	126,8	133,1	128,0	124,5	131,5
	w	106,3	104,4	105,3	101,8	105,1	99,9	96,2	101,7	94,0	94,7	96,3
I26 - I28	i	11,5	11,4	12,8	11,0	8,5	6,9	9,3	7,6	9,7	9,3	16,9
	m	11,0	11,1	11,3	10,9	8,4	7,0	8,6	6,5	8,4	7,6	14,6
	w	11,9	11,7	14,1	11,0	8,4	6,8	10,0	8,7	10,9	10,9	19,0
I30 - I52	i	74,5	75,6	78,8	72,6	69,5	76,6	74,9	77,8	90,5	91,3	114,5
	m	56,0	56,4	62,5	56,1	56,6	64,4	57,8	63,4	74,2	71,0	88,5
	w	92,1	93,9	94,3	88,2	81,7	88,2	91,2	91,6	106,0	110,7	139,5
I60 - I69	i	154,9	142,7	134,6	131,7	134,4	129,8	117,3	118,0	112,5	109,4	112,3
	m	113,8	101,6	99,1	93,8	99,8	94,1	88,0	86,8	87,1	81,9	86,4
	w	193,7	181,5	168,1	167,5	167,3	163,9	145,1	147,8	136,7	135,8	137,0
dar. I64	i	66,4	61,9	55,1	51,3	47,3	44,8	34,0	34,6	32,6	32,2	31,1
	m	47,4	43,1	39,6	35,1	32,1	30,8	23,3	22,6	23,9	22,7	21,4
	w	84,3	79,5	69,8	66,7	61,6	58,2	44,2	46,0	40,8	41,4	40,4
I70 - I79	i	39,4	40,6	33,8	33,5	32,8	36,6	29,8	29,6	30,1	27,5	25,4
	m	27,3	31,8	26,8	25,3	26,2	28,7	24,9	25,3	24,4	21,7	21,3
	w	50,9	49,0	40,5	41,3	39,1	44,2	34,4	33,6	35,6	33,0	29,3
dar. I70	i	31,5	31,5	24,3	23,7	23,2	26,1	19,8	19,0	19,7	16,7	14,6
	m	19,0	20,9	16,6	14,8	15,9	17,8	14,6	13,9	13,3	11,4	10,6
	w	43,3	41,5	31,5	32,2	30,1	34,1	24,7	23,8	25,9	21,8	18,4
I80 - I99	i	4,2	4,0	5,6	4,9	4,6	4,1	3,4	3,9	3,1	2,4	3,9
	m	2,8	3,3	4,9	4,7	3,9	3,0	2,0	3,0	2,8	1,8	2,6
	w	5,5	4,7	6,2	5,1	5,3	5,2	4,7	4,8	3,4	3,0	5,1
Insgesamt I00 - I99	i	609,5	595,5	584,4	576,1	587,8	594,5	561,2	567,7	572,2	551,5	583,3
	m	506,5	492,1	492,4	483,8	492,3	496,6	474,0	479,4	488,6	463,6	494,2
	w	706,7	693,2	671,4	663,5	678,3	687,6	644,4	651,9	652,0	635,6	668,6

Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2008 nach Geschlecht



- Hypertonie
- Sonstige ischämische Krankheiten
- Arteriosklerotische Gefäßkrankheiten
- Myokardinfarkt
- Zerebrovaskuläre Krankheiten
- Übrige Herz-Kreislaufkrankheiten

Sterbefälle durch Neubildungen 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	7 721	9	40	695	3 720	3 257
	m	4 301	5	22	412	2 335	1 527
	w	3 420	4	18	283	1 385	1 730
dar. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00 - C14)	i	195	1	-	61	101	32
	m	166	1	-	59	90	16
	w	29	-	-	2	11	16
Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	2 532	-	6	186	1 187	1 153
	m	1 378	-	4	136	777	461
	w	1 154	-	2	50	410	692
Atmungsorgane u. intrathorakale Organe (C30 - C39)	i	1 562	-	2	154	896	510
	m	1 170	-	1	104	715	350
	w	392	-	1	50	181	160
Haut (C43 - C44)	i	96	-	1	12	32	51
	m	47	-	-	9	16	22
	w	49	-	1	3	16	29
Brustdrüse (C50)	i	488	-	2	64	223	199
	m	5	-	-	-	2	3
	w	483	-	2	64	221	196
Weibliche Genital- organe (C51 - C58)	i	444	-	1	51	197	195
	m	x	x	x	x	x	x
	w	444	-	1	51	197	195
Männliche Genital- organe (C60 - C63)	i	415	-	1	10	156	248
	m	415	-	1	10	156	248
	w	x	x	x	x	x	x
Harnorgane (C64 - C68)	i	534	-	-	24	248	262
	m	347	-	-	15	179	153
	w	187	-	-	9	69	109
Auge, Gehirn u. Teile d. Zentralnerven- systems (C69 - C72)	i	200	3	11	33	110	43
	m	108	1	5	17	64	21
	w	92	2	6	16	46	22
Lymphatische, blutbil- dende Gewebe (C81 - C96)	i	614	3	4	45	284	278
	m	333	3	3	29	170	128
	w	281	-	1	16	114	150
In-situ-Neubildungen (D00 - D09)	i	3	-	-	-	-	3
	m	-	-	-	-	-	-
	w	3	-	-	-	-	3
Gutartige Neubildungen (D10 - D36)	i	35	-	-	4	10	21
	m	14	-	-	2	6	6
	w	21	-	-	2	4	15
Neubildungen unbekanntes Verhaltens (D37 - D48)	i	172	3	2	5	53	109
	m	88	2	1	4	31	50
	w	84	1	1	1	22	59
Neubildungen insgesamt (C00 - D48)	i	7 931	12	42	704	3 783	3 390
	m	4 403	7	23	418	2 372	1 583
	w	3 528	5	19	286	1 411	1 807

Sterbefälle durch Neubildungen 1998 - 2008 nach Geschlecht

Männer

Sterbefälle in Tausend

Frauen



- Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
- Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und intrathorakaler Organe
- Bösartige Neubildungen der Genitalorgane
- Bösartige Neubildungen der Harnorgane
- Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden Gewebes
- Übrige Neubildungen

Nichtnatürliche Sterbefälle 2008 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Verletzungen d. Kopfes (S00 - S09)	i	222	2	27	53	66	74
	m	152	1	19	46	53	33
	w	70	1	8	7	13	41
Verletzungen d. Halses (S10 - S19)	i	35	-	4	8	16	7
	m	26	-	3	5	13	5
	w	9	-	1	3	3	2
Verletzungen d. Thorax (S20 - S29)	i	44	-	5	9	12	18
	m	30	-	5	9	7	9
	w	14	-	-	-	5	9
Verletzungen d. Abdomens, d. Lendenwirbelsäule u. d. Beckens (S30 - S39)	i	28	-	1	2	9	16
	m	20	-	1	2	9	8
	w	8	-	-	-	-	8
Verletzungen d. Extremitäten (S40 - S99)	i	177	-	1	9	23	144
	m	59	-	1	5	12	41
	w	118	-	-	4	11	103
dar. Verletzungen d. Hüfte u. d. Oberschenkels (S70 - S79)	i	144	-	-	3	17	124
	m	43	-	-	1	7	35
	w	101	-	-	2	10	89
Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00 - T07)	i	190	1	64	61	36	28
	m	140	-	55	47	25	13
	w	50	1	9	14	11	15
Verbrennungen o. Ver- ätzungen (T20 - T32)	i	18	1	2	4	8	3
	m	15	1	2	4	7	1
	w	3	-	-	-	1	2
Erfrierungen (T33 - T35)	i	3	-	-	1	2	-
	m	3	-	-	1	2	-
	w	-	-	-	-	-	-
Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen u. biologisch aktive Substanzen (T36 - T50)	i	37	1	4	15	9	8
	m	16	1	4	8	3	-
	w	21	-	-	7	6	8
Toxische Wirkung von nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51 - T65)	i	42	-	4	20	16	2
	m	28	-	3	14	10	1
	w	14	-	1	6	6	1
Sonstige Schäden	i	362	6	39	109	114	94
	m	246	3	33	88	81	41
	w	116	3	6	21	33	53
Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	1 158	11	151	291	311	394
	m	735	6	126	229	222	152
	w	423	5	25	62	89	242

Unfalltote 2008 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	25	-	5	13	7	-
	m	24	-	5	13	6	-
	w	1	-	-	-	1	-
Verkehrsunfall	i	228	2	83	65	47	31
	m	169	1	67	50	34	17
	w	59	1	16	15	13	14
Häuslicher Unfall	i	267	1	1	29	59	177
	m	129	1	1	24	42	61
	w	138	-	-	5	17	116
Sport-/Spielunfall	i	4	2	-	1	1	-
	m	4	2	-	1	1	-
	w	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	183	3	10	36	58	76
	m	96	2	9	26	40	19
	w	87	1	1	10	18	57
Insgesamt	i	707	8	99	144	172	284
	m	422	6	82	114	123	97
	w	285	2	17	30	49	187

Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2008 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	1,0	-	0,9	1,7	1,1	-
	m	2,0	-	1,8	3,4	2,0	-
	w	0,1	-	-	-	0,3	-
Verkehrsunfall	i	9,5	0,8	15,7	8,7	7,3	13,7
	m	14,4	0,8	23,7	13,0	11,1	22,8
	w	4,8	0,8	6,5	4,1	3,8	9,2
Häuslicher Unfall	i	11,1	0,4	0,2	3,9	9,1	78,2
	m	11,0	0,8	0,4	6,3	13,7	81,9
	w	11,3	-	-	1,4	5,0	76,4
Sport-/Spielunfall	i	0,2	0,8	-	0,1	0,2	-
	m	0,3	1,6	-	0,3	0,3	-
	w	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	7,6	1,2	1,9	4,8	9,0	33,6
	m	8,2	1,6	3,2	6,8	13,1	25,5
	w	7,1	0,8	0,4	2,7	5,3	37,5
Insgesamt	i	29,5	3,3	18,7	19,2	26,6	125,5
	m	36,0	4,7	29,0	29,8	40,2	130,2
	w	23,3	1,7	6,9	8,2	14,4	123,2

Unfalltote 2008 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Männer



Frauen



Unfälle 1998 - 2008 nach Unfallkategorien und Geschlecht



Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Arbeits- / Schulunfall	i	36	44	37	33	18	35	28	29	33	28	25
	m	33	42	36	31	17	33	28	26	30	27	24
	w	3	2	1	2	1	2	-	3	3	1	1
Verkehrs- Unfall	i	451	354	382	323	267	318	259	250	207	180	228
	m	345	264	284	235	196	235	187	187	156	131	169
	w	106	90	98	88	71	83	72	63	51	49	59
Häuslicher Unfall	i	268	277	281	261	301	297	262	285	216	228	267
	m	130	139	133	115	142	137	123	126	96	107	129
	w	138	138	148	146	159	160	139	159	120	121	138
Sport- / Spielunfall	i	8	6	6	5	1	7	7	4	1	1	4
	m	6	3	5	4	1	6	5	3	1	1	4
	w	2	3	1	1	-	1	2	1	-	-	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	167	146	181	174	154	155	143	129	141	98	183
	m	116	89	116	106	101	95	91	78	86	56	96
	w	51	57	65	68	53	60	52	51	55	42	87
Insgesamt	i	930	827	887	796	741	812	699	697	598	535	707
	m	630	537	574	491	457	506	434	420	369	322	422
	w	300	290	313	305	284	306	265	277	229	213	285

Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 1998 - 2008 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Arbeits- / Schulunfall	i	1,3	1,7	1,4	1,3	0,7	1,4	1,1	1,2	1,3	1,2	1,0
	m	2,5	3,2	2,8	2,5	1,4	2,7	2,3	2,1	2,5	2,3	2,0
	w	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,1
Verkehrs- unfall	i	16,8	13,3	14,5	12,4	10,4	12,5	10,3	10,1	8,4	7,4	9,5
	m	26,4	20,4	22,2	18,6	15,7	19,0	15,3	15,4	13,0	11,0	14,4
	w	7,7	6,6	7,2	6,6	5,4	6,4	5,6	5,0	4,1	3,9	4,8
Häuslicher Unfall	i	10,0	10,4	10,7	10,0	11,7	11,7	10,4	11,5	8,8	9,4	11,1
	m	10,0	10,7	10,4	9,1	11,4	11,1	10,0	10,4	8,0	9,0	11,0
	w	10,0	10,1	10,9	10,9	12,1	12,3	10,8	12,5	9,6	9,8	11,3
Sport- / Spielunfall	i	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
	m	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3
	w	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	6,2	5,5	6,9	6,7	6,0	6,1	5,7	5,2	5,7	4,0	7,6
	m	8,9	6,9	9,1	8,4	8,1	7,7	7,4	6,4	7,2	4,7	8,2
	w	3,7	4,2	4,8	5,1	4,0	4,6	4,0	4,0	4,4	3,4	7,1
Insgesamt	i	34,6	31,1	33,7	30,6	28,9	32,0	27,9	28,1	24,4	22,0	29,5
	m	48,2	41,5	44,8	38,9	36,6	40,9	35,4	34,7	30,8	27,1	36,0
	w	21,7	21,2	23,1	22,9	21,6	23,6	20,6	21,8	18,2	17,2	23,3

Nichtnatürliche Sterbefälle 2008 nach äußerer Ursache und Geschlecht

Äußere Ursache	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.
Transportmittelunfälle (V01- V99)	234	20,2	9,8	173	23,5	14,7	61	14,4	5,0
dar. Fußgänger (V01 - V09)	27	2,3	1,1	20	2,7	1,7	7	1,7	0,6
Radfahrer (V10 - V19)	14	1,2	0,6	11	1,5	0,9	3	0,7	0,2
Krad-Benutzer (V20 - V19)	29	2,5	1,2	26	3,5	2,2	3	0,7	0,2
PKW-Benutzer (V40 - V49)	78	6,7	3,3	54	7,3	4,6	24	5,7	2,0
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	5	0,4	0,2	4	0,5	0,3	1	0,2	0,1
Autobusbenutzer (V70 - V79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	213	18,4	8,9	106	14,4	9,0	107	25,3	8,7
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	14	1,2	0,6	10	1,4	0,9	4	0,9	0,3
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	33	2,9	1,4	14	1,9	1,2	19	4,5	1,6
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	19	1,6	0,8	16	2,2	1,4	3	0,7	0,2
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	10	0,9	0,4	7	0,9	0,6	3	0,7	0,2
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	20	1,7	0,8	13	1,8	1,1	7	1,7	0,6
Suizide (X60 - X84)	288	24,9	12,0	211	28,7	18,0	77	18,2	6,3
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	22	1,9	0,9	11	1,5	0,9	11	2,6	0,9
Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	140	12,1	5,8	91	12,4	7,8	49	11,6	4,0
Komplikationen bei der medizi- nischen und chirurgischen Behandlung (Y40 - Y84)	26	2,2	1,1	10	1,4	0,9	16	3,8	1,3
Übrige	139	12,0	5,8	73	9,9	6,2	66	15,6	5,4
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	1 158	100	48,3	735	100	62,7	423	100	34,5
dar. Unfälle insgesamt (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	707	61,1	29,5	422	57,4	36,0	285	67,4	23,3






Alkoholbedingte Sterbefälle 2003 und 2008 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	2003			2008		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
E24.4	Durch Alkohol induziertes Pseudo-Cushing-Syndrom	-	-	-	-	-
E52	Niazinmangel [Pellagra]	-	-	-	-	-
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	136	121	15	110	94
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	5	5	-	11	8
G62.1	Alkohol-Polyneuropathie	2	2	-	1	1
G72.1	Alkoholmyopathie	-	-	-	-	-
I42.6	Alkoholische Kardiomyopathie	32	30	2	24	23
K29.2	Alkoholgastritis	13	8	5	4	4
K70	Alkoholische Leberkrankheit	663	523	140	506	396
K85.2	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis	-	-	-	5	5
K86.0	Durch Alkohol induzierte chronische Pankreatitis	18	14	4	7	7
O35.4	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol	-	x	-	-	x
P04.3	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter	-	-	-	-	-
Q86.0	Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)	-	-	-	-	-
R78.0	Nachweis von Alkohol im Blut	-	-	-	-	-
T51.0	Toxische Wirkung: Äthanol	7	7	-	9	6
T51.9	Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet	9	6	3	3	1
Insgesamt		885	716	169	680	545
Anteil aller Sterbefälle in %		3,0	5,1	1,1	2,3	3,8
Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung		34,9	57,9	13,0	28,4	46,5

Alkoholbedingte Sterbefälle 2003 und 2008 nach Altersgruppen im Vergleich

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			
	2003		2008	
	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	-	-	-	-
1 - 15	-	-	-	-
15 - 35	17	1,9	8	1,2
35 - 55	392	44,3	289	42,5
55 - 75	432	48,8	339	49,8
75 und mehr	44	5,0	44	6,5
insgesamt	885	100	680	100



Mittleres Sterbealter 2002 - 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren						
		2002 ¹⁾	2003 ¹⁾	2004	2005	2006	2007	2008
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	i	65,9	68,1	69,9	70,6	69,8	73,4	71,2
	m	61,5	63,1	65,1	66,7	64,1	72,0	68,1
	w	70,4	72,9	74,8	74,7	75,5	74,4	74,3
II Neubildungen (C00 - D48)	i	70,8	71,0	70,9	71,0	71,1	71,5	71,4
	m	68,9	69,4	69,1	69,6	69,7	70,1	70,0
	w	73,1	73,1	73,1	72,7	72,9	73,3	73,1
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	70,7	70,9	70,8	70,9	71,0	71,4	71,3
	m	68,9	69,3	69,1	69,5	69,7	70,1	69,9
	w	72,9	72,9	73,0	72,5	72,6	73,1	73,0
dar. Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	72,1	72,2	71,9	72,0	72,3	72,5	72,4
	m	68,8	69,3	69,2	69,6	69,7	70,1	69,6
	w	75,5	75,3	75,0	74,7	75,2	75,3	75,8
... der Atmungsorgane (C30 - C39)	i	69,0	69,1	68,7	68,9	68,7	69,2	69,4
	m	68,5	68,4	68,3	68,5	68,5	68,9	69,2
	w	70,8	71,8	70,2	70,3	69,4	70,4	70,1
... des lymphatischen, blutbilden- den und verwandten Gewebes (C81 - C96)	i	69,8	70,8	71,1	71,7	71,6	71,7	72,1
	m	67,3	68,4	69,1	70,0	68,9	70,0	70,2
	w	72,1	73,0	73,6	73,2	73,9	73,5	74,4
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	i	73,0	73,1	74,5	76,4	77,9	75,8	75,4
	m	64,6	72,3	65,1	71,5	79,0	71,3	70,9
	w	78,6	73,6	78,6	79,1	77,3	79,1	77,8
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	i	77,7	77,3	76,8	77,4	76,9	77,4	77,6
	m	73,2	72,2	70,2	71,5	71,7	71,1	73,0
	w	80,1	80,1	80,1	80,7	80,0	81,1	80,7
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	i	78,8	77,8	77,5	78,3	77,8	78,3	79,1
	m	74,5	73,0	70,8	72,9	72,6	72,5	74,6
	w	81,1	80,4	80,9	81,4	80,8	81,6	81,8
V Psychische und Verhaltens- störungen (F00 - F99)	i	60,0	56,8	57,7	56,4	57,0	63,1	75,0
	m	58,4	56,4	55,5	54,6	55,8	60,3	65,7
	w	66,6	59,8	68,0	64,0	61,8	71,3	83,8
dar. ... durch Alkohol (F10)	i	57,5	56,7	54,9	54,6	55,2	57,0	54,2
	m	56,8	56,5	54,7	54,1	55,5	57,7	53,5
	w	61,4	58,5	57,1	57,5	53,0	51,8	58,3
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	i	71,4	73,2	72,6	70,9	71,6	73,6	72,9
	m	68,0	67,7	67,5	67,1	67,1	69,5	68,4
	w	74,7	78,1	77,1	74,4	75,8	77,1	76,8
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	i	79,6	79,8	79,2	79,4	79,6	79,7	79,9
	m	74,7	74,5	74,2	74,4	74,5	74,4	75,0
	w	82,9	83,3	82,8	82,9	83,2	83,3	83,4
dar. Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	78,8	78,9	78,5	78,7	78,6	78,7	78,7
	m	74,1	73,7	73,7	73,9	73,8	73,7	74,3
	w	82,6	83,2	82,5	82,8	82,8	83,1	82,8
dar. Akuter Myokardinfarkt (I21)	i	74,2	74,2	73,9	74,7	74,3	75,1	74,9
	m	70,3	70,0	69,9	70,9	70,4	70,9	71,3
	w	78,8	79,5	78,7	79,3	79,3	80,1	79,5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	80,9	81,3	80,2	80,3	80,5	80,4	80,5
	m	77,0	77,2	75,9	76,0	76,2	75,7	76,1
	w	83,2	83,5	82,7	82,6	83,2	83,1	83,2

¹⁾ Berechnung über jeweilige fiktive Altersgruppenmitten

Noch: Mittleres Sterbealter 2002 - 2008 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren						
		2002 ¹⁾	2003 ¹⁾	2004	2005	2006	2007	2008
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	i	77,2	77,3	76,4	77,3	76,8	77,6	77,9
	m	74,4	74,8	74,1	75,3	73,7	74,6	75,3
	w	80,7	80,5	79,2	79,8	80,3	80,9	80,8
dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	i	76,8	76,7	75,6	75,8	75,8	75,7	77,1
	m	74,9	74,6	74,3	74,4	73,5	74,0	75,4
	w	79,7	79,9	77,5	78,0	78,9	78,1	79,4
XI Krankheiten des Verdauungs- systems (K00 - K93)	i	65,9	67,0	68,0	67,5	69,0	69,6	70,0
	m	61,2	62,4	63,1	62,5	64,1	64,6	65,0
	w	72,5	73,9	74,8	74,6	75,2	76,2	76,1
dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	i	58,4	59,4	60,1	59,9	60,8	61,5	62,6
	m	57,2	58,8	58,9	58,4	59,4	60,4	61,1
	w	61,1	61,2	63,3	64,2	64,4	64,4	66,3
XIV Krankheiten des Urogenital- systems (N00 - N99)	i	78,8	79,0	79,3	79,5	79,2	79,8	81,1
	m	76,5	76,1	77,6	77,1	76,6	77,6	78,4
	w	80,5	81,2	80,6	81,5	81,7	81,3	82,8
XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	i	18,0	30,8	37,8	41,0	30,7	49,2	49,2
	m	17,4	31,4	35,2	35,3	38,8	39,8	42,5
	w	18,6	30,2	40,8	49,0	25,3	56,9	53,4
XIX Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	55,3	55,2	56,0	57,6	59,6	61,2	61,1
	m	50,3	49,1	51,3	52,2	53,8	55,9	55,2
	w	65,9	67,2	65,6	67,9	70,6	71,1	71,4
dar. Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70 - S79)	i	84,0	85,1	84,3	82,9	84,8	83,9	83,9
	m	77,0	82,9	81,8	80,4	82,8	82,5	80,9
	w	86,6	85,9	85,6	84,1	85,7	84,7	85,2
aus XX Transportmittelunfälle (V01 - V99)	i	39,8	41,4	40,0	42,6	42,5	45,4	45,9
	m	38,0	39,2	39,0	41,4	38,9	43,0	43,9
	w	44,9	47,8	42,6	45,9	54,5	51,9	51,6
Unfälle durch Sturz (W00 - W19)	i	73,3	74,1	75,3	75,2	73,7	76,8	76,0
	m	64,1	64,8	69,0	66,7	66,6	69,8	67,5
	w	82,0	82,1	80,8	80,9	81,3	82,4	84,3
Unfälle durch Ertrinken (W65 - W74)	i	50,6	43,0	43,2	46,7	46,1	53,3	59,5
	m	43,0	31,9	37,8	43,0	42,7	52,8	51,7
	w	65,7	66,4	74,0	57,7	51,3	56,0	79,0
Suizide (X60 - X84)	i	54,7	54,7	54,6	54,3	59,1	57,5	56,3
	m	53,1	52,1	53,5	53,2	58,0	56,7	54,3
	w	60,4	62,2	57,6	57,5	62,4	60,5	61,8
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	i	56,1	36,7	28,1	35,9	41,1	45,5	49,5
	m	58,1	35,4	30,2	30,7	46,3	51,9	45,4
	w	53,9	38,9	25,2	38,5	35,0	38,2	53,6
Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	i	48,0	53,3	58,3	57,7	61,5	63,7	63,2
	m	46,8	50,8	52,8	53,3	58,2	59,0	58,6
	w	51,2	58,9	73,4	70,1	68,5	73,1	71,9
Insgesamt (A00 - T98)	i	74,5	74,9	74,4	74,6	74,9	75,3	75,5
	m	69,6	69,7	69,5	69,9	70,3	70,7	71,0
	w	79,0	79,5	79,0	78,9	79,2	79,6	79,7

¹⁾ Berechnung über jeweilige fiktive Altersgruppenmitten

Mittleres Sterbealter 1990 bis 2008 nach Geschlecht

Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren											
	1990 ¹⁾	1992 ¹⁾	1994 ¹⁾	1996 ¹⁾	1998 ¹⁾	2000 ¹⁾	2002 ¹⁾	2004	2005	2006	2007	2008
i	74,0	74,0	74,4	74,8	73,8	74,1	74,5	74,4	74,6	74,9	75,3	75,5
m	69,7	69,6	69,8	70,2	68,7	69,2	69,6	69,5	69,9	70,3	70,7	71,0
w	77,6	77,9	78,1	78,8	78,2	78,5	79,0	79,0	78,9	79,2	79,6	79,7

¹⁾ Berechnung über jeweilige fiktive Altersgruppenmitten

Vermeidbare Sterbefälle 2003 und 2008 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Alter	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		2003			2008		
		insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
- Alle Krankheiten (A00 - T98)	unter 1	2,8	4,0	1,8	2,5	3,2	2,0
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten Tuberkulose und deren Folgezustände (A15 - A19, B90)	5 - 65	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	-
II Neubildungen Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses (C53) Hodgkin-Krankheit (C81)	5 - 65 5 - 35	1,2 0,1	x 0,2	2,3 -	1,4 -	x -	2,7 -
IX Krankheiten des Kreislaufsystems Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09) Hypertonie (I10 - I15) Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	5 - 45 5 - 65 5 - 65	- 4,7 8,3	- 6,1 10,8	- 3,2 6,0	- 3,3 7,8	- 4,9 10,8	- 1,7 4,9
XI Krankheiten des Verdauungssystems Krankheiten der Appendix (K35 - K38) Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K80 - K83)	5 - 65 5 - 65	0,0 0,2	0,1 0,1	- 0,2	0,0 0,3	- 0,3	0,1 0,3
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	15 - 50	-	x	-	0,1	x	0,2
Insgesamt		17,4	21,4	13,6	15,7	19,7	11,9

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2008

Im Jahr 2008 wurden insgesamt 61 Säuglingssterbefälle, davon 37 männliche und 24 weibliche, registriert. Das waren gegenüber dem Vorjahr 9 gestorbene Säuglinge mehr.

Das zweite Jahr infolge konnte eine leichte Zunahme der Anzahl der Lebendgeborenen festgestellt werden.

Obwohl die Anzahl der Lebendgeborenen um 565 gegenüber dem Vorjahr zugenommen hatte, ist die Säuglingssterblichkeit von 2,99 ‰ im Jahr 2007 auf 3,45 ‰ im Berichtsjahr angestiegen. Der Anteil der verstorbenen männlichen Säuglinge an

der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge betrug 60,7 %.

Von den 61 verstorbenen Säuglingen starben wie auch im Vorjahr 24 innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt.

Durch die höhere Anzahl an Lebendgeborenen sank die Säuglingssterbeziffer der Frühsterblichkeit von 1,38 ‰ im Vorjahr auf 1,36 ‰ im Berichtsjahr.

Die Anzahl der Totgeborenen sank gegenüber dem Vorjahr auf 66 Totgeburten. Die Totgeborenenrate fiel damit auf 3,72 ‰.

Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer

Lebensdauer von ... bis unter ...	Gestorbene Säuglinge					
	2008			2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 24 Stunden	16	9	7	17	11	6
24 Stunden - 7 Tage	8	5	3	7	4	3
7 Tage - 28 Tage	12	7	5	12	7	5
28 Tage - 1 Jahr	25	16	9	16	6	10
insgesamt	61	37	24	52	28	24

Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer

Vorgang	2008			2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl der Lebendgeborenen	17 697	9 079	8 618	17 132	8 868	8 264
Anzahl der Totgeborenen	66	35	31	83	46	37
Anzahl der gestorbenen Säuglinge	61	37	24	52	28	24
dar. in den ersten 7 Tagen	24	14	10	24	15	9
Säuglingssterblichkeit in ‰	3,45	4,08	2,78	2,99	3,13	2,84
Frühsterblichkeit in ‰	1,36	1,54	1,16	1,38	1,68	1,07
Spätsterblichkeit in ‰	0,68	0,77	0,58	0,70	0,79	0,61
Nachsterblichkeit in ‰	1,41	1,76	1,04	0,93	0,68	1,21
Totgeborenenrate in ‰	3,72	3,84	3,58	4,82	5,16	4,46
Perinatale Mortalität in ‰	5,07	5,38	4,74	6,22	6,84	5,54

Säuglingssterbefälle nach Geburtsgewicht


Von besonderer Bedeutung für die Überlebenschancen der Neugeborenen ist das Geburtsgewicht. Die Sterblichkeit der untergewichtigen Lebendgeborenen (Geburtsgewicht unter 2 500 g),

liegt erfahrungsgemäß höher als bei Normgewichtigen. Der Anteil der Untergewichtigen an der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge betrug im Berichtsjahr 67,2 %.

Geburtsgewicht	2008			2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1000 g	27	19	8	19	14	5
1000 g - 1500 g	4	4	-	8	3	5
1500 g - 2000 g	3	3	-	1	-	1
2000 g - 2500 g	7	1	6	4	2	2
2500 g - 3000 g	8	3	5	2	-	2
3000 g - 3500 g	4	-	4	4	1	3
3500 g und mehr	4	4	-	5	2	3
ohne Angabe	4	3	1	9	6	3
insgesamt	61	37	24	52	28	24

Säuglingssterbefälle 1970 - 2008 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle im ersten Lebensjahr					
	absolut			je 1 000 Lebendgeborene		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	861	494	367	19,02	21,36	16,57
1971	831	488	343	18,20	20,73	15,51
1972	725	435	290	18,95	22,11	15,60
1973	531	300	231	15,89	17,35	14,32
1974	578	335	243	17,69	20,06	15,20
1975	523	311	212	16,24	18,64	13,66
1976	469	268	201	13,60	15,16	11,96
1977	548	313	235	13,88	15,43	12,25
1978	592	366	226	14,32	17,14	11,32
1979	566	329	237	13,66	15,39	11,81
1980	534	315	219	12,39	14,23	10,45
1981	550	344	206	13,05	15,81	10,11
1982	486	281	205	11,61	13,12	10,02
1983	437	277	160	10,52	12,93	7,95
1984	414	234	180	10,28	11,32	9,18
1985	394	231	163	9,84	11,24	8,37
1986	400	243	157	10,16	12,09	8,15
1987	348	208	140	8,73	10,19	7,20
1988	320	187	133	8,32	9,42	7,15
1989	285	171	114	8,11	9,42	6,71
1990	254	166	88	7,98	10,07	5,73
1991	177	106	71	9,10	10,64	7,48
1992	128	77	51	7,86	9,12	6,51
1993	84	43	41	5,75	5,73	5,77
1994	91	44	47	6,37	6,01	6,76
1995	90	53	37	6,18	7,04	5,26
1996	92	49	43	5,70	5,89	5,49
1997	86	45	41	5,00	5,03	4,98
1998	93	50	43	5,31	5,57	5,03
1999	70	38	32	3,85	4,03	3,66
2000	79	45	34	4,22	4,63	3,77
2001	73	41	32	4,04	4,40	3,65
2002	87	47	40	4,94	5,16	4,70
2003	72	49	23	4,26	5,63	2,81
2004	70	38	32	4,04	4,22	3,84
2005	53	25	28	3,09	2,88	3,30
2006	58	24	34	3,43	2,72	4,20
2007	52	28	24	2,99	3,13	2,84
2008	61	37	24	3,45	4,08	2,78



Säuglingssterblichkeit 1998 - 2008 nach Geschlecht

Vorgang	Ge- schl.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Lebend- geborene	i	17 513	18 176	18 723	18 073	17 617	16 889	17 337	17 166	16 927	17 132	17 697
	m	8 969	9 426	9 716	9 313	9 113	8 696	9 012	8 674	8 838	8 868	9 079
	w	8 544	8 750	9 007	8 760	8 504	8 193	8 325	8 492	8 089	8 264	8 618
Totgeborene	i	85	87	76	75	71	87	77	66	57	83	66
	m	46	43	39	39	40	49	40	36	25	46	35
	w	39	44	37	36	31	38	37	30	32	37	31
Gestorbene Säuglinge	i	93	70	79	73	87	72	70	53	58	52	61
	m	50	38	45	41	47	49	38	25	24	28	37
	w	43	32	34	32	40	23	32	28	34	24	24
dar. in den ersten 7 Tagen	i	40	35	43	38	48	30	46	30	22	24	24
	m	12	17	21	19	28	20	27	17	11	15	14
	w	28	18	22	19	20	10	19	13	11	9	10
Säuglings- sterblichkeit	i	5,31	3,85	4,22	4,04	4,94	4,26	4,04	3,09	3,43	2,99	3,45
	m	5,57	4,03	4,63	4,40	5,16	5,63	4,22	2,88	2,72	3,13	4,08
	w	5,03	3,66	3,77	3,65	4,70	2,81	3,84	3,30	4,20	2,84	2,78
Frühsterblich- keit	i	2,28	1,93	2,30	2,10	2,73	1,78	2,65	1,75	1,30	1,38	1,36
	m	1,34	1,80	2,16	2,04	3,07	2,30	3,00	1,96	1,24	1,68	1,54
	w	3,28	2,06	2,44	2,17	2,35	1,22	2,28	1,53	1,36	1,07	1,16
Totgeborenen- rate	i	4,83	4,76	4,04	4,13	4,01	5,12	4,42	3,83	3,36	4,82	3,72
	m	5,10	4,54	4,00	4,17	4,37	5,60	4,42	4,13	2,82	5,16	3,84
	w	4,54	5,00	4,09	4,09	3,63	4,62	4,43	3,52	3,94	4,46	3,58
Perinatale Mortalität	i	7,10	6,68	6,33	6,23	6,73	6,89	7,06	5,57	4,65	6,22	5,07
	m	6,43	6,34	6,15	6,20	7,43	7,89	7,40	6,08	4,06	6,84	5,38
	w	7,81	7,05	6,52	6,25	5,98	5,83	6,70	5,05	5,29	5,54	4,74

Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2008

Die hauptsächlichen Todesursachen, die die Höhe der Säuglingssterblichkeit maßgeblich beeinflussten, waren nach wie vor **Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben** mit 50,8 %. Wesentlichen Anteil haben in dieser Kategorie Krankheiten des Atmungs- und Kreislaufsystems mit 19,7 % und Frühgeburten mit 14,8% aller Säuglingssterbefälle.

Der seit Jahren beobachtete rückläufige Trend der Sterblichkeit beim Syndrom **Plötzlicher Kindstod** (Säuglingssterbefälle, deren Todesursache nicht bekannt ist bzw. auch durch Autopsie nicht geklärt werden konnte) setzte sich 2008 nicht fort. Während im Jahr 2005 keine Säuglinge an dieser Todesursache verstarben und im Vorjahr auch nur ein Fall in dieser Kategorie gezählt wurde, waren

im aktuellen Berichtsjahr gleich 9 solcher Sterbefälle zu verzeichnen. Das waren 13,1 % aller Säuglingssterbefälle. Davon waren 8 männliche und ein weiblicher Säugling.

Mit 11,5 % waren die **Angeborenen Fehlbildungen**, darunter zum größten Teil die Fehlbildungen des Kreislaufsystems (4,9 % aller Säuglingssterbefälle) an den Todesursachen im Säuglingsalter beteiligt. Der Anteil der angeborenen Fehlbildungen bei den Säuglingssterbefällen ist seit Jahren schon rückläufig.


Jeweils 4,9 % im Berichtsjahr entfielen auch auf **Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten**, die **Krankheiten des Atmungssystems** sowie auf die **Nichtnatürlichen Todesursachen**.

Säuglingssterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Säuglinge					
	insgesamt	männlich	weiblich	dar. in den ersten 7 Tagen		
				insg.	männl.	weibl.
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	3	1	2	1	1	-
II Neubildungen (C00 - D48)	-	-	-	-	-	-
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	-	-	-	-	-	-
IV Endokrine , Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1	-	1	-	-	-
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren (G00 - H95)	2	1	1	-	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	-	-	-	-	-	-
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	3	1	2	-	-	-
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	1	1	-	-	-	-
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	1	-	1	-	-	-
XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	31	22	9	16	11	5
dar. Frühgeburten (P05, P07)	9	8	1	5	4	1
Krankheiten des Atmungs- und Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20 - P29)	12	8	4	6	4	2
Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Neugeborenen (P50 - P61)	4	3	1	2	2	-
XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	7	4	3	4	2	2
dar. ... des Kreislaufsystems (Q20 - Q28)	3	1	2	1	-	1
aus XVIII Plötzlicher Kindstod (R95)	9	6	3	1	-	1
XX Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	3	1	2	1	-	1
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	1	1	-	-	-	-
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	2	-	2	2	-	2
Übrige	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	61	37	24	24	14	10

Säuglingssterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

männlich



weiblich





Säuglingssterbefälle 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I A00 - B99	i	3	-	1	1	2	3	2	1	-	2	3
	m	1	-	-	-	2	2	1	1	-	1	1
	w	2	-	1	1	-	1	1	-	-	1	2
VI G00 - G99	i	2	1	2	-	3	2	-	-	3	-	2
	m	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1
	w	-	1	1	-	2	-	-	-	3	-	1
X J00 - J99	i	2	1	1	2	3	3	2	2	5	4	3
	m	1	1	1	2	1	1	1	-	1	1	1
	w	1	-	-	-	2	2	1	2	4	3	2
XVI P00 - P96	i	47	36	37	37	49	40	37	35	27	31	31
	m	23	15	22	19	26	29	19	14	15	20	22
	w	24	21	15	18	23	11	18	21	12	11	9
dar. P00 - P04	i	6	6	11	13	12	2	4	5	2	6	2
	m	4	3	7	8	5	1	2	2	1	5	-
	w	2	3	4	5	7	1	2	3	1	1	2
P05, P07	i	24	11	15	10	22	26	20	9	9	3	9
	m	12	4	6	4	13	18	10	4	5	3	8
	w	12	7	9	6	9	8	10	5	4	-	1
P20 - P29	i	8	6	7	4	11	6	4	-	8	16	12
	m	3	4	5	3	8	5	4	-	5	7	8
	w	5	2	2	1	3	1	-	-	3	9	4
XVII Q00 - Q99	i	26	21	29	17	19	12	13	11	8	7	7
	m	14	14	16	11	12	6	10	9	3	3	4
	w	12	7	13	6	7	6	3	2	5	4	3
dar. Q20 - Q28	i	17	10	20	10	9	7	8	7	4	4	3
	m	10	6	11	7	6	4	6	6	2	2	1
	w	7	4	9	3	3	3	2	1	2	2	2
XVIII R95	i	6	6	6	9	6	10	8	-	3	1	9
	m	5	5	5	5	3	7	4	-	2	-	6
	w	1	1	1	4	3	3	4	-	1	1	3
XIX S00 - T98	i	7	3	2	4	3	2	6	1	3	2	3
	m	4	2	-	2	1	2	2	1	1	1	1
	w	3	1	2	2	2	-	4	-	2	1	2
Insgesamt A00 - T98	i	93	70	79	73	87	72	70	53	58	52	61
	m	50	38	45	41	47	49	38	25	24	28	37
	w	43	32	34	32	40	23	32	28	34	24	24
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1
	m	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1
	w	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
dar. W75 - W84	i	1	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-
	m	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	w	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
aus XX X89 - Y09	i	6	2	-	2	-	2	5	-	-	-	2
	m	3	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-
	w	3	1	-	1	-	-	3	-	-	-	2

Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I A00 - B99	i	17,1	-	5,3	5,5	11,4	17,8	11,5	5,8	-	11,7	17,0
	m	11,1	-	-	-	21,9	23,0	11,1	11,1	-	11,3	11,0
	w	23,4	-	11,1	11,4	-	12,2	12,0	-	-	12,1	23,2
VI G00 - G99	i	11,4	5,5	10,7	-	17,0	11,8	-	-	5,9	-	11,3
	m	22,3	-	10,3	-	11,0	23,0	-	-	-	-	11,0
	w	-	11,4	11,1	-	23,5	-	-	-	12,4	-	11,6
X J00 - J99	i	11,4	5,5	5,3	11,1	17,0	17,8	11,5	11,5	29,5	23,3	17,0
	m	11,1	10,6	10,3	21,5	11,0	11,5	11,1	-	11,3	11,3	11,0
	w	11,7	-	-	-	23,5	24,4	12,0	24,0	49,4	36,3	23,2
XVI P00 - P96	i	268,4	198,1	197,6	204,7	278,1	236,8	213,4	201,9	159,5	180,9	175,2
	m	256,4	159,1	226,4	204,0	285,3	333,5	210,8	155,3	169,7	225,5	242,3
	w	280,9	240,0	166,5	205,5	270,5	134,3	216,2	252,3	148,3	133,1	104,4
dar. P00 - P04	i	34,3	33,0	58,8	71,9	68,1	11,8	23,1	28,8	11,8	35,0	11,3
	m	44,6	31,8	72,0	85,9	54,9	11,5	22,2	22,2	11,3	56,4	-
	w	23,4	34,3	44,4	57,1	82,3	12,2	24,0	36,0	12,4	12,1	23,2
P05, P07	i	137,0	60,5	80,1	55,3	124,9	153,9	115,4	51,9	53,2	17,5	50,9
	m	133,8	42,4	61,8	43,0	142,7	207,0	111,0	44,4	56,6	33,8	88,1
	w	140,4	80,0	99,9	68,5	105,8	97,6	120,1	60,1	49,4	-	11,6
P20 - P29	i	45,7	33,0	37,4	22,1	62,4	35,5	23,1	-	47,3	93,4	67,8
	m	33,4	42,4	51,5	32,2	87,8	57,5	44,4	-	56,6	78,9	88,1
	w	58,5	22,9	22,2	11,4	35,3	12,2	-	-	37,1	108,9	46,4
XVII Q00 - Q99	i	148,5	115,5	154,9	94,1	107,9	71,1	75,0	63,4	47,3	40,9	39,6
	m	156,1	148,5	164,7	118,1	131,7	69,0	111	99,9	33,9	33,8	44,1
	w	140,4	80,0	144,3	68,5	82,3	73,2	36,0	24,0	61,8	48,4	34,8
dar. Q20 - Q28	i	97,1	55,0	106,8	55,3	51,1	41,4	46,1	40,4	23,6	23,3	17,0
	m	111,5	63,7	113,2	75,2	65,8	46,0	66,1	66,6	22,6	22,6	11,0
	w	81,9	45,7	99,9	34,2	35,3	36,6	24,0	12,0	24,7	24,2	23,2
XVIII R95	i	34,3	33,0	32,0	49,8	34,1	59,2	46,1	-	17,7	5,8	50,9
	m	55,7	53,0	51,5	53,7	32,9	80,5	44,4	-	22,6	-	66,1
	w	11,7	11,4	11,1	45,7	35,3	36,6	48,0	-	12,4	12,1	34,8
XIX S00 - T98	i	40,0	16,5	10,7	22,1	17,0	11,8	34,6	5,8	17,7	11,7	17,0
	m	44,6	21,2	-	21,5	11,0	23,0	22,2	11,1	11,3	11,3	11,0
	w	35,1	11,4	22,2	22,8	23,5	-	48,0	-	24,7	12,1	23,2
Insgesamt A00 - T98	i	531,0	385,1	421,9	403,9	493,8	426,3	403,8	305,7	342,6	303,5	344,7
	m	557,5	403,1	463,2	440,2	515,8	563,5	421,7	277,4	271,6	315,7	407,5
	w	503,3	365,7	355,3	365,3	470,4	280,7	384,4	336,3	420,3	290,4	278,5
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	5,7	5,5	10,7	5,5	5,7	-	5,8	5,8	5,9	5,8	5,7
	m	11,1	10,6	-	10,7	11,0	-	-	11,1	11,3	11,3	11,0
	w	-	-	22,2	-	-	-	12,0	-	-	-	-
dar. W75 - W84	i	5,7	-	5,3	5,5	5,7	-	-	5,8	5,9	-	-
	m	11,1	-	-	10,7	-	-	-	11,1	11,3	-	-
	w	-	-	11,1	-	11,8	-	-	-	-	-	-
aus XX X89 - Y09	i	34,3	11,0	-	11,1	-	11,8	28,8	-	-	-	11,3
	m	33,5	10,6	-	10,7	-	23,0	22,2	-	-	-	-
	w	36,4	11,4	-	11,4	-	-	36,0	-	-	-	23,2

Säuglingssterbefälle 1997 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht



Müttersterbefälle 1998 - 2008

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Müttersterbefälle										
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
XV Schwangerschaft, Geburt u. Wochen- bett (O00 - O99)	-	-	1	2	2	-	2	2	2	-	3
dar. Wochenbett (O85 - O92)	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2
XIX Verletzungen, Ver- giftungen und Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	1	2	2	-	2	2	2	-	3
Je 100 000 Lebend- geborene	-	-	5,3	11,1	11,4	-	11,5	11,7	11,8	-	17,0

Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2008

Im Jahr 2008 verstarben insgesamt 35 Kinder, davon 21 Jungen und 14 Mädchen, im Alter zwischen 1 bis unter 15 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr waren damit 7 Kindersterbefälle mehr zu dokumentieren, davon waren 6 Jungen und ein Mädchen.

Die meisten Sterbefälle werden erfahrungsgemäß bei den Kindern in der Altersgruppe von 1 bis

unter 5 Jahren verzeichnet, so auch im Jahr 2008. Allein in dieser Altersgruppe verstarben insgesamt 16 Kinder bzw. 45,7 % der Kinder.


In den Jahren 1990 bis 2005 war eine Rückläufigkeit der Kindersterblichkeit zu verzeichnen, seit 2006 ist jedoch eine leichte Zunahme zu beobachten


Kindersterbefälle nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene Kinder 2008			Gestorbene Kinder 2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1 - 5	16	10	6	15	9	6
5 - 10	10	6	4	7	3	4
10 - 15	9	5	4	6	3	3
insgesamt	35	21	14	28	15	13

Kindersterblichkeit je 10 000 Kinder nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterblichkeit je 10 000 Kinder 2008			Sterblichkeit je 10 000 Kinder 2007		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1 - 5	2,36	2,86	1,83	2,20	2,57	1,82
5 - 10	1,17	1,35	0,96	0,82	0,68	0,96
10 - 15	1,21	1,31	1,11	0,82	0,79	0,84
insgesamt	1,53	1,79	1,27	1,23	1,28	1,18





Kindersterbefälle 1998 - 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Ge- schl.	Gestorbene Kinder										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1 - 5	i	22	24	20	17	21	12	16	21	8	15	16
	m	13	13	11	13	9	6	5	12	3	9	10
	w	9	11	9	4	12	6	11	9	5	6	6
5 - 10	i	17	21	18	7	11	13	13	2	2	7	10
	m	11	10	10	3	8	6	8	1	-	3	6
	w	6	11	8	4	3	7	5	1	2	4	4
10 - 15	i	32	37	29	34	23	16	10	12	12	6	9
	m	18	23	19	21	14	13	5	7	6	3	5
	w	14	14	10	13	9	3	5	5	6	3	4
insgesamt	i	71	82	67	58	55	41	39	35	22	28	35
	m	42	46	40	37	31	25	18	20	9	15	21
	w	29	36	27	21	24	16	21	15	13	13	14

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 1998 - 2008 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Ge- schl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1 - 5	i	35,7	37,4	29,3	24,3	23,9	16,9	22,7	30,1	11,6	22,0	23,6
	m	40,9	39,3	31,3	36,0	19,8	16,3	13,7	33,4	8,5	25,7	28,6
	w	30,1	35,4	27,2	11,8	28,1	17,5	32,2	26,7	15,0	18,2	18,3
5 - 10	i	13,5	19,9	22,6	9,3	14,6	16,8	16,5	2,4	2,4	8,2	11,7
	m	17,0	18,3	24,4	7,7	20,6	15,1	19,7	2,4	-	6,8	13,5
	w	9,9	21,5	20,6	10,9	8,2	18,6	13,0	2,5	4,9	9,6	9,6
10 - 15	i	17,6	20,7	17,1	22,3	16,2	14,4	9,8	14,1	15,9	8,2	12,1
	m	19,3	25,1	21,8	26,8	19,2	22,7	9,5	15,9	15,5	7,9	13,1
	w	15,8	16,1	12,1	17,6	13,1	5,6	10,1	12,1	16,4	8,4	11,1
insgesamt	i	19,2	23,5	21,1	19,5	19,1	15,8	15,5	14,8	9,6	12,3	15,3
	m	22,1	25,7	24,5	24,2	20,9	18,7	13,9	16,4	7,6	12,8	17,9
	w	16,2	21,3	17,5	14,5	17,2	12,7	17,2	13,0	11,7	11,8	12,7

Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2008

In diesem Berichtsjahr stellten die **Neubildungen** mit 34,3 % den Hauptanteil an den Todesursachen im Kindesalter. Im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 10,7 %.

An zweiter Stelle folgten die **Nichtnatürlichen Todesursachen** mit 22,9 %. Im Wesentlichen waren hier Verkehrsunfälle und Sport- und Spielunfälle für den Tod im Kindesalter verantwortlich.


Mit jeweils 11,4 % bestimmten die durch die

Angeborenen Fehlbildungen verursachten Krankheiten und die **Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane** die weitere Reihenfolge. Im Vorjahr lag der Anteil bei beiden Todesursachenkategorien bei 14,3 %.


Abschließend wären noch die **Krankheiten des Atmungssystems** mit 8,6 % und die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** sowie die **Krankheiten des Kreislaufsystems** mit jeweils 5,7 % zu erwähnen.

**Kindersterbefälle 2008
nach Todesursachen und Geschlecht**

männlich



weiblich



Kindersterbefälle 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Kinder					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	je 100 000 der mittl. Bev.
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	-	-	-	-	-	-
II Neubildungen (C00 - D48)	12	5,26	7	5,95	5	4,53
dar. Bösartige Neubildung der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73 - C75)	2	0,88	-	-	2	1,81
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 - C96)	3	1,32	3	2,55	-	-
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	2	0,88	1	0,85	1	0,91
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	4	1,75	2	1,70	2	1,81
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	2	0,88	1	0,85	1	0,91
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	3	1,32	2	1,70	1	0,91
dar. Grippe und Pneumonie (J09 - J18)	-	-	-	-	-	-
Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60 - J70)	1	0,44	1	0,85	-	-
XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	4	1,75	3	2,55	1	0,91
XIX Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	8	3,51	5	4,25	3	2,72
Übrige	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	35	15,34	21	17,85	14	12,67
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	7	3,07	5	4,25	2	1,81


Kindersterbefälle 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I A00 - B99	i	1	2	3	2	6	1	1	1	-	-	-
	m	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-
	w	-	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-
II C00 - D48	i	15	11	13	8	11	6	6	3	4	3	12
	m	5	7	7	6	7	2	1	2	1	2	7
	w	10	4	6	2	4	4	5	1	3	1	5
dar. C81 - C96	i	7	3	6	4	4	2	3	1	-	1	3
	m	3	2	3	3	3	-	1	1	-	1	3
	w	4	1	3	1	1	2	2	-	-	-	-
IV E00 - E90	i	2	4	2	2	2	2	-	-	2	5	2
	m	2	2	1	1	-	1	-	-	1	4	1
	w	-	2	1	1	2	1	-	-	1	1	1
VI G00 - G99	i	5	11	10	2	5	-	9	9	4	4	4
	m	5	5	5	2	3	-	5	4	2	-	2
	w	-	6	5	-	2	-	4	5	2	4	2
IX I00 - I99	i	4	-	3	3	2	4	2	3	-	-	2
	m	1	-	1	2	-	2	1	2	-	-	1
	w	3	-	2	1	2	2	1	1	-	-	1
X J00 - J99	i	6	4	2	4	5	1	-	2	1	2	3
	m	2	2	2	4	5	1	-	-	1	1	2
	w	4	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1
XVII Q00 - Q99	i	7	9	8	2	5	4	7	3	6	4	4
	m	5	5	5	2	1	1	1	1	1	4	3
	w	2	4	3	-	4	3	6	2	5	-	1
XIX S00 - T98	i	27	33	23	30	17	17	13	11	5	7	8
	m	18	19	16	16	11	14	8	9	3	4	5
	w	9	14	7	14	6	3	5	2	2	3	3
Insgesamt A00 - T98	i	71	82	67	58	55	41	39	35	22	28	35
	m	42	46	40	37	31	25	18	20	9	15	21
	w	29	36	27	21	24	16	21	15	13	13	14
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	25	27	17	27	12	13	10	10	3	7	7
	m	16	16	12	13	7	12	6	8	2	4	5
	w	9	11	5	14	5	1	4	2	1	3	2
dar. V01 - V99	i	12	12	12	13	7	5	4	5	2	4	2
	m	8	8	7	7	4	4	1	4	2	1	1
	w	4	4	5	6	3	1	3	1	-	3	1
W65 - W74	i	2	5	2	3	4	5	4	1	1	1	2
	m	1	3	2	2	3	5	4	1	-	1	2
	w	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-
X00 - X09	i	5	3	1	4	-	1	1	-	-	2	1
	m	3	2	1	1	-	1	-	-	-	1	1
	w	2	1	-	3	-	-	1	-	-	1	-

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 1998 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I A00 - B99	i	0,3	0,6	0,9	0,7	2,1	0,4	0,4	0,4	-	-	-
	m	0,5	0,6	1,2	0,7	2,0	0,7	0,8	-	-	-	-
	w	-	0,6	0,6	0,7	2,2	-	-	0,8	-	-	-
II C00 - D48	i	4,1	3,2	4,1	2,7	3,8	2,3	2,4	1,3	1,7	1,3	5,3
	m	2,6	3,9	4,3	3,9	4,7	1,5	0,8	1,6	0,8	1,7	6,0
	w	5,6	2,4	3,9	1,4	2,9	3,2	4,1	0,9	2,7	0,9	4,5
dar. C81 - C96	i	1,9	0,9	1,9	1,3	1,4	0,8	1,2	0,4	-	0,4	1,3
	m	1,6	1,1	1,8	2,0	2,0	-	0,4	0,8	-	0,9	2,6
	w	2,2	0,6	1,9	0,7	0,7	1,6	1,6	-	-	-	-
IV E00 - E90	i	0,5	1,1	0,6	0,7	0,7	0,8	-	-	0,9	2,2	0,9
	m	1,1	1,1	0,6	0,7	-	0,7	-	-	0,8	3,4	0,9
	w	-	1,2	0,6	0,7	1,4	0,8	-	-	0,9	0,9	0,9
VI G00 - G99	i	1,4	3,2	3,1	0,7	1,7	-	3,6	3,8	1,7	1,8	1,8
	m	2,6	2,8	3,1	1,3	2,0	-	2,0	1,7	1,7	-	1,7
	w	-	3,5	3,2	-	1,4	-	3,3	4,3	1,8	3,6	1,8
IX I00 - I99	i	1,1	-	0,9	1,0	0,7	1,5	0,8	1,3	-	-	0,9
	m	0,5	-	0,6	1,3	-	1,5	0,8	1,6	-	-	0,9
	w	1,7	-	1,3	0,7	1,4	1,6	0,8	0,9	-	-	0,9
X J00 - J99	i	1,6	1,1	0,6	1,3	1,7	0,4	-	0,8	0,4	0,9	1,3
	m	1,1	1,1	1,2	2,6	3,4	0,7	-	-	0,8	0,9	1,7
	w	2,2	1,2	-	-	-	-	-	1,7	-	0,9	0,9
XVII Q00 - Q99	i	1,9	2,6	2,5	0,7	1,7	1,5	2,8	2,8	2,6	1,8	1,8
	m	2,6	2,8	3,1	1,3	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	3,4	2,6
	w	1,1	2,4	1,9	-	2,9	2,4	4,9	1,7	4,5	-	0,9
XIX S00 - T98	i	7,3	9,5	7,2	10,1	5,9	6,5	5,2	4,6	2,2	3,1	3,5
	m	9,5	10,6	9,8	10,4	7,4	10,5	6,2	7,4	2,5	3,4	4,3
	w	5,0	8,3	4,5	9,7	4,3	2,4	4,1	1,7	1,8	2,7	2,7
Insgesamt A00 - T98	i	19,2	23,5	21,1	19,5	19,1	15,8	15,5	14,8	9,6	12,3	15,3
	m	22,1	25,7	24,5	24,2	20,9	18,7	13,9	16,4	7,6	12,8	17,9
	w	16,2	21,3	17,5	14,5	17,2	12,7	17,2	13,0	11,7	11,8	12,7
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	6,8	7,8	5,4	9,1	4,2	5,0	4,0	4,2	1,3	3,1	3,1
	m	8,4	8,9	7,3	8,5	4,7	9,0	4,6	6,5	1,7	3,4	4,3
	w	5,0	6,5	3,2	9,7	3,6	0,8	3,3	1,7	0,9	2,7	1,8
dar. V01 - V99	i	3,3	3,4	3,8	4,4	2,4	1,9	1,6	2,1	0,9	1,8	0,9
	m	4,2	4,5	4,3	4,6	2,7	3,0	0,8	3,3	1,7	0,9	0,9
	w	2,2	2,4	3,2	4,2	2,2	0,8	2,5	0,9	-	2,7	0,9
W65 - W74	i	0,5	1,4	0,6	1,0	1,4	1,9	1,6	0,4	0,4	0,4	0,9
	m	0,5	1,7	1,2	1,3	2,0	3,7	3,1	0,8	-	0,9	1,7
	w	0,6	1,2	-	0,7	0,7	-	-	-	0,9	-	-
X00 - X09	i	1,4	0,9	0,3	1,3	-	0,4	0,4	-	-	0,9	0,4
	m	1,6	1,1	0,6	0,7	-	0,7	-	-	-	0,9	0,9
	w	1,1	0,6	-	2,1	-	-	0,8	-	-	0,9	-

Kindersterbefälle 1997 - 2008 nach Todesursachen und Geschlecht



- Verletzungen und Vergiftungen
- Neubildungen
- Krankheiten des Atmungssystems
- Angeborene Fehlbildungen
- Krankheiten des Nervensystems
- Übrige

Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat November 2009 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03 ¹⁾	Z	Statistisches Monatsheft 11/09	5,50
4 S 0 21 ²⁾	S - j/08	Kreisindikatoren - Ausgewählte Regionaldaten für Sachsen-Anhalt - 2008	8,00
3 A 4 02 ¹⁾	A IV - j/08	Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen - Jahr 2008 -	6,00
3 B 1 02 ¹⁾	B I - j/08	Allgemeinbildende Schulen - Schuljahr 2008/09 - Schuljahrendendstatistik	5,50
3 B 3 04 ¹⁾	B III - j/08	Personal an Hochschulen - Stand: 01.12.2008 -	4,50
3 C 2 04 ¹⁾	C II - j/09	Weinbestände - Stand: 31.07.2009 -	1,50
3 C 3 05 ¹⁾	C III - m-9/09	Schlachtungen und Geflügel - September 2009 -	1,50
3 D 1 01 ¹⁾	D I - hj-1/09	Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen - 1. Halbjahr 2009 -	3,00
3 E 1 02 ¹⁾	E I - m-8/09	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - August 2009 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,50
3 E 1 09 ¹⁾	E I - vj-2/09	Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden II. Quartal 2009	2,00
3 E 2 01 ¹⁾	E II - m-8/09	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe August 2009	2,50
3 F 2 01 ¹⁾	F II - m-8/09	Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau August 2009	
3 G 1 01 ¹⁾	G I, G IV - m-7/09	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel, Einzelhandel und Gastgewerbe - Juli 2009 -	3,00
3 G 4 01 ¹⁾	G IV - m-6/09	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Juni 2009; Januar bis Juni 2009 - Vorläufige Ergebnisse -	6,50
3 J 1 01 ¹⁾	J I - j/07	Dienstleistungen - Bereiche Verkehr und Nachrichtenübermittlung; Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, a.n.g. - Jahr 2007 -	8,50
3 K 1 01 ¹⁾	K I - j/08	Ausgaben und Einnahmen, Empfängerinnen und Empfänger der Sozialhilfe Jahr 2008	4,00
3 K 7 01 ¹⁾	K VII - j/08	Wohngeld - Jahr 2008 -	2,50
3 L 2 03 ¹⁾	L II - j/08	Realsteuervergleich - Jahr 2008 - Realsteuern und kommunale Steuerbeteiligung -	10,00

1) als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen

2) zum gleichen Preis als PDF-Datei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.