

STATISTISCHE BERICHTE

A IV
j/13

Bestellnummer:
3A402



Gesundheitswesen

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2013



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Herausgabemonat: Januar 2015

Zu beziehen durch das

Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)

Preis: 6,50 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestellnummer: 6A402)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Bildung, Soziales, Gesundheit
Frau Leuchte
Telefon: 0345 2318-205

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777
Telefon: 0345 2318-715
Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>
E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2015

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr - möglichst nach Vereinbarung
Telefon: 0345 2318-714
E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Gestorbene nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2013

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen	4
Ziel der Statistik	4
Erfassungsgrundlage	4
Rechtsgrundlage	4
Begriffserläuterungen	5
Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2013	6
Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2013 nach Geschlecht	7
Sterbefälle 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
Sterbefälle 1970 bis 2013 nach Geschlecht	8
Sterbefälle 2003 bis 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	10
Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2013	11
Sterbefälle 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	12
Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	14
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	15
Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	17
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	19
Sterbefälle 2003 bis 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	22
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2003 bis 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	24
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	27
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2003 bis 2013 nach Geschlecht	28
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2003 bis 2013 nach Geschlecht	29
Sterbefälle durch Neubildungen 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	31
Sterbefälle durch Neubildungen 2003 bis 2013 nach Geschlecht	32
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2003 bis 2013 nach Geschlecht	33
Nichtnatürliche Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht	35
Unfalltote 2013 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	36
Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2013 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	36
Unfälle 2003 bis 2013 nach Unfallkategorien und Geschlecht	38
Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2003 bis 2013 nach Unfallkategorien und Geschlecht	38
Nichtnatürliche Sterbefälle 2013 nach äußerer Ursache und Geschlecht	39
Nichtnatürliche Sterbefälle 2013 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht	40
Alkoholbedingte Sterbefälle 2008 und 2013 im Vergleich	43
Alkoholbedingte Sterbefälle 2008 und 2013 nach Altersgruppen im Vergleich	43
Mittleres Sterbealter seit 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	45
Vermeidbare Sterbefälle 2008 und 2013 im Vergleich	47

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2013	47
Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer	47
Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer	48
Säuglingssterblichkeit 2003 bis 2013 nach Geschlecht	48
Säuglingssterbefälle 1970 bis 2013 nach Geschlecht	49
Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2013	51
Säuglingssterbefälle 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	51
Säuglingssterbefälle 2003 bis 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	52
Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2003 bis 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	53
Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2013	54
Kindersterbefälle 2003 bis 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2003 bis 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2013	54
Kindersterbefälle 2003 bis 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	55
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2003 bis 2013 nach Todesursachen und Geschlecht	56
Grafiken:	
Grafik: Sterblichkeit 1970 - 2013 nach Geschlecht	9
Grafik: Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	13
Grafik: Sterbefälle 2013 nach Todesursachen und Altersgruppen	16
Grafik: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen	21
Grafik: Sterblichkeit 1998 - 2013 nach Todesursachen	26
Grafik: Sterblichkeit durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2013	30
Grafik: Sterblichkeit durch Neubildungen 1998 - 2013	34
Grafik: Unfalltote 2013 nach Unfallkategorien und Geschlecht	37
Grafik: Suizide 2013 nach der äußeren Ursache und Geschlecht	41
Grafik: Suizidrate 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht	41
Grafik: Suizidrate 1980 - 2013 nach Geschlecht	42
Grafik: Alkoholbedingte Sterblichkeit 1980 - 2013 nach Geschlecht	44
Grafik: Säuglingssterblichkeit 1970 - 2013 nach Geschlecht	50

Vorbemerkungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik ist mangels umfassender Morbiditätsstatistiken die am weitesten verbreitete Statistik zur Analyse der quantitativen Bedeutung einzelner Krankheiten. Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen einer Region zu geben.

Diese Statistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung.

Sie ermöglicht eine fundierte Todesursachenforschung, die die Einflussfaktoren der todesursachenspezifischen Sterblichkeit, ihre regionalen Besonderheiten und Veränderungen im Laufe der Zeit untersucht.

Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z.B. für die Gesundheitspolitik und die epidemiologische Forschung abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Erfassungsgrundlage

Erfassungsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind die vom Leichenschauarzt ausgestellte Todesbescheinigung sowie die vom Standesbeamten aufgrund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte. Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Angaben zur Todesursache im Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen und signiert. Dies bedarf jedoch großer Genauigkeit und Korrektheit des Leichenschauarztes bei der Ausstellung der Todesbescheinigung.

Um überregionale Vergleiche der Sterblichkeit zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Aus diesem Grund erfolgt die Signierung der Todesursachen anhand der von der WHO verabschiedeten "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", in der Bundesrepublik

Deutschland seit dem 01.01.1998 in der Fassung der 10. Revision (ICD-10).

In der amtlichen Todesursachenstatistik wurden in den Jahren 1980 bis 1997 Todesursachen nach der 9. Revision der ICD signiert. Das bedeutet, dass Zeitreihen nicht (bzw. noch nicht) problemlos fortgesetzt werden können - aus den ehemals 17 Todesursachenklassen wurden jetzt 20 - zumal ein praktikabler „Umsteiger“ nicht vorliegt. Wenn hier trotzdem der Versuch unternommen wird, Zeitreihen beginnend ab dem Jahr 1980 anzubieten, muss man sich der o.g. Unzulänglichkeiten bewusst sein.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität", das in den vorangegangenen Revisionen der ICD als ergänzende Klassifikation bestand, ermöglicht die Klassifizierung von Umweltereignissen und Umständen als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. Dieser Zustand wird mit einer Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)" klassifiziert.

Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen sowie bei nichtnatürlichen Todesursachen außerdem die äußeren Ursachen (Unfälle und sonstige Gewaltwirkungen) erfasst. Bei Unfällen werden zusätzlich die Unfallkategorie (z.B. häuslicher Unfall, Verkehrsunfall usw.) registriert.

Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, unabhängig vom Sterbeort.

Für die Berechnung der Mortalitätsraten der Jahre ab 2011 wurden die vorläufigen Bevölkerungszahlen auf Basis der Zensusergebnisse 2011 verwendet. Zur Berechnung der Mortalitätsraten bis einschließlich 2010 sind die Bevölkerungszahlen auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung vom 03.10.1990 herangezogen worden.

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.03.1980 (BGBl. I S. 308). Zu berücksichtigen sind das

Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 11.08.2004 (GVBl. LSA S. 506), das Personenstandsgesetz in der im BGBl. III, Gliederungsnummer 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, einschließlich späterer Änderungen, das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA Nr. 8 S. 45) und die Bestattungsverordnung vom 26.01.2005 (GVBl. LSA Nr. 6 S. 35).

Begriffserläuterungen

Allgemeine Sterbeziffern: Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die beim Vergleich von Absolutzahlen auftreten können, lassen sich mit Hilfe der mittleren Jahresbevölkerung nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Männer bzw. Frauen im Alter } a}{\text{Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 100\,000$$

geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden gleichen Geschlechts und Alters) für jede Todesursache einzeln und insgesamt berechnen.

Fehlgeburt: Eine Fehlgeburt, auch Abort genannt, ist als eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft mit oder ohne Ausstoßung der abgestorbenen Frucht mit einem Gewicht unter 500 g und vor Beginn der 24. Schwangerschaftswoche definiert. Eine Fehlgeburt unterliegt, anders als die Totgeburt, nicht der standesamtlichen Meldepflicht.

Frühsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene in den ersten 7 Lebenstagen angibt. Sie betrifft vor allem Kinder, die frühgeboren und untergewichtig sind, mit Fehlbildungen zur Welt kommen oder unter den Folgen von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen leiden.

Gestorbene: Die Begriffe Gestorbene und Sterbefälle sind inhaltlich identisch. Nicht berücksichtigt werden Totgeborene, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Grundleiden: Unter Grundleiden versteht man die Krankheit oder Verletzung, die die Kausalkette der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöst oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachen.

Kindersterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Kinder im Alter von 1 bis unter 15 Jahren angibt.

Lebendgeborene: Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Die Begriffe Lebendgeborene und Lebendgeburten unterscheiden sich inhaltlich nicht.

Mittleres Sterbealter: Gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter des an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre für jede Todesursache.

Müttersterbefall: Als Müttersterbefall gilt der Tod jeder Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Dabei gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse.

Nachsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von 28 bis 364 Tagen angibt.

Perinatale Mortalität: Die perinatale Mortalität oder perinatale Sterblichkeit gibt die Anzahl der Todesfälle in der Perinatalperiode an, also dem Zeitraum zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und dem 7. Tag nach der Geburt. Diese Zahl wird dabei auf die Gesamtzahl von 1 000 Lebend- und Totgeborenen bezogen und nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der Totgeborenen und Zahl der in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen}}{\text{Anzahl der Lebend- und Totgeborenen}} \times 1\,000$$

berechnet. Die perinatale Sterblichkeit ist eindeutig eine Sterbeziffer. Systematisch steht sie allerdings zwischen Geburten- und Sterbestatistik, da die Totgeborenen definitionsgemäß zu den Geburten und nicht zu den Sterbefällen zählen.

Säuglinge: Kinder im Alter von 0 bis unter 1 Jahr, d.h. Kinder von der Geburt bis vor Vollendung des 1. Lebensjahres.

Säuglingssterblichkeit: Findet ihren Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene des gleichen Zeitraumes bezieht. Die Höhe der Säuglingssterblichkeit ist abhängig von zahlreichen biologischen, medizinischen und sozialen Faktoren, die bei einer Analyse als Merkmal benutzt werden, z.B. Geschlecht, Alter, Geburtsgewicht, Todesursache, Legitimität der Mutter.

Spätsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von sieben bis 27 Tagen angibt.

Totgeborene: Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz

geschlagen, die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 g betrug.

Totgeborenenrate: Totgeborene je 1 000 Geborene (Lebend- und Totgeborene).

Vermeidbare Sterbefälle: Als vermeidbare Sterbefälle werden Sterbefälle bezeichnet, die bei angemessener Krankheitsprävention oder Therapie hätten verhindert werden können. Die Kennziffer der vermeidbaren Sterbefälle richtet sich im Wesentlichen nach einem Konzept des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Danach gelten spezifische Todesursachen in bestimmten Altersgruppen als vermeidbar. Die vermeidbaren Sterbefälle werden je 100 000 Einwohner angegeben.

Arbeitsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z.B. Busfahren) so ist dieser Unfall als "Arbeitsunfall" anzusehen.

Schulunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten, innerhalb der Schule oder Hochschule oder bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Schule.

Verkehrsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten

Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Häuslicher Unfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet die Unfälle im häuslichen Bereich, die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (siehe Definition „Arbeitsunfall“). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Sport- oder Spielunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder bei einer sonstigen Freizeitbeschäftigung ereignen, sofern diese nicht als Arbeits-, Schul- oder als häuslicher Unfall anzusehen sind.

Sonstiger Unfall: Diese Kategorie umfasst alle sonst nicht einzuordnenden Unfälle bzw. Unfälle unbekannter Kategorie.

Zeichenerklärung:

- Nichts vorhanden, das Zeichen " - " steht für den mathematisch exakten Wert Null.
- 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.

Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2013

Im Jahr 2013 starben bundesweit insgesamt 31 385 Personen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, davon waren 15 411 männlichen sowie 15 974 weiblichen Geschlechts.

Damit starben im aktuellen Berichtsjahr insgesamt 1 064 Personen bzw. 3,5 % mehr als im Vorjahr. Das waren 625 Mann bzw. 439 Frauen mehr als im Jahr 2012. Das bedeutet eine Zunahme der Sterblichkeit gegenüber dem Jahr 2012.

Je 100 000 Einwohner Sachsen-Anhalts verstarben im Berichtsjahr 1 394 Personen, im Vorjahr 1 337 Personen und vor zehn Jahren 1 169 Personen. Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, so stellt man eine Zunahme der Sterblichkeit fest. Dabei gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Starben 2003 noch 1 138 Männer bzw. 1 198 Frauen je 100 000 der Bevölkerung, so waren es in diesem Berichtsjahr schon 1 399 Männer bzw. 1 389 Frauen.

Insgesamt war auch 2013 - wie in den vergangenen

Jahren - die Sterblichkeit der weiblichen Personen höher als die der männlichen Personen. Bedingt durch die Altersstruktur und einen Frauenüberschuss von 1,1 %, verstarben 1,8 % mehr Frauen als Männer. Allerdings ist der Geschlechterunterschied bei der Sterblichkeit in den letzten Jahren sichtbar zurückgegangen.

Die Entwicklung der Altersstruktur in Sachsen-Anhalt beeinflusst auch die Anteile an den Gesamtsterbefällen in den Altersgruppen. So stellte die Altersgruppe der über 75-jährigen mit 65,2 % die meisten Sterbefälle, 2003 lag deren Anteil noch bei 57,0 % aller Sterbefälle. Seit Jahren ist in allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 80-jährigen eine wesentlich höhere Zahl an männlichen Verstorbenen zu beobachten.

Zwischen den Jahren 1980 und 1999 konnte eine sinkende Sterblichkeit beobachtet werden. Nach dem Jahr 2004 kann dann allerdings wieder von einer tendenziellen Zunahme der Sterblichkeit gesprochen werden.

Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2013 nach Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	49	0,2	31	0,2	18	0,1
1 - 15	17	0,1	12	0,1	5	0,0
15 - 35	226	0,7	157	1,0	69	0,5
35 - 55	1 836	5,8	1 289	8,4	547	3,4
55 - 75	8 802	28,0	5 722	37,1	3 080	19,3
75 und mehr	20 455	65,2	8 200	53,2	12 255	76,7
Insgesamt	31 385	100	15 411	100	15 974	100

Sterbefälle 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	49	31	18	2,90	3,60	2,17
1 - 2	1	1	-	0,06	0,12	-
2 - 3	1	1	-	0,06	0,12	-
3 - 4	4	3	1	0,24	0,35	0,12
4 - 5	1	1	-	0,06	0,11	-
5 - 10	5	3	2	0,06	0,07	0,05
10 - 15	5	3	2	0,06	0,07	0,05
15 - 18	12	5	7	0,26	0,21	0,32
18 - 20	19	11	8	0,70	0,79	0,60
20 - 25	32	22	10	0,29	0,38	0,19
25 - 30	59	44	15	0,43	0,61	0,24
30 - 35	104	75	29	0,80	1,07	0,49
35 - 40	97	71	26	0,87	1,19	0,50
40 - 45	249	164	85	1,69	2,13	1,21
45 - 50	536	384	152	2,87	4,04	1,66
50 - 55	954	670	284	4,79	6,67	2,88
55 - 60	1 371	950	421	7,46	10,40	4,55
60 - 65	1 826	1 237	589	10,90	15,20	6,84
65 - 70	1 841	1 231	610	15,06	21,42	9,42
70 - 75	3 764	2 304	1 460	22,70	30,65	16,11
75 - 80	4 938	2 751	2 187	38,77	51,66	29,51
80 - 85	5 574	2 567	3 007	72,07	91,46	61,03
85 - 90	5 462	1 875	3 587	128,38	160,68	116,17
90 - 95	3 512	833	2 679	218,67	253,42	209,71
95 und mehr	969	174	795	404,59	502,89	387,05
Insgesamt	31 385	15 411	15 974	13,94	13,99	13,89

Sterbefälle 1970 - 2013 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	44 918	21 570	23 348	13,95	14,45	13,51
1971	43 045	20 355	22 690	13,39	13,65	13,17
1972	43 683	20 712	22 971	13,62	13,88	13,38
1973	42 933	20 201	22 732	13,46	13,60	13,33
1974	42 773	20 159	22 614	13,48	13,63	13,35
1975	44 990	21 020	23 970	14,28	14,28	14,27
1976	43 226	19 999	23 227	13,81	13,67	13,93
1977	41 826	19 620	22 206	13,42	13,45	13,39
1978	43 459	20 207	23 252	13,99	13,87	14,09
1979	43 554	20 243	23 311	14,07	13,93	14,20
1980	44 448	20 623	23 825	14,41	14,23	14,58
1981	43 258	19 780	23 478	14,08	13,67	14,44
1982	42 306	19 350	22 956	13,84	13,45	14,20
1983	41 628	18 762	22 866	13,65	13,05	14,19
1984	41 595	18 766	22 829	13,68	13,07	14,23
1985	41 930	18 966	22 964	13,85	13,25	14,39
1986	41 887	18 528	23 359	13,90	12,98	14,73
1987	40 128	17 835	22 293	13,34	12,48	14,12
1988	40 009	17 998	22 011	13,31	12,55	14,00
1989	38 127	17 301	20 826	12,73	12,07	13,34
1990	38 711	18 118	20 593	13,39	13,14	13,62
1991	38 203	17 859	20 344	13,41	13,13	13,66
1992	35 754	16 726	19 028	12,73	12,43	13,00
1993	34 838	16 546	18 292	12,49	12,34	12,64
1994	33 816	15 929	17 887	12,21	11,93	12,48
1995	33 519	15 816	17 703	12,19	11,89	12,46
1996	32 639	15 539	17 100	11,95	11,74	12,14
1997	30 892	14 294	16 598	11,38	10,85	11,88
1998	31 011	14 496	16 515	11,53	11,10	11,94
1999	30 059	14 076	15 983	11,29	10,88	11,67
2000	30 175	14 298	15 877	11,46	11,17	11,73
2001	29 621	13 954	15 667	11,40	11,04	11,74
2002	30 159	14 250	15 909	11,76	11,41	12,09
2003	29 632	14 062	15 570	11,69	11,38	11,98
2004	29 008	13 892	15 116	11,56	11,34	11,76
2005	29 277	14 002	15 275	11,79	11,56	12,02
2006	29 151	13 980	15 171	11,87	11,65	12,08
2007	29 392	14 059	15 333	12,11	11,84	12,36
2008	29 905	14 344	15 561	12,47	12,23	12,71
2009	30 480	14 690	15 790	12,87	12,67	13,06
2010	30 729	14 781	15 948	13,10	12,87	13,33
2011	30 183	14 780	15 403	13,20	13,23	13,16
2012	30 321	14 786	15 535	13,37	13,34	13,40
2013	31 385	15 411	15 974	13,94	13,99	13,89



Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2013

Die Haupttodesursachenklasse stellte 2013 - wie auch in den vergangenen Jahren - mit 43,9 % aller Todesfälle die **Krankheiten des Kreislaufsystems**. Daran starben insgesamt 5 906 Männer und 7 858 Frauen. Bezogen auf 100 000 Einwohner waren im Jahr 2013 insgesamt 611 Personen einem Herz-Kreislaufleiden erlegen. Im Vorjahr verstarben 602 Personen je 100 000 Einwohner an diesem Leiden. Allein an ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt, verstarben 5 948 Personen. Herzinfarkt führte bei wesentlich mehr Männern (1 346 Sterbefälle) als Frauen (999 Sterbefälle) zum Tode. Dagegen waren von zerebrovaskulären Erkrankungen, wozu auch Schlaganfälle gerechnet werden, deutlich mehr Frauen (1 177 Sterbefälle) als Männer (768 Sterbefälle) betroffen.

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die **Neubildungen** mit 26,6 % vertreten, darunter mit 26,0 % die bösartigen Neubildungen („Krebs“). Bezogen auf 100 000 Einwohner starben im Berichtsjahr 362 Personen an Krebserkrankungen. Im Vorjahr waren das noch 348 Personen. Am häufigsten traten hier bösartige Neubildungen im Bereich der Verdauungsorgane mit 32,9 % aller an Krebs Verstorbenen auf, gefolgt vom Lungenkrebs mit 19,5 %. Bei 15,3 % der im Jahr 2013 an Krebs verstorbenen Frauen wurde Brustkrebs als Todesursache festgestellt.

Mit 1 676 Verstorbenen und 5,3 % aller Sterbefälle im Berichtsjahr folgten an dritter Stelle der Todesursachenklassen die **Krankheiten des Atmungssystems**. Dabei waren insbesondere die chronischen Krankheiten der unteren Atemwege auffällig, die mit 55,9 % aller Atemwegserkrankungen deutlich mehr als die Hälfte ausmachten. Das entsprach 3,0 % der Gesamtsterbefälle bzw. 42 Personen je 100 000 Einwohner im Jahr 2013.

Dicht hinter den Krankheiten des Atmungssystems folgten die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** mit 1 665 Todesfällen und ebenfalls 5,3 % aller Verstorbenen. Diese Klasse wurde insbesondere vom Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") geprägt. Für 1 445 Frauen und Männer mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt war dies die Todesursache. Gegenüber dem Vorjahr war hierbei ein Anstieg auf 4,6 % aller Sterbefälle zu verzeichnen. 56,6 % der an Diabetes mellitus Verstorbenen waren Frauen.

Erst an fünfter Stelle folgten im Jahr 2013 die **Krankheiten des Verdauungssystems** mit 1 553 Sterbefällen und einem Anteil von 5,0 % aller Todesfälle im Berichtsjahr. Hier fielen wiederum die Leberkrankheiten auf, wobei der männliche

Personenanteil aller an diesem Leiden Verstorbenen im Berichtsjahr zwei Drittel ausmachte. Von den Krankheiten der Leber waren 69,7 % alkoholbedingt. Das entsprach 1,7 % der Gesamtsterbefälle bzw. 24 Personen je 100 000 Einwohner.

Die Zahl derer, die an einem nichtnatürlichen Tod verstarben stieg geringfügig auf 1 245 Sterbefälle an. Das entsprach einem Anteil von 4,0 % aller im Berichtsjahr Verstorbenen. Dabei erlagen mit 792 Sterbefällen deutlich mehr Männer als Frauen an **Verletzungen und Vergiftungen**.

Durch Verkehrsunfälle verstarben im Berichtsjahr 157 Personen, davon 112 Männer und 45 Frauen. Gegenüber dem Vorjahr waren das 7 Verkehrstote mehr. Einem Arbeits- oder Schulunfall mit Todesfolge erlagen im Berichtsjahr 21 Männer und 2 Frauen. 47,6 % aller tödlichen Unfälle konnten den häuslichen Unfällen zugerechnet werden, überwiegend als Folge eines Sturzes älterer Menschen. An einem Sport- und Spielunfall erlagen 10 Personen.

Suizid (Selbsttötung) begingen im Berichtsjahr 373 Einwohner, davon 296 Männer und 77 Frauen. Damit stieg die Suizidrate erneut etwas an.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag Getöteten betrug im Berichtsjahr 9, davon 6 männliche und 3 weibliche Personen.

Die Haupttodesursache in der Altersgruppe der über 75-jährigen Männer und Frauen waren die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 52,8 %, gefolgt von den Neubildungen mit 20,1 % und den Krankheiten der Atmungsorgane mit 5,6 %. Bei den unter 75-jährigen waren hingegen die Neubildungen mit 38,3 % die Haupttodesursache. Erst an zweiter Stelle folgten hier mit 27,1 % die Krankheiten des Kreislaufsystems. Mit einem Anteil von 8,0 % rangierten hier die Krankheiten des Verdauungssystems an dritter Stelle. Verletzungen und Vergiftungen waren mit 42,5 % die häufigste Todesursache bei den unter 35-jährigen, zum überwiegenden Teil infolge eines Verkehrsunfalls. Mit Anteilen von 11,6 % und 6,5 % folgten hier die Neubildungen bzw. Krankheiten des Nervensystems.

Das mittlere Sterbealter betrug im Jahr 2013 insgesamt 76,9 Jahre (73,0 Jahre bei Männern bzw. 80,5 Jahre bei Frauen). Im Jahr 2003 lag dieses noch bei 74,4 Jahren.


Das mittlere Sterbealter bei den Todesursachenklassen lag im Berichtsjahr für angeborene Fehlbildungen mit 35,0 Jahren am niedrigsten, hingegen mit 82,2 Jahren für Krankheiten des Urogenitalsystems am höchsten.

Sterbefälle 2013 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	296	0,9	143	0,9	153	1,0
II Neubildungen (C00 - D48)	8 360	26,6	4 731	30,7	3 629	22,7
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	8 162	26,0	4 638	30,1	3 524	22,1
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	61	0,2	23	0,2	38	0,2
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 665	5,3	727	4,7	938	5,9
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	1 445	4,6	627	4,1	818	5,1
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	794	2,5	373	2,4	421	2,6
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	862	2,7	415	2,7	447	2,8
VII- VIII Krankheiten des Auges und des Ohres (H00 - H95)	1	0,0	-	-	1	0,0
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	13 764	43,9	5 906	38,3	7 858	49,2
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	2 345	7,5	1 346	8,7	999	6,3
Chron. ischäm. Herzkrankheit (I25)	3 535	11,3	1 674	10,9	1 861	11,7
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	1 945	6,2	768	5,0	1 177	7,4
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	1 676	5,3	912	5,9	764	4,8
dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	937	3,0	532	3,5	405	2,5
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	1 553	5,0	871	5,7	682	4,3
dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	779	2,5	527	3,4	252	1,6
XII- XIII Krankheiten der Haut, des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (L00 - M99)	138	0,5	56	0,4	82	0,5
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	642	2,0	243	1,6	399	2,5
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	-	-	x	x	-	-
XVI Perinatalperiode (P00 - P96)	19	0,1	16	0,1	3	0,0
XVII Angeb. Fehlbildungen (Q00 - Q99)	54	0,2	34	0,2	20	0,1
XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	255	0,8	169	1,1	86	0,6
XIX Verletzungen, Vergiftungen, Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	1 245	4,0	792	5,1	453	2,8
Insgesamt (A00 - T98)	31 385	100	15 411	100	15 974	100

Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Männer



Frauen




Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	296	1	1	19	61	212
	m	143	1	1	13	38	90
	w	153	-	-	6	23	122
II C00 - D48	i	8 360	4	30	612	3 601	4 113
	m	4 731	2	17	355	2 241	2 116
	w	3 629	2	13	257	1 360	1 997
dar. C00 - C97	i	8 162	4	30	606	3 545	3 977
	m	4 638	2	17	353	2 213	2 053
	w	3 524	2	13	253	1 332	1 924
dar. C15 - C26	i	2 686	-	4	173	1 153	1 356
	m	1 535	-	2	107	765	661
	w	1 151	-	2	66	388	695
IV E00 - E90	i	1 665	1	7	78	445	1 134
	m	727	1	3	56	276	391
	w	938	-	4	22	169	743
dar. E10 - E14	i	1 445	-	2	50	347	1 046
	m	627	-	1	39	223	364
	w	818	-	1	11	124	682
V F00 - F99	i	794	-	8	95	174	517
	m	373	-	7	79	139	148
	w	421	-	1	16	35	369
VI G00 - G99	i	862	-	17	58	220	565
	m	415	-	11	38	116	248
	w	447	-	6	20	104	317
IX I00 - I99	i	13 764	1	14	373	2 572	10 804
	m	5 906	-	10	284	1 756	3 856
	w	7 858	1	4	89	816	6 948
dar. I21, I22	i	2 345	-	2	157	725	1 461
	m	1 346	-	1	130	526	689
	w	999	-	1	27	199	772
I60 - I69	i	1 945	1	3	44	369	1 528
	m	768	-	3	27	246	492
	w	1 177	1	-	17	123	1 036
X J00 - J99	i	1 676	1	6	54	467	1 145
	m	912	1	3	35	306	564
	w	764	-	3	19	161	581
dar. J40 - J47	i	937	-	2	19	312	604
	m	532	-	1	8	209	314
	w	405	-	1	11	103	290
XI K00 - K93	i	1 553	-	17	240	613	683
	m	871	-	13	186	409	263
	w	682	-	4	54	204	420
dar. K70 - K77	i	779	-	8	186	419	166
	m	527	-	7	147	289	84
	w	252	-	1	39	130	82
XIV N00 - N99	i	642	-	-	3	98	541
	m	243	-	-	2	52	189
	w	399	-	-	1	46	352
XIX S00 - T98	i	1 245	7	113	229	344	548
	m	792	6	81	184	262	258
	w	453	1	32	45	82	290
Insgesamt A00 - T98	i	31 385	17	226	1 836	8 802	20 455
	m	15 411	12	157	1 289	5 722	8 200
	w	15 974	5	69	547	3 080	12 255

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	13,1	0,4	0,2	2,9	9,5	79,8
	m	13,0	0,8	0,4	3,9	12,4	93,1
	w	13,3	-	-	1,9	6,9	72,1
II C00 - D48	i	362,4	1,7	6,7	94,0	554,6	1 496,7
	m	421,0	1,6	7,2	106,3	724,7	2 124,8
	w	306,4	1,8	6,1	80,9	398,9	1 137,8
dar. C00 - C97	i	371,2	1,7	6,7	94,9	563,3	1 547,9
	m	429,4	1,6	7,2	106,9	733,9	2 190,0
	w	315,5	1,8	6,1	82,2	407,3	1 181,0
dar. C15 - C26	i	119,3	-	0,9	26,8	180,4	510,3
	m	139,3	-	0,8	32,2	250,5	684,1
	w	100,1	-	0,9	21,1	116,2	411,0
IV E00 - E90	i	73,9	0,4	1,6	12,1	69,6	426,8
	m	66,0	0,8	1,3	16,9	90,4	404,7
	w	81,5	-	1,9	7,0	50,6	439,4
dar. E10 - E14	i	64,2	-	0,4	7,8	54,3	393,7
	m	56,9	-	0,4	11,7	73,0	376,7
	w	71,1	-	0,5	3,5	37,1	403,3
V F00 - F99	i	35,3	-	1,8	14,7	27,2	194,6
	m	33,9	-	2,9	23,8	45,5	153,2
	w	36,6	-	0,5	5,1	10,5	218,2
VI G00 - G99	i	38,3	-	3,8	9,0	34,4	212,6
	m	37,7	-	4,6	11,4	38,0	256,7
	w	38,9	-	2,8	6,4	31,1	187,5
IX I00 - I99	i	611,2	0,4	3,1	57,8	402,3	4 066,0
	m	536,1	-	4,2	85,5	575,1	3 990,9
	w	683,1	0,9	1,9	28,5	244,4	4 108,8
dar. I21, I22	i	104,1	-	0,4	24,3	113,4	549,8
	m	122,2	-	0,4	39,1	172,3	713,1
	w	86,8	-	0,5	8,6	59,6	456,5
I60 - I69	i	86,4	0,4	0,7	6,8	57,7	575,1
	m	69,7	-	1,3	8,1	80,6	509,2
	w	102,3	0,9	-	5,4	36,8	612,7
X J00 - J99	i	74,4	0,4	1,3	8,4	73,1	430,9
	m	82,8	0,8	1,3	10,5	100,2	583,7
	w	66,4	-	1,4	6,1	48,2	343,6
dar. J40 - J47	i	41,6	-	0,4	2,9	48,8	227,3
	m	48,3	-	0,4	2,4	68,4	325,0
	w	35,2	-	0,5	3,5	30,8	171,5
XI K00 - K93	i	69,0	-	3,8	37,2	95,9	257,0
	m	79,1	-	5,5	56,0	133,9	272,2
	w	59,3	-	1,9	17,3	61,1	248,4
dar. K70 - K77	i	34,6	-	1,8	28,8	65,5	62,5
	m	47,8	-	2,9	44,2	94,6	86,9
	w	21,9	-	0,5	12,5	38,9	48,5
XIV N00 - N99	i	28,5	-	-	0,5	15,3	203,6
	m	22,1	-	-	0,6	17,0	195,6
	w	34,7	-	-	0,3	13,8	208,2
XIX S00 - T98	i	55,3	3,0	25,1	35,5	53,8	206,2
	m	71,9	4,9	34,1	55,4	85,8	267,0
	w	39,4	0,9	15,1	14,4	24,6	171,5
Insgesamt A00 - T98	i	1 393,7	7,2	50,3	284,7	1 376,9	7 698,1
	m	1 398,8	9,9	66,1	388,0	1 873,9	8 486,8
	w	1 388,7	4,4	32,5	174,9	922,4	7 247,1

Sterbefälle 2013 nach Todesursachen und Altersgruppen in %



Anmerkung: Damit die Grafik übersichtlich bleibt, sind die Anteile der Todesursachenklassen, deren berechnete Werte weniger als 1 ergeben, der Rubrik "Übrige" zugeordnet worden. In der Rubrik "Übrige" sind ebenfalls die hier nicht aufgeführten Todesursachenklassen III, XII, XIII, XV, XVI, XVII und XVIII enthalten. Die Todesursachenklassen V-VIII sind in der Grafik zusammengefasst worden.

Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	II (C00 - D48)			IV (E00 - E90)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	345	180	165	47	15	32
Halle (Saale), Stadt	845	458	387	159	56	103
Magdeburg, Stadt	793	447	346	121	61	60
Altmarkkreis Salzwedel	299	163	136	68	35	33
Anhalt-Bitterfeld	645	374	271	123	56	67
Börde	560	336	224	127	51	76
Burgenlandkreis	689	397	292	138	56	82
Harz	902	491	411	163	60	103
Jerichower Land	354	204	150	85	38	47
Mansfeld-Südharz	596	348	248	125	59	66
Saalekreis	647	371	276	125	66	59
Salzlandkreis	798	463	335	177	81	96
Stendal	414	226	188	107	54	53
Wittenberg	473	273	200	100	39	61
Sachsen-Anhalt	8 360	4 731	3 629	1 665	727	938

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	VI (G00 - G99)			IX (I00 - I99)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	31	13	18	521	210	311
Halle (Saale), Stadt	90	50	40	1 258	513	745
Magdeburg, Stadt	82	38	44	1 215	533	682
Altmarkkreis Salzwedel	24	8	16	466	196	270
Anhalt-Bitterfeld	62	30	32	1 135	475	660
Börde	41	26	15	973	419	554
Burgenlandkreis	69	25	44	1 275	529	746
Harz	82	40	42	1 511	665	846
Jerichower Land	43	23	20	553	221	332
Mansfeld-Südharz	65	30	35	874	389	485
Saalekreis	68	29	39	1 016	474	542
Salzlandkreis	67	35	32	1 536	706	830
Stendal	68	35	33	620	241	379
Wittenberg	70	33	37	811	335	476
Sachsen-Anhalt	862	415	447	13 764	5 906	7 858

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	X (J00 - J99)			XI (K00 - K93)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	72	37	35	63	42	21
Halle (Saale), Stadt	167	81	86	131	70	61
Magdeburg, Stadt	178	93	85	126	67	59
Altmarkkreis Salzwedel	59	26	33	65	45	20
Anhalt-Bitterfeld	138	83	55	121	62	59
Börde	108	46	62	103	60	43
Burgenlandkreis	131	82	49	109	54	55
Harz	192	98	94	166	96	70
Jerichower Land	51	24	27	85	43	42
Mansfeld-Südharz	106	67	39	109	62	47
Saalekreis	127	68	59	136	76	60
Salzlandkreis	146	82	64	150	78	72
Stendal	106	68	38	90	55	35
Wittenberg	95	57	38	99	61	38
Sachsen-Anhalt	1 676	912	764	1 553	871	682

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XIX (S00 - T98)			insges. (A00 - T98)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	61	31	30	1 248	566	682
Halle (Saale), Stadt	124	66	58	3 034	1 405	1 629
Magdeburg, Stadt	115	65	50	2 820	1 397	1 423
Altmarkkreis Salzwedel	50	35	15	1 129	554	575
Anhalt-Bitterfeld	102	70	32	2 497	1 235	1 262
Börde	88	66	22	2 132	1 072	1 060
Burgenlandkreis	126	90	36	2 741	1 334	1 407
Harz	104	65	39	3 330	1 617	1 713
Jerichower Land	52	30	22	1 318	632	686
Mansfeld-Südharz	89	60	29	2 119	1 075	1 044
Saalekreis	89	54	35	2 376	1 223	1 153
Salzlandkreis	104	68	36	3 205	1 620	1 585
Stendal	64	49	15	1 578	773	805
Wittenberg	77	43	34	1 858	908	950
Sachsen-Anhalt	1 245	792	453	31 385	15 411	15 974

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	II (C00 - D48)			IV (E00 - E90)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	410,2	442,9	379,6	55,9	36,9	73,6
Halle (Saale), Stadt	365,0	414,5	319,8	68,7	50,7	85,1
Magdeburg, Stadt	344,1	398,7	292,3	52,5	54,4	50,7
Altmarkkreis Salzwedel	345,3	377,2	313,5	78,5	81,0	76,1
Anhalt-Bitterfeld	384,7	456,7	316,0	73,4	68,4	78,1
Börde	322,8	389,7	256,7	73,2	59,2	87,1
Burgenlandkreis	371,4	435,6	309,4	74,4	61,4	86,9
Harz	406,2	453,5	361,2	73,4	55,4	90,5
Jerichower Land	384,6	446,0	323,9	92,3	83,1	101,5
Mansfeld-Südharz	413,9	491,8	338,7	86,8	83,4	90,1
Saalekreis	343,3	399,1	289,0	66,3	71,0	61,8
Salzlandkreis	399,1	475,7	326,4	88,5	83,2	93,5
Stendal	356,7	395,3	319,2	92,2	94,4	90,0
Wittenberg	363,7	428,3	301,5	76,9	61,2	92,0
Sachsen-Anhalt	371,2	429,4	315,5	73,9	66,0	81,5

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht


Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	VI (G00 - G99)			IX (I00 - I99)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	36,9	32,0	41,4	619,4	516,7	715,4
Halle (Saale), Stadt	38,9	45,2	33,1	543,4	464,2	615,7
Magdeburg, Stadt	35,6	33,9	37,2	527,2	475,4	576,2
Altmarkkreis Salzwedel	27,7	18,5	36,9	538,1	453,6	622,3
Anhalt-Bitterfeld	37,0	36,6	37,3	677,0	580,1	769,5
Börde	23,6	30,2	17,2	560,9	486,0	634,8
Burgenlandkreis	37,2	27,4	46,6	687,3	580,4	790,5
Harz	36,9	36,9	36,9	680,4	614,2	743,4
Jerichower Land	46,7	50,3	43,2	600,8	483,2	717,0
Mansfeld-Südharz	45,1	42,4	47,8	607,0	549,7	662,3
Saalekreis	36,1	31,2	40,8	539,1	509,9	567,6
Salzlandkreis	33,5	36,0	31,2	768,1	725,3	808,8
Stendal	58,6	61,2	56,0	534,2	421,5	643,5
Wittenberg	53,8	51,8	55,8	623,5	525,6	717,7
Sachsen-Anhalt	38,3	37,7	38,9	611,2	536,1	683,1

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	X (J00 - J99)			XI (K00 - K93)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	85,6	91,0	80,5	74,9	103,3	48,3
Halle (Saale), Stadt	72,1	73,3	71,1	56,6	63,3	50,4
Magdeburg, Stadt	77,2	82,9	71,8	54,7	59,8	49,9
Altmarkkreis Salzwedel	68,1	60,2	76,1	75,1	104,1	46,1
Anhalt-Bitterfeld	82,3	101,4	64,1	72,2	75,7	68,8
Börde	62,3	53,4	71,0	59,4	69,6	49,3
Burgenlandkreis	70,6	90,0	51,9	58,8	59,2	58,3
Harz	86,5	90,5	82,6	74,8	88,7	61,5
Jerichower Land	55,4	52,5	58,3	92,3	94,0	90,7
Mansfeld-Südharz	73,6	94,7	53,3	75,7	87,6	64,2
Saalekreis	67,4	73,2	61,8	72,2	81,8	62,8
Salzlandkreis	73,0	84,2	62,4	75,0	80,1	70,2
Stendal	91,3	118,9	64,5	77,5	96,2	59,4
Wittenberg	73,0	89,4	57,3	76,1	95,7	57,3
Sachsen-Anhalt	74,4	82,8	66,4	69,0	79,1	59,3

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XIX (S00 - T98)			insges. (A00 - T98)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	72,5	76,3	69,0	1 483,8	1 392,7	1 568,9
Halle (Saale), Stadt	53,6	59,7	47,9	1 310,6	1 271,5	1 346,3
Magdeburg, Stadt	49,9	58,0	42,2	1 223,6	1 246,0	1 202,3
Altmarkkreis Salzwedel	57,7	81,0	34,6	1 303,8	1 282,1	1 325,3
Anhalt-Bitterfeld	60,8	85,5	37,3	1 489,4	1 508,2	1 471,5
Börde	50,7	76,6	25,2	1 229,0	1 243,5	1 214,7
Burgenlandkreis	67,9	98,7	38,1	1 477,5	1 463,6	1 490,9
Harz	46,8	60,0	34,3	1 499,5	1 493,5	1 505,2
Jerichower Land	56,5	65,6	47,5	1 431,9	1 381,8	1 481,5
Mansfeld-Südharz	61,8	84,8	39,6	1 471,6	1 519,1	1 425,8
Saalekreis	47,2	58,1	36,7	1 260,8	1 315,7	1 207,4
Salzlandkreis	52,0	69,9	35,1	1 602,8	1 664,3	1 544,4
Stendal	55,1	85,7	25,5	1 359,5	1 352,0	1 366,9
Wittenberg	59,2	67,5	51,3	1 428,5	1 424,5	1 432,3
Sachsen-Anhalt	55,3	71,9	39,4	1 393,7	1 398,8	1 388,7



Sterbefälle 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I A00 - B99	i	115	143	132	127	182	270	268	259	299	307	296
	m	56	72	68	63	78	134	122	121	138	158	143
	w	59	71	64	64	104	136	146	138	161	149	153
II C00 - D48	i	7 356	7 560	7 683	7 584	7 747	7 931	8 051	8 301	8 187	8 090	8 360
	m	4 047	4 232	4 199	4 140	4 351	4 403	4 514	4 633	4 569	4 495	4 731
	w	3 309	3 328	3 484	3 408	3 396	3 528	3 537	3 668	3 618	3 595	3 629
dar. C00 - C97	i	7 208	7 382	7 497	7 337	7 546	7 721	7 839	8 090	7 996	7 888	8 162
	m	3 979	4 159	4 120	4 060	4 268	4 301	4 414	4 537	4 485	4 416	4 638
	w	3 229	3 223	3 377	3 277	3 278	3 420	3 425	3 553	3 511	3 472	3 524
III D50 - D89	i	73	52	67	67	109	64	70	65	62	67	61
	m	28	16	24	23	46	22	32	26	24	23	23
	w	45	36	43	44	63	42	38	39	38	44	38
IV E00 - E90	i	1 388	1 573	1 439	1 542	1 613	1 146	1 368	1 238	1 317	1 483	1 665
	m	497	532	522	577	592	453	535	524	559	613	727
	w	891	1 041	917	965	1 021	693	833	714	758	870	938
dar. E10 - E14	i	1 273	1 430	1 319	1 419	1 457	999	1 200	1 039	1 121	1 282	1 445
	m	448	480	470	527	528	376	468	440	482	552	627
	w	825	950	849	892	929	623	732	599	639	730	818
dar. E11	i	824	922	900	1 026	1 062	734	916	884	975	1 118	1 291
	m	283	304	331	359	375	272	347	368	414	465	553
	w	541	618	569	667	687	462	569	516	561	653	738
V F00 - F99	i	167	176	191	220	216	380	496	606	600	656	794
	m	132	145	155	176	160	186	243	279	326	348	373
	w	35	31	36	44	56	194	253	327	274	308	421
dar. F10	i	136	144	161	181	147	110	142	177	196	212	228
	m	121	129	137	156	130	94	123	150	162	187	193
	w	15	15	24	25	17	16	19	27	34	25	35
VI G00 - G99	i	542	620	576	624	664	607	755	850	803	815	862
	m	256	293	276	304	303	282	366	401	402	395	415
	w	286	327	300	320	361	325	389	449	401	420	447
dar. G30	i	195	173	150	177	190	152	225	271	246	255	231
	m	67	56	54	56	63	41	84	87	86	89	89
	w	128	117	96	121	127	111	141	184	160	166	142
VII - VIII H00 - H95	i	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
	m	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
IX I00 - I99	i	15 072	14 086	14 093	14 052	13 388	13 983	14 100	14 289	13 832	13 665	13 764
	m	6 138	5 804	5 809	5 561	5 503	5 797	5 931	5 940	5 922	5 735	5 906
	w	8 934	8 282	8 284	8 191	7 885	8 186	8 169	8 349	7 910	7 930	7 858
dar. I25	i	4 163	3 743	3 587	3 494	3 155	2 953	3 357	3 474	3 435	3 527	3 535
	m	1 514	1 503	1 379	1 393	1 256	1 212	1 378	1 529	1 491	1 561	1 674
	w	2 649	2 340	2 208	2 101	1 899	1 741	1 979	1 945	1 944	1 966	1 861

Noch: Sterbefälle 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
X J00 - J99	i	1 010	958	1 090	1 012	1 186	1 488	1 550	1 431	1 406	1 442	1 676
	m	573	521	597	532	621	798	819	788	778	831	912
	w	437	437	493	480	565	690	731	643	628	611	764
dar. J40 - J47	i	680	588	602	530	608	707	915	858	837	839	937
	m	405	346	366	304	352	417	525	504	503	502	532
	w	275	242	236	226	256	290	390	354	334	337	405
XI K00 - K93	i	1 687	1 698	1 706	1 742	1 679	1 648	1 566	1 585	1 542	1 560	1 553
	m	1 006	979	1 013	965	949	905	846	880	859	909	871
	w	681	719	693	777	730	743	720	705	683	651	682
dar. K70 - K77	i	897	878	857	797	732	780	733	755	721	718	779
	m	674	639	630	565	545	550	516	514	511	522	527
	w	223	239	227	232	187	230	217	241	210	196	252
XII L00 - L99	i	3	3	3	6	2	11	14	12	15	16	21
	m	1	1	-	2	-	6	3	3	10	6	8
	w	2	2	3	4	2	5	11	9	5	10	13
XIII M00 - M99	i	55	55	63	60	58	68	95	87	102	115	117
	m	15	18	20	24	16	32	34	35	42	51	48
	w	40	37	43	36	42	36	61	52	60	64	69
XIV N00 - N99	i	411	416	524	558	646	620	567	503	533	561	642
	m	174	184	230	270	265	242	230	187	210	229	243
	w	237	232	294	288	381	378	337	316	323	332	399
XV O00 - O99	i	-	2	2	2	-	3	-	-	2	1	-
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	-	2	2	2	-	3	-	-	2	1	-
XVI P00 - P96	i	40	37	35	27	31	31	19	22	25	22	19
	m	29	19	14	15	20	22	10	16	11	12	16
	w	11	18	21	12	11	9	9	6	14	10	3
XVII Q00 - Q99	i	43	56	48	35	58	52	65	56	44	51	54
	m	22	30	28	14	26	20	30	29	23	32	34
	w	21	26	20	21	32	32	35	27	21	19	20
XVIII R00 - R99	i	392	342	393	442	811	444	305	320	313	286	255
	m	241	222	234	298	478	306	229	232	218	214	169
	w	151	120	159	144	333	138	76	88	95	72	86
XIX S00 - T98	i	1 278	1 231	1 232	1 086	1 002	1 158	1 191	1 105	1 101	1 183	1 245
	m	847	824	813	715	651	735	746	687	689	735	792
	w	431	407	419	371	351	423	445	418	412	448	453
Insgesamt A00 - T98	i	29 632	29 008	29 277	29 151	29 392	29 905	30 480	30 729	30 183	30 321	31 385
	m	14 062	13 892	14 002	14 980	14 059	14 344	14 690	14 781	14 780	14 786	15 411
	w	15 570	15 116	15 275	15 171	15 333	15 561	15 790	15 948	15 403	15 535	15 974

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I A00 - B99	i	4,5	5,7	5,3	5,2	7,5	11,3	11,3	11,0	13,1	13,5	13,1
	m	4,5	5,9	5,6	5,3	6,6	11,4	10,5	10,5	12,4	14,3	13,0
	w	4,5	5,5	5,0	5,1	8,4	11,1	12,1	11,5	13,8	12,9	13,3
II C00 - D48	i	290,1	301,2	309,5	307,4	319,1	330,8	340,0	354,0	358,0	356,7	371,2
	m	327,4	345,6	346,6	345,1	366,6	375,3	389,4	403,4	409,0	405,4	429,4
	w	254,7	258,9	274,2	271,3	273,7	288,1	292,6	306,6	309,2	310,1	315,5
dar. C00 - C97	i	284,3	294,1	302,0	298,8	310,8	322,1	331,0	345,0	349,6	347,8	362,4
	m	321,9	339,6	340,0	338,5	359,6	366,7	380,8	395,0	401,5	398,3	421,0
	w	248,5	250,8	265,7	260,9	264,2	279,3	283,4	297,0	300,1	299,5	306,4
III D50 - D89	i	2,9	2,1	2,7	2,7	4,5	2,7	3,0	2,8	2,7	3,0	2,7
	m	2,3	1,3	2,0	1,9	3,9	1,9	2,8	2,3	2,1	2,1	2,1
	w	3,5	2,8	3,4	3,5	5,1	3,4	3,1	3,3	3,2	3,8	3,3
IV E00 - E90	i	54,7	62,7	58,0	62,8	66,4	47,8	57,8	52,8	57,6	65,4	73,9
	m	40,2	43,4	43,1	48,1	49,9	38,6	46,1	45,6	50,0	55,3	66,0
	w	68,6	81,0	72,2	76,8	82,3	56,6	68,9	59,7	64,8	75,0	81,5
dar. E10 - E14	i	50,2	57,0	53,1	57,8	60,0	41,7	50,7	44,3	49,0	56,5	64,2
	m	36,2	39,2	38,8	43,9	44,5	32,1	40,4	38,3	43,2	49,8	56,9
	w	63,5	73,9	66,8	71,0	74,9	50,9	60,6	50,1	54,6	63,0	71,1
dar. E11	i	32,5	36,7	36,3	41,8	43,7	30,6	38,7	37,7	42,6	49,3	57,3
	m	22,9	24,8	27,3	29,9	31,6	23,2	29,9	32,0	37,1	41,9	50,2
	w	41,6	48,1	44,8	53,1	55,4	37,7	47,1	43,1	47,9	56,3	64,2
V F00 - F99	i	6,6	7,0	7,7	9,0	8,9	15,9	20,9	25,8	26,2	28,9	35,3
	m	10,7	11,8	12,8	14,7	13,5	15,9	21,0	24,3	29,2	31,4	33,9
	w	2,7	2,4	2,8	3,5	4,5	15,8	20,9	27,3	23,4	26,6	36,6
dar. F10	i	5,4	5,7	6,5	7,4	6,1	4,6	6,0	7,5	8,6	9,3	10,1
	m	9,8	10,5	11,3	13,0	11,0	8,0	10,6	13,1	14,5	16,9	17,5
	w	1,2	1,2	1,9	2,0	1,4	1,3	1,6	2,3	2,9	2,2	3,0
VI G00 - G99	i	21,4	24,7	23,2	25,4	27,4	25,3	31,9	36,2	35,1	35,9	38,3
	m	20,7	23,9	22,8	25,3	25,5	24,0	31,6	34,9	36,0	35,6	37,7
	w	22,0	25,4	23,6	25,5	29,1	26,5	32,2	37,5	34,3	36,2	38,9
dar. G30	i	7,7	6,9	6,0	7,2	7,8	6,3	9,5	11,6	10,8	11,2	10,3
	m	5,4	4,6	4,5	4,7	5,3	3,5	7,2	7,6	7,7	8,0	8,1
	w	9,9	9,1	7,6	9,6	10,2	9,1	11,7	15,4	13,7	14,3	12,3
VII - VIII H00 - H95	i	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0
	m	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
IX I00 - I99	i	594,5	561,2	567,7	572,2	551,5	583,3	595,5	609,4	604,8	602,5	611,2
	m	496,6	474,0	479,4	488,6	463,6	494,2	511,6	517,2	530,2	517,3	536,1
	w	687,6	644,4	651,9	652,0	635,6	668,6	675,9	697,9	676,1	684,0	683,1
dar. I25	i	164,2	149,1	144,5	142,3	130,0	123,2	141,8	148,2	150,2	155,5	157,0
	m	122,5	122,7	113,8	116,1	105,8	103,3	118,9	133,1	133,5	140,8	151,9
	w	203,9	182,1	173,7	167,2	153,1	142,2	163,7	162,6	166,2	169,6	161,8

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10		Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung										
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
X	J00 - J99	i	39,8	38,2	43,9	41,2	48,9	62,1	65,5	61,0	61,5	63,6	74,4
		m	46,4	42,5	49,3	44,3	52,3	68,0	70,6	68,6	69,6	75,0	82,8
		w	33,6	34,0	38,8	38,2	45,5	56,4	60,5	53,7	53,7	52,7	66,4
dar.	J40 - J47	i	26,8	23,4	24,3	21,6	25,0	29,5	38,6	36,6	36,6	37,0	41,6
		m	32,8	28,3	30,2	25,3	29,7	35,5	45,3	43,9	45,0	45,3	48,3
		w	21,2	18,8	18,6	18,0	20,6	23,7	32,3	29,6	28,5	29,1	35,2
XI	K00 - K93	i	66,5	67,7	68,7	70,9	69,2	68,7	66,1	67,6	67,4	68,8	69,0
		m	81,4	79,9	83,6	80,4	79,9	77,1	73,0	76,6	76,9	82,0	79,1
		w	52,4	55,9	54,5	61,9	58,8	60,7	59,6	58,9	58,4	56,2	59,3
dar.	K70 - K77	i	35,4	35,0	34,5	32,5	30,2	32,5	31,0	32,2	31,5	31,7	34,6
		m	54,4	52,2	52,0	47,1	45,9	46,9	44,5	44,8	45,7	47,1	47,8
		w	17,2	18,6	17,9	18,5	15,1	18,8	18,0	20,1	17,9	16,9	21,9
XII	L00 - L99	i	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9
		m	0,1	0,1	-	0,2	-	0,5	0,3	0,3	0,9	0,5	0,7
		w	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,9	0,8	0,4	0,9	1,1
XIII	M00 - M99	i	2,2	2,2	2,5	2,4	2,4	2,8	4,0	3,7	4,5	5,1	5,2
		m	1,2	1,5	1,7	2,0	1,3	2,7	2,9	3,0	3,8	4,6	4,4
		w	3,1	2,9	3,4	2,9	3,4	2,9	5,0	4,3	5,1	5,5	6,0
XIV	N00 - N99	i	16,2	16,6	21,1	22,7	26,6	25,9	23,9	21,5	23,3	24,7	28,5
		m	14,1	15,0	19,0	22,5	22,3	20,6	19,8	16,3	18,8	20,7	22,1
		w	18,2	18,1	23,1	22,9	30,7	30,9	27,9	26,4	27,6	28,6	34,7
XV	O00 - O99	i	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,0	-
		m	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
		w	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,1	-
XVI	P00 - P96	i	1,6	1,5	1,4	1,1	1,3	1,3	0,8	0,9	1,1	1,0	0,8
		m	2,4	1,6	1,2	1,3	1,7	1,9	0,9	1,4	1,0	1,1	1,5
		w	0,9	1,4	1,7	1,0	0,9	0,7	0,7	0,5	1,2	0,9	0,3
XVII	Q00 - Q99	i	1,7	2,2	1,9	1,4	2,4	2,2	2,7	2,4	1,9	2,2	2,4
		m	1,8	2,4	2,3	1,2	2,2	1,7	2,6	2,5	2,1	2,9	3,1
		w	1,6	2,0	1,6	1,7	2,6	2,6	2,9	2,3	1,8	1,6	1,7
XVIII	R00 - R99	i	15,5	13,6	15,8	18,0	33,4	18,5	12,9	13,6	13,7	12,6	11,3
		m	19,5	18,1	19,3	24,8	40,3	26,1	19,8	20,2	19,5	19,3	15,3
		w	11,6	9,3	12,5	11,5	26,8	11,3	6,3	7,4	8,1	6,2	7,5
XIX	S00 - T98	i	50,4	49,0	49,6	44,2	41,3	48,3	50,3	47,1	48,1	52,2	55,3
		m	68,5	67,3	67,1	59,6	54,8	62,7	64,4	59,8	61,7	66,3	71,9
		w	33,2	31,7	33,0	29,5	28,3	34,5	36,8	34,9	35,2	38,6	39,4
Insgesamt A00 - T98		i	1 168,7	1 155,8	1 179,4	1 187,0	1 210,7	1 247,4	1 287,2	1 310,5	1 319,7	1 336,9	1 393,7
		m	1 137,6	1 134,4	1 155,6	1 165,4	1 184,4	1 222,8	1 267,2	1 286,9	1 323,2	1 333,6	1 398,8
		w	1 198,3	1 176,1	1 202,0	1 207,7	1 235,9	1 270,9	1 306,4	1 333,1	1 316,5	1 340,0	1 388,7



Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Geschl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Akutes rheumatisches Fieber (I00 - I02)	i	-	-	-	-	-	
	m	-	-	-	-	-	
	w	-	-	-	-	-	
Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09)	i	82	-	-	-	17	65
	m	22	-	-	-	8	14
	w	60	-	-	-	9	51
Hypertonie (I10 - I15)	i	2 108	-	-	24	226	1 858
	m	645	-	-	20	134	491
	w	1 463	-	-	4	92	1 367
Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	5 948	-	2	201	1 315	4 430
	m	3 053	-	1	165	959	1 928
	w	2 895	-	1	36	356	2 502
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	i	2 345	-	2	157	725	1 461
	m	1 346	-	1	130	526	689
	w	999	-	1	27	199	772
Pulmonale Herzkrankheiten (I26 - I28)	i	190	-	3	19	71	97
	m	85	-	2	12	42	29
	w	105	-	1	7	29	68
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30 - I52)	i	3 056	-	4	66	468	2 518
	m	1 166	-	3	50	301	812
	w	1 890	-	1	16	167	1 706
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	1 945	1	3	44	369	1 528
	m	768	-	3	27	246	492
	w	1 177	1	-	17	123	1 036
dar. Schlaganfall nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet (I64)	i	207	1	-	1	34	171
	m	78	-	-	1	24	53
	w	129	1	-	-	10	118
Krankheiten d. Arterien, Arteriolen u. Kapillaren (I70 - I79)	i	354	-	1	11	81	261
	m	135	-	-	8	54	73
	w	219	-	1	3	27	188
dar. Atherosklerose (I70)	i	179	-	-	2	26	151
	m	52	-	-	2	17	33
	w	127	-	-	-	9	118
Krankheiten d. Venen, Lymphgefäße u. -knoten, n. anders klassifiziert (I80 - I89)	i	79	-	1	8	24	46
	m	31	-	1	2	11	17
	w	48	-	-	6	13	29
Sonstige Krankheiten d. Kreislaufsystems (I95 - I99)	i	2	-	-	-	1	1
	m	1	-	-	-	1	-
	w	1	-	-	-	-	1
Krankheiten d. Kreislaufsystems insgesamt (I00 - I99)	i	13 764	1	14	373	2 572	10 804
	m	5 906	-	10	284	1 756	3 856
	w	7 858	1	4	89	816	6 948

Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2003 - 2013 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I00 - I02	i	-	-	-	1	1	2	6	1	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	w	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
I05 - I09	i	78	65	79	87	69	47	73	43	68	52	82
	m	22	19	24	27	16	12	23	13	16	16	22
	w	56	46	55	60	53	35	50	30	52	36	60
I10 - I15	i	1 208	1 328	1 479	1 547	1 507	1 416	1 574	1 849	1 985	2 054	2 108
	m	379	431	484	475	493	409	490	557	635	590	645
	w	829	897	995	1 072	1 014	1 007	1 084	1 292	1 350	1 464	1 463
I20 - I25	i	7 344	6 804	6 653	6 379	5 986	5 974	6 391	6 416	6 152	6 080	5 948
	m	3 299	3 133	3 059	2 997	2 809	2 871	3 094	3 154	3 039	2 963	3 053
	w	4 045	3 671	3 594	3 382	3 177	3 103	3 297	3 262	3 113	3 117	2 895
dar. I21, I22	i	3 002	2 790	2 906	2 717	2 653	2 722	2 817	2 760	2 581	2 452	2 345
	m	1 704	1 553	1 613	1 536	1 478	1 543	1 616	1 559	1 490	1 359	1 346
	w	1 298	1 237	1 293	1 181	1 175	1 179	1 201	1 201	1 091	1 093	999
I26 - I28	i	175	234	189	238	225	404	220	258	224	183	190
	m	87	105	79	101	90	171	89	106	87	82	85
	w	88	129	110	137	135	233	131	152	137	101	105
I30 - I52	i	1 942	1 880	1 932	2 222	2 216	2 746	2 364	2 670	2 730	2 894	3 056
	m	796	708	768	890	843	1 038	888	945	1 056	1 113	1 166
	w	1 146	1 172	1 164	1 332	1 373	1 708	1 476	1 725	1 674	1 781	1 890
I60 - I69	i	3 292	2 943	2 930	2 762	2 657	2 692	2 780	2 581	2 165	1 948	1 945
	m	1 163	1 078	1 052	1 045	972	1 014	1 024	938	845	782	768
	w	2 129	1 865	1 878	1 717	1 685	1 678	1 756	1 643	1 320	1 166	1 177
dar. I64	i	1 137	853	858	800	782	746	677	585	288	222	207
	m	381	285	274	287	269	251	242	187	112	82	78
	w	756	568	584	513	513	495	435	398	176	140	129
I70 - I79	i	929	747	734	740	668	609	581	383	431	368	354
	m	355	305	307	293	258	250	274	192	210	156	135
	w	574	442	427	447	410	359	307	191	221	212	219
dar. I70	i	663	497	472	484	406	349	279	165	195	184	179
	m	220	179	169	159	135	124	111	74	80	69	52
	w	443	318	303	325	271	225	168	91	115	115	127
I80 - I99	i	104	85	97	76	58	93	111	88	77	86	81
	m	37	25	36	33	21	31	47	34	34	33	32
	w	67	60	61	43	37	62	64	51	43	53	49
Insgesamt I00 - I99	i	15 072	14 086	14 093	14 052	13 388	13 983	14 100	14 289	13 832	13 665	13 764
	m	6 138	5 804	5 809	5 861	5 503	5 797	5 931	5 940	5 922	5 735	5 906
	w	8 934	8 282	8 284	8 191	7 885	8 186	8 169	8 349	7 910	7 930	7 858

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2003 - 2013 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I00 - I02	i	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-
	w	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,3	-	-	-	-
I05 - I09	i	3,1	2,6	3,2	3,5	2,8	2,0	3,1	1,8	3,0	2,3	3,6
	m	1,8	1,6	2,0	2,3	1,3	1,0	2,0	1,1	1,4	1,4	2,0
	w	4,3	3,6	4,3	4,8	4,3	2,9	4,1	2,5	4,7	3,2	5,4
I10 - I15	i	47,6	52,9	59,6	63,0	62,1	59,1	66,5	78,9	86,8	90,6	93,6
	m	30,7	35,2	39,9	39,6	41,5	34,9	42,3	48,5	56,8	53,2	58,5
	w	63,8	69,8	78,3	85,3	81,7	82,2	89,7	108,0	120,9	132,0	132,8
I20 - I25	i	289,7	271,1	268,0	259,8	246,6	249,2	269,9	273,6	269,0	268,1	264,1
	m	266,9	255,8	252,5	249,8	236,6	244,7	266,9	274,6	272,1	267,2	277,1
	w	311,3	285,6	282,8	269,2	256,1	253,4	272,8	272,7	278,7	281,1	262,8
dar. I21, I22	i	118,4	111,2	117,1	110,6	109,3	113,5	119,0	117,7	112,9	108,1	104,1
	m	137,9	126,8	133,1	128,0	124,5	131,5	139,4	135,7	133,4	122,6	122,2
	w	99,9	96,2	101,7	94,0	94,7	96,3	99,4	100,4	97,7	98,6	90,7
I26 - I28	i	6,9	9,3	7,6	9,7	9,3	16,9	9,3	11,0	9,8	8,1	8,4
	m	7,0	8,6	6,5	8,4	7,6	14,6	7,7	9,2	7,8	7,4	7,7
	w	6,8	10,0	8,7	10,9	10,9	19,0	10,8	12,7	12,3	9,1	9,5
I30 - I52	i	76,6	74,9	77,8	90,5	91,3	114,5	99,8	113,9	119,4	127,6	135,7
	m	64,4	57,8	63,4	74,2	71,0	88,5	76,6	82,3	94,5	100,4	105,8
	w	88,2	91,2	91,6	106,0	110,7	139,5	122,1	144,2	149,9	160,6	171,6
I60 - I69	i	129,8	117,3	118,0	112,5	109,4	112,3	117,4	110,1	94,7	85,9	86,4
	m	94,1	88,0	86,8	87,1	81,9	86,4	88,3	81,7	75,6	70,5	69,7
	w	163,9	145,1	147,8	136,7	135,8	137,0	145,3	137,3	118,2	105,2	106,8
dar. I64	i	44,8	34,0	34,6	32,6	32,2	31,1	28,6	24,9	12,6	9,8	9,2
	m	30,8	23,3	22,6	23,9	22,7	21,4	20,9	16,3	10,0	7,4	7,1
	w	58,2	44,2	46,0	40,8	41,4	40,4	36,0	33,3	15,8	12,6	11,7
I70 - I79	i	36,6	29,8	29,6	30,1	27,5	25,4	24,5	16,3	18,8	16,2	15,7
	m	28,7	24,9	25,3	24,4	21,7	21,3	23,6	16,7	18,8	14,1	12,3
	w	44,2	34,4	33,6	35,6	33,0	29,3	25,4	16,0	19,8	19,1	19,9
dar. I70	i	26,1	19,8	19,0	19,7	16,7	14,6	11,8	7,0	8,5	8,1	7,9
	m	17,8	14,6	13,9	13,3	11,4	10,6	9,6	6,4	7,2	6,2	4,7
	w	34,1	24,7	23,8	25,9	21,8	18,4	13,9	7,6	10,3	10,4	11,5
I80 - I99	i	4,1	3,4	3,9	3,1	2,4	3,9	4,7	3,8	3,4	3,8	3,6
	m	3,0	2,0	3,0	2,8	1,8	2,6	4,1	3,0	3,0	3,0	2,9
	w	5,2	4,7	4,8	3,4	3,0	5,1	5,3	4,3	3,8	4,8	4,4
Insgesamt I00 - I99	i	594,5	561,2	567,7	572,2	551,5	583,3	595,5	609,4	604,8	602,5	611,2
	m	496,6	474,0	479,4	488,6	463,6	494,2	511,6	517,2	530,2	517,3	536,1
	w	687,6	644,4	651,9	652,0	635,6	668,6	675,9	697,9	708,1	715,2	713,3



Sterbefälle durch Neubildungen 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl .	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	8 162	4	30	606	3 545	3 977
	m	4 638	2	17	353	2 213	2 053
	w	3 524	2	13	253	1 332	1 924
dar. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00 - C14)	i	213	-	-	55	119	39
	m	169	-	-	50	97	22
	w	44	-	-	5	22	17
Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	2 686	-	4	173	1 153	1 356
	m	1 535	-	2	107	765	661
	w	1 151	-	2	66	388	695
Atmungsorgane u. intrathorakale Organe (C30 - C39)	i	1 684	-	-	152	906	626
	m	1 250	-	-	111	678	461
	w	434	-	-	41	228	165
Knochen u. Gelenk- knorpel (C40 - C41)	i	11	-	1	-	2	8
	m	4	-	1	-	1	2
	w	7	-	-	-	1	6
Haut (C43 - C44)	i	132	-	3	12	53	64
	m	82	-	2	5	36	39
	w	50	-	1	7	17	25
Brustdrüse (C50)	i	544	-	2	67	197	278
	m	4	-	-	-	2	2
	w	540	-	2	67	195	276
Weibliche Genital- organe (C51 - C58)	i	365	-	2	26	159	178
	m	x	x	x	x	x	x
	w	365	-	2	26	159	178
Männliche Genital- organe (C60 - C63)	i	533	-	2	6	170	355
	m	533	-	2	6	170	355
	w	x	x	x	x	x	x
Harnorgane (C64 - C68)	i	608	-	-	23	203	382
	m	361	-	-	18	134	209
	w	247	-	-	5	69	173
Auge, Gehirn u. Teile d. Zentralnerven- systems (C69 - C72)	i	209	1	4	35	104	65
	m	95	1	2	20	49	23
	w	114	-	2	15	55	42
Schilddrüse u. sonstige endokrine Drüsen (C73 - C75)	i	47	-	-	3	18	26
	m	21	-	-	2	10	9
	w	26	-	-	1	8	17
Lymphatische, blutbil- dende Gewebe (C81 - C96)	i	752	2	11	30	308	401
	m	405	1	7	19	188	190
	w	347	1	4	11	120	211
In-situ-Neubildungen (D00 - D09)	i	2	-	-	-	-	2
	m	1	-	-	-	-	1
	w	1	-	-	-	-	1
Gutartige Neubildungen (D10 - D36)	i	32	-	-	3	14	15
	m	11	-	-	1	5	5
	w	21	-	-	2	9	10
Neubildungen unbekanntem Verhaltens (D37 - D48)	i	164	-	-	3	42	119
	m	81	-	-	1	23	57
	w	83	-	-	2	19	62
Neubildungen insgesamt (C00 - D48)	i	8 360	4	30	612	3 601	4 113
	m	4 731	2	17	355	2 241	2 116
	w	3 629	2	13	257	1 360	1 997

Sterbefälle durch Neubildungen 2003 - 2013 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
C00 - C97	i	7 208	7 382	7497	7 337	7 546	7 721	7 839	8 090	7 996	7 888	8 162
	m	3 979	4 159	4120	4 060	4 268	4 301	4 414	4 537	4 485	4 416	4 638
	w	3 229	3 223	3377	3 277	3 278	3 420	3 425	3 553	3 511	3 472	3 524
dar.												
C00 - C14	i	153	147	173	176	171	195	206	201	206	241	213
	m	121	113	143	148	143	166	173	165	168	192	169
	w	32	34	30	28	28	29	33	36	38	49	44
C15 - C26	i	2 499	2 493	2532	2 510	2 544	2 532	2 631	2 668	2 630	2 602	2 686
	m	1 289	1 345	1343	1 358	1 382	1 378	1 424	1 469	1 463	1 481	1 535
	w	1 210	1 148	1189	1 152	1 162	1 154	1 207	1 199	1 167	1 121	1 151
C30 - C39	i	1 467	1 471	1581	1 549	1 637	1 562	1 518	1 609	1 608	1 578	1 684
	m	1 172	1 175	1221	1 178	1 249	1 170	1 145	1 212	1 194	1 165	1 250
	w	295	296	360	371	388	392	373	397	414	413	434
C43 - C44	i	93	100	109	79	87	96	114	108	140	115	132
	m	58	52	51	46	49	47	71	61	81	63	82
	w	35	48	58	33	38	49	43	47	59	52	50
C50	i	478	514	518	471	491	488	489	563	584	545	544
	m	6	5	6	3	4	5	7	5	6	5	4
	w	472	509	512	468	487	483	482	558	578	540	540
C51 - C58	i	409	391	425	404	377	444	411	397	408	408	365
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	409	391	425	404	377	444	411	397	408	408	365
C60 - C63	i	385	388	389	407	427	415	500	515	507	508	533
	m	385	388	389	407	427	415	500	515	507	508	533
	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C64 - C68	i	488	564	504	474	472	534	582	627	595	584	608
	m	317	367	321	290	296	347	382	384	376	347	361
	w	171	197	183	184	176	187	200	243	219	237	247
C69 - C72	i	201	173	183	179	171	200	211	206	199	175	209
	m	121	103	107	98	92	108	120	106	111	101	95
	w	80	70	76	81	79	92	91	100	88	74	114
C81 - C96	i	511	586	554	566	584	614	611	669	657	669	752
	m	249	321	268	265	298	333	305	342	351	343	405
	w	262	265	286	301	286	281	306	327	306	326	347
D00 - D09	i	2	2	3	4	5	3	3	-	1	2	2
	m	2	1	-	1	2	-	2	-	-	2	1
	w	-	1	3	3	3	3	1	-	1	-	1
D10 - D36	i	16	18	20	29	23	35	46	29	26	22	32
	m	7	5	5	11	8	14	16	11	6	6	11
	w	9	13	15	18	15	21	30	18	20	16	21
D37 - D48	i	130	158	163	178	173	172	163	182	164	178	164
	m	59	67	74	68	73	88	82	85	78	71	81
	w	71	91	89	110	100	84	81	97	86	107	83
Insgesamt C00 - D48	i	7356	7 560	7 683	7 548	7 747	7 931	8 051	8 301	8 187	8 090	8 360
	m	4047	4 232	4 199	4 140	4 351	4 403	4 514	4 633	4 569	4 495	4 731
	w	3309	3 328	3 484	3 408	3 396	3 528	3 537	3 668	3 618	3 595	3 629

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2003 - 2013 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
C00 - C97	i	284,3	294,1	302,0	298,8	310,8	322,1	331,0	345,0	349,6	347,8	362,4
	m	321,9	339,6	340,0	338,5	359,6	366,7	380,8	395,0	401,5	398,3	421,0
	w	248,5	250,8	265,7	260,9	264,2	279,3	283,4	297,0	300,1	299,5	306,4
dar.												
C00 - C14	i	6,0	5,9	7,0	7,2	7,0	8,1	8,7	8,6	9,0	10,6	9,5
	m	9,8	9,2	11,8	12,3	12,0	14,2	14,9	14,4	15,0	17,3	15,3
	w	2,5	2,6	2,4	2,2	2,3	2,4	2,7	3,0	3,2	4,2	3,8
C15 - C26	i	98,6	99,3	102,0	102,2	104,8	105,6	111,1	113,8	115,0	114,7	119,3
	m	104,3	109,8	110,8	113,2	116,4	117,5	122,8	127,9	131,0	133,6	139,3
	w	93,1	89,3	93,6	91,7	93,7	94,3	99,9	100,2	99,7	96,7	100,1
C30 - C39	i	57,9	58,6	63,7	63,1	67,4	65,2	64,1	68,6	70,3	69,6	74,8
	m	94,8	96,0	100,8	98,2	105,2	99,7	98,8	105,5	106,9	105,1	113,5
	w	22,7	23,0	28,3	29,5	31,3	32,0	30,9	33,2	35,4	35,6	37,7
C43 - C44	i	3,7	4,0	4,4	3,2	3,6	4,0	4,8	4,6	6,1	5,1	5,9
	m	4,7	4,2	4,2	3,8	4,1	4,0	6,1	5,3	7,3	5,7	7,4
	w	2,7	3,7	4,6	2,6	3,1	4,0	3,6	3,9	5,0	4,5	4,3
C50	i	18,9	20,5	20,9	19,2	20,2	20,4	20,7	24,0	25,5	24,0	24,2
	m	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4
	w	36,3	39,6	40,3	37,3	39,3	39,4	39,9	46,6	49,4	46,6	46,9
C51 - C58	i	16,1	15,6	17,1	16,5	15,5	18,5	17,4	16,9	17,8	18,0	16,2
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	31,5	30,4	33,4	32,2	30,4	36,3	34,0	33,2	34,9	35,2	31,7
C60 - C63	i	15,2	15,5	15,7	16,6	17,6	17,3	21,1	22,0	22,2	22,4	23,7
	m	31,1	31,7	32,1	33,9	36,0	35,4	43,1	44,8	45,4	45,8	48,4
	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C64 - C68	i	19,2	22,5	20,3	19,3	19,4	22,3	24,6	26,7	26,0	25,7	27,0
	m	25,6	30,0	26,5	24,2	24,9	29,6	33,0	33,4	33,7	31,3	32,8
	w	13,2	15,3	14,4	14,6	14,2	15,3	16,5	20,3	18,7	20,4	21,5
C69 - C72	i	7,9	6,9	7,4	7,3	7,0	8,3	8,9	8,8	8,7	7,7	9,3
	m	9,8	8,4	8,8	8,2	7,8	9,2	10,4	9,2	9,9	9,1	8,6
	w	6,2	5,4	6,0	6,4	6,4	7,5	7,5	8,4	7,5	6,4	9,9
C81 - C96	i	20,2	23,3	22,3	23,0	24,1	25,6	25,8	28,5	28,7	29,5	33,4
	m	20,1	26,2	22,1	22,1	25,1	28,4	26,3	29,8	31,4	30,9	36,8
	w	20,2	20,6	22,5	24,0	23,1	23,0	25,3	27,3	26,2	28,1	30,2
D00 - D09	i	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,1
	m	0,2	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,1
	w	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,1	-	0,1
D10 - D36	i	0,6	0,7	0,8	1,2	0,9	1,5	1,9	1,2	1,1	1,0	1,4
	m	0,6	0,4	0,4	0,9	0,7	1,2	1,4	1,0	0,5	0,5	1,0
	w	0,7	1,0	1,2	1,4	1,2	1,7	2,5	1,5	1,7	1,4	1,8
D37 - D48	i	5,1	6,3	6,6	7,2	7,1	7,2	6,9	7,8	7,2	7,8	7,3
	m	4,8	5,5	6,1	5,7	6,1	7,5	7,1	7,4	7,0	6,4	7,4
	w	5,5	7,1	7,0	8,8	8,1	6,9	6,7	8,1	7,4	9,2	7,2
Insgesamt C00 - D48	i	290,1	301,2	309,5	307,4	319,1	330,8	340,0	354,0	358,0	356,7	371,2
	m	327,4	345,6	346,6	345,1	366,6	375,3	389,4	403,4	409,0	405,4	429,4
	w	254,7	258,9	274,2	271,3	273,7	288,1	292,6	306,6	309,2	310,1	315,5



Nichtnatürliche Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Verletzungen d. Kopfes (S00 - S09)	i	248	3	23	44	76	102
	m	163	1	19	34	60	49
	w	85	2	4	10	16	53
Verletzungen d. Halses (S10 - S19)	i	36	1	8	7	4	16
	m	24	1	7	5	3	8
	w	12	-	1	2	1	8
Verletzungen d. Thorax (S20 - S29)	i	49	1	5	2	17	24
	m	38	1	5	2	15	15
	w	11	-	-	-	2	9
Verletzungen d. Abdomens, d. Lendenwirbelsäule u. d. Beckens (S30 - S39)	i	46	-	1	1	11	33
	m	14	-	1	-	6	7
	w	32	-	-	1	5	26
Verletzungen d. Extremitäten (S40 - S99)	i	218	-	-	6	33	179
	m	90	-	-	6	23	61
	w	128	-	-	-	10	118
dar. Verletzungen d. Hüfte u. d. Oberschenkels (S70 - S79)	i	180	-	-	3	23	154
	m	72	-	-	3	17	52
	w	108	-	-	-	6	102
Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00 - T07)	i	123	2	23	40	30	28
	m	87	1	17	31	22	16
	w	36	1	6	9	8	12
Verbrennungen o. Ver- ätzungen (T20 - T32)	i	13	-	1	3	3	6
	m	8	-	1	2	2	3
	w	5	-	-	1	1	3
Erfrierungen (T33 - T35)	i	2	-	-	-	1	1
	m	2	-	-	-	1	1
	w	-	-	-	-	-	-
Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen u. biologisch aktive Substanzen (T36 - T50)	i	42	-	9	13	12	8
	m	16	-	4	6	4	2
	w	26	-	5	7	8	6
Toxische Wirkung von nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51 - T65)	i	55	-	7	25	14	9
	m	43	-	4	21	13	5
	w	12	-	3	4	1	4
Sonstige Schäden	i	413	4	36	88	143	142
	m	307	3	23	77	113	91
	w	106	1	13	11	30	51
Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	1 245	11	113	229	344	548
	m	792	7	81	184	262	258
	w	453	4	32	45	82	290

Unfalltote 2013 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	23	-	5	8	10	-
	m	21	-	3	8	10	-
	w	2	-	2	-	-	-
Verkehrsunfall	i	157	3	38	49	41	26
	m	112	2	28	36	31	15
	w	45	1	10	13	10	11
Häuslicher Unfall	i	397	3	12	34	82	266
	m	202	2	12	28	61	99
	w	195	1	-	6	21	167
Sport-/Spielunfall	i	10	2	1	1	5	1
	m	7	2	-	1	4	-
	w	3	-	1	-	1	1
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	247	-	9	24	64	150
	m	125	-	3	18	44	60
	w	122	-	6	6	20	90
Insgesamt	i	834	8	65	116	202	443
	m	467	6	46	91	150	174
	w	367	2	19	25	52	269

Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2013 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	1,0	-	1,1	1,2	1,6	-
	m	1,9	-	1,3	2,4	3,3	-
	w	0,2	-	0,9	-	-	-
Verkehrsunfall	i	7,0	1,2	8,5	7,6	6,4	9,8
	m	10,2	1,5	11,8	10,8	10,2	15,5
	w	3,9	0,8	4,7	4,2	3,0	6,5
Häuslicher Unfall	i	17,6	1,2	2,7	5,3	12,8	100,1
	m	18,3	1,5	5,1	8,4	20,0	102,5
	w	17,0	0,8	-	1,9	6,3	98,8
Sport-/Spielunfall	i	0,4	0,8	0,2	0,2	0,8	0,4
	m	0,6	1,5	-	0,3	1,3	-
	w	0,3	-	0,5	-	0,3	0,6
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	11,0	-	2,0	3,7	10,0	56,5
	m	11,3	-	1,3	5,4	14,4	62,1
	w	10,6	-	2,8	1,9	6,0	53,2
Insgesamt	i	37,0	3,2	14,5	18,0	31,6	166,7
	m	42,4	4,6	19,4	27,4	49,1	180,1
	w	31,9	1,6	9,0	8,0	15,6	159,1

Unfalltote 2013 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Männer



Frauen



Unfälle 2003 - 2013 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arbeits- / Schulunfall	i	35	28	29	33	28	25	22	26	30	19	23
	m	33	28	26	30	27	24	21	26	30	17	21
	w	2	-	3	3	1	1	1	-	-	2	2
Verkehrsunfall	i	318	259	250	207	180	228	177	158	176	150	157
	m	235	187	187	156	131	169	125	119	120	114	112
	w	83	72	63	51	49	59	52	39	56	36	45
Häuslicher Unfall	i	297	262	285	216	228	267	344	364	356	358	397
	m	137	123	126	96	107	129	155	169	170	156	202
	w	160	139	159	120	121	138	189	195	186	202	195
Sport- / Spielunfall	i	7	7	4	1	1	4	6	6	7	16	10
	m	6	5	3	1	1	4	5	5	5	12	7
	w	1	2	1	-	-	-	1	1	2	4	3
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	155	143	129	141	98	183	213	192	175	233	247
	m	95	91	78	86	56	96	105	107	92	119	125
	w	60	52	51	55	42	87	108	85	83	114	122
Insgesamt	i	812	699	697	598	535	707	762	746	744	776	834
	m	506	434	420	369	322	422	411	426	417	418	467
	w	306	265	277	229	213	285	351	320	327	358	367

Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2003 - 2013 nach Unfallkategorien und Geschlecht



Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arbeits- / Schulunfall	i	1,4	1,1	1,2	1,3	1,2	1,0	0,9	1,1	1,3	0,8	1,0
	m	2,7	2,3	2,1	2,5	2,3	2,0	1,8	2,3	2,7	1,5	1,9
	w	0,2	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2
Verkehrsunfall	i	12,5	10,3	10,1	8,4	7,4	9,5	7,5	6,7	7,7	6,6	7,0
	m	19,0	15,3	15,4	13,0	11,0	14,4	10,8	10,4	10,7	10,3	10,2
	w	6,4	5,6	5,0	4,1	3,9	4,8	4,3	3,3	4,8	3,1	3,9
Häuslicher Unfall	i	11,7	10,4	11,5	8,8	9,4	11,1	14,5	15,5	15,6	15,8	17,6
	m	11,1	10,0	10,4	8,0	9,0	11,0	13,4	14,7	15,2	14,1	18,3
	w	12,3	10,8	12,5	9,6	9,8	11,3	15,6	16,3	15,9	17,4	17,0
Sport- / Spielunfall	i	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4
	m	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	1,1	0,6
	w	0,1	0,2	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	6,1	5,7	5,2	5,7	4,0	7,6	9,0	8,2	7,7	10,3	11,0
	m	7,7	7,4	6,4	7,2	4,7	8,2	9,1	9,3	8,2	10,7	11,3
	w	4,6	4,0	4,0	4,4	3,4	7,1	8,9	7,1	7,1	9,8	10,6
Insgesamt	i	32,0	27,9	28,1	24,4	22,0	29,5	32,2	31,8	32,5	34,2	37,0
	m	40,9	35,4	34,7	30,8	27,1	36,0	35,5	37,1	37,3	37,7	42,4
	w	23,6	20,6	21,8	18,2	17,2	23,3	29,0	26,7	27,9	30,9	31,9


Nichtnatürliche Sterbefälle 2013 nach äußerer Ursache und Geschlecht

Äußere Ursache	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.
Transportmittelunfälle (V01- V99)	168	13,5	7,5	121	15,3	11,0	47	10,4	4,1
dar. Fußgänger (V01 - V09)	23	1,8	1,0	12	1,5	1,1	11	2,4	1,0
Radfahrer (V10 - V19)	23	1,8	1,0	20	2,5	1,8	3	0,7	0,3
Krad-Benutzer (V20 - V29)	20	1,6	0,9	19	2,4	1,7	1	0,2	0,1
PKW-Benutzer (V40 - V49)	81	6,5	3,6	52	6,6	4,7	29	6,4	2,5
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	4	0,3	0,2	4	0,5	0,4	-	-	-
Autobusbenutzer (V70 - V79)	1	0,1	0,0	1	0,1	0,1	-	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	312	25,1	13,9	142	17,9	12,9	170	37,5	14,8
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	18	1,4	0,8	11	1,4	1,0	7	1,6	0,6
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	28	2,2	1,2	14	1,8	1,3	14	3,1	1,2
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	17	1,4	0,8	11	1,4	1,0	6	1,3	0,5
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	14	1,1	0,6	12	1,5	1,1	2	0,4	0,2
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	40	3,2	1,8	29	3,7	2,6	11	2,4	1,0
Suizide (X60 - X84)	373	30,0	16,6	296	37,4	26,9	77	17,0	6,7
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	9	0,7	0,4	6	0,7	0,5	3	0,7	0,3
Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	28	2,3	1,2	22	2,8	2,0	6	1,3	0,5
Komplikationen bei der medizi- nischen und chirurgischen Behandlung (Y40 - Y84)	84	6,7	3,7	48	6,0	4,4	36	8,0	3,1
Übrige	154	12,4	6,8	80	10,1	7,3	74	16,3	6,4
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	1 245	100	55,3	792	100	71,9	453	100	39,4
dar. Unfälle insgesamt (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	834	67,0	37,0	467	59,0	42,4	367	81,0	31,9

Nichtnatürliche Sterbefälle 2013 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht

Äußere Ursache	Ge- schlecht	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Transportmittelunfälle (V01- V99)	i	168	3	40	52	47	26
	m	121	2	29	39	36	15
	w	47	1	11	13	11	11
dar. Fußgänger (V01 - V09)	i	23	1	2	8	4	8
	m	12	1	2	4	2	3
	w	11	-	-	4	2	5
Radfahrer (V10 - V19)	i	23	1	-	3	12	7
	m	20	1	-	3	12	4
	w	3	-	-	-	-	3
Krad-Benutzer (V20 - V29)	i	20	-	10	7	3	-
	m	19	-	10	6	3	-
	w	1	-	-	1	-	-
PKW-Benutzer (V40 - V49)	i	81	1	25	28	17	10
	m	52	-	15	20	10	7
	w	29	1	10	8	7	3
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	i	4	-	-	1	3	-
	m	4	-	-	1	3	-
	w	-	-	-	-	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	i	312	1	8	14	60	229
	m	142	1	8	12	40	81
	w	170	-	-	2	20	148
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	i	18	3	2	4	3	6
	m	11	3	-	4	1	3
	w	7	-	2	-	2	3
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	i	28	1	2	1	8	16
	m	14	-	2	1	5	6
	w	14	1	-	-	3	10
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	i	17	-	1	3	3	10
	m	11	-	1	3	3	4
	w	6	-	-	-	-	6
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	i	14	-	1	2	6	5
	m	12	-	-	2	5	5
	w	2	-	1	-	1	-
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	i	40	-	6	19	9	6
	m	29	-	4	14	8	3
	w	11	-	2	5	1	3
Suizide (X60 - X84)	i	373	-	44	107	130	92
	m	296	-	33	87	102	74
	w	77	-	11	20	28	18
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	i	9	3	3	-	1	2
	m	6	1	2	-	1	2
	w	3	2	1	-	-	-
Übrige	i	266	-	6	27	77	156
	m	150	-	2	22	61	65
	w	116	-	4	5	16	91
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	i	1 245	11	113	229	344	548
	m	792	7	81	184	262	258
	w	453	4	32	45	82	290






Alkoholbedingte Sterbefälle 2008 und 2013 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle						
	2008			2013			
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	
E24.4	Durch Alkohol induziertes Pseudo-Cushing-Syndrom	-	-	-	-	-	
E52	Niazinmangel [Pellagra]	-	-	-	-	-	
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	110	94	16	228	193	35
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	11	8	3	13	10	3
G62.1	Alkohol-Polyneuropathie	1	1	-	6	4	2
G72.1	Alkoholmyopathie	-	-	-	-	-	-
I42.6	Alkoholische Kardiomyopathie	24	23	1	24	17	7
K29.2	Alkoholgastritis	4	4	-	1	1	-
K70	Alkoholische Leberkrankheit	506	396	110	543	396	147
K85.2	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis	5	5	-	17	15	2
K86.0	Durch Alkohol induzierte chronische Pankreatitis	7	7	-	13	13	-
O35.4	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol	-	x	-	-	x	-
P04.3	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter	-	-	-	-	-	-
Q86.0	Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)	-	-	-	-	-	-
R78.0	Nachweis von Alkohol im Blut	-	-	-	-	-	-
T51.0	Toxische Wirkung: Äthanol	9	6	3	21	17	4
T51.9	Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet	3	1	2	5	4	1
Insgesamt		680	545	135	871	670	201
Anteil aller Sterbefälle in %		2,3	3,8	0,9	2,8	4,3	1,3
Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung		28,4	46,5	11,0	38,7	60,8	17,5

Alkoholbedingte Sterbefälle 2008 und 2013 nach Altersgruppen im Vergleich

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			
	2008		2013	
	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	-	-	-	-
1 - 15	-	-	-	-
15 - 35	8	1,2	12	1,4
35 - 55	289	42,5	280	32,1
55 - 75	339	49,8	508	58,3
75 und mehr	44	6,5	71	8,2
Insgesamt	680	100	871	100



Mittleres Sterbealter seit 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren						
			2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	i	65,0	67,5	70,6	73,4	74,7	77,1	77,5
		m	61,0	62,6	66,7	72,0	71,4	73,5	74,3
		w	69,1	72,2	74,7	74,4	77,4	80,2	80,5
II	Neubildungen (C00 - D48)	i	70,3	70,5	71,0	71,5	72,0	72,4	72,8
		m	68,6	68,9	69,6	70,1	70,6	71,1	71,7
		w	72,2	72,6	72,7	73,3	73,7	74,0	74,2
dar.	Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	70,2	70,4	70,9	71,4	71,8	72,2	72,6
		m	68,6	68,8	69,5	70,1	70,5	71,0	71,6
		w	72,0	72,4	72,5	73,1	73,5	73,8	74,0
	dar. Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	71,7	71,7	72,0	72,5	72,9	73,0	73,4
		m	68,5	68,8	69,6	70,1	70,6	70,8	71,6
		w	74,8	74,8	74,7	75,3	75,5	75,8	75,8
	... der Atmungsorgane (C30 - C39)	i	68,1	68,5	68,9	69,2	69,5	70,1	70,1
		m	67,6	67,8	68,5	68,9	69,0	69,8	70,0
		w	70,1	71,3	70,3	70,4	70,8	71,2	70,1
	... der Brustdrüse (C50)	i	68,4	68,9	68,9	70,4	70,9	71,7	72,7
		m	71,8	71,3	64,3	79,5	69,3	70,2	72,8
		w	68,3	68,9	68,9	70,3	71,0	71,7	72,7
	... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 - C96)	i	68,8	70,2	71,7	71,7	73,5	73,5	73,3
		m	66,6	67,9	70,0	70,0	71,3	72,2	71,8
		w	70,9	72,3	73,2	73,5	75,6	75,0	75,1
III	Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	i	71,6	72,8	76,4	75,8	78,2	76,0	76,6
		m	64,3	71,9	71,5	71,3	73,6	73,2	73,4
		w	76,4	73,4	79,1	79,1	82,1	77,7	78,5
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	i	76,5	76,8	77,4	77,4	77,1	76,2	77,4
		m	71,0	71,8	71,5	71,1	72,1	72,4	73,1
		w	79,4	79,7	80,7	81,1	80,2	79,0	80,7
dar.	Diabetes mellitus (E10 - E14)	i	77,5	77,3	78,3	78,3	78,0	77,2	78,6
		m	72,2	72,6	72,9	72,5	73,3	73,3	74,5
		w	80,2	79,9	81,4	81,6	81,0	80,1	81,8
V	Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	i	61,4	59,8	56,4	63,1	76,2	74,5	76,6
		m	57,2	56,8	54,6	60,3	68,4	67,7	67,7
		w	73,5	71,4	64,0	71,3	83,6	82,7	84,5
dar.	... durch Alkohol (F10)	i	56,6	56,3	54,6	57,0	57,3	57,3	58,8
		m	56,5	56,0	54,1	57,7	56,7	56,7	58,5
		w	57,6	58,3	57,5	51,8	61,4	60,1	60,1
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	i	70,3	72,6	70,9	73,6	73,2	74,7	75,8
		m	66,6	67,2	67,1	69,5	69,7	71,7	73,1
		w	73,7	77,5	74,4	77,1	76,6	78,3	78,3
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	i	78,8	79,3	79,4	79,7	80,1	80,6	81,2
		m	73,8	74,0	74,4	74,4	75,2	76,0	76,9
		w	82,2	82,9	82,9	83,3	83,7	84,1	84,5
dar.	Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	77,8	78,5	78,7	78,7	78,8	79,7	79,9
		m	73,0	73,2	73,9	73,7	74,3	75,5	76,2
		w	81,8	82,8	82,8	83,1	83,1	83,7	83,7
	dar. Akuter Myokardinfarkt (I21)	i	73,2	73,7	74,7	75,1	74,8	76,1	76,3
		m	69,1	69,5	70,9	70,9	71,1	72,5	72,9
		w	78,2	79,1	79,3	80,1	79,8	80,9	80,8
	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	80,6	80,8	80,3	80,4	81,0	80,6	81,1
		m	76,8	76,7	76,0	75,7	76,9	76,7	76,9
		w	82,7	83,0	82,6	83,1	83,4	83,1	83,9

Noch: Mittleres Sterbealter seit 2001 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren							
			2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	i	76,5	76,8	77,3	77,6	77,5	77,3	77,6	
		m	73,5	74,3	75,3	74,6	75,0	75,3	75,6	
		w	80,5	80,0	79,8	80,9	80,3	79,8	80,1	
	dar. Grippe und Pneumonie (J09 - J18)	i	80,0	79,6	80,6	80,5	79,7	78,4	78,8	
		m	75,9	75,5	77,5	76,1	74,9	73,9	74,9	
		w	83,4	83,6	83,1	83,7	83,4	81,9	82,4	
	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	i	75,6	76,2	75,8	75,7	76,7	77,0	77,0	
		m	73,6	74,0	74,4	74,0	75,0	76,1	76,0	
		w	79,1	79,3	78,0	78,1	79,0	78,4	78,5	
XI	Krankheiten des Verdauungs- systems (K00 - K93)	i	64,9	66,5	67,5	69,6	69,7	69,9	70,2	
		m	60,0	61,9	62,5	64,6	64,1	65,2	65,8	
		w	72,0	73,4	74,6	76,2	76,3	75,9	75,7	
	dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	i	57,7	58,9	59,9	61,5	60,8	61,9	63,6	
		m	56,6	58,3	58,4	60,4	59,3	60,8	61,7	
		w	60,6	60,6	64,2	64,4	64,6	64,5	67,5	
	XIV	Krankheiten des Urogenital- systems (N00 - N99)	i	76,5	78,5	79,5	79,8	80,7	80,9	82,2
			m	74,4	75,5	77,1	77,6	78,2	78,5	80,3
			w	78,3	80,6	81,5	81,3	82,4	82,5	83,4
XVII	Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	i	28,1	30,2	41,0	49,2	42,6	38,0	35,0	
		m	13,6	30,7	35,3	39,8	40,5	36,0	36,1	
		w	38,7	29,8	49,0	56,9	44,4	40,3	33,1	
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	54,5	54,7	57,6	61,2	62,2	63,8	66,1	
		m	49,3	48,6	52,2	55,9	57,0	58,6	62,0	
		w	64,6	66,8	67,9	71,1	70,9	72,6	73,1	
	dar. Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70 - S79)	i	84,6	84,9	82,9	83,9	83,4	83,8	83,0	
		m	80,7	82,9	80,4	82,5	78,2	80,3	78,8	
		w	86,2	85,6	84,1	84,7	85,9	85,4	85,7	
	aus XX	Transportmittelunfälle (V01 - V99)	i	40,9	40,9	42,6	45,4	46,6	49,0	50,6
			m	38,9	38,8	41,4	43,0	45,5	45,3	49,8
			w	46,4	47,3	45,9	51,9	49,5	57,2	52,7
Unfälle durch Sturz (W00 - W19)		i	73,6	73,8	75,2	76,8	78,3	78,1	78,1	
		m	64,5	64,5	66,7	69,8	72,1	71,7	71,9	
		w	81,5	81,8	80,9	82,4	82,5	82,9	83,4	
Unfälle durch Ertrinken (W65 - W74)		i	53,1	42,2	46,7	53,3	54,8	44,7	53,9	
		m	48,8	30,8	43,0	52,8	53,9	48,8	47,7	
		w	59,3	66,6	57,7	56,0	56,5	31,0	63,7	
Suizide (X60 - X84)		i	55,7	54,2	54,3	57,5	58,1	58,8	59,7	
		m	53,0	51,6	53,2	56,7	57,4	57,9	59,9	
		w	63,3	61,7	57,5	60,5	61,3	61,7	59,0	
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)		i	39,4	35,9	35,9	45,5	39,1	37,8	34,4	
		m	42,8	34,6	30,7	51,9	38,5	32,4	47,3	
		w	29,7	38,1	38,5	38,2	40,1	49,3	8,7	
Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10 - Y34)		i	48,9	53,0	57,7	63,7	62,6	72,2	67,2	
		m	45,9	50,6	53,3	59,0	59,0	72,7	66,1	
		w	57,9	58,3	70,1	73,1	68,9	70,7	71,0	
Insgesamt (A00 - T98)		i	73,9	74,4	74,6	75,3	75,8	76,2	76,9	
		m	69,0	69,2	69,9	70,7	71,5	72,2	73,0	
		w	78,2	79,1	78,9	79,6	79,9	80,1	80,5	

Vermeidbare Sterbefälle 2008 und 2013 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Alter	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		2008			2013		
		insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
- Alle Krankheiten (A00 - T98)	unter 1	2,5	3,2	2,0	2,2	2,8	1,6
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten Tuberkulose und deren Folgezustände (A15 - A19, B90)	5 - 65	0,3	0,5	-	0,1	0,2	-
II Neubildungen Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses (C53)	5 - 65	1,4	x	2,7	0,9	-	1,7
Hodgkin-Krankheit (C81)	5 - 35	-	-	-	-	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09)	5 - 45	-	-	-	-	-	-
Hypertonie (I10 - I15)	5 - 65	3,3	4,9	1,7	3,7	6,2	1,3
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	5 - 65	7,8	10,8	4,9	6,1	8,8	3,5
XI Krankheiten des Verdauungssystems Krankheiten der Appendix (K35 - K38)	5 - 65	0,0	-	0,1	0,1	0,3	-
Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K80 - K83)	5 - 65	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	15 - 50	0,1	x	0,2	-	x	-
Insgesamt		15,7	19,7	11,9	13,2	18,4	8,2

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2013

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 49 Säuglingssterbefälle, davon 31 männliche und 18 weibliche, registriert. Das war im Vergleich zum Vorjahr ein männlicher Säugling mehr, aber 3 weibliche weniger. Der Anteil der verstorbenen männlichen Säuglinge an der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge betrug 63,3 %.

Die Säuglingssterblichkeit lag mit 2,92 ‰ gering-

fügig unter dem Wert des Vorjahres. Im Jahr 2010 ist mit 2,83 ‰ die niedrigste Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt registriert worden.

Die Anzahl der Lebendgeborenen ging im Vergleich zum Vorjahr um 91 zurück. Die Zahl der Totgeborenen nahm hingegen um 3 Fälle zu. Dadurch stieg auch die Totgeborenenrate auf 3,91 ‰.

Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer

Lebensdauer von ... bis unter ...	Gestorbene Säuglinge					
	2013			2012		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Unter 24 Stunden	10	7	3	13	7	6
24 Stunden - 7 Tage	11	8	3	6	1	5
7 Tage - 28 Tage	9	7	2	7	5	2
28 Tage - 1 Jahr	19	9	10	25	17	8
Insgesamt	49	31	18	51	30	21

Von den 49 verstorbenen Säuglingen verstarben 21 innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt.

Das sind 2 mehr als das Jahr zuvor. Dadurch stieg die Frühsterblichkeit von 1,13 ‰ im Vorjahr

auf 1,25 ‰ im Berichtsjahr. Die perinatale Mortalität betrug 5,16 ‰ und damit leicht mehr als im Jahr 2012. Dennoch kann insgesamt im Gegen-

satz zu den Jahren vor 2010 von einem vergleichsweise niedrigen Wert gesprochen werden.

Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer


Vorgang	2013			2012		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl der Lebendgeborenen	16 797	8 542	8 255	16 888	8 599	8 289
Anzahl der Totgeborenen	66	32	34	63	31	32
Anzahl der gestorbenen Säuglinge	49	31	18	51	30	21
dar. in den ersten 7 Tagen	21	15	6	19	8	11
Säuglingssterblichkeit in ‰	2,92	3,63	2,18	3,02	3,49	2,53
Frühsterblichkeit in ‰	1,25	1,76	0,73	1,13	0,93	1,33
Spätsterblichkeit in ‰	0,54	0,82	0,24	0,41	0,58	0,24
Nachsterblichkeit in ‰	1,13	1,05	1,21	1,48	1,98	0,97
Totgeborenenrate in ‰	3,91	3,73	4,10	3,72	3,59	3,85
Perinatale Mortalität in ‰	5,16	5,48	4,83	4,84	4,52	5,17

Säuglingssterblichkeit 2003 - 2013 nach Geschlecht

Vorgang	Ge-schl.	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lebendgeborene	i	16 889	17 337	17 166	16 927	17 132	17 697	17 144	17 300	16 837	16 888	16 797
	m	8 696	9 012	8 674	8 838	8 868	9 079	8 853	8 802	8 658	8 599	8 542
	w	8 193	8 325	8 492	8 089	8 264	8 618	8 291	8 498	8 179	8 289	8 255
Totgeborene	i	87	77	66	57	83	66	69	63	69	63	66
	m	49	40	36	25	46	35	29	40	34	31	32
	w	38	37	30	32	37	31	40	23	35	32	34
Gestorbene Säuglinge	i	72	70	53	58	52	61	49	49	51	51	49
	m	49	38	25	24	28	37	29	36	26	30	31
	w	23	32	28	34	24	24	20	13	25	21	18
dar. in den ersten 7 Tagen	i	30	46	30	22	24	24	20	17	10	19	21
	m	20	27	17	11	15	14	10	10	5	8	15
	w	10	19	13	11	9	10	10	7	5	11	6
Säuglingssterblichkeit	i	4,26	4,04	3,09	3,43	2,99	3,45	2,86	2,83	3,03	3,02	2,92
	m	5,63	4,22	2,88	2,72	3,13	4,08	3,28	4,09	3,00	3,49	3,63
	w	2,81	3,84	3,30	4,20	2,84	2,78	2,41	1,53	3,06	2,53	2,18
Frühsterblichkeit	i	1,78	2,65	1,75	1,30	1,38	1,36	1,17	-,98	-,59	1,13	1,25
	m	2,30	3,00	1,96	1,24	1,68	1,54	1,13	1,14	-,58	-,93	1,76
	w	1,22	2,28	1,53	1,36	1,07	1,16	1,21	-,82	-,61	1,33	-,73
Totgeborenenrate	i	5,12	4,42	3,83	3,36	4,82	3,72	4,01	3,63	4,08	3,72	3,91
	m	5,60	4,42	4,13	2,82	5,16	3,84	3,27	4,52	3,91	3,59	3,73
	w	4,62	4,43	3,52	3,94	4,46	3,58	4,80	2,70	4,26	3,85	4,10
Perinatale Mortalität	i	6,89	7,06	5,57	4,65	6,22	5,07	5,17	4,61	4,67	4,84	5,16
	m	7,89	7,40	6,08	4,06	6,84	5,38	4,39	5,65	4,49	4,52	5,48
	w	5,83	6,70	5,05	5,29	5,54	4,74	6,00	3,52	4,87	5,17	4,83

Säuglingssterbefälle 1970 - 2013 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle im ersten Lebensjahr					
	absolut			je 1 000 Lebendgeborene		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	861	494	367	19,02	21,36	16,57
1971	831	488	343	18,20	20,73	15,51
1972	725	435	290	18,95	22,11	15,60
1973	531	300	231	15,89	17,35	14,32
1974	578	335	243	17,69	20,06	15,20
1975	523	311	212	16,24	18,64	13,66
1976	469	268	201	13,60	15,16	11,96
1977	548	313	235	13,88	15,43	12,25
1978	592	366	226	14,32	17,14	11,32
1979	566	329	237	13,66	15,39	11,81
1980	534	315	219	12,39	14,23	10,45
1981	550	344	206	13,05	15,81	10,11
1982	486	281	205	11,61	13,12	10,02
1983	437	277	160	10,52	12,93	7,95
1984	414	234	180	10,28	11,32	9,18
1985	394	231	163	9,84	11,24	8,37
1986	400	243	157	10,16	12,09	8,15
1987	348	208	140	8,73	10,19	7,20
1988	320	187	133	8,32	9,42	7,15
1989	285	171	114	8,11	9,42	6,71
1990	254	166	88	7,98	10,07	5,73
1991	177	106	71	9,10	10,64	7,48
1992	128	77	51	7,86	9,12	6,51
1993	84	43	41	5,75	5,73	5,77
1994	91	44	47	6,37	6,01	6,76
1995	90	53	37	6,18	7,04	5,26
1996	92	49	43	5,70	5,89	5,49
1997	86	45	41	5,00	5,03	4,98
1998	93	50	43	5,31	5,57	5,03
1999	70	38	32	3,85	4,03	3,66
2000	79	45	34	4,22	4,63	3,77
2001	73	41	32	4,04	4,40	3,65
2002	87	47	40	4,94	5,16	4,70
2003	72	49	23	4,26	5,63	2,81
2004	70	38	32	4,04	4,22	3,84
2005	53	25	28	3,09	2,88	3,30
2006	58	24	34	3,43	2,72	4,20
2007	52	28	24	2,99	3,13	2,84
2008	61	37	24	3,45	4,08	2,78
2009	49	29	20	2,86	3,28	2,41
2010	49	36	13	2,83	4,09	1,53
2011	51	26	25	3,03	3,00	3,06
2012	51	30	21	3,02	3,49	2,53
2013	49	31	18	2,92	3,63	2,18



Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2013

Die hauptsächlichen Todesursachen, die die Höhe der Säuglingssterblichkeit maßgeblich beeinflussten, waren nach wie vor **Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben** mit 36,7 %.

Angeborenen Fehlbildungen waren mit 34,7 % an den Todesursachen im Säuglingsalter beteiligt. **Plötzlicher Kindstod** (Säuglingssterbefälle, bei

denen die Todesursache nicht bekannt ist bzw. auch durch Autopsie nicht geklärt werden konnte) führte im aktuellen Berichtsjahr bei drei Säuglingen zum Tod. Vier Säuglinge kamen durch **Nichtnatürliche Todesursachen** ums Leben. Davon verstarben drei Säuglinge durch Kindstötung und ein Säugling unfallbedingt.

Säuglingssterbefälle 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Säuglinge						
	insgesamt	in %	männlich	weiblich	dar. in den ersten 7 Tagen		
					insg.	männl.	weibl.
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	2	4,1	-	2	-	-	-
II Neubildungen (C00 - D48)	-	-	-	-	-	-	-
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	-	-	-	-	-	-	-
IV Endokrine , Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	-	-	-	-	-	-	-
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren (G00 - H95)	2	4,1	2	-	-	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	-	-	-	-	-	-	-
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	3	6,1	3	-	-	-	-
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	-	-	-	-	-	-	-
XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	18	36,7	15	3	11	9	2
dar. Frühgeburten (P05, P07)	6	12,2	6	-	5	5	-
Krankheiten des Atmungs- und Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20 - P29)	8	16,3	6	2	5	3	2
XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	17	34,7	10	7	10	6	4
dar. ... des Kreislaufsystems (Q20 - Q28)	4	8,2	2	2	1	-	1
aus							
XVIII Plötzlicher Kindstod (R95)	3	6,1	-	3	-	-	-
XX Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	4	8,2	1	3	-	-	-
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	1	2,0	-	1	-	-	-
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	3	6,1	1	2	-	-	-
Übrige	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	49	100	31	18	21	15	6

Säuglingssterbefälle 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I A00 - B99	i	3	2	1	-	2	3	1	1	-	2	2
	m	2	1	1	-	1	1	1	1	-	2	-
	w	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2
VI G00 - G99	i	2	-	-	3	-	2	1	2	2	3	2
	m	2	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2
	w	-	-	-	3	-	1	-	-	1	3	-
X J00 - J99	i	3	2	2	5	4	3	3	-	3	7	3
	m	1	1	-	1	1	1	3	-	2	5	3
	w	2	1	2	4	3	2	-	-	1	2	-
XVI P00 - P96	i	40	37	35	27	31	31	19	22	25	22	18
	m	29	19	14	15	20	22	10	16	11	12	15
	w	11	18	21	12	11	9	9	6	14	10	3
dar. P00 - P04	i	2	4	5	2	6	2	4	1	-	2	1
	m	1	2	2	1	5	-	2	1	-	1	1
	w	1	2	3	1	1	2	2	-	-	1	-
P05, P07	i	26	20	9	9	3	9	1	6	7	3	6
	m	18	10	4	5	3	8	-	6	1	-	6
	w	8	10	5	4	-	1	1	-	6	3	-
P20 - P29	i	6	4	-	8	16	12	9	1	10	12	8
	m	5	4	-	5	7	8	6	-	6	8	6
	w	1	-	-	3	9	4	3	1	4	4	2
XVII Q00 - Q99	i	12	13	11	8	7	7	12	15	10	10	17
	m	6	10	9	3	3	4	3	10	5	6	10
	w	6	3	2	5	4	3	9	5	5	4	7
dar. Q20 - Q28	i	7	8	7	4	4	3	6	7	4	5	4
	m	4	6	6	2	2	1	-	4	2	3	2
	w	3	2	1	2	2	2	6	3	2	2	2
XVIII R95	i	10	8	-	3	1	9	3	4	5	2	3
	m	7	4	-	2	-	6	3	4	1	1	-
	w	3	4	-	1	1	3	-	-	4	1	3
XIX S00 - T98	i	2	6	1	3	2	3	6	4	4	3	4
	m	2	2	1	1	1	1	5	3	4	1	1
	w	-	4	-	2	1	2	1	1	-	2	3
Insgesamt A00 - T98	i	72	70	53	58	52	61	49	49	51	51	49
	m	49	38	25	24	28	37	29	36	26	30	31
	w	23	32	28	34	24	24	20	13	25	21	18
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	-	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1
	m	-	-	1	1	1	1	3	1	2	1	-
	w	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
dar. W75 - W84	i	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	1
	m	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
aus XX X85 - Y09	i	2	5	-	-	-	2	2	2	2	2	3
	m	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	1
	w	-	3	-	-	-	2	1	-	-	2	2

Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I A00 - B99	i	17,8	11,5	5,8	-	11,7	17,0	5,8	5,8	-	11,8	11,9
	m	23,0	11,1	11,1	-	11,3	11,0	11,3	11,4	-	23,3	-
	w	12,2	12,0	-	-	12,1	23,2	-	-	-	-	24,2
VI G00 - G99	i	11,8	-	-	5,9	-	11,3	5,8	11,6	11,9	17,8	11,9
	m	23,0	-	-	-	-	11,0	11,3	22,7	11,6	-	23,4
	w	-	-	-	12,4	-	11,6	-	-	12,2	36,2	-
X J00 - J99	i	17,8	11,5	11,5	29,5	23,3	17,0	17,5	-	17,8	41,4	17,9
	m	11,5	11,1	-	11,3	11,3	11,0	33,9	-	23,1	58,1	35,1
	w	24,4	12,0	24,0	49,4	36,3	23,2	-	-	12,2	24,1	-
XVI P00 - P96	i	236,8	213,4	201,9	159,5	180,9	175,2	110,8	127,2	148,5	130,3	107,2
	m	333,5	210,8	155,3	169,7	225,5	242,3	113,0	181,8	127,1	139,6	175,6
	w	134,3	216,2	252,3	148,3	133,1	104,4	108,6	70,6	171,2	120,6	36,3
dar. P00 - P04	i	11,8	23,1	28,8	11,8	35,0	11,3	23,3	5,8	-	11,8	6,0
	m	11,5	22,2	22,2	11,3	56,4	-	22,6	11,4	-	11,6	11,7
	w	12,2	24,0	36,0	12,4	12,1	23,2	24,1	-	-	12,1	-
P05, P07	i	153,9	115,4	51,9	53,2	17,5	50,9	5,8	34,7	41,6	17,8	35,7
	m	207,0	111,0	44,4	56,6	33,8	88,1	-	68,2	11,6	-	70,2
	w	97,6	120,1	60,1	49,4	-	11,6	12,1	-	73,4	36,2	-
P20 - P29	i	35,5	23,1	-	47,3	93,4	67,8	52,5	5,8	59,4	71,1	47,6
	m	57,5	44,4	-	56,6	78,9	88,1	67,8	-	69,3	93,0	70,2
	w	12,2	-	-	37,1	108,9	46,4	36,2	11,8	48,9	48,3	24,2
XVII Q00 - Q99	i	71,1	75,0	63,4	47,3	40,9	39,6	70,0	86,7	59,4	59,2	101,2
	m	69,0	111	99,9	33,9	33,8	44,1	33,9	113,6	57,8	69,8	117,1
	w	73,2	36,0	24,0	61,8	48,4	34,8	108,6	58,8	61,1	48,3	84,8
dar. Q20 - Q28	i	41,4	46,1	40,4	23,6	23,3	17,0	35,0	40,5	23,8	29,6	23,8
	m	46,0	66,1	66,6	22,6	22,6	11,0	-	45,4	23,1	34,9	23,4
	w	36,6	24,0	12,0	24,7	24,2	23,2	72,4	35,3	24,5	24,1	24,2
XVIII R95	i	59,2	46,1	-	17,7	5,8	50,9	17,5	23,1	29,7	11,8	17,9
	m	80,5	44,4	-	22,6	-	66,1	33,9	45,4	11,6	11,6	-
	w	36,6	48,0	-	12,4	12,1	34,8	-	-	48,9	12,1	36,3
XIX S00 - T98	i	11,8	34,6	5,8	17,7	11,7	17,0	35,0	23,1	23,8	17,8	23,8
	m	23,0	22,2	11,1	11,3	11,3	11,0	56,5	34,1	46,2	11,6	11,7
	w	-	48,0	-	24,7	12,1	23,2	12,1	11,8	-	24,1	36,3
Insgesamt A00 - T98	i	426,3	403,8	305,7	342,6	303,5	344,7	285,8	283,2	302,9	302,0	291,7
	m	563,5	421,7	277,4	271,6	315,7	407,5	327,6	409,0	300,3	348,9	362,9
	w	280,7	384,4	336,3	420,3	290,4	278,5	241,2	153,0	305,7	253,3	218,0
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	-	5,8	5,8	5,9	5,8	5,7	17,5	11,6	11,9	5,9	6,0
	m	-	-	11,1	11,3	11,3	11,0	33,9	11,4	23,1	11,6	-
	w	-	12,0	-	-	-	-	-	11,8	-	-	12,1
dar. W75 - W84	i	-	-	5,8	5,9	-	-	11,7	-	5,9	5,9	6,0
	m	-	-	11,1	11,3	-	-	22,6	-	11,6	11,6	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
aus XX X85 - Y09	i	11,8	28,8	-	-	-	11,3	11,7	11,6	11,9	11,8	17,9
	m	23,0	22,2	-	-	-	-	11,3	22,7	23,1	-	11,7
	w	-	36,0	-	-	-	23,2	12,1	-	-	24,1	24,2

Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2013

Im Jahr 2013 verstarben insgesamt 17 Kinder, davon 12 Jungen und 5 Mädchen, im Alter zwischen ein bis unter 15 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr waren damit 7 Kindersterbefälle weniger zu dokumentieren.

In den Jahren 1990 bis 2006 war eine Rückläufigkeit der Kindersterblichkeit zu verzeichnen, bis zum Jahr 2010 war dann wieder eine leichte Zunahme zu beobachten. Seitdem ist die Kindersterblichkeit weiter rückläufig.

Kindersterbefälle 2003 - 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Geschl.	Gestorbene Kinder										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 - 5	i	12	16	21	8	15	16	18	18	14	10	7
	m	6	5	12	3	9	10	10	10	8	4	6
	w	6	11	9	5	6	6	8	8	6	6	1
5 - 10	i	13	13	2	2	7	10	9	9	6	10	5
	m	6	8	1	-	3	6	6	4	5	6	3
	w	7	5	1	2	4	4	3	5	1	4	2
10 - 15	i	16	10	12	12	6	9	9	15	8	4	5
	m	13	5	7	6	3	5	5	8	6	2	3
	w	3	5	5	6	3	4	4	7	2	2	2
Insgesamt	i	41	39	35	22	28	35	36	42	28	24	17
	m	25	18	20	9	15	21	21	22	19	12	12
	w	16	21	15	13	13	14	15	20	9	12	5

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2003 - 2013 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Geschl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 - 5	i	16,9	22,7	30,1	11,6	22,0	23,6	26,4	26,2	20,6	14,7	10,3
	m	16,3	13,7	33,4	8,5	25,7	28,6	28,5	28,3	22,9	11,5	17,3
	w	17,5	32,2	26,7	15,0	18,2	18,3	24,2	24,0	18,2	18,0	3,0
5 - 10	i	16,8	16,5	2,4	2,4	8,2	11,7	10,5	10,6	7,2	12,1	6,0
	m	15,1	19,7	2,4	-	6,8	13,5	13,6	9,1	11,7	14,0	7,0
	w	18,6	13,0	2,5	4,9	9,6	9,6	7,3	12,2	2,5	10,0	4,9
10 - 15	i	14,4	9,8	14,1	15,9	8,2	12,1	11,7	18,7	9,8	4,8	5,9
	m	22,7	9,5	15,9	15,5	7,9	13,1	12,7	19,4	14,2	4,6	6,9
	w	5,6	10,1	12,1	16,4	8,4	11,1	10,7	18,0	5,0	4,9	4,9
Insgesamt	i	15,8	15,5	14,8	9,6	12,3	15,3	15,6	18,0	12,0	10,2	7,2
	m	18,7	13,9	16,4	7,6	12,8	17,9	17,7	18,3	15,8	9,9	9,9
	w	12,7	17,2	13,0	11,7	11,8	12,7	13,4	17,7	8,0	10,5	4,4

Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2013

In diesem Berichtsjahr stellten die **nichtnatürlichen Todesursachen** (41,2 %) und die **Neubildungen** (23,5 %) den Hauptanteil an den Todesursachen im Kindesalter. Im Wesentlichen waren hier Verkehrsunfälle sowie Sport- und

Spielunfälle für den Tod im Kindesalter verantwortlich. Mit 11,7 % folgten an dritter Stelle die **angeborenen Fehlbildungen**.

Kindersterbefälle 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I A00 - B99	i	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
II C00 - D48	i	6	6	3	4	3	12	3	6	5	4	4
	m	2	1	2	1	2	7	3	1	4	2	2
	w	4	5	1	3	1	5	-	5	1	2	2
dar. C81 - C96	i	2	3	1	-	1	3	-	2	1	1	2
	m	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	1
	w	2	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1
IV E00 - E90	i	2	-	-	2	5	2	1	3	-	1	1
	m	1	-	-	1	4	1	1	2	-	1	1
	w	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
VI G00 - G99	i	-	9	9	4	4	4	5	6	4	-	-
	m	-	5	4	2	-	2	2	4	3	-	-
	w	-	4	5	2	4	2	3	2	1	-	-
IX I00 - I99	i	4	2	3	-	-	2	2	3	-	-	1
	m	2	1	2	-	-	1	1	3	-	-	-
	w	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1
X J00 - J99	i	1	-	2	1	2	3	2	4	4	2	1
	m	1	-	-	1	1	2	-	2	2	1	1
	w	-	-	2	-	1	1	2	2	2	1	-
XVII Q00 - Q99	i	4	7	3	6	4	4	7	6	2	7	2
	m	1	1	1	1	4	3	6	3	1	5	1
	w	3	6	2	5	-	1	1	3	1	2	1
XIX S00 - T98	i	17	13	11	5	7	8	15	12	12	7	7
	m	14	8	9	3	4	5	7	7	8	2	6
	w	3	5	2	2	3	3	8	5	4	5	1
Insgesamt A00 - T98	i	41	39	35	22	28	35	36	42	28	24	17
	m	25	18	20	9	15	21	21	22	19	12	12
	w	16	21	15	13	13	14	15	20	9	12	5
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	13	10	10	3	7	7	13	10	11	6	7
	m	12	6	8	2	4	5	6	5	7	2	6
	w	1	4	2	1	3	2	7	5	4	4	1
dar. V01 - V99	i	5	4	5	2	4	2	3	6	3	2	3
	m	4	1	4	2	1	1	1	2	2	-	2
	w	1	3	1	-	3	1	2	4	1	2	1
W65 - W74	i	5	4	1	1	1	2	3	2	3	3	3
	m	5	4	1	-	1	2	1	1	2	1	3
	w	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-
X00 - X09	i	1	1	-	-	2	1	4	1	-	-	-
	m	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	w	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2003 - 2013 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I A00 - B99	i	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4
	m	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
	w	-	-	0,8	-	-	-	-	0,9	-	-	-
II C00 - D48	i	2,3	2,4	1,3	1,7	1,3	5,3	1,3	2,6	2,1	1,7	1,7
	m	1,5	0,8	1,6	0,8	1,7	6,0	2,5	0,8	3,3	1,7	1,6
	w	3,2	4,1	0,9	2,7	0,9	4,5	-	4,4	0,9	1,8	1,8
dar. C81 - C96	i	0,8	1,2	0,4	-	0,4	1,3	-	0,9	0,4	0,4	0,8
	m	-	0,4	0,8	-	0,9	2,6	-	0,8	-	-	0,8
	w	1,6	1,6	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
IV E00 - E90	i	0,8	-	-	0,9	2,2	0,9	0,4	1,3	-	0,4	0,4
	m	0,7	-	-	0,8	3,4	0,9	0,8	1,7	-	0,8	0,8
	w	0,8	-	-	0,9	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-
VI G00 - G99	i	-	3,6	3,8	1,7	1,8	1,8	2,2	2,6	1,7	-	-
	m	-	2,0	1,7	1,7	-	1,7	1,7	3,3	2,5	-	-
	w	-	3,3	4,3	1,8	3,6	1,8	2,7	1,8	0,9	-	-
IX I00 - I99	i	1,5	0,8	1,3	-	-	0,9	0,9	1,3	-	-	0,4
	m	1,5	0,8	1,6	-	-	0,9	0,8	2,5	-	-	-
	w	1,6	0,8	0,9	-	-	0,9	0,9	-	-	-	0,9
X J00 - J99	i	0,4	-	0,8	0,4	0,9	1,3	0,9	1,7	1,7	0,9	0,4
	m	0,7	-	-	0,8	0,9	1,7	-	1,7	1,7	0,8	0,8
	w	-	-	1,7	-	0,9	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	-
XVII Q00 - Q99	i	1,5	2,8	2,8	2,6	1,8	1,8	3,0	2,6	0,9	3,0	0,8
	m	0,7	0,7	0,8	0,8	3,4	2,6	5,0	2,5	0,8	4,1	0,8
	w	2,4	4,9	1,7	4,5	-	0,9	0,9	2,7	0,9	1,8	0,9
XIX S00 - T98	i	6,5	5,2	4,6	2,2	3,1	3,5	6,5	5,1	5,1	3,0	3,0
	m	10,5	6,2	7,4	2,5	3,4	4,3	5,9	5,8	6,7	1,7	4,9
	w	2,4	4,1	1,7	1,8	2,7	2,7	7,2	4,4	3,5	4,4	0,9
Insgesamt A00 - T98	i	15,8	15,5	14,8	9,6	12,3	15,3	15,6	18,0	12,0	10,2	7,2
	m	18,7	13,9	16,4	7,6	12,8	17,9	17,7	18,3	15,8	9,9	9,9
	w	12,7	17,2	13,0	11,7	11,8	12,7	13,4	17,7	8,0	10,5	4,4
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	5,0	4,0	4,2	1,3	3,1	3,1	5,6	4,3	4,7	2,6	3,0
	m	9,0	4,6	6,5	1,7	3,4	4,3	5,0	4,2	5,8	1,7	4,9
	w	0,8	3,3	1,7	0,9	2,7	1,8	6,3	4,4	3,5	3,5	0,9
dar. V01 - V99	i	1,9	1,6	2,1	0,9	1,8	0,9	1,3	2,6	1,3	0,9	1,3
	m	3,0	0,8	3,3	1,7	0,9	0,9	0,8	1,7	1,7	-	1,6
	w	0,8	2,5	0,9	-	2,7	0,9	1,8	3,5	0,9	1,8	0,9
W65 - W74	i	1,9	1,6	0,4	0,4	0,4	0,9	1,3	0,9	1,3	1,3	1,3
	m	3,7	3,1	0,8	-	0,9	1,7	0,8	0,8	1,7	0,8	2,5
	w	-	-	-	0,9	-	-	1,8	0,9	0,9	1,8	-
X00 - X09	i	0,4	0,4	-	-	0,9	0,4	1,7	0,4	-	-	-
	m	0,7	-	-	-	0,9	0,9	1,7	0,8	-	-	-
	w	-	0,8	-	-	0,9	-	1,8	-	-	-	-

Veröffentlichungen ¹⁾ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Dezember 2014 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 12/14	5,50
3 A 1 04	A I - j/13	Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Stand: 31.12.2013 - (auf Basis des Zensus 2011 - Stand 10.04.2014) ; Land, Kreisfreie Stadt, Landkreis	4,50
3 A 1 13	A I, AVI - j/13	Ergebnisse des Mikrozensus - Haushalt und Familie - 2013	5,00
3 B 1 02	B I - j/13	Allgemeinbildende Schulen - Schuljahr 2013/14 - Schuljahresendstatistik	6,50
3 B 6 01	B VI - j/13	Gerichtliche Ehelösungen - 1991 - 2013 -	2,50
3 E 1 02	E I - m-7/14	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Juli 2014 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 02	E I - m-8/14	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - August 2014 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 1 10	E I - j/12	Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Jahr 2012 -	7,00
3 E 2 01	E II - m-8/14	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe August 2014	2,50
3 E 4 01	E IV - j/13	Energie- und Wasserversorgung - Jahr 2013 -	4,50
3 E 4 02	E IV - j/12	Energiebilanz 2012	6,50
3 E 5 01	E V - j/13	Beschäftigte, Umsatz im Handwerk - Jahr 2013 -	1,50
3 G 1 03	G I - m-6/14	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel - Juni 2014 -	1,50
3 G 4 01	G IV - m-7/14	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Juli 2014, Januar - Juli 2014 - Vorläufige Ergebnisse -	6,00
3 H 2 01	H II - m-6/14	Binnenschifffahrt - Juni 2014 -	4,00
3 J 1 01	J I - j/11	Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich - Jahr 2011-	5,50
3 L 3 02	L III - j/13	Personal im öffentlichen Dienst - Stand: 30.06.2013 -	7,00

1) Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen