



Gesundheitswesen

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2014



SACHSEN-ANHALT

Herausgabemonat: Januar 2016

Zu beziehen durch das

Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)

Preis: 6,50 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestellnummer: 6A402)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Bildung, Soziales, Gesundheit
Frau Leuchte
Telefon: 0345 2318-205

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777
Telefon: 0345 2318-715
Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>
E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr - möglichst nach Vereinbarung
Telefon: 0345 2318-714
E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Gestorbene nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2014

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen	4
Ziel der Statistik	4
Erfassungsgrundlage	4
Rechtsgrundlage	4
Begriffserläuterungen	5
Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2014	6
Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2014 nach Geschlecht	7
Sterbefälle 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
Sterbefälle 1970 bis 2014 nach Geschlecht	8
Sterbefälle 2004 bis 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	10
Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2014	11
Sterbefälle 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	12
Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	14
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	15
Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	17
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	19
Sterbefälle 2004 bis 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	22
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2004 bis 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	24
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	27
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2004 bis 2014 nach Geschlecht	28
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2004 bis 2014 nach Geschlecht	29
Sterbefälle durch Neubildungen 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	31
Sterbefälle durch Neubildungen 2004 bis 2014 nach Geschlecht	32
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2004 bis 2014 nach Geschlecht	33
Nichtnatürliche Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht	35
Unfalltote 2014 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	36
Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2014 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	36
Unfälle 2004 bis 2014 nach Unfallkategorien und Geschlecht	38
Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2004 bis 2014 nach Unfallkategorien und Geschlecht	38
Nichtnatürliche Sterbefälle 2014 nach äußerer Ursache und Geschlecht	39
Nichtnatürliche Sterbefälle 2014 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht	40
Alkoholbedingte Sterbefälle 2009 und 2014 im Vergleich	43
Alkoholbedingte Sterbefälle 2009 und 2014 nach Altersgruppen im Vergleich	43
Mittleres Sterbealter seit 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	45
Vermeidbare Sterbefälle 2009 und 2014 im Vergleich	47

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2014	47
Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer	47
Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer	48
Säuglingssterblichkeit 2004 bis 2014 nach Geschlecht	48
Säuglingssterbefälle 1970 bis 2014 nach Geschlecht	49
Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2014	51
Säuglingssterbefälle 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	51
Säuglingssterbefälle 2004 bis 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	52
Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2004 bis 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	53
Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2014	54
Kindersterbefälle 2004 bis 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2004 bis 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2014	54
Kindersterbefälle 2004 bis 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	55
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2004 bis 2014 nach Todesursachen und Geschlecht	56
Grafiken:	
Grafik: Sterblichkeit 1970 - 2014 nach Geschlecht	9
Grafik: Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	13
Grafik: Sterbefälle 2014 nach Todesursachen und Altersgruppen	16
Grafik: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen	21
Grafik: Sterblichkeit 1998 - 2014 nach Todesursachen	26
Grafik: Sterblichkeit durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2014	30
Grafik: Sterblichkeit durch Neubildungen 1998 - 2014	34
Grafik: Unfalltote 2014 nach Unfallkategorien und Geschlecht	37
Grafik: Suizide 2014 nach der äußeren Ursache und Geschlecht	41
Grafik: Suizidrate 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht	41
Grafik: Suizidrate 1980 - 2014 nach Geschlecht	42
Grafik: Alkoholbedingte Sterblichkeit 1980 - 2014 nach Geschlecht	44
Grafik: Säuglingssterblichkeit 1970 - 2014 nach Geschlecht	50

Vorbemerkungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik ist mangels umfassender Morbiditätsstatistiken die am weitesten verbreitete Statistik zur Analyse der quantitativen Bedeutung einzelner Krankheiten. Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen einer Region zu geben.

Diese Statistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung.

Sie ermöglicht eine fundierte Todesursachenforschung, die die Einflussfaktoren der todesursachenspezifischen Sterblichkeit, ihre regionalen Besonderheiten und Veränderungen im Laufe der Zeit untersucht.

Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z.B. für die Gesundheitspolitik und die epidemiologische Forschung abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Erfassungsgrundlage

Erfassungsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind die vom Leichenschauarzt ausgestellte Todesbescheinigung sowie die vom Standesbeamten aufgrund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte. Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d.h. von den Angaben zur Todesursache im Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen und signiert. Dies bedarf jedoch großer Genauigkeit und Korrektheit des Leichenschauarztes bei der Ausstellung der Todesbescheinigung.

Um überregionale Vergleiche der Sterblichkeit zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Aus diesem Grund erfolgt die Signierung der Todesursachen anhand der von der WHO verabschiedeten "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", in der Bundesrepublik Deutschland seit dem

01.01.1998 in der Fassung der 10. Revision (ICD-10).

In der amtlichen Todesursachenstatistik wurden in den Jahren 1980 bis 1997 Todesursachen nach der 9. Revision der ICD signiert. Das bedeutet, dass Zeitreihen nicht (bzw. noch nicht) problemlos fortgesetzt werden können - aus den ehemals 17 Todesursachenklassen wurden jetzt 20 - zumal ein praktikabler „Umsteiger“ nicht vorliegt. Wenn hier trotzdem der Versuch unternommen wird, Zeitreihen beginnend ab dem Jahr 1980 anzubieten, muss man sich der o.g. Unzulänglichkeiten bewusst sein.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität", das in den vorangegangenen Revisionen der ICD als ergänzende Klassifikation bestand, ermöglicht die Klassifizierung von Umwelteignissen und Umständen als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. Dieser Zustand wird mit einer Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)" klassifiziert.

Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen sowie bei nichtnatürlichen Todesursachen außerdem die äußeren Ursachen (Unfälle und sonstige Gewaltwirkungen) erfasst. Bei Unfällen werden zusätzlich die Unfallkategorie (z.B. häuslicher Unfall, Verkehrsunfall usw.) registriert.

Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, unabhängig vom Sterbeort.

Für die Berechnung der Mortalitätsraten der Jahre ab 2011 wurden die Bevölkerungszahlen auf Basis der Zensusergebnisse 2011 verwendet. Zur Berechnung der Mortalitätsraten bis einschließlich 2010 sind die Bevölkerungszahlen auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung vom 03.10.1990 herangezogen worden.

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.03.1980 (BGBl. I S. 308). Zu berücksichtigen sind das

Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 11.08.2004 (GVBl. LSA S. 506), das Personenstandsgesetz in der im BGBl. III, Gliederungsnr. 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, einschließlich späterer Änderungen, das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA Nr. 8 S. 45) und die Bestattungsverordnung vom 26.01.2005 (GVBl. LSA Nr. 6 S. 35).

Begriffserläuterungen

Allgemeine Sterbeziffern: Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die beim Vergleich von Absolutzahlen auftreten können, lassen sich mit Hilfe der mittleren Jahresbevölkerung nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Männer bzw. Frauen im Alter } a}{\text{Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter } a} \times 100\,000$$

geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden gleichen Geschlechts und Alters) für jede Todesursache einzeln und insgesamt berechnen.

Fehlgeburt: Eine Fehlgeburt, auch Abort genannt, ist als eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft mit oder ohne Ausstoßung der abgestorbenen Frucht mit einem Gewicht unter 500 g und vor Beginn der 24. Schwangerschaftswoche definiert. Eine Fehlgeburt unterliegt, anders als die Totgeburt, nicht der standesamtlichen Meldepflicht.

Frühsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene in den ersten 7 Lebenstagen angibt. Sie betrifft vor allem Kinder, die frühgeboren und untergewichtig sind, mit Fehlbildungen zur Welt kommen oder unter den Folgen von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen leiden.

Gestorbene: Die Begriffe Gestorbene und Sterbefälle sind inhaltlich identisch. Nicht berücksichtigt werden Totgeborene, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Grundleiden: Unter Grundleiden versteht man die Krankheit oder Verletzung, die die Kausalkette der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Kindersterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Kinder im Alter von 1 bis unter 15 Jahren angibt.

Lebendgeborene: Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Die Begriffe Lebendgeborene und Lebendgeburten unterscheiden sich inhaltlich nicht.

Mittleres Sterbealter: Gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter des an einer Todesursache Verstorbenen war. Die Berechnung erfolgt über die Summierung der Altersjahre für jede Todesursache.

Müttersterbefall: Als Müttersterbefall gilt der Tod jeder Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Dabei gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse.

Nachsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von 28 bis 364 Tagen angibt.

Perinatale Mortalität: Die perinatale Mortalität oder perinatale Sterblichkeit gibt die Anzahl der Todesfälle in der Perinatalperiode an, also dem Zeitraum zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und dem 7. Tag nach der Geburt. Diese Zahl wird dabei auf die Gesamtzahl von 1 000 Lebend- und Totgeborenen bezogen und nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der Totgeborenen und Zahl der in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen}}{\text{Anzahl der Lebend- und Totgeborenen}} \times 1\,000$$

berechnet. Die perinatale Sterblichkeit ist eindeutig eine Sterbeziffer. Systematisch steht sie allerdings zwischen Geburten- und Sterbestatistik, da die Totgeborenen definitionsgemäß zu den Geburten und nicht zu den Sterbefällen zählen.

Säuglinge: Kinder im Alter von 0 bis unter 1 Jahr, d.h. Kinder von der Geburt bis vor Vollendung des 1. Lebensjahres.

Säuglingssterblichkeit: Findet ihren Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene des gleichen Zeitraumes bezieht. Die Höhe der Säuglingssterblichkeit ist abhängig von zahlreichen biologischen, medizinischen und sozialen Faktoren, die bei einer Analyse als Merkmal benutzt werden, z.B. Geschlecht, Alter, Geburtsgewicht, Todesursache, Legitimität der Mutter.

Spätsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von sieben bis 27 Tagen angibt.

Totgeborene: Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz

geschlagen, die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 g betrug.

Totgeborenenrate: Totgeborene je 1 000 Geborene (Lebend- und Totgeborene).

Vermeidbare Sterbefälle: Als vermeidbare Sterbefälle werden Sterbefälle bezeichnet, die bei angemessener Krankheitsprävention oder Therapie hätten verhindert werden können. Die Kennziffer der vermeidbaren Sterbefälle richtet sich im Wesentlichen nach einem Konzept des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Danach gelten spezifische Todesursachen in bestimmten Altersgruppen als vermeidbar. Die vermeidbaren Sterbefälle werden je 100 000 Einwohner angegeben.

Arbeitsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z.B. Busfahren) so ist dieser Unfall als "Arbeitsunfall" anzusehen.

Schulunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten, innerhalb der Schule oder Hochschule oder bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Schule.

Verkehrsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten

Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Häuslicher Unfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet die Unfälle im häuslichen Bereich, die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (siehe Definition „Arbeitsunfall“). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Sport- oder Spielunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder bei einer sonstigen Freizeitbeschäftigung ereignen, sofern diese nicht als Arbeits-, Schul- oder als häuslicher Unfall anzusehen sind.

Sonstiger Unfall: Diese Kategorie umfasst alle sonst nicht einzuordnenden Unfälle bzw. Unfälle unbekannter Kategorie.

Zeichenerklärung:

- Nichts vorhanden, das Zeichen " - " steht für den mathematisch exakten Wert Null.
- 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.

Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2014

Im Jahr 2014 starben bundesweit insgesamt 30 830 Personen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, davon waren 15 137 männlichen sowie 15 693 weiblichen Geschlechts.

Im aktuellen Berichtsjahr verstarben insgesamt 555 Personen, davon 274 Männer und 281 Frauen, weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Sterbefälle ging gegenüber dem Jahr 2013 damit um 1,8 % zurück.

Je 100 000 Einwohner Sachsen-Anhalts verstarben im Berichtsjahr 1 376 Personen, im Vorjahr 1 394 Personen und vor zehn Jahren 1 156 Personen. Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, so stellt man eine Zunahme der Sterblichkeit fest. Dabei gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Starben 2004 noch 1 134 Männer bzw. 1 176 Frauen je 100 000 der Bevölkerung, so waren es in diesem Berichtsjahr schon 1 380 Männer bzw. 1 373 Frauen.

Insgesamt war auch 2014 - wie in den vergangenen Jahren - die Sterblichkeit der weiblichen Personen

höher als die der männlichen Personen. Bedingt durch die Altersstruktur und einen Frauenüberschuss von 1,0 %, verstarben 1,8 % mehr Frauen als Männer. Allerdings ist der Geschlechterunterschied bei der Sterblichkeit in den letzten Jahren sichtbar zurückgegangen.

Die Entwicklung der Altersstruktur in Sachsen-Anhalt beeinflusst auch die Anteile an den Gesamtsterbefällen in den Altersgruppen. So stellte die Altersgruppe der über 75-jährigen mit 66,7 % die meisten Sterbefälle, 2004 lag deren Anteil noch bei 57,0 % aller Sterbefälle. Seit Jahren ist in allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 80-jährigen eine wesentlich höhere Zahl an männlichen Verstorbenen zu beobachten.

Zwischen den Jahren 1980 und 1999 konnte eine sinkende Sterblichkeit beobachtet werden. Auch wenn im aktuellen Berichtsjahr die Sterblichkeit leicht rückläufig gewesen ist, so kann ab dem Jahr 2004 insgesamt von einer tendenziellen Zunahme der Sterblichkeit gesprochen werden.

Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2014 nach Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	42	0,1	25	0,1	17	0,1
1 - 15	29	0,1	16	0,1	13	0,1
15 - 35	213	0,7	165	1,1	48	0,3
35 - 55	1 705	5,5	1 212	8,0	493	3,1
55 - 75	8 296	26,9	5 520	36,5	2 776	17,7
75 und mehr	20 545	66,7	8 199	54,2	12 346	78,7
Insgesamt	30 830	100	15 137	100	15 693	100

Sterbefälle 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	42	25	17	2,47	2,86	2,05
1 - 2	3	1	2	0,18	0,12	0,24
2 - 3	3	1	2	0,18	0,11	0,24
3 - 4	3	2	1	0,18	0,23	0,12
4 - 5	3	1	2	0,17	0,11	0,24
5 - 10	9	7	2	0,11	0,16	0,05
10 - 15	8	4	4	0,10	0,09	0,10
15 - 18	10	8	2	0,21	0,33	0,09
18 - 20	17	11	6	0,59	0,73	0,44
20 - 25	38	29	9	0,39	0,56	0,20
25 - 30	68	57	11	0,50	0,79	0,17
30 - 35	80	60	20	0,61	0,86	0,33
35 - 40	79	51	28	0,68	0,83	0,52
40 - 45	189	136	53	1,38	1,90	0,81
45 - 50	490	337	153	2,76	3,71	1,76
50 - 55	947	688	259	4,71	6,78	2,60
55 - 60	1 255	863	392	6,83	9,46	4,24
60 - 65	1 873	1 321	552	10,68	15,50	6,13
65 - 70	1 718	1 185	533	14,28	20,87	8,38
70 - 75	3 450	2 151	1 299	21,71	29,72	15,01
75 - 80	5 038	2 725	2 313	37,35	47,83	29,69
80 - 85	5 406	2 539	2 867	68,77	87,33	57,87
85 - 90	5 552	1 905	3 647	125,00	149,89	115,03
90 - 95	3 676	901	2 775	217,84	263,87	206,17
95 und mehr	873	129	744	353,73	372,29	350,70
Insgesamt	30 830	15 137	15 693	13,76	13,80	13,73

Sterbefälle 1970 - 2014 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	44 918	21 570	23 348	13,95	14,45	13,51
1971	43 045	20 355	22 690	13,39	13,65	13,17
1972	43 683	20 712	22 971	13,62	13,88	13,38
1973	42 933	20 201	22 732	13,46	13,60	13,33
1974	42 773	20 159	22 614	13,48	13,63	13,35
1975	44 990	21 020	23 970	14,28	14,28	14,27
1976	43 226	19 999	23 227	13,81	13,67	13,93
1977	41 826	19 620	22 206	13,42	13,45	13,39
1978	43 459	20 207	23 252	13,99	13,87	14,09
1979	43 554	20 243	23 311	14,07	13,93	14,20
1980	44 448	20 623	23 825	14,41	14,23	14,58
1981	43 258	19 780	23 478	14,08	13,67	14,44
1982	42 306	19 350	22 956	13,84	13,45	14,20
1983	41 628	18 762	22 866	13,65	13,05	14,19
1984	41 595	18 766	22 829	13,68	13,07	14,23
1985	41 930	18 966	22 964	13,85	13,25	14,39
1986	41 887	18 528	23 359	13,90	12,98	14,73
1987	40 128	17 835	22 293	13,34	12,48	14,12
1988	40 009	17 998	22 011	13,31	12,55	14,00
1989	38 127	17 301	20 826	12,73	12,07	13,34
1990	38 711	18 118	20 593	13,39	13,14	13,62
1991	38 203	17 859	20 344	13,41	13,13	13,66
1992	35 754	16 726	19 028	12,73	12,43	13,00
1993	34 838	16 546	18 292	12,49	12,34	12,64
1994	33 816	15 929	17 887	12,21	11,93	12,48
1995	33 519	15 816	17 703	12,19	11,89	12,46
1996	32 639	15 539	17 100	11,95	11,74	12,14
1997	30 892	14 294	16 598	11,38	10,85	11,88
1998	31 011	14 496	16 515	11,53	11,10	11,94
1999	30 059	14 076	15 983	11,29	10,88	11,67
2000	30 175	14 298	15 877	11,46	11,17	11,73
2001	29 621	13 954	15 667	11,40	11,04	11,74
2002	30 159	14 250	15 909	11,76	11,41	12,09
2003	29 632	14 062	15 570	11,69	11,38	11,98
2004	29 008	13 892	15 116	11,56	11,34	11,76
2005	29 277	14 002	15 275	11,79	11,56	12,02
2006	29 151	13 980	15 171	11,87	11,65	12,08
2007	29 392	14 059	15 333	12,11	11,84	12,36
2008	29 905	14 344	15 561	12,47	12,23	12,71
2009	30 480	14 690	15 790	12,87	12,67	13,06
2010	30 729	14 781	15 948	13,10	12,87	13,33
2011	30 183	14 780	15 403	13,20	13,23	13,17
2012	30 321	14 786	15 535	13,37	13,34	13,40
2013	31 385	15 411	15 974	13,94	13,99	13,89
2014	30 830	15 137	15 693	13,76	13,80	13,73



Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2014

Die Haupttodesursachenklasse stellte 2014 - wie auch in den vergangenen Jahren - mit 44,5 % aller Todesfälle die **Krankheiten des Kreislaufsystems**. Daran starben insgesamt 5 972 Männer und 7 752 Frauen. Bezogen auf 100 000 Einwohner waren im Jahr 2014 insgesamt 613 Personen einem Herz-Kreislaufleiden erlegen. Im Vorjahr verstarben 611 Personen je 100 000 Einwohner an diesem Leiden. Allein an ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt, verstarben 5 779 Personen. Herzinfarkt führte bei wesentlich mehr Männern (1 329 Sterbefälle) als Frauen (953 Sterbefälle) zum Tode. Dagegen waren von zerebrovaskulären Erkrankungen, wozu auch Schlaganfälle gerechnet werden, deutlich mehr Frauen (1 102 Sterbefälle) als Männer (716 Sterbefälle) betroffen.

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die **Neubildungen** mit 27,0 % vertreten, darunter mit 26,3 % die bösartigen Neubildungen („Krebs“). Bezogen auf 100 000 Einwohner starben im Berichtsjahr 362 Personen an Krebserkrankungen und damit genauso viele wie im Vorjahr. Am häufigsten traten hier bösartige Neubildungen im Bereich der Verdauungsorgane mit 33,0 % aller an Krebs Verstorbenen auf, gefolgt vom Lungenkrebs mit 18,7 %. Bei 15,0 % der im Jahr 2014 an Krebs verstorbenen Frauen wurde Brustkrebs als Todesursache festgestellt.

Mit 1 452 Verstorbenen und 4,7 % aller Sterbefälle im Berichtsjahr folgten an dritter Stelle der Todesursachenklassen die **Krankheiten des Atmungssystems**. Dabei waren insbesondere die chronischen Krankheiten der unteren Atemwege auffällig, die mit 57,3 % aller Atemwegserkrankungen deutlich mehr als die Hälfte ausmachten. Das entsprach 2,7 % der Gesamtsterbefälle bzw. 37 Personen je 100 000 Einwohner im Jahr 2014.

Dicht hinter den Krankheiten des Atmungssystems folgten **Krankheiten des Verdauungssystems** mit 1 443 Sterbefällen und einem Anteil von ebenfalls 4,7 % aller Todesfälle im Berichtsjahr. Hier fielen wiederum die Leberkrankheiten auf, wobei der männliche Personenanteil aller an diesem Leiden Verstorbenen im Berichtsjahr drei Viertel ausmachte. Von den Krankheiten der Leber waren 66,5 % alkoholbedingt. Das entsprach 1,6 % der Gesamtsterbefälle bzw. 21 Personen je 100 000 Einwohner.

Die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** mit 1 345 Todesfällen folgten mit 4,4 % aller Verstorbenen an fünfter Stelle. Diese Klasse wurde insbesondere vom Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") geprägt. Für 1 136

Frauen und Männer mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt war dies die Todesursache. Gegenüber dem Vorjahr war hierbei ein Rückgang auf 3,7 % aller Sterbefälle zu verzeichnen. 58,4 % der an Diabetes mellitus Verstorbenen waren Frauen.

Die Zahl derer, die an einem nichtnatürlichen Tod verstarben stieg geringfügig auf 1 285 Sterbefälle an. Das entsprach einem Anteil von 4,2 % aller im Berichtsjahr Verstorbenen. Dabei erlagen mit 767 Sterbefällen deutlich mehr Männer als Frauen an **Verletzungen und Vergiftungen**.

Durch Verkehrsunfälle verstarben im Berichtsjahr 142 Personen, davon 103 Männer und 39 Frauen. Gegenüber dem Vorjahr waren das 15 Verkehrstote weniger. Einem Arbeits- oder Schulunfall mit Todesfolge erlagen im Berichtsjahr 18 Männer. Exakt die Hälfte aller tödlichen Unfälle konnten den häuslichen Unfällen zugerechnet werden, überwiegend als Folge eines Sturzes älterer Menschen. An einem Sport- und Spielunfall erlagen 5 Personen.

Suizid (Selbsttötung) begingen im Berichtsjahr 367 Einwohner, davon 280 Männer und 87 Frauen.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag Getöteten betrug im Berichtsjahr 14, davon 9 männliche und 5 weibliche Personen.

Die Haupttodesursache in der Altersgruppe der über 75-jährigen Männer und Frauen waren die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 52,6 %, gefolgt von den Neubildungen mit 21,1 % und den Krankheiten der Atmungsorgane mit 4,9 %. Bei den unter 75-jährigen waren hingegen die Neubildungen mit 38,6 % die Haupttodesursache. Erst an zweiter Stelle folgten hier mit 28,3 % die Krankheiten des Kreislaufsystems. Mit einem Anteil von 7,3 % rangierten hier die Krankheiten des Verdauungssystems an dritter Stelle. Verletzungen und Vergiftungen waren mit 41,2 % die häufigste Todesursache bei den unter 35-jährigen, zum überwiegenden Teil infolge eines Verkehrsunfalls. Mit Anteilen von 10,6 % und 9,2 % folgten hier die Neubildungen bzw. Krankheiten des Nervensystems.

Das mittlere Sterbealter betrug im Jahr 2014 insgesamt 77,2 Jahre (73,2 Jahre bei Männern bzw. 81,0 Jahre bei Frauen). Im Jahr 2004 lag dieses noch bei 74,4 Jahren.


Das mittlere Sterbealter bei den Todesursachenklassen lag im Berichtsjahr für angeborene Fehlbildungen mit 34,3 Jahren am niedrigsten, hingegen mit 82,3 Jahren für Krankheiten des Urogenitalsystems am höchsten.

Sterbefälle 2014 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	291	0,9	134	0,9	157	1,0
II Neubildungen (C00 - D48)	8 311	27,0	4 677	30,9	3 634	23,2
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	8 112	26,3	4 579	30,3	3 533	22,5
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	50	0,2	23	0,1	27	0,2
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 345	4,4	562	3,7	783	5,0
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	1 136	3,7	473	3,1	663	4,2
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	941	3,0	438	2,9	503	3,2
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	911	2,9	422	2,8	489	3,1
VII- VIII Krankheiten des Auges und des Ohres (H00 - H95)	2	0,0	1	0,0	1	0,0
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	13 724	44,5	5 972	39,4	7 752	49,4
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	2 282	7,7	1 329	8,8	953	6,1
Chron. ischäm. Herzkrankheit (I25)	3 434	11,1	1 688	11,2	1 746	11,1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	1 818	5,9	716	4,7	1 102	7,0
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	1 452	4,7	816	5,4	636	4,1
dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	832	2,7	496	3,3	336	2,1
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	1 443	4,7	815	5,4	628	4,0
dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	723	2,3	496	3,3	227	1,4
XII- XIII Krankheiten der Haut, des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (L00 - M99)	104	0,3	39	0,2	65	0,4
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	617	2,0	239	1,6	378	2,4
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	-	-	x	x	-	-
XVI Perinatalperiode (P00 - P96)	19	0,1	12	0,1	7	0,0
XVII Angeb. Fehlbildungen (Q00 - Q99)	48	0,2	27	0,2	21	0,1
XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	287	0,9	193	1,3	94	0,6
XIX Verletzungen, Vergiftungen, Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	1 285	4,2	767	5,1	518	3,3
Insgesamt (A00 - T98)	30 830	100	15 137	100	15 693	100

**Sterbefälle 2014
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Männer



Frauen




Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	291	1	1	12	70	205
	m	134	1	1	12	44	74
	w	157	-	-	-	26	131
II C00 - D48	i	8 311	4	26	583	3 361	4 337
	m	4 677	3	16	351	2 136	2 171
	w	3 634	1	10	232	1 225	2 166
dar. C00 - C97	i	8 112	4	26	580	3 313	4 189
	m	4 579	3	16	349	2 105	2 106
	w	3 533	1	10	231	1 208	2 083
dar. C15 - C26	i	2 673	1	2	161	1 094	1 415
	m	1 498	1	1	112	716	668
	w	1 175	-	1	49	378	747
IV E00 - E90	i	1 345	-	6	57	357	925
	m	562	-	3	44	203	312
	w	783	-	3	13	154	613
dar. E10 - E14	i	1 136	-	3	28	276	829
	m	473	-	2	24	166	281
	w	663	-	1	4	110	548
V F00 - F99	i	941	-	3	105	208	625
	m	438	-	3	86	161	188
	w	503	-	-	19	47	437
VI G00 - G99	i	911	8	18	59	226	600
	m	422	3	14	32	124	249
	w	489	5	4	27	102	351
IX I00 - I99	i	13 724	-	25	341	2 547	10 811
	m	5 972	-	17	256	1 795	3 904
	w	7 752	-	8	85	752	6 907
dar. I21, I22	i	2 282	-	3	129	782	1 368
	m	1 329	-	2	103	587	637
	w	953	-	1	26	195	731
I60 - I69	i	1 818	-	5	31	320	1 462
	m	716	-	2	19	199	496
	w	1 102	-	3	12	121	966
X J00 - J99	i	1 452	4	-	47	391	1 010
	m	816	2	-	38	272	504
	w	636	2	-	9	119	506
dar. J40 - J47	i	832	-	-	25	262	545
	m	496	-	-	22	184	290
	w	336	-	-	3	78	255
XI K00 - K93	i	1 443	-	6	212	533	692
	m	815	-	5	161	375	274
	w	628	-	1	51	158	418
dar. K70 - K77	i	723	-	6	172	367	178
	m	496	-	5	129	269	93
	w	227	-	1	43	98	85
XIV N00 - N99	i	617	1	-	10	86	520
	m	239	1	-	9	52	177
	w	378	-	-	1	34	343
XIX S00 - T98	i	1 285	5	108	201	336	631
	m	767	4	90	161	238	272
	w	518	1	18	40	98	359
Insgesamt A00 - T98	i	30 830	29	213	1 705	8 296	20 545
	m	15 137	16	165	1 212	5 520	8 199
	w	15 693	13	48	493	2 776	12 346

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	13,0	0,4	0,2	1,9	11,0	73,9
	m	12,2	0,8	0,4	3,7	14,4	72,2
	w	13,7	-	-	-	7,8	75,0
II C00 - D48	i	371,0	1,7	5,9	92,4	526,5	1 564,3
	m	426,3	2,5	6,9	107,9	698,9	2 117,6
	w	318,0	0,9	4,8	75,9	368,1	1 239,6
dar. C00 - C97	i	362,1	1,7	5,9	92,0	519,0	1 510,9
	m	417,3	2,5	6,9	107,3	688,8	2 054,2
	w	309,1	0,9	4,8	75,6	363,0	1 192,1
dar. C15 - C26	i	119,3	0,4	0,5	25,5	171,4	510,4
	m	136,5	0,8	0,4	34,4	234,3	651,6
	w	102,8	-	0,5	16,0	113,6	427,5
IV E00 - E90	i	60,0	-	1,4	9,0	55,9	333,6
	m	51,2	-	1,3	13,5	66,4	304,3
	w	68,5	-	1,5	4,3	46,3	350,8
dar. E10 - E14	i	50,7	-	0,7	4,4	43,2	299,0
	m	43,1	-	0,9	7,4	54,3	274,1
	w	58,0	-	0,5	1,3	33,1	313,6
V F00 - F99	i	42,0	-	0,7	16,6	32,6	225,4
	m	39,9	-	1,3	26,4	52,7	183,4
	w	44,0	-	-	6,2	14,1	250,1
VI G00 - G99	i	40,7	3,4	4,1	9,4	35,4	216,4
	m	38,5	2,5	6,0	9,8	40,6	242,9
	w	42,8	4,3	1,9	8,8	30,7	200,9
IX I00 - I99	i	612,7	-	5,7	54,1	399,0	3 899,4
	m	544,3	-	7,3	78,7	587,3	3 808,0
	w	678,3	-	3,9	27,8	226,0	3 953,0
dar. I21, I22	i	101,9	-	0,7	20,5	122,5	493,4
	m	121,1	-	0,9	31,7	192,1	621,3
	w	83,4	-	0,5	8,5	58,6	418,4
I60 - I69	i	81,2	-	1,1	4,9	50,1	527,3
	m	65,3	-	0,9	5,8	65,1	483,8
	w	96,4	-	1,5	3,9	36,4	552,9
X J00 - J99	i	64,8	1,7	-	7,5	61,2	364,3
	m	74,4	1,6	-	11,7	89,0	491,6
	w	55,7	1,7	-	2,9	35,8	289,6
dar. J40 - J47	i	37,1	-	-	4,0	41,0	196,6
	m	45,2	-	-	6,8	60,2	282,9
	w	29,4	-	-	1,0	23,4	145,9
XI K00 - K93	i	64,4	-	1,4	33,6	83,5	249,6
	m	74,3	-	2,1	49,5	122,7	267,3
	w	55,0	-	0,5	16,7	47,5	239,2
dar. K70 - K77	i	32,3	-	1,4	27,3	57,5	64,2
	m	45,2	-	2,1	39,7	88,0	90,7
	w	19,9	-	0,5	14,1	29,4	48,6
XIV N00 - N99	i	27,5	0,4	-	1,6	13,5	187,6
	m	21,8	0,8	-	2,8	17,0	172,6
	w	33,1	-	-	0,3	10,2	196,3
XIX S00 - T98	i	57,4	2,1	24,6	31,9	52,6	227,6
	m	69,9	3,3	38,6	49,5	77,9	265,3
	w	45,3	0,9	8,7	13,1	29,4	205,5
Insgesamt A00 - T98	i	1 376,3	12,2	48,5	270,3	1 299,5	7 410,3
	m	1 379,6	13,1	70,8	372,6	1 806,2	7 997,3
	w	1 373,1	11,3	23,2	161,4	834,2	7 065,8

Sterbefälle 2014 nach Todesursachen und Altersgruppen in %



Anmerkung: Damit die Grafik übersichtlich bleibt, sind die Anteile der Todesursachenklassen, deren berechnete Werte weniger als 1 ergeben, der Rubrik "Übrige" zugeordnet worden. In der Rubrik "Übrige" sind ebenfalls die hier nicht aufgeführten Todesursachenklassen III, XII, XIII, XV, XVI, XVII und XVIII enthalten. Die Todesursachenklassen V-VIII sind in der Grafik zusammengefasst worden.

Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	II (C00 - D48)			IV (E00 - E90)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	327	181	146	49	24	25
Halle (Saale), Stadt	820	454	366	96	29	67
Magdeburg, Stadt	811	429	382	96	46	50
Altmarkkreis Salzwedel	307	190	117	51	25	26
Anhalt-Bitterfeld	640	351	289	80	28	52
Börde	542	320	222	109	44	65
Burgenlandkreis	705	403	302	142	49	93
Harz	910	504	406	141	66	75
Jerichower Land	332	194	138	79	36	43
Mansfeld-Südharz	577	334	243	106	49	57
Saalekreis	688	392	296	86	36	50
Salzlandkreis	781	439	342	133	61	72
Stendal	423	234	189	99	35	64
Wittenberg	448	252	196	78	34	44
Sachsen-Anhalt	8 311	4 677	3 634	1 345	562	783

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	VI (G00 - G99)			IX (I00 - I99)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	54	24	30	514	217	297
Halle (Saale), Stadt	89	41	48	1 213	493	720
Magdeburg, Stadt	81	38	43	1 247	572	675
Altmarkkreis Salzwedel	41	15	26	455	202	253
Anhalt-Bitterfeld	60	31	29	1 199	483	716
Börde	43	23	20	953	422	531
Burgenlandkreis	81	37	44	1 195	526	669
Harz	91	45	46	1 496	635	861
Jerichower Land	42	19	23	548	235	313
Mansfeld-Südharz	70	34	36	901	384	517
Saalekreis	67	30	37	1 085	509	576
Salzlandkreis	79	35	44	1 430	638	792
Stendal	51	22	29	637	296	341
Wittenberg	62	28	34	851	360	491
Sachsen-Anhalt	911	422	489	13 724	5 972	7 752

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	X (J00 - J99)			XI (K00 - K93)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	76	38	38	63	36	27
Halle (Saale), Stadt	135	74	61	123	70	53
Magdeburg, Stadt	133	69	64	128	67	61
Altmarkkreis Salzwedel	67	39	28	58	36	22
Anhalt-Bitterfeld	87	48	39	109	58	51
Börde	100	46	54	94	58	36
Burgenlandkreis	116	73	43	128	59	69
Harz	163	90	73	172	91	81
Jerichower Land	42	27	15	55	30	25
Mansfeld-Südharz	92	53	39	97	51	46
Saalekreis	124	74	50	89	47	42
Salzlandkreis	127	76	51	165	105	60
Stendal	97	50	47	58	38	20
Wittenberg	93	59	34	104	69	35
Sachsen-Anhalt	1 452	816	636	1 443	815	628

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XIX (S00 - T98)			insges. (A00 - T98)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	61	25	36	1 236	578	658
Halle (Saale), Stadt	145	78	67	2 873	1 360	1 513
Magdeburg, Stadt	107	70	37	2 824	1 406	1 418
Altmarkkreis Salzwedel	54	40	14	1 131	596	535
Anhalt-Bitterfeld	96	57	39	2 452	1 136	1 316
Börde	85	60	25	2 080	1 048	1 032
Burgenlandkreis	116	62	54	2 682	1 302	1 380
Harz	121	83	38	3 362	1 643	1 719
Jerichower Land	47	22	25	1 243	613	630
Mansfeld-Südharz	90	53	37	2 112	1 022	1 090
Saalekreis	118	64	54	2 414	1 233	1 181
Salzlandkreis	109	62	47	3 020	1 510	1 510
Stendal	53	37	16	1 545	762	783
Wittenberg	83	54	29	1 856	928	928
Sachsen-Anhalt	1 285	767	518	30 830	15 137	15 693

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	II (C00 - D48)			IV (E00 - E90)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	392,4	449,1	339,2	58,8	59,6	58,1
Halle (Saale), Stadt	353,4	409,2	302,3	41,4	26,1	55,3
Magdeburg, Stadt	350,1	379,4	322,1	41,4	40,7	42,2
Altmarkkreis Salzwedel	356,2	441,8	270,9	59,2	58,1	60,2
Anhalt-Bitterfeld	385,7	432,4	340,9	48,2	34,5	61,3
Börde	313,5	371,8	255,7	63,0	51,1	74,9
Burgenlandkreis	382,1	443,5	322,5	77,0	53,9	99,3
Harz	413,0	469,0	359,7	64,0	61,4	66,5
Jerichower Land	362,7	426,1	299,9	86,3	79,1	93,5
Mansfeld-Südharz	404,5	476,1	335,2	74,3	69,8	78,6
Saalekreis	367,7	424,6	312,3	46,0	39,0	52,8
Salzlandkreis	395,0	456,0	337,1	67,3	63,4	71,0
Stendal	367,6	412,7	323,8	86,0	61,7	109,7
Wittenberg	347,1	398,1	298,0	60,4	53,7	66,9
Sachsen-Anhalt	371,0	426,3	318,0	60,0	51,2	68,5

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht


Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	VI (G00 - G99)			IX (I00 - I99)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	64,8	59,6	69,7	616,8	538,5	690,1
Halle (Saale), Stadt	38,4	36,9	39,7	522,8	444,3	594,8
Magdeburg, Stadt	35,0	33,6	36,3	538,3	505,9	569,2
Altmarkkreis Salzwedel	47,6	34,9	60,2	527,9	469,7	585,8
Anhalt-Bitterfeld	36,2	38,2	34,2	722,5	595,0	844,5
Börde	24,9	26,7	23,0	551,2	490,4	611,5
Burgenlandkreis	43,9	40,7	47,0	647,7	578,8	714,5
Harz	41,3	41,9	40,8	679,0	590,9	762,9
Jerichower Land	45,9	41,7	50,0	598,6	516,1	680,3
Mansfeld-Südharz	49,1	48,5	49,7	631,6	547,4	713,1
Saalekreis	35,8	32,5	39,0	579,9	551,3	607,8
Salzlandkreis	40,0	36,4	43,4	723,2	662,6	780,7
Stendal	44,3	38,8	49,7	553,6	522,0	584,3
Wittenberg	48,0	44,2	51,7	659,3	568,7	746,5
Sachsen-Anhalt	40,7	38,5	42,8	612,7	544,3	678,3

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	X (J00 - J99)			XI (K00 - K93)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	91,2	94,3	88,3	75,6	89,3	62,7
Halle (Saale), Stadt	58,2	66,7	50,4	53,0	63,1	43,8
Magdeburg, Stadt	57,4	61,0	54,0	55,3	59,3	51,4
Altmarkkreis Salzwedel	77,7	90,7	64,8	67,3	83,7	50,9
Anhalt-Bitterfeld	52,4	59,1	46,0	65,7	71,5	60,2
Börde	57,8	53,5	62,2	54,4	67,4	41,5
Burgenlandkreis	62,9	80,3	45,9	69,4	64,9	73,7
Harz	74,0	83,7	64,7	78,1	84,7	71,8
Jerichower Land	45,9	59,3	32,6	60,1	65,9	54,3
Mansfeld-Südharz	64,5	75,5	53,8	68,0	72,7	63,5
Saalekreis	66,3	80,1	52,8	47,6	50,9	44,3
Salzlandkreis	64,2	78,9	50,3	83,4	109,1	59,1
Stendal	84,3	88,2	80,5	50,4	67,0	34,3
Wittenberg	72,0	93,2	51,7	80,6	109,0	53,2
Sachsen-Anhalt	64,8	74,4	55,7	64,4	74,3	55,0

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XIX (S00 - T98)			insges. (A00 - T98)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	73,2	62,0	83,6	1 483,1	1 434,3	1 528,8
Halle (Saale), Stadt	62,5	70,3	55,3	1 238,3	1 225,7	1 249,8
Magdeburg, Stadt	46,2	61,9	31,2	1 219,0	1 243,5	1 195,7
Altmarkkreis Salzwedel	62,7	93,0	32,4	1 312,2	1 386,0	1 238,7
Anhalt-Bitterfeld	57,8	70,2	46,0	1 477,5	1 399,5	1 552,3
Börde	49,2	69,7	28,8	1 203,1	1 217,8	1 188,5
Burgenlandkreis	62,9	68,2	57,7	1 453,6	1 432,8	1 473,8
Harz	54,9	77,2	33,7	1 525,9	1 528,8	1 523,1
Jerichower Land	51,3	48,3	54,3	1 357,9	1 346,4	1 369,3
Mansfeld-Südharz	63,1	75,5	51,0	1 480,5	1 456,8	1 503,5
Saalekreis	63,1	69,3	57,0	1 290,2	1 335,4	1 246,2
Salzlandkreis	55,1	64,4	46,3	1 527,3	1 568,3	1 488,4
Stendal	46,1	65,2	27,4	1 342,7	1 343,8	1 341,6
Wittenberg	64,3	85,3	44,1	1 437,9	1 465,9	1 410,9
Sachsen-Anhalt	57,4	69,9	45,3	1 376,3	1 379,6	1 373,1



Sterbefälle 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I A00 - B99	i	143	132	127	182	270	268	259	299	307	296	291
	m	72	68	63	78	134	122	121	138	158	143	134
	w	71	64	64	104	136	146	138	161	149	153	157
II C00 - D48	i	7 560	7 683	7 584	7 747	7 931	8 051	8 301	8 187	8 090	8 360	8 311
	m	4 232	4 199	4 140	4 351	4 403	4 514	4 633	4 569	4 495	4 731	4 677
	w	3 328	3 484	3 408	3 396	3 528	3 537	3 668	3 618	3 595	3 629	3 634
dar. C00 - C97	i	7 382	7 497	7 337	7 546	7 721	7 839	8 090	7 996	7 888	8 162	8 112
	m	4 159	4 120	4 060	4 268	4 301	4 414	4 537	4 485	4 416	4 638	4 579
	w	3 223	3 377	3 277	3 278	3 420	3 425	3 553	3 511	3 472	3 524	3 533
III D50 - D89	i	52	67	67	109	64	70	65	62	67	61	50
	m	16	24	23	46	22	32	26	24	23	23	23
	w	36	43	44	63	42	38	39	38	44	38	27
IV E00 - E90	i	1 573	1 439	1 542	1 613	1 146	1 368	1 238	1 317	1 483	1 665	1 345
	m	532	522	577	592	453	535	524	559	613	727	562
	w	1 041	917	965	1 021	693	833	714	758	870	938	783
dar. E10 - E14	i	1 430	1 319	1 419	1 457	999	1 200	1 039	1 121	1 282	1 445	1 136
	m	480	470	527	528	376	468	440	482	552	627	473
	w	950	849	892	929	623	732	599	639	730	818	663
dar. E11	i	922	900	1 026	1 062	734	916	884	975	1 118	1 291	1 018
	m	304	331	359	375	272	347	368	414	465	553	417
	w	618	569	667	687	462	569	516	561	653	738	601
V F00 - F99	i	176	191	220	216	380	496	606	600	656	794	941
	m	145	155	176	160	186	243	279	326	348	373	438
	w	31	36	44	56	194	253	327	274	308	421	503
dar. F10	i	144	161	181	147	110	142	177	196	212	228	284
	m	129	137	156	130	94	123	150	162	187	193	234
	w	15	24	25	17	16	19	27	34	25	35	50
VI G00 - G99	i	620	576	624	664	607	755	850	803	815	862	911
	m	293	276	304	303	282	366	401	402	395	415	422
	w	327	300	320	361	325	389	449	401	420	447	489
dar. G30	i	173	150	177	190	152	225	271	246	255	231	278
	m	56	54	56	63	41	84	87	86	89	89	95
	w	117	96	121	127	111	141	184	160	166	142	183
VII - VIII H00 - H95	i	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2
	m	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
IX I00 - I99	i	14 086	14 093	14 052	13 388	13 983	14 100	14 289	13 832	13 665	13 764	13 724
	m	5 804	5 809	5 561	5 503	5 797	5 931	5 940	5 922	5 735	5 906	5 972
	w	8 282	8 284	8 191	7 885	8 186	8 169	8 349	7 910	7 930	7 858	7 752
dar. I25	i	3 743	3 587	3 494	3 155	2 953	3 357	3 474	3 435	3 527	3 535	3 434
	m	1 503	1 379	1 393	1 256	1 212	1 378	1 529	1 491	1 561	1 674	1 688
	w	2 340	2 208	2 101	1 899	1 741	1 979	1 945	1 944	1 966	1 861	1 746

Noch: Sterbefälle 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
X J00 - J99	i	958	1 090	1 012	1 186	1 488	1 550	1 431	1 406	1 442	1 676	1 452
	m	521	597	532	621	798	819	788	778	831	912	816
	w	437	493	480	565	690	731	643	628	611	764	636
dar. J40 - J47	i	588	602	530	608	707	915	858	837	839	937	832
	m	346	366	304	352	417	525	504	503	502	532	496
	w	242	236	226	256	290	390	354	334	337	405	336
XI K00 - K93	i	1 698	1 706	1 742	1 679	1 648	1 566	1 585	1 542	1 560	1 553	1 443
	m	979	1 013	965	949	905	846	880	859	909	871	815
	w	719	693	777	730	743	720	705	683	651	682	628
dar. K70 - K77	i	878	857	797	732	780	733	755	721	718	779	723
	m	639	630	565	545	550	516	514	511	522	527	496
	w	239	227	232	187	230	217	241	210	196	252	227
XII L00 - L99	i	3	3	6	2	11	14	12	15	16	21	16
	m	1	-	2	-	6	3	3	10	6	8	5
	w	2	3	4	2	5	11	9	5	10	13	11
XIII M00 - M99	i	55	63	60	58	68	95	87	102	115	117	88
	m	18	20	24	16	32	34	35	42	51	48	34
	w	37	43	36	42	36	61	52	60	64	69	54
XIV N00 - N99	i	416	524	558	646	620	567	503	533	561	642	617
	m	184	230	270	265	242	230	187	210	229	243	239
	w	232	294	288	381	378	337	316	323	332	399	378
XV O00 - O99	i	2	2	2	-	3	-	-	2	1	-	-
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	2	2	2	-	3	-	-	2	1	-	-
XVI P00 - P96	i	37	35	27	31	31	19	22	25	22	19	19
	m	19	14	15	20	22	10	16	11	12	16	12
	w	18	21	12	11	9	9	6	14	10	3	7
XVII Q00 - Q99	i	56	48	35	58	52	65	56	44	51	54	48
	m	30	28	14	26	20	30	29	23	32	34	27
	w	26	20	21	32	32	35	27	21	19	20	21
XVIII R00 - R99	i	342	393	442	811	444	305	320	313	286	255	287
	m	222	234	298	478	306	229	232	218	214	169	193
	w	120	159	144	333	138	76	88	95	72	86	94
XIX S00 - T98	i	1 231	1 232	1 086	1 002	1 158	1 191	1 105	1 101	1 183	1 245	1 285
	m	824	813	715	651	735	746	687	689	735	792	767
	w	407	419	371	351	423	445	418	412	448	453	518
Insgesamt A00 - T98	i	29 008	29 277	29 151	29 392	29 905	30 480	30 729	30 183	30 321	31 385	30 830
	m	13 892	14 002	14 980	14 059	14 344	14 690	14 781	14 780	14 786	15 411	15 137
	w	15 116	15 275	15 171	15 333	15 561	15 790	15 948	15 403	15 535	15 974	15 693

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I A00 - B99	i	5,7	5,3	5,2	7,5	11,3	11,3	11,0	13,1	13,5	13,1	13,0
	m	5,9	5,6	5,3	6,6	11,4	10,5	10,5	12,3	14,2	13,0	12,2
	w	5,5	5,0	5,1	8,4	11,1	12,1	11,5	13,8	12,9	13,3	13,7
II C00 - D48	i	301,2	309,5	307,4	319,1	330,8	340,0	354,0	358,0	356,7	371,2	371,0
	m	345,6	346,6	345,1	366,6	375,3	389,4	403,4	408,9	405,4	429,4	426,3
	w	258,9	274,2	271,3	273,7	288,1	292,6	306,6	309,3	310,1	315,5	318,0
dar. C00 - C97	i	294,1	302,0	298,8	310,8	322,1	331,0	345,0	349,6	347,8	362,4	362,1
	m	339,6	340,0	338,5	359,6	366,7	380,8	395,0	401,4	398,3	421,0	417,3
	w	250,8	265,7	260,9	264,2	279,3	283,4	297,0	300,2	299,5	306,4	309,1
III D50 - D89	i	2,1	2,7	2,7	4,5	2,7	3,0	2,8	2,7	3,0	2,7	2,2
	m	1,3	2,0	1,9	3,9	1,9	2,8	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
	w	2,8	3,4	3,5	5,1	3,4	3,1	3,3	3,2	3,8	3,3	2,4
IV E00 - E90	i	62,7	58,0	62,8	66,4	47,8	57,8	52,8	57,6	65,4	73,9	60,0
	m	43,4	43,1	48,1	49,9	38,6	46,1	45,6	50,0	55,3	66,0	51,2
	w	81,0	72,2	76,8	82,3	56,6	68,9	59,7	64,8	75,0	81,5	68,5
dar. E10 - E14	i	57,0	53,1	57,8	60,0	41,7	50,7	44,3	49,0	56,5	64,2	50,7
	m	39,2	38,8	43,9	44,5	32,1	40,4	38,3	43,1	49,8	56,9	43,1
	w	73,9	66,8	71,0	74,9	50,9	60,6	50,1	54,6	63,0	71,1	58,0
dar. E11	i	36,7	36,3	41,8	43,7	30,6	38,7	37,7	42,6	49,3	57,3	45,4
	m	24,8	27,3	29,9	31,6	23,2	29,9	32,0	37,0	41,9	50,2	38,0
	w	48,1	44,8	53,1	55,4	37,7	47,1	43,1	48,0	56,3	64,2	52,6
V F00 - F99	i	7,0	7,7	9,0	8,9	15,9	20,9	25,8	26,2	28,9	35,3	42,0
	m	11,8	12,8	14,7	13,5	15,9	21,0	24,3	29,2	31,4	33,9	39,9
	w	2,4	2,8	3,5	4,5	15,8	20,9	27,3	23,4	26,6	36,6	44,0
dar. F10	i	5,7	6,5	7,4	6,1	4,6	6,0	7,5	8,6	9,3	10,1	12,7
	m	10,5	11,3	13,0	11,0	8,0	10,6	13,1	14,5	16,9	17,5	21,3
	w	1,2	1,9	2,0	1,4	1,3	1,6	2,3	2,9	2,2	3,0	4,4
VI G00 - G99	i	24,7	23,2	25,4	27,4	25,3	31,9	36,2	35,1	35,9	38,3	40,7
	m	23,9	22,8	25,3	25,5	24,0	31,6	34,9	36,0	35,6	37,7	38,5
	w	25,4	23,6	25,5	29,1	26,5	32,2	37,5	34,3	36,2	38,9	42,8
dar. G30	i	6,9	6,0	7,2	7,8	6,3	9,5	11,6	10,8	11,2	10,3	12,4
	m	4,6	4,5	4,7	5,3	3,5	7,2	7,6	7,7	8,0	8,1	8,7
	w	9,1	7,6	9,6	10,2	9,1	11,7	15,4	13,7	14,3	12,3	16,0
VII - VIII H00 - H95	i	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,1
	m	-	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1
IX I00 - I99	i	561,2	567,7	572,2	551,5	583,3	595,5	609,4	604,8	602,5	611,2	612,7
	m	474,0	479,4	488,6	463,6	494,2	511,6	517,2	530,0	517,2	536,0	544,3
	w	644,4	651,9	652,0	635,6	668,6	675,9	697,9	676,3	684,1	683,2	678,3
dar. I25	i	149,1	144,5	142,3	130,0	123,2	141,8	148,2	150,2	155,5	157,0	153,3
	m	122,7	113,8	116,1	105,8	103,3	118,9	133,1	133,4	140,8	151,9	153,8
	w	182,1	173,7	167,2	153,1	142,2	163,7	162,6	166,2	169,6	161,8	152,8

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
X J00 - J99	i	38,2	43,9	41,2	48,9	62,1	65,5	61,0	61,5	63,6	74,4	64,8
	m	42,5	49,3	44,3	52,3	68,0	70,6	68,6	69,6	74,9	82,8	74,4
	w	34,0	38,8	38,2	45,5	56,4	60,5	53,7	53,7	52,7	66,4	55,7
dar. J40 - J47	i	23,4	24,3	21,6	25,0	29,5	38,6	36,6	36,6	37,0	41,6	37,1
	m	28,3	30,2	25,3	29,7	35,5	45,3	43,9	45,0	45,3	48,3	45,2
	w	18,8	18,6	18,0	20,6	23,7	32,3	29,6	28,6	29,1	35,2	29,4
XI K00 - K93	i	67,7	68,7	70,9	69,2	68,7	66,1	67,6	67,4	68,8	69,0	64,4
	m	79,9	83,6	80,4	79,9	77,1	73,0	76,6	76,9	82,0	79,1	74,3
	w	55,9	54,5	61,9	58,8	60,7	59,6	58,9	58,4	56,2	59,3	55,0
dar. K70 - K77	i	35,0	34,5	32,5	30,2	32,5	31,0	32,2	31,5	31,7	34,6	32,3
	m	52,2	52,0	47,1	45,9	46,9	44,5	44,8	45,7	47,1	47,8	45,2
	w	18,6	17,9	18,5	15,1	18,8	18,0	20,1	18,0	16,9	21,9	19,9
XII L00 - L99	i	0,1	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,7
	m	0,1	-	0,2	-	0,5	0,3	0,3	0,9	0,5	0,7	0,5
	w	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,9	0,8	0,4	0,9	1,1	1,0
XIII M00 - M99	i	2,2	2,5	2,4	2,4	2,8	4,0	3,7	4,5	5,1	5,2	3,9
	m	1,5	1,7	2,0	1,3	2,7	2,9	3,0	3,8	4,6	4,4	3,1
	w	2,9	3,4	2,9	3,4	2,9	5,0	4,3	5,1	5,5	6,0	4,7
XIV N00 - N99	i	16,6	21,1	22,7	26,6	25,9	23,9	21,5	23,3	24,7	28,5	27,5
	m	15,0	19,0	22,5	22,3	20,6	19,8	16,3	18,8	20,7	22,1	21,8
	w	18,1	23,1	22,9	30,7	30,9	27,9	26,4	27,6	28,6	34,7	33,1
XV O00 - O99	i	0,1	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,0	-	-
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,1	-	-
XVI P00 - P96	i	1,5	1,4	1,1	1,3	1,3	0,8	0,9	1,1	1,0	0,8	0,8
	m	1,6	1,2	1,3	1,7	1,9	0,9	1,4	1,0	1,1	1,5	1,1
	w	1,4	1,7	1,0	0,9	0,7	0,7	0,5	1,2	0,9	0,3	0,6
XVII Q00 - Q99	i	2,2	1,9	1,4	2,4	2,2	2,7	2,4	1,9	2,2	2,4	2,1
	m	2,4	2,3	1,2	2,2	1,7	2,6	2,5	2,1	2,9	3,1	2,5
	w	2,0	1,6	1,7	2,6	2,6	2,9	2,3	1,8	1,6	1,7	1,8
XVIII R00 - R99	i	13,6	15,8	18,0	33,4	18,5	12,9	13,6	13,7	12,6	11,3	12,8
	m	18,1	19,3	24,8	40,3	26,1	19,8	20,2	19,5	19,3	15,3	17,6
	w	9,3	12,5	11,5	26,8	11,3	6,3	7,4	8,1	6,2	7,5	8,2
XIX S00 - T98	i	49,0	49,6	44,2	41,3	48,3	50,3	47,1	48,1	52,2	55,3	57,4
	m	67,3	67,1	59,6	54,8	62,7	64,4	59,8	61,7	66,3	71,9	69,9
	w	31,7	33,0	29,5	28,3	34,5	36,8	34,9	35,2	38,6	39,4	45,3
Insgesamt A00 - T98	i	1 155,8	1 179,4	1 187,0	1 210,7	1 247,4	1 287,2	1 310,5	1 319,7	1 336,9	1 393,7	1 376,3
	m	1 134,4	1 155,6	1 165,4	1 184,4	1 222,8	1 267,2	1 286,9	1 322,7	1 333,5	1 398,8	1 379,6
	w	1 176,1	1 202,0	1 207,7	1 235,9	1 270,9	1 306,4	1 333,1	1 316,9	1 340,1	1 388,8	1 373,1



Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Geschl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Akutes rheumatisches Fieber (I00 - I02)	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09)	i	77	-	-	3	28	46
	m	26	-	-	1	16	9
	w	51	-	-	2	12	37
Hypertonie (I10 - I15)	i	2 183	-	1	16	219	1 947
	m	642	-	1	12	131	498
	w	1 541	-	-	4	88	1 449
Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	5 779	-	4	185	1 368	4 222
	m	3 042	-	3	146	1 034	1 859
	w	2 737	-	1	39	334	2 363
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	i	2 282	-	3	129	782	1 368
	m	1 329	-	2	103	587	637
	w	953	-	1	26	195	731
Pulmonale Herzkrankheiten (I26 - I28)	i	158	-	3	14	47	94
	m	72	-	2	10	24	36
	w	86	-	1	4	23	58
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30 - I52)	i	3 231	-	8	77	446	2 700
	m	1 246	-	5	57	304	880
	w	1 985	-	3	20	142	1 820
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	1 818	-	5	31	320	1 462
	m	716	-	2	19	199	496
	w	1 102	-	3	12	121	966
dar. Schlaganfall nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet (I64)	i	203	-	-	3	38	162
	m	75	-	-	1	27	47
	w	128	-	-	2	11	115
Krankheiten d. Arterien, Arteriolen u. Kapillaren (I70 - I79)	i	371	-	3	10	87	271
	m	182	-	3	7	66	106
	w	189	-	-	3	21	165
dar. Atherosklerose (I70)	i	163	-	-	2	27	134
	m	61	-	-	2	20	39
	w	102	-	-	-	7	95
Krankheiten d. Venen, Lymphgefäße u. -knoten, n. anders klassifiziert (I80 - I89)	i	107	-	1	5	32	69
	m	46	-	1	4	21	20
	w	61	-	-	1	11	49
Sonstige Krankheiten d. Kreislaufsystems (I95 - I99)	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Krankheiten d. Kreislaufsystems insgesamt (I00 - I99)	i	13 724	-	25	341	2 547	10 811
	m	5 972	-	17	256	1 795	3 904
	w	7 752	-	8	85	752	6 907

Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2004 - 2014 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
100 - 102	i	-	-	1	1	2	6	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	w	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-
105 - 109	i	65	79	87	69	47	73	43	68	52	82	77
	m	19	24	27	16	12	23	13	16	16	22	26
	w	46	55	60	53	35	50	30	52	36	60	51
110 - 115	i	1 328	1 479	1 547	1 507	1 416	1 574	1 849	1 985	2 054	2 108	2 183
	m	431	484	475	493	409	490	557	635	590	645	642
	w	897	995	1 072	1 014	1 007	1 084	1 292	1 350	1 464	1 463	1 541
120 - 125	i	6 804	6 653	6 379	5 986	5 974	6 391	6 416	6 152	6 080	5 948	5 779
	m	3 133	3 059	2 997	2 809	2 871	3 094	3 154	3 039	2 963	3 053	3 042
	w	3 671	3 594	3 382	3 177	3 103	3 297	3 262	3 113	3 117	2 895	2 737
dar. I21, I22	i	2 790	2 906	2 717	2 653	2 722	2 817	2 760	2 581	2 452	2 345	2 282
	m	1 553	1 613	1 536	1 478	1 543	1 616	1 559	1 490	1 359	1 346	1 329
	w	1 237	1 293	1 181	1 175	1 179	1 201	1 201	1 091	1 093	999	953
I26 - I28	i	234	189	238	225	404	220	258	224	183	190	158
	m	105	79	101	90	171	89	106	87	82	85	72
	w	129	110	137	135	233	131	152	137	101	105	86
I30 - I52	i	1 880	1 932	2 222	2 216	2 746	2 364	2 670	2 730	2 894	3 056	3 231
	m	708	768	890	843	1 038	888	945	1 056	1 113	1 166	1 246
	w	1 172	1 164	1 332	1 373	1 708	1 476	1 725	1 674	1 781	1 890	1 985
I60 - I69	i	2 943	2 930	2 762	2 657	2 692	2 780	2 581	2 165	1 948	1 945	1 818
	m	1 078	1 052	1 045	972	1 014	1 024	938	845	782	768	716
	w	1 865	1 878	1 717	1 685	1 678	1 756	1 643	1 320	1 166	1 177	1 102
dar. I64	i	853	858	800	782	746	677	585	288	222	207	203
	m	285	274	287	269	251	242	187	112	82	78	75
	w	568	584	513	513	495	435	398	176	140	129	128
I70 - I79	i	747	734	740	668	609	581	383	431	368	354	371
	m	305	307	293	258	250	274	192	210	156	135	182
	w	442	427	447	410	359	307	191	221	212	219	189
dar. I70	i	497	472	484	406	349	279	165	195	184	179	163
	m	179	169	159	135	124	111	74	80	69	52	61
	w	318	303	325	271	225	168	91	115	115	127	102
I80 - I99	i	85	97	76	58	93	111	88	77	86	81	107
	m	25	36	33	21	31	47	34	34	33	32	46
	w	60	61	43	37	62	64	51	43	53	49	61
Insgesamt I00 - I99	i	14 086	14 093	14 052	13 388	13 983	14 100	14 289	13 832	13 665	13 764	13 724
	m	5 804	5 809	5 861	5 503	5 797	5 931	5 940	5 922	5 735	5 906	5 972
	w	8 282	8 284	8 191	7 885	8 186	8 169	8 349	7 910	7 930	7 858	7 752

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2004 - 2014 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
100 - I02	i	-	-	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-
	w	-	-	0,1	0,1	0,1	0,3	-	-	-	-	-
105 - I09	i	2,6	3,2	3,5	2,8	2,0	3,1	1,8	3,0	2,3	3,6	3,4
	m	1,6	2,0	2,3	1,3	1,0	2,0	1,1	1,4	1,4	2,0	2,4
	w	3,6	4,3	4,8	4,3	2,9	4,1	2,5	4,4	3,1	5,2	4,5
110 - I15	i	52,9	59,6	63,0	62,1	59,1	66,5	78,9	86,8	90,6	93,6	97,5
	m	35,2	39,9	39,6	41,5	34,9	42,3	48,5	56,8	53,2	58,5	58,5
	w	69,8	78,3	85,3	81,7	82,2	89,7	108,0	115,4	126,3	127,2	134,8
120 - I25	i	271,1	268,0	259,8	246,6	249,2	269,9	273,6	269,0	268,1	264,1	258,0
	m	255,8	252,5	249,8	236,6	244,7	266,9	274,6	272,0	267,2	277,1	277,2
	w	285,6	282,8	269,2	256,1	253,4	272,8	272,7	266,2	268,9	251,7	239,5
dar. I21, I22	i	111,2	117,1	110,6	109,3	113,5	119,0	117,7	112,9	108,1	104,1	101,9
	m	126,8	133,1	128,0	124,5	131,5	139,4	135,7	133,3	122,6	122,2	121,1
	w	96,2	101,7	94,0	94,7	96,3	99,4	100,4	93,3	94,3	86,9	83,4
126 - I28	i	9,3	7,6	9,7	9,3	16,9	9,3	11,0	9,8	8,1	8,4	7,1
	m	8,6	6,5	8,4	7,6	14,6	7,7	9,2	7,8	7,4	7,7	6,6
	w	10,0	8,7	10,9	10,9	19,0	10,8	12,7	11,7	8,7	9,1	7,5
130 - I52	i	74,9	77,8	90,5	91,3	114,5	99,8	113,9	119,4	127,6	135,7	144,2
	m	57,8	63,4	74,2	71,0	88,5	76,6	82,3	94,5	100,4	105,8	113,6
	w	91,2	91,6	106,0	110,7	139,5	122,1	144,2	143,1	153,6	164,3	173,7
160 - I69	i	117,3	118,0	112,5	109,4	112,3	117,4	110,1	94,7	85,9	86,4	81,2
	m	88,0	86,8	87,1	81,9	86,4	88,3	81,7	75,6	70,5	69,7	65,3
	w	145,1	147,8	136,7	135,8	137,0	145,3	137,3	112,9	100,6	102,3	96,4
dar. I64	i	34,0	34,6	32,6	32,2	31,1	28,6	24,9	12,6	9,8	9,2	9,1
	m	23,3	22,6	23,9	22,7	21,4	20,9	16,3	10,0	7,4	7,1	6,8
	w	44,2	46,0	40,8	41,4	40,4	36,0	33,3	15,0	12,1	11,2	11,2
170 - I79	i	29,8	29,6	30,1	27,5	25,4	24,5	16,3	18,8	16,2	15,7	16,6
	m	24,9	25,3	24,4	21,7	21,3	23,6	16,7	18,8	14,1	12,3	16,6
	w	34,4	33,6	35,6	33,0	29,3	25,4	16,0	18,9	18,3	19,0	16,5
dar. I70	i	19,8	19,0	19,7	16,7	14,6	11,8	7,0	8,5	8,1	7,9	7,3
	m	14,6	13,9	13,3	11,4	10,6	9,6	6,4	7,2	6,2	4,7	5,6
	w	24,7	23,8	25,9	21,8	18,4	13,9	7,6	9,8	9,9	11,0	8,9
180 - I99	i	3,4	3,9	3,1	2,4	3,9	4,7	3,8	3,4	3,8	3,6	4,8
	m	2,0	3,0	2,8	1,8	2,6	4,1	3,0	3,0	3,0	2,9	4,2
	w	4,7	4,8	3,4	3,0	5,1	5,3	4,3	3,7	4,6	4,3	5,3
Insgesamt I00 - I99	i	561,2	567,7	572,2	551,5	583,3	595,5	609,4	604,8	602,5	611,2	612,7
	m	474,0	479,4	488,6	463,6	494,2	511,6	517,2	530,0	517,2	536,0	544,3
	w	644,4	651,9	652,0	635,6	668,6	675,9	697,9	676,3	684,1	683,2	678,3



Sterbefälle durch Neubildungen 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	8 112	4	26	580	3 313	4 189
	m	4 579	3	16	349	2 105	2 106
	w	3 533	1	10	231	1 208	2 083
dar. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00 - C14)	i	214	-	1	50	112	51
	m	175	-	1	47	97	30
	w	39	-	-	3	15	21
Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	2 673	1	2	161	1 094	1 415
	m	1 498	1	1	112	716	668
	w	1 175	-	1	49	378	747
Atmungsorgane u. intrathorakale Organe (C30 - C39)	i	1 613	-	-	139	834	640
	m	1 179	-	-	97	637	445
	w	434	-	-	42	197	195
Knochen u. Gelenk- knorpel (C40 - C41)	i	14	-	2	1	2	9
	m	8	-	2	1	1	4
	w	6	-	-	-	1	5
Haut (C43 - C44)	i	129	-	3	15	36	75
	m	78	-	3	9	21	45
	w	51	-	-	6	15	30
Mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45 - C49)	i	85	-	1	18	33	33
	m	41	-	-	8	17	16
	w	44	-	1	10	16	17
Brustdrüse (C50)	i	540	-	6	57	169	308
	m	9	-	-	2	2	5
	w	531	-	6	55	167	303
Weibliche Genital- organe (C51 - C58)	i	417	-	-	27	157	233
	m	x	x	x	x	x	x
	w	417	-	-	27	157	233
Männliche Genital- organe (C60 - C63)	i	516	-	1	12	165	338
	m	516	-	1	12	165	338
	w	x	x	x	x	x	x
Harnorgane (C64 - C68)	i	629	1	3	25	211	389
	m	398	1	2	18	148	229
	w	231	-	1	7	63	160
Auge, Gehirn u. Teile d. Zentralnerven- systems (C69 - C72)	i	214	1	4	29	112	68
	m	109	1	3	18	58	29
	w	105	-	1	11	54	39
Schilddrüse u. sonstige endokrine Drüsen (C73 - C75)	i	46	-	-	6	17	23
	m	18	-	-	6	6	6
	w	28	-	-	-	11	17
Lymphatische, blutbil- dende Gewebe (C81 - C96)	i	727	-	3	26	256	442
	m	378	-	3	10	153	212
	w	349	-	-	16	103	230
In-situ-Neubildungen (D00 - D09)	i	2	-	-	-	-	2
	m	-	-	-	-	-	-
	w	2	-	-	-	-	2
Gutartige Neubildungen (D10 - D36)	i	27	-	-	1	7	19
	m	9	-	-	-	4	5
	w	18	-	-	1	3	14
Neubildungen unbekanntem Verhaltens (D37 - D48)	i	170	-	-	2	41	127
	m	89	-	-	2	27	60
	w	81	-	-	-	14	67
Neubildungen insgesamt (C00 - D48)	i	8 311	4	26	583	3 361	4 337
	m	4 677	3	16	351	2 136	2 171
	w	3 634	1	10	232	1 225	2 166

Sterbefälle durch Neubildungen 2004 - 2014 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C00 - C97	i	7 382	7497	7 337	7 546	7 721	7 839	8 090	7 996	7 888	8 162	8 112
	m	4 159	4120	4 060	4 268	4 301	4 414	4 537	4 485	4 416	4 638	4 579
	w	3 223	3377	3 277	3 278	3 420	3 425	3 553	3 511	3 472	3 524	3 533
dar.												
C00 - C14	i	147	173	176	171	195	206	201	206	241	213	214
	m	113	143	148	143	166	173	165	168	192	169	175
	w	34	30	28	28	29	33	36	38	49	44	39
C15 - C26	i	2 493	2532	2 510	2 544	2 532	2 631	2 668	2 630	2 602	2 686	2 673
	m	1 345	1343	1 358	1 382	1 378	1 424	1 469	1 463	1 481	1 535	1 498
	w	1 148	1189	1 152	1 162	1 154	1 207	1 199	1 167	1 121	1 151	1 175
C30 - C39	i	1 471	1581	1 549	1 637	1 562	1 518	1 609	1 608	1 578	1 684	1 613
	m	1 175	1221	1 178	1 249	1 170	1 145	1 212	1 194	1 165	1 250	1 179
	w	296	360	371	388	392	373	397	414	413	434	434
C43 - C44	i	100	109	79	87	96	114	108	140	115	132	129
	m	52	51	46	49	47	71	61	81	63	82	78
	w	48	58	33	38	49	43	47	59	52	50	51
C45 - C49	i	77	73	80	77	76	90	86	85	74	77	85
	m	37	39	38	42	42	47	47	46	33	40	41
	w	40	34	42	35	34	43	39	39	41	37	44
C50	i	514	518	471	491	488	489	563	584	545	544	540
	m	5	6	3	4	5	7	5	6	5	4	9
	w	509	512	468	487	483	482	558	578	540	540	531
C51 - C58	i	391	425	404	377	444	411	397	408	408	365	417
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	391	425	404	377	444	411	397	408	408	365	417
C60 - C63	i	388	389	407	427	415	500	515	507	508	533	516
	m	388	389	407	427	415	500	515	507	508	533	516
	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C64 - C68	i	564	504	474	472	534	582	627	595	584	608	629
	m	367	321	290	296	347	382	384	376	347	361	398
	w	197	183	184	176	187	200	243	219	237	247	231
C69 - C72	i	173	183	179	171	200	211	206	199	175	209	214
	m	103	107	98	92	108	120	106	111	101	95	109
	w	70	76	81	79	92	91	100	88	74	114	105
C81 - C96	i	586	554	566	584	614	611	669	657	669	752	727
	m	321	268	265	298	333	305	342	351	343	405	378
	w	265	286	301	286	281	306	327	306	326	347	349
D00 - D09	i	2	3	4	5	3	3	-	1	2	2	2
	m	1	-	1	2	-	2	-	-	2	1	-
	w	1	3	3	3	3	1	-	1	-	1	2
D10 - D36	i	18	20	29	23	35	46	29	26	22	32	27
	m	5	5	11	8	14	16	11	6	6	11	9
	w	13	15	18	15	21	30	18	20	16	21	18
D37 - D48	i	158	163	178	173	172	163	182	164	178	164	170
	m	67	74	68	73	88	82	85	78	71	81	89
	w	91	89	110	100	84	81	97	86	107	83	81
Insgesamt C00 - D48	i	7 560	7 683	7 548	7 747	7 931	8 051	8 301	8 187	8 090	8 360	8 311
	m	4 232	4 199	4 140	4 351	4 403	4 514	4 633	4 569	4 495	4 731	4 677
	w	3 328	3 484	3 408	3 396	3 528	3 537	3 668	3 618	3 595	3 629	3 634

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2004 - 2014 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C00 - C97	i	294,1	302,0	298,8	310,8	322,1	331,0	345,0	349,6	347,8	362,4	362,1
	m	339,6	340,0	338,5	359,6	366,7	380,8	395,0	401,4	398,3	421,0	417,3
	w	250,8	265,7	260,9	264,2	279,3	283,4	297,0	300,2	299,5	306,4	309,1
dar.												
C00 - C14	i	5,9	7,0	7,2	7,0	8,1	8,7	8,6	9,0	10,6	9,5	9,6
	m	9,2	11,8	12,3	12,0	14,2	14,9	14,4	15,0	17,3	15,3	15,9
	w	2,6	2,4	2,2	2,3	2,4	2,7	3,0	3,2	4,2	3,8	3,4
C15 - C26	i	99,3	102,0	102,2	104,8	105,6	111,1	113,8	115,0	114,7	119,3	119,3
	m	109,8	110,8	113,2	116,4	117,5	122,8	127,9	130,9	133,6	139,3	136,5
	w	89,3	93,6	91,7	93,7	94,3	99,9	100,2	99,8	96,7	100,1	102,8
C30 - C39	i	58,6	63,7	63,1	67,4	65,2	64,1	68,6	70,3	69,6	74,8	72,0
	m	96,0	100,8	98,2	105,2	99,7	98,8	105,5	106,9	105,1	113,5	107,5
	w	23,0	28,3	29,5	31,3	32,0	30,9	33,2	35,4	35,6	37,7	38,0
C43 - C44	i	4,0	4,4	3,2	3,6	4,0	4,8	4,6	6,1	5,1	5,9	5,8
	m	4,2	4,2	3,8	4,1	4,0	6,1	5,3	7,2	5,7	7,4	7,1
	w	3,7	4,6	2,6	3,1	4,0	3,6	3,9	5,0	4,5	4,3	4,5
C45 - C49	i	3,1	2,9	3,3	3,2	3,2	3,8	3,7	3,7	3,3	3,4	3,8
	m	3,0	3,2	3,2	3,5	3,6	4,1	4,1	4,1	3,0	3,6	3,7
	w	3,1	2,7	3,3	2,8	2,8	3,6	3,3	3,3	3,5	3,2	3,9
C50	i	20,5	20,9	19,2	20,2	20,4	20,7	24,0	25,5	24,0	24,2	24,1
	m	0,4	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,8
	w	39,6	40,3	37,3	39,3	39,4	39,9	46,6	49,4	46,6	46,9	46,5
C51 - C58	i	15,6	17,1	16,5	15,5	18,5	17,4	16,9	17,8	18,0	16,2	18,6
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	30,4	33,4	32,2	30,4	36,3	34,0	33,2	34,9	35,2	31,7	36,5
C60 - C63	i	15,5	15,7	16,6	17,6	17,3	21,1	22,0	22,2	22,4	23,7	23,0
	m	31,7	32,1	33,9	36,0	35,4	43,1	44,8	45,4	45,8	48,4	47,0
	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C64 - C68	i	22,5	20,3	19,3	19,4	22,3	24,6	26,7	26,0	25,7	27,0	28,1
	m	30,0	26,5	24,2	24,9	29,6	33,0	33,4	33,6	31,3	32,8	36,3
	w	15,3	14,4	14,6	14,2	15,3	16,5	20,3	18,7	20,4	21,5	20,2
C69 - C72	i	6,9	7,4	7,3	7,0	8,3	8,9	8,8	8,7	7,7	9,3	9,6
	m	8,4	8,8	8,2	7,8	9,2	10,4	9,2	9,9	9,1	8,6	9,9
	w	5,4	6,0	6,4	6,4	7,5	7,5	8,4	7,5	6,4	9,9	9,2
C81 - C96	i	23,3	22,3	23,0	24,1	25,6	25,8	28,5	28,7	29,5	33,4	32,5
	m	26,2	22,1	22,1	25,1	28,4	26,3	29,8	31,4	30,9	36,8	34,5
	w	20,6	22,5	24,0	23,1	23,0	25,3	27,3	26,2	28,1	30,2	30,5
D00 - D09	i	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1
	m	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,1	-
	w	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,1	-	0,1	0,2
D10 - D36	i	0,7	0,8	1,2	0,9	1,5	1,9	1,2	1,1	1,0	1,4	1,2
	m	0,4	0,4	0,9	0,7	1,2	1,4	1,0	0,5	0,5	1,0	0,8
	w	1,0	1,2	1,4	1,2	1,7	2,5	1,5	1,7	1,4	1,8	1,6
D37 - D48	i	6,3	6,6	7,2	7,1	7,2	6,9	7,8	7,2	7,8	7,3	7,6
	m	5,5	6,1	5,7	6,1	7,5	7,1	7,4	7,0	6,4	7,4	8,1
	w	7,1	7,0	8,8	8,1	6,9	6,7	8,1	7,4	9,2	7,2	7,1
Insgesamt C00 - D48	i	301,2	309,5	307,4	319,1	330,8	340,0	354,0	358,0	356,7	371,2	371,0
	m	345,6	346,6	345,1	366,6	375,3	389,4	403,4	408,9	405,4	429,4	426,3
	w	258,9	274,2	271,3	273,7	288,1	292,6	306,6	309,3	310,1	315,5	318,0



Nichtnatürliche Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Verletzungen d. Kopfes (S00 - S09)	i	225	2	18	23	60	122
	m	143	1	18	19	48	57
	w	82	1	-	4	12	65
Verletzungen d. Halses (S10 - S19)	i	43	-	5	6	12	20
	m	26	-	4	5	8	9
	w	17	-	1	1	4	11
Verletzungen d. Thorax (S20 - S29)	i	57	2	2	9	13	31
	m	36	2	2	9	8	15
	w	21	-	-	-	5	16
Verletzungen d. Abdomens, d. Lendenwirbelsäule u. d. Beckens (S30 - S39)	i	31	-	1	4	4	22
	m	10	-	1	3	2	4
	w	21	-	-	1	2	18
Verletzungen d. Extremitäten (S40 - S99)	i	249	-	-	-	29	220
	m	85	-	-	-	18	67
	w	164	-	-	-	11	153
dar. Verletzungen d. Hüfte u. d. Oberschenkels (S70 - S79)	i	224	-	-	-	22	202
	m	73	-	-	-	13	60
	w	151	-	-	-	9	142
Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00 - T07)	i	126	-	30	34	42	20
	m	89	-	24	28	24	13
	w	37	-	6	6	18	7
Verbrennungen o. Ver- ätzungen (T20 - T32)	i	15	-	2	4	5	4
	m	12	-	2	3	4	3
	w	3	-	-	1	1	1
Erfrierungen (T33 - T35)	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen u. biologisch aktive Substanzen (T36 - T50)	i	63	-	8	22	20	13
	m	28	-	5	10	9	4
	w	35	-	3	12	11	9
Toxische Wirkung von nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51 - T65)	i	46	-	7	16	16	7
	m	34	-	5	13	13	3
	w	12	-	2	3	3	4
Sonstige Schäden	i	430	5	35	83	135	172
	m	304	3	29	71	104	97
	w	126	2	6	12	31	75
Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	1 285	9	108	201	336	631
	m	767	6	90	161	238	272
	w	518	3	18	40	98	359

Unfalltote 2014 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	18	-	1	11	6	-
	m	18	-	1	11	6	-
	w	-	-	-	-	-	-
Verkehrsunfall	i	142	2	39	36	38	27
	m	103	2	35	30	23	13
	w	39	-	4	6	15	14
Häuslicher Unfall	i	444	2	12	34	83	313
	m	206	1	9	28	55	113
	w	238	1	3	6	28	200
Sport-/Spielunfall	i	5	-	3	2	-	-
	m	5	-	3	2	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	279	3	9	16	71	180
	m	139	2	8	14	48	67
	w	140	1	1	2	23	113
Insgesamt	i	888	7	64	99	198	520
	m	471	5	56	85	132	193
	w	417	2	8	14	66	327

Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2014 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	0,8	-	0,2	1,7	0,9	-
	m	1,6	-	0,4	3,4	2,0	-
	w	-	-	-	-	-	-
Verkehrsunfall	i	6,3	0,8	8,9	5,7	6,0	9,7
	m	9,4	1,5	15,0	9,2	7,5	12,7
	w	3,4	-	1,9	2,0	4,5	8,0
Häuslicher Unfall	i	19,8	0,8	2,7	5,4	13,0	112,9
	m	18,8	0,8	3,9	8,6	18,0	110,2
	w	20,8	0,8	1,5	2,0	8,4	114,5
Sport-/Spielunfall	i	0,2	-	0,7	0,3	-	-
	m	0,5	-	1,3	0,6	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	12,5	1,2	2,0	2,5	11,1	64,9
	m	12,7	1,5	3,4	4,3	15,7	65,4
	w	12,3	0,8	0,5	0,7	6,9	64,7
Insgesamt	i	39,6	2,8	14,6	15,7	31,0	187,6
	m	42,9	3,8	24,0	26,1	43,2	188,3
	w	36,5	1,6	3,9	4,6	19,8	187,1

Unfalltote 2014 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Männer



Frauen



Unfälle 2004 - 2014 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arbeits- / Schulunfall	i	28	29	33	28	25	22	26	30	19	23	18
	m	28	26	30	27	24	21	26	30	17	21	18
	w	-	3	3	1	1	1	-	-	2	2	-
Verkehrsunfall	i	259	250	207	180	228	177	158	176	150	157	142
	m	187	187	156	131	169	125	119	120	114	112	103
	w	72	63	51	49	59	52	39	56	36	45	39
Häuslicher Unfall	i	262	285	216	228	267	344	364	356	358	397	444
	m	123	126	96	107	129	155	169	170	156	202	206
	w	139	159	120	121	138	189	195	186	202	195	238
Sport- / Spielunfall	i	7	4	1	1	4	6	6	7	16	10	5
	m	5	3	1	1	4	5	5	5	12	7	5
	w	2	1	-	-	-	1	1	2	4	3	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	143	129	141	98	183	213	192	175	233	247	279
	m	91	78	86	56	96	105	107	92	119	125	139
	w	52	51	55	42	87	108	85	83	114	122	140
Insgesamt	i	699	697	598	535	707	762	746	744	776	834	888
	m	434	420	369	322	422	411	426	417	418	467	471
	w	265	277	229	213	285	351	320	327	358	367	417

Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2004 - 2014 nach Unfallkategorien und Geschlecht



Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Arbeits- / Schulunfall	i	1,1	1,2	1,3	1,2	1,0	0,9	1,1	1,3	0,8	1,0	0,8
	m	2,3	2,1	2,5	2,3	2,0	1,8	2,3	2,7	1,5	1,9	1,6
	w	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-
Verkehrsunfall	i	10,3	10,1	8,4	7,4	9,5	7,5	6,7	7,7	6,6	7,0	6,3
	m	15,3	15,4	13,0	11,0	14,4	10,8	10,4	10,7	10,3	10,2	9,4
	w	5,6	5,0	4,1	3,9	4,8	4,3	3,3	4,8	3,1	3,9	3,4
Häuslicher Unfall	i	10,4	11,5	8,8	9,4	11,1	14,5	15,5	15,6	15,8	17,6	19,8
	m	10,0	10,4	8,0	9,0	11,0	13,4	14,7	15,2	14,1	18,3	18,8
	w	10,8	12,5	9,6	9,8	11,3	15,6	16,3	15,9	17,4	17,0	20,8
Sport- / Spielunfall	i	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,2
	m	0,4	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	1,1	0,6	0,5
	w	0,2	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	-
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	5,7	5,2	5,7	4,0	7,6	9,0	8,2	7,7	10,3	11,0	12,5
	m	7,4	6,4	7,2	4,7	8,2	9,1	9,3	8,2	10,7	11,3	12,7
	w	4,0	4,0	4,4	3,4	7,1	8,9	7,1	7,1	9,8	10,6	12,3
Insgesamt	i	27,9	28,1	24,4	22,0	29,5	32,2	31,8	32,5	34,2	37,0	39,6
	m	35,4	34,7	30,8	27,1	36,0	35,5	37,1	37,3	37,7	42,4	42,9
	w	20,6	21,8	18,2	17,2	23,3	29,0	26,7	28,0	30,9	31,9	36,5


Nichtnatürliche Sterbefälle 2014 nach äußerer Ursache und Geschlecht

Äußere Ursache	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.
Transportmittelunfälle (V01- V99)	151	11,8	6,7	113	14,7	10,3	38	7,3	3,3
dar. Fußgänger (V01 - V09)	42	3,3	1,9	26	3,4	2,4	16	3,1	1,4
Radfahrer (V10 - V19)	11	0,9	0,5	6	0,8	0,5	5	1,0	0,4
Krad-Benutzer (V20 - V29)	12	0,9	0,5	12	1,6	1,1	-	-	-
PKW-Benutzer (V40 - V49)	66	5,1	2,9	51	6,6	4,6	15	2,9	1,3
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	8	0,6	0,4	7	0,9	0,6	1	0,2	0,1
Autobusbenutzer (V70 - V79)	1	0,1	0,0	1	0,1	0,1	-	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	365	28,4	16,3	152	19,8	13,9	213	41,1	18,6
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	21	1,6	0,9	17	2,2	1,5	4	0,8	0,4
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	23	1,8	1,0	11	1,5	1,0	12	2,3	1,1
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	21	1,6	0,9	14	1,8	1,3	7	1,4	0,6
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	7	0,5	0,3	7	0,9	0,6	-	-	-
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	37	2,9	1,7	23	3,0	2,1	14	2,7	1,2
Suizide (X60 - X84)	367	28,6	16,4	280	36,5	25,5	87	16,8	7,6
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	14	1,1	0,6	9	1,2	0,8	5	1,0	0,4
Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	14	1,1	0,6	7	0,9	0,6	7	1,3	0,6
Komplikationen bei der medizi- nischen und chirurgischen Behandlung (Y40 - Y84)	84	6,5	3,7	41	5,4	3,7	43	8,3	3,8
Übrige	181	14,1	8,1	93	12,1	8,5	88	17,0	7,7
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	1 285	100	57,4	767	100	69,9	518	100	45,3
dar. Unfälle insgesamt (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	888	69,1	39,6	471	61,4	42,9	417	80,5	36,5

Nichtnatürliche Sterbefälle 2014 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht

Äußere Ursache	Ge- schlecht	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Transportmittelunfälle (V01- V99)	i	151	2	42	39	41	27
	m	113	2	38	33	27	13
	w	38	-	4	6	14	14
dar. Fußgänger (V01 - V09)	i	42	2	5	11	10	14
	m	26	2	5	10	5	4
	w	16	-	-	1	5	10
Radfahrer (V10 - V19)	i	11	-	2	3	5	1
	m	6	-	2	1	3	-
	w	5	-	-	2	2	1
Krad-Benutzer (V20 - V29)	i	12	-	5	5	2	-
	m	12	-	5	5	2	-
	w	-	-	-	-	-	-
PKW-Benutzer (V40 - V49)	i	66	-	26	13	17	10
	m	51	-	22	11	11	7
	w	15	-	4	2	6	3
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	i	8	-	3	4	1	-
	m	7	-	3	3	1	-
	w	1	-	-	1	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	i	365	1	3	14	68	279
	m	152	1	3	11	45	92
	w	213	-	-	3	23	187
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	i	21	1	4	4	6	6
	m	17	-	4	4	4	5
	w	4	1	-	-	2	1
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	i	23	-	2	4	5	12
	m	11	-	1	4	3	3
	w	12	-	1	-	2	9
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	i	21	-	3	6	5	7
	m	14	-	2	5	5	2
	w	7	-	1	1	-	5
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	i	7	-	-	4	2	1
	m	7	-	-	4	2	1
	w	-	-	-	-	-	-
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	i	37	-	7	10	12	8
	m	23	-	5	8	7	3
	w	14	-	2	2	5	5
Suizide (X60 - X84)	i	367	-	40	92	133	102
	m	280	-	33	68	102	77
	w	87	-	7	24	31	25
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	i	14	2	4	7	1	-
	m	9	1	1	6	1	-
	w	5	1	3	1	-	-
Übrige	i	279	3	3	21	63	189
	m	141	2	3	18	42	76
	w	138	1	-	3	21	113
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	i	1 285	9	108	201	336	631
	m	767	6	90	161	238	272
	w	518	3	18	40	98	359






Alkoholbedingte Sterbefälle 2009 und 2014 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle						
	2009			2014			
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	
E24.4	Durch Alkohol induziertes Pseudo-Cushing-Syndrom	-	-	-	-	-	
E52	Niazinmangel [Pellagra]	-	-	-	-	-	
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	142	123	19	284	234	50
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	9	7	2	12	8	4
G62.1	Alkohol-Polyneuropathie	6	5	1	6	3	3
G72.1	Alkoholmyopathie	-	-	-	-	-	-
I42.6	Alkoholische Kardiomyopathie	22	21	1	16	15	1
K29.2	Alkoholgastritis	-	-	-	1	1	-
K70	Alkoholische Leberkrankheit	550	417	133	481	371	110
K85.2	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis	21	18	3	10	9	1
K86.0	Durch Alkohol induzierte chronische Pankreatitis	11	11	-	11	11	-
O35.4	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol	-	x	-	-	x	-
P04.3	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter	-	-	-	-	-	-
Q86.0	Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)	1	1	-	-	-	-
R78.0	Nachweis von Alkohol im Blut	-	-	-	-	-	-
T51.0	Toxische Wirkung: Äthanol	9	7	2	14	12	2
T51.9	Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet	21	16	5	-	-	-
Insgesamt		792	626	166	835	664	171
Anteil aller Sterbefälle in %		2,6	4,3	1,1	2,7	4,4	1,1
Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung		33,4	54,0	13,7	37,3	60,5	15,0

Alkoholbedingte Sterbefälle 2009 und 2014 nach Altersgruppen im Vergleich

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			
	2009		2014	
	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	-	-	-	-
1 - 15	1	0,1	-	-
15 - 35	9	1,1	8	1,0
35 - 55	341	43,1	266	31,9
55 - 75	390	49,3	488	58,4
75 und mehr	51	6,4	73	8,7
Insgesamt	792	100	835	100



Mittleres Sterbealter seit 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren						
		2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	i	65,4	69,9	69,8	71,2	73,1	76,9	77,4
	m	61,2	65,1	64,1	68,1	68,6	72,2	72,2
	w	69,7	74,8	75,5	74,3	77,2	81,9	82,5
II Neubildungen (C00 - D48)	i	70,3	70,9	71,1	71,4	72,1	72,3	73,3
	m	68,4	69,1	69,7	70,0	70,8	71,0	71,9
	w	72,6	73,1	72,9	73,1	73,8	74,0	75,1
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	70,2	70,8	71,0	71,3	72,0	72,2	73,2
	m	68,3	69,1	69,7	69,9	70,7	71,0	71,8
	w	72,4	73,0	72,6	73,0	73,5	73,8	74,9
dar. Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	71,6	71,9	72,3	72,4	72,8	72,9	73,7
	m	68,3	69,2	69,7	69,6	70,8	70,7	71,7
	w	75,0	75,0	75,2	75,8	75,2	75,8	76,2
... der Atmungsorgane (C30 - C39)	i	68,5	68,7	68,7	69,4	69,9	70,0	70,4
	m	68,0	68,3	68,5	69,2	69,6	69,6	70,0
	w	70,2	70,2	69,4	70,1	70,8	71,3	71,6
... der Brustdrüse (C50)	i	69,6	71,2	71,1	70,3	72,6	72,4	73,8
	m	57,0	66,2	77,7	76,8	64,6	69,6	69,2
	w	69,6	71,3	71,1	70,2	72,6	72,5	73,9
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 - C96)	i	69,6	71,1	71,6	72,1	72,6	73,2	75,7
	m	67,3	69,1	68,9	70,2	70,5	71,9	74,5
	w	72,0	73,6	73,9	74,4	74,7	74,6	76,9
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	i	72,2	74,5	77,9	75,4	76,1	78,7	81,1
	m	63,9	65,1	79,0	70,9	70,2	71,3	80,5
	w	77,7	78,6	77,3	77,8	80,1	82,5	81,6
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	i	77,2	76,8	76,9	77,6	76,3	77,3	77,8
	m	72,6	70,2	71,7	73,0	72,3	72,7	74,1
	w	79,5	80,1	80,0	80,7	79,2	80,5	80,5
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	i	78,2	77,5	77,8	79,1	77,1	78,2	79,1
	m	73,8	70,8	72,6	74,6	73,3	73,8	75,3
	w	80,5	80,9	80,8	81,8	80,0	81,5	81,7
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	i	59,7	57,7	57,0	75,0	75,7	75,2	76,9
	m	58,1	55,5	55,8	65,7	66,4	67,5	69,0
	w	66,6	68,0	61,8	83,8	83,6	83,6	83,8
dar. ... durch Alkohol (F10)	i	57,3	54,9	55,2	54,2	55,7	58,1	58,5
	m	56,5	54,7	55,5	53,5	55,1	58,2	58,2
	w	61,7	57,1	53,0	58,3	59,1	57,4	59,7
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	i	70,9	72,6	71,6	72,9	74,6	76,0	75,8
	m	67,5	67,5	67,1	68,4	70,7	72,9	73,1
	w	74,4	77,1	75,8	76,8	78,1	79,0	78,2
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	i	79,1	79,2	79,6	79,9	80,6	80,8	81,3
	m	74,1	74,2	74,5	75,0	75,9	76,2	77,0
	w	82,5	82,8	83,2	83,4	83,9	84,2	84,6
dar. Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	78,3	78,5	78,6	78,7	79,3	79,4	79,5
	m	73,6	73,7	73,8	74,3	75,1	75,1	75,8
	w	82,1	82,5	82,8	82,8	83,4	83,6	83,7
dar. Akuter Myokardinfarkt (I21)	i	73,7	73,9	74,3	74,9	75,6	75,4	75,8
	m	69,8	69,9	70,4	71,3	72,0	71,4	72,4
	w	78,4	78,7	79,3	79,5	80,4	80,2	80,2
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	80,5	80,2	80,5	80,5	81,0	80,7	81,3
	m	76,5	75,9	76,2	76,1	76,9	77,0	77,8
	w	82,7	82,7	83,2	83,2	83,4	83,2	83,7

Noch: Mittleres Sterbealter seit 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren							
			2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	i	76,6	76,4	76,8	77,9	77,1	78,0	77,9	
		m	73,8	74,1	73,7	75,3	74,9	76,2	75,6	
		w	80,1	79,2	80,3	80,8	79,9	80,6	80,8	
	dar. Grippe und Pneumonie (J09 - J18)	i	78,4	80,2	78,9	79,6	78,9	79,3	79,7	
		m	73,7	76,9	74,1	75,9	75,4	76,0	77,5	
		w	81,9	82,7	82,8	82,9	82,1	82,7	82,0	
	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	i	76,1	75,6	75,8	77,1	76,5	77,7	76,9	
		m	74,2	74,3	73,5	75,4	75,0	76,4	74,9	
		w	79,0	77,5	78,9	79,4	78,6	79,6	79,8	
XI	Krankheiten des Verdauungs- systems (K00 - K93)	i	65,4	68,0	69,0	70,0	69,8	70,4	71,2	
		m	60,7	63,1	64,1	65,0	65,3	65,8	66,9	
		w	72,1	74,8	75,2	76,1	75,5	76,8	76,9	
	dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	i	57,9	60,1	60,8	62,6	61,8	62,4	64,2	
		m	56,7	58,9	59,4	61,1	60,5	61,2	62,6	
		w	60,6	63,3	64,4	66,3	64,6	65,6	67,8	
	XIV	Krankheiten des Urogenital- systems (N00 - N99)	i	78,3	79,3	79,2	81,1	81,0	81,7	82,3
			m	76,1	77,6	76,6	78,4	78,4	79,1	79,0
			w	80,1	80,6	81,7	82,8	82,6	83,4	84,4
XVII	Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	i	17,5	37,8	30,7	49,2	34,6	34,8	34,3	
		m	16,9	35,2	38,8	42,5	26,8	32,5	34,9	
		w	18,2	40,8	25,3	53,4	43,0	38,7	33,4	
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	54,8	56,0	59,6	61,1	62,5	65,4	68,0	
		m	49,8	51,3	53,8	55,2	57,3	59,7	62,5	
		w	65,4	65,6	70,6	71,4	71,2	74,8	76,1	
	dar. Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70 - S79)	i	83,4	84,3	84,8	83,9	84,7	84,0	85,0	
		m	76,9	81,8	82,8	80,9	82,2	81,2	83,3	
		w	85,9	85,6	85,7	85,2	86,0	84,8	85,9	
	aus XX	Transportmittelunfälle (V01 - V99)	i	39,4	40,0	42,5	45,9	44,3	48,5	50,7
			m	37,6	39,0	38,9	43,9	46,1	47,4	46,8
			w	44,2	42,6	54,5	51,6	38,4	52,1	62,4
Unfälle durch Sturz (W00 - W19)		i	72,8	75,3	73,7	76,0	78,0	79,4	80,2	
		m	63,5	69,0	66,6	67,5	71,2	71,7	74,7	
		w	81,4	80,8	81,3	84,3	83,5	84,1	84,1	
Unfälle durch Ertrinken (W65 - W74)		i	49,9	43,2	46,1	59,5	49,3	50,2	53,0	
		m	42,4	37,8	42,7	51,7	52,7	50,4	56,2	
		w	65,0	74,0	51,3	79,0	41,9	49,7	42,2	
Suizide (X60 - X84)		i	54,2	54,6	59,1	56,3	55,1	59,9	61,4	
		m	52,5	53,5	58,0	54,3	54,3	58,5	60,9	
		w	59,9	57,6	62,4	61,8	57,8	65,5	63,2	
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)		i	55,7	28,1	41,1	49,5	43,5	42,1	34,2	
		m	57,3	30,2	46,3	45,4	40,0	50,0	41,3	
		w	53,9	25,2	35,0	53,6	51,2	32,1	21,4	
Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10 - Y34)		i	47,6	58,3	61,5	63,2	66,2	74,3	69,1	
		m	46,2	52,8	58,2	58,6	61,6	69,9	62,1	
		w	51,2	73,4	68,5	71,9	70,3	81,1	76,1	
Insgesamt (A00 - T98)		i	74,1	74,4	74,9	75,5	76,1	76,5	77,2	
		m	69,1	69,5	70,3	71,0	71,8	72,3	73,2	
		w	78,5	79,0	79,2	79,7	80,0	80,5	81,0	

Vermeidbare Sterbefälle 2009 und 2014 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Alter	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		2009			2014		
		insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
- Alle Krankheiten (A00 - T98)	unter 1	2,5	3,2	2,0	1,9	2,3	1,5
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten Tuberkulose und deren Folgezustände (A15 - A19, B90)	5 - 65	0,3	0,5	-	0,2	0,3	0,1
II Neubildungen Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses (C53)	5 - 65	1,4	x	2,7	1,3	x	2,5
Hodgkin-Krankheit (C81)	5 - 35	-	-	-	0,0	0,1	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09)	5 - 45	-	-	-	0,0	-	0,1
Hypertonie (I10 - I15)	5 - 65	3,3	4,9	1,7	3,4	4,5	2,5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	5 - 65	7,8	10,8	4,9	5,7	7,5	3,9
XI Krankheiten des Verdauungssystems Krankheiten der Appendix (K35 - K38)	5 - 65	0,0	-	0,1	-	-	-
Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K80 - K83)	5 - 65	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	15 - 50	0,1	x	0,2	-	x	-
Insgesamt		15,7	19,7	11,9	12,7	14,8	10,7

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2014

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 42 Säuglingssterbefälle, davon 25 männliche und 17 weibliche, registriert. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 6 männliche und ein weiblicher Säugling weniger. Der Anteil der verstorbenen männlichen Säuglinge an der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge betrug 59,5 %.

Die Säuglingssterblichkeit lag mit 2,46 ‰ etwas unter dem Wert des Vorjahres und erreichte damit den niedrigsten Wert. Die Anzahl der Lebendgeborenen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 267

an. Die Zahl der Totgeborenen nahm hingegen um 2 Fälle zu. Die Totgeborenenrate stieg allerdings nur geringfügig auf 3,97 ‰.

Von den 42 verstorbenen Säuglingen verstarben 21 innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt. Das sind genauso viele wie im Jahr zuvor. Die Frühsterblichkeit betrug 1,23 ‰ und war damit konstant gegenüber dem Vorjahr geblieben. Die perinatale Mortalität erreichte 5,19 ‰ und blieb damit auf Vorjahresniveau.

Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer

Lebensdauer von ... bis unter ...	Gestorbene Säuglinge					
	2014			2013		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Unter 24 Stunden	16	11	5	10	7	3
24 Stunden - 7 Tage	5	2	3	11	8	3
7 Tage - 28 Tage	8	4	4	9	7	2
28 Tage - 1 Jahr	13	8	5	19	9	10
Insgesamt	42	25	17	49	31	18

Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer


Vorgang	2014			2013		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl der Lebendgeborenen	17 064	8 816	8 248	16 797	8 542	8 255
Anzahl der Totgeborenen	68	36	32	66	32	34
Anzahl der gestorbenen Säuglinge	42	25	17	49	31	18
dar. in den ersten 7 Tagen	21	13	8	21	15	6
Säuglingssterblichkeit in ‰	2,46	2,84	2,06	2,92	3,63	2,18
Frühsterblichkeit in ‰	1,23	1,47	0,97	1,25	1,76	0,73
Spätsterblichkeit in ‰	0,47	0,45	0,48	0,54	0,82	0,24
Nachsterblichkeit in ‰	0,76	0,91	0,61	1,13	1,05	1,21
Totgeborenenrate in ‰	3,97	4,07	3,86	3,91	3,73	4,10
Perinatale Mortalität in ‰	5,19	5,54	4,83	5,16	5,48	4,83

Säuglingssterblichkeit 2004 - 2014 nach Geschlecht

Vorgang	Ge- schl.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lebend- geborene	i	17 337	17 166	16 927	17 132	17 697	17 144	17 300	16 837	16 888	16 797	17 064
	m	9 012	8 674	8 838	8 868	9 079	8 853	8 802	8 658	8 599	8 542	8 816
	w	8 325	8 492	8 089	8 264	8 618	8 291	8 498	8 179	8 289	8 255	8 248
Totgeborene	i	77	66	57	83	66	69	63	69	63	66	68
	m	40	36	25	46	35	29	40	34	31	32	36
	w	37	30	32	37	31	40	23	35	32	34	32
Gestorbene Säuglinge	i	70	53	58	52	61	49	49	51	51	49	42
	m	38	25	24	28	37	29	36	26	30	31	25
	w	32	28	34	24	24	20	13	25	21	18	17
dar. in den ersten 7 Tagen	i	46	30	22	24	24	20	17	10	19	21	21
	m	27	17	11	15	14	10	10	5	8	15	13
	w	19	13	11	9	10	10	7	5	11	6	8
Säuglings- sterblichkeit	i	4,04	3,09	3,43	2,99	3,45	2,86	2,83	3,03	3,02	2,92	2,46
	m	4,22	2,88	2,72	3,13	4,08	3,28	4,09	3,00	3,49	3,63	2,84
	w	3,84	3,30	4,20	2,84	2,78	2,41	1,53	3,06	2,53	2,18	2,06
Frühsterblich- keit	i	2,65	1,75	1,30	1,38	1,36	1,17	0,98	0,59	1,13	1,25	1,23
	m	3,00	1,96	1,24	1,68	1,54	1,13	1,14	0,58	0,93	1,76	1,47
	w	2,28	1,53	1,36	1,07	1,16	1,21	0,82	0,61	1,33	0,73	0,97
Totgeborenen- rate	i	4,42	3,83	3,36	4,82	3,72	4,01	3,63	4,08	3,72	3,91	3,97
	m	4,42	4,13	2,82	5,16	3,84	3,27	4,52	3,91	3,59	3,73	4,07
	w	4,43	3,52	3,94	4,46	3,58	4,80	2,70	4,26	3,85	4,10	3,86
Perinatale Mortalität	i	7,06	5,57	4,65	6,22	5,07	5,17	4,61	4,67	4,84	5,16	5,19
	m	7,40	6,08	4,06	6,84	5,38	4,39	5,65	4,49	4,52	5,48	5,54
	w	6,70	5,05	5,29	5,54	4,74	6,00	3,52	4,87	5,17	4,83	4,83

Säuglingssterbefälle 1970 - 2014 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle im ersten Lebensjahr					
	absolut			je 1 000 Lebendgeborene		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	861	494	367	19,02	21,36	16,57
1971	831	488	343	18,20	20,73	15,51
1972	725	435	290	18,95	22,11	15,60
1973	531	300	231	15,89	17,35	14,32
1974	578	335	243	17,69	20,06	15,20
1975	523	311	212	16,24	18,64	13,66
1976	469	268	201	13,60	15,16	11,96
1977	548	313	235	13,88	15,43	12,25
1978	592	366	226	14,32	17,14	11,32
1979	566	329	237	13,66	15,39	11,81
1980	534	315	219	12,39	14,23	10,45
1981	550	344	206	13,05	15,81	10,11
1982	486	281	205	11,61	13,12	10,02
1983	437	277	160	10,52	12,93	7,95
1984	414	234	180	10,28	11,32	9,18
1985	394	231	163	9,84	11,24	8,37
1986	400	243	157	10,16	12,09	8,15
1987	348	208	140	8,73	10,19	7,20
1988	320	187	133	8,32	9,42	7,15
1989	285	171	114	8,11	9,42	6,71
1990	254	166	88	7,98	10,07	5,73
1991	177	106	71	9,10	10,64	7,48
1992	128	77	51	7,86	9,12	6,51
1993	84	43	41	5,75	5,73	5,77
1994	91	44	47	6,37	6,01	6,76
1995	90	53	37	6,18	7,04	5,26
1996	92	49	43	5,70	5,89	5,49
1997	86	45	41	5,00	5,03	4,98
1998	93	50	43	5,31	5,57	5,03
1999	70	38	32	3,85	4,03	3,66
2000	79	45	34	4,22	4,63	3,77
2001	73	41	32	4,04	4,40	3,65
2002	87	47	40	4,94	5,16	4,70
2003	72	49	23	4,26	5,63	2,81
2004	70	38	32	4,04	4,22	3,84
2005	53	25	28	3,09	2,88	3,30
2006	58	24	34	3,43	2,72	4,20
2007	52	28	24	2,99	3,13	2,84
2008	61	37	24	3,45	4,08	2,78
2009	49	29	20	2,86	3,28	2,41
2010	49	36	13	2,83	4,09	1,53
2011	51	26	25	3,03	3,00	3,06
2012	51	30	21	3,02	3,49	2,53
2013	49	31	18	2,92	3,63	2,18
2014	42	25	17	2,46	2,84	2,06



Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2014

Die hauptsächlichen Todesursachen, die die Höhe der Säuglingssterblichkeit maßgeblich beeinflussten, waren nach wie vor **Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben** mit 45,2 %.

Angeborenen Fehlbildungen waren mit 31,0 % an den Todesursachen im Säuglingsalter beteiligt. **Plötzlicher Kindstod** (Säuglingssterbefälle, bei

denen die Todesursache nicht bekannt ist bzw. auch durch Autopsie nicht geklärt werden konnte) führte im aktuellen Berichtsjahr bei 4 Säuglingen zum Tod. Vier Säuglinge kamen durch **nicht-natürliche Todesursachen** ums Leben. Davon verstarb ein Säugling durch Kindstötung und 3 Säuglinge unfallbedingt.

Säuglingssterbefälle 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Säuglinge						
	insgesamt	in %	männlich	weiblich	dar. in den ersten 7 Tagen		
					insg.	männl.	weibl.
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	2	4,8	2	-	-	-	-
II Neubildungen (C00 - D48)	-	-	-	-	-	-	-
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	-	-	-	-	-	-	-
IV Endokrine , Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	-	-	-	-	-	-	-
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren (G00 - H95)	-	-	-	-	-	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	-	-	-	-	-	-	-
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	-	-	-	-	-	-	-
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	-	-	-	-	-	-	-
XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	19	45,2	12	7	13	9	4
dar. Frühgeburten (P05, P07)	7	16,7	4	3	6	4	2
Krankheiten des Atmungs- und Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20 - P29)	7	16,7	6	1	4	3	1
XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	13	31,0	6	7	6	2	4
dar. ... des Kreislaufsystems (Q20 - Q28)	5	11,9	3	2	1	-	1
aus							
XVIII Plötzlicher Kindstod (R95)	4	9,5	3	1	-	-	-
XX Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	4	9,5	2	2	2	2	-
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	3	7,1	2	1	2	2	-
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	1	2,4	-	1	-	-	-
Übrige	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	42	100	25	17	21	13	8

Säuglingssterbefälle 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I A00 - B99	i	2	1	-	2	3	1	1	-	2	2	2
	m	1	1	-	1	1	1	1	-	2	-	2
	w	1	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-
VI G00 - G99	i	-	-	3	-	2	1	2	2	3	2	-
	m	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-
	w	-	-	3	-	1	-	-	1	3	-	-
X J00 - J99	i	2	2	5	4	3	3	-	3	7	3	-
	m	1	-	1	1	1	3	-	2	5	3	-
	w	1	2	4	3	2	-	-	1	2	-	-
XVI P00 - P96	i	37	35	27	31	31	19	22	25	22	18	19
	m	19	14	15	20	22	10	16	11	12	15	12
	w	18	21	12	11	9	9	6	14	10	3	7
dar. P00 - P04	i	4	5	2	6	2	4	1	-	2	1	2
	m	2	2	1	5	-	2	1	-	1	1	2
	w	2	3	1	1	2	2	-	-	1	-	-
P05, P07	i	20	9	9	3	9	1	6	7	3	6	7
	m	10	4	5	3	8	-	6	1	-	6	4
	w	10	5	4	-	1	1	-	6	3	-	3
P20 - P29	i	4	-	8	16	12	9	1	10	12	8	7
	m	4	-	5	7	8	6	-	6	8	6	6
	w	-	-	3	9	4	3	1	4	4	2	1
XVII Q00 - Q99	i	13	11	8	7	7	12	15	10	10	17	13
	m	10	9	3	3	4	3	10	5	6	10	6
	w	3	2	5	4	3	9	5	5	4	7	7
dar. Q20 - Q28	i	8	7	4	4	3	6	7	4	5	4	5
	m	6	6	2	2	1	-	4	2	3	2	3
	w	2	1	2	2	2	6	3	2	2	2	2
XVIII R95	i	8	-	3	1	9	3	4	5	2	3	4
	m	4	-	2	-	6	3	4	1	1	-	3
	w	4	-	1	1	3	-	-	4	1	3	1
XIX S00 - T98	i	6	1	3	2	3	6	4	4	3	4	4
	m	2	1	1	1	1	5	3	4	1	1	2
	w	4	-	2	1	2	1	1	-	2	3	2
Insgesamt A00 - T98	i	70	53	58	52	61	49	49	51	51	49	42
	m	38	25	24	28	37	29	36	26	30	31	25
	w	32	28	34	24	24	20	13	25	21	18	17
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	3
	m	-	1	1	1	1	3	1	2	1	-	2
	w	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
dar. W75 - W84	i	-	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-
	m	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
aus XX X85 - Y09	i	5	-	-	-	2	2	2	2	2	3	1
	m	2	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-
	w	3	-	-	-	2	1	-	-	2	2	1

Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I A00 - B99	i	11,5	5,8	-	11,7	17,0	5,8	5,8	-	11,8	11,9	11,7
	m	11,1	11,1	-	11,3	11,0	11,3	11,4	-	23,3	-	22,7
	w	12,0	-	-	12,1	23,2	-	-	-	-	24,2	-
VI G00 - G99	i	-	-	5,9	-	11,3	5,8	11,6	11,9	17,8	11,9	-
	m	-	-	-	-	11,0	11,3	22,7	11,6	-	23,4	-
	w	-	-	12,4	-	11,6	-	-	12,2	36,2	-	-
X J00 - J99	i	11,5	11,5	29,5	23,3	17,0	17,5	-	17,8	41,4	17,9	-
	m	11,1	-	11,3	11,3	11,0	33,9	-	23,1	58,1	35,1	-
	w	12,0	24,0	49,4	36,3	23,2	-	-	12,2	24,1	-	-
XVI P00 - P96	i	213,4	201,9	159,5	180,9	175,2	110,8	127,2	148,5	130,3	107,2	111,3
	m	210,8	155,3	169,7	225,5	242,3	113,0	181,8	127,1	139,6	175,6	136,1
	w	216,2	252,3	148,3	133,1	104,4	108,6	70,6	171,2	120,6	36,3	84,9
dar. P00 - P04	i	23,1	28,8	11,8	35,0	11,3	23,3	5,8	-	11,8	6,0	11,7
	m	22,2	22,2	11,3	56,4	-	22,6	11,4	-	11,6	11,7	22,7
	w	24,0	36,0	12,4	12,1	23,2	24,1	-	-	12,1	-	-
P05, P07	i	115,4	51,9	53,2	17,5	50,9	5,8	34,7	41,6	17,8	35,7	41,0
	m	111,0	44,4	56,6	33,8	88,1	-	68,2	11,6	-	70,2	45,4
	w	120,1	60,1	49,4	-	11,6	12,1	-	73,4	36,2	-	36,4
P20 - P29	i	23,1	-	47,3	93,4	67,8	52,5	5,8	59,4	71,1	47,6	41,0
	m	44,4	-	56,6	78,9	88,1	67,8	-	69,3	93,0	70,2	68,1
	w	-	-	37,1	108,9	46,4	36,2	11,8	48,9	48,3	24,2	12,1
XVII Q00 - Q99	i	75,0	63,4	47,3	40,9	39,6	70,0	86,7	59,4	59,2	101,2	76,2
	m	111	99,9	33,9	33,8	44,1	33,9	113,6	57,8	69,8	117,1	68,1
	w	36,0	24,0	61,8	48,4	34,8	108,6	58,8	61,1	48,3	84,8	84,9
dar. Q20 - Q28	i	46,1	40,4	23,6	23,3	17,0	35,0	40,5	23,8	29,6	23,8	29,3
	m	66,1	66,6	22,6	22,6	11,0	-	45,4	23,1	34,9	23,4	34,0
	w	24,0	12,0	24,7	24,2	23,2	72,4	35,3	24,5	24,1	24,2	24,2
XVIII R95	i	46,1	-	17,7	5,8	50,9	17,5	23,1	29,7	11,8	17,9	23,4
	m	44,4	-	22,6	-	66,1	33,9	45,4	11,6	11,6	-	34,0
	w	48,0	-	12,4	12,1	34,8	-	-	48,9	12,1	36,3	12,1
XIX S00 - T98	i	34,6	5,8	17,7	11,7	17,0	35,0	23,1	23,8	17,8	23,8	23,4
	m	22,2	11,1	11,3	11,3	11,0	56,5	34,1	46,2	11,6	11,7	22,7
	w	48,0	-	24,7	12,1	23,2	12,1	11,8	-	24,1	36,3	24,2
Insgesamt A00 - T98	i	403,8	305,7	342,6	303,5	344,7	285,8	283,2	302,9	302,0	291,7	246,1
	m	421,7	277,4	271,6	315,7	407,5	327,6	409,0	300,3	348,9	362,9	283,6
	w	384,4	336,3	420,3	290,4	278,5	241,2	153,0	305,7	253,3	218,0	206,1
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	5,8	5,8	5,9	5,8	5,7	17,5	11,6	11,9	5,9	6,0	17,6
	m	-	11,1	11,3	11,3	11,0	33,9	11,4	23,1	11,6	-	22,7
	w	12,0	-	-	-	-	-	11,8	-	-	12,1	12,1
dar. W75 - W84	i	-	5,8	5,9	-	-	11,7	-	5,9	5,9	6,0	-
	m	-	11,1	11,3	-	-	22,6	-	11,6	11,6	-	-
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-
aus XX X85 - Y09	i	28,8	-	-	-	11,3	11,7	11,6	11,9	11,8	17,9	5,9
	m	22,2	-	-	-	-	11,3	22,7	23,1	-	11,7	-
	w	36,0	-	-	-	23,2	12,1	-	-	24,1	24,2	12,1

Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2014

Im Jahr 2014 verstarben insgesamt 29 Kinder, davon 16 Jungen und 13 Mädchen, im Alter zwischen ein bis unter 15 Jahren. Gegenüber

dem Vorjahr waren damit 12 Kindersterbefälle mehr zu dokumentieren.

Kindersterbefälle 2004 - 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Ge-schl.	Gestorbene Kinder										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 - 5	i	16	21	8	15	16	18	18	14	10	7	12
	m	5	12	3	9	10	10	10	8	4	6	5
	w	11	9	5	6	6	8	8	6	6	1	7
5 - 10	i	13	2	2	7	10	9	9	6	10	5	9
	m	8	1	-	3	6	6	4	5	6	3	7
	w	5	1	2	4	4	3	5	1	4	2	2
10 - 15	i	10	12	12	6	9	9	15	8	4	5	8
	m	5	7	6	3	5	5	8	6	2	3	4
	w	5	5	6	3	4	4	7	2	2	2	4
Insgesamt	i	39	35	22	28	35	36	42	28	24	17	29
	m	18	20	9	15	21	21	22	19	12	12	16
	w	21	15	13	13	14	15	20	9	12	5	13

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2004 - 2014 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Ge-schl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 - 5	i	22,7	30,1	11,6	22,0	23,6	26,4	26,2	20,5	14,6	10,2	17,5
	m	13,7	33,4	8,5	25,7	28,6	28,5	28,3	22,8	11,4	17,2	14,3
	w	32,2	26,7	15,0	18,2	18,3	24,2	24,0	18,0	17,9	3,0	20,9
5 - 10	i	16,5	2,4	2,4	8,2	11,7	10,5	10,6	7,2	12,1	6,0	10,6
	m	19,7	2,4	-	6,8	13,5	13,6	9,1	11,7	14,1	7,0	16,1
	w	13,0	2,5	4,9	9,6	9,6	7,3	12,2	2,5	10,0	4,9	4,9
10 - 15	i	9,8	14,1	15,9	8,2	12,1	11,7	18,7	9,8	4,8	6,0	9,5
	m	9,5	15,9	15,5	7,9	13,1	12,7	19,4	14,3	4,7	6,9	9,2
	w	10,1	12,1	16,4	8,4	11,1	10,7	18,0	5,1	5,0	5,0	9,9
Insgesamt	i	15,5	14,8	9,6	12,3	15,3	15,6	18,0	12,0	10,2	7,2	12,2
	m	13,9	16,4	7,6	12,8	17,9	17,7	18,3	15,8	9,9	9,9	13,1
	w	17,2	13,0	11,7	11,8	12,7	13,4	17,7	8,0	10,6	4,4	11,3

Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2014

In diesem Berichtsjahr waren die **Krankheiten des Nervensystems** (27,6 %) gefolgt von den **nichtnatürlichen Todesursachen** (17,2 %) im Wesentlichen für den Tod im Kindesalter verantwortlich. Bei den nichtnatürlichen Todesfällen waren hauptsächlich häusliche Unfälle sowie Verkehrsunfälle ursächlich.

Neubildungen, Krankheiten des Atmungssystems und **Angeborene Fehlbildungen** führten zu je 13,8 % im Kindesalter zum Tod.

Kindersterbefälle 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I A00 - B99	i	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	w	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
II C00 - D48	i	6	3	4	3	12	3	6	5	4	4	4
	m	1	2	1	2	7	3	1	4	2	2	3
	w	5	1	3	1	5	-	5	1	2	2	1
dar. C81 - C96	i	3	1	-	1	3	-	2	1	1	2	-
	m	1	1	-	1	3	-	1	-	-	1	-
	w	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
IV E00 - E90	i	-	-	2	5	2	1	3	-	1	1	-
	m	-	-	1	4	1	1	2	-	1	1	-
	w	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
VI G00 - G99	i	9	9	4	4	4	5	6	4	-	-	8
	m	5	4	2	-	2	2	4	3	-	-	3
	w	4	5	2	4	2	3	2	1	-	-	5
IX I00 - I99	i	2	3	-	-	2	2	3	-	-	1	-
	m	1	2	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
X J00 - J99	i	-	2	1	2	3	2	4	4	2	1	4
	m	-	-	1	1	2	-	2	2	1	1	2
	w	-	2	-	1	1	2	2	2	1	-	2
XVII Q00 - Q99	i	7	3	6	4	4	7	6	2	7	2	4
	m	1	1	1	4	3	6	3	1	5	1	1
	w	6	2	5	-	1	1	3	1	2	1	3
XIX S00 - T98	i	13	11	5	7	8	15	12	12	7	7	5
	m	8	9	3	4	5	7	7	8	2	6	4
	w	5	2	2	3	3	8	5	4	5	1	1
Insgesamt A00 - T98	i	39	35	22	28	35	36	42	28	24	17	29
	m	18	20	9	15	21	21	22	19	12	12	16
	w	21	15	13	13	14	15	20	9	12	5	13
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	10	10	3	7	7	13	10	11	6	7	4
	m	6	8	2	4	5	6	5	7	2	6	3
	w	4	2	1	3	2	7	5	4	4	1	1
dar. V01 - V99	i	4	5	2	4	2	3	6	3	2	3	2
	m	1	4	2	1	1	1	2	2	-	2	2
	w	3	1	-	3	1	2	4	1	2	1	-
W65 - W74	i	4	1	1	1	2	3	2	3	3	3	1
	m	4	1	-	1	2	1	1	2	1	3	-
	w	-	-	1	-	-	2	1	1	2	-	1
X00 - X09	i	1	-	-	2	1	4	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
	w	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2004 - 2014 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I A00 - B99	i	0,4	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	0,4
	m	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8
	w	-	0,8	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
II C00 - D48	i	2,4	1,3	1,7	1,3	5,3	1,3	2,6	2,1	1,7	1,7	1,7
	m	0,8	1,6	0,8	1,7	6,0	2,5	0,8	3,3	1,7	1,6	2,5
	w	4,1	0,9	2,7	0,9	4,5	-	4,4	0,9	1,8	1,8	0,9
dar. C81 - C96	i	1,2	0,4	-	0,4	1,3	-	0,9	0,4	0,4	0,8	-
	m	0,4	0,8	-	0,9	2,6	-	0,8	-	-	0,8	-
	w	1,6	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-
IV E00 - E90	i	-	-	0,9	2,2	0,9	0,4	1,3	-	0,4	0,4	-
	m	-	-	0,8	3,4	0,9	0,8	1,7	-	0,8	0,8	-
	w	-	-	0,9	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-	-
VI G00 - G99	i	3,6	3,8	1,7	1,8	1,8	2,2	2,6	1,7	-	-	3,4
	m	2,0	1,7	1,7	-	1,7	1,7	3,3	2,5	-	-	2,5
	w	3,3	4,3	1,8	3,6	1,8	2,7	1,8	0,9	-	-	4,3
IX I00 - I99	i	0,8	1,3	-	-	0,9	0,9	1,3	-	-	0,4	-
	m	0,8	1,6	-	-	0,9	0,8	2,5	-	-	-	-
	w	0,8	0,9	-	-	0,9	0,9	-	-	-	0,9	-
X J00 - J99	i	-	0,8	0,4	0,9	1,3	0,9	1,7	1,7	0,9	0,4	1,7
	m	-	-	0,8	0,9	1,7	-	1,7	1,7	0,8	0,8	1,6
	w	-	1,7	-	0,9	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	-	1,7
XVII Q00 - Q99	i	2,8	2,8	2,6	1,8	1,8	3,0	2,6	0,9	3,0	0,8	1,7
	m	0,7	0,8	0,8	3,4	2,6	5,0	2,5	0,8	4,1	0,8	0,8
	w	4,9	1,7	4,5	-	0,9	0,9	2,7	0,9	1,8	0,9	2,6
XIX S00 - T98	i	5,2	4,6	2,2	3,1	3,5	6,5	5,1	5,2	3,0	3,0	2,1
	m	6,2	7,4	2,5	3,4	4,3	5,9	5,8	6,7	1,7	4,9	3,3
	w	4,1	1,7	1,8	2,7	2,7	7,2	4,4	3,5	4,4	0,9	0,9
Insgesamt A00 - T98	i	15,5	14,8	9,6	12,3	15,3	15,6	18,0	12,0	10,2	7,2	12,2
	m	13,9	16,4	7,6	12,8	17,9	17,7	18,3	15,8	9,9	9,9	13,1
	w	17,2	13,0	11,7	11,8	12,7	13,4	17,7	8,0	10,6	4,4	11,3
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	4,0	4,2	1,3	3,1	3,1	5,6	4,3	4,7	2,6	3,0	1,7
	m	4,6	6,5	1,7	3,4	4,3	5,0	4,2	5,8	1,7	4,9	2,5
	w	3,3	1,7	0,9	2,7	1,8	6,3	4,4	3,5	3,5	0,9	0,9
dar. V01 - V99	i	1,6	2,1	0,9	1,8	0,9	1,3	2,6	1,3	0,9	1,3	0,8
	m	0,8	3,3	1,7	0,9	0,9	0,8	1,7	1,7	-	1,6	1,6
	w	2,5	0,9	-	2,7	0,9	1,8	3,5	0,9	1,8	0,9	-
W65 - W74	i	1,6	0,4	0,4	0,4	0,9	1,3	0,9	1,3	1,3	1,3	0,4
	m	3,1	0,8	-	0,9	1,7	0,8	0,8	1,7	0,8	2,5	-
	w	-	-	0,9	-	-	1,8	0,9	0,9	1,8	-	0,9
X00 - X09	i	0,4	-	-	0,9	0,4	1,7	0,4	-	-	-	-
	m	-	-	-	0,9	0,9	1,7	0,8	-	-	-	-
	w	0,8	-	-	0,9	-	1,8	-	-	-	-	-

Veröffentlichungen ¹⁾ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Dezember 2015 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
3 A 1 19	A I - j/14	Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht - Stand: 31.12.2014 - Gemeinden	9,50
3 A 6 05	A VI - j/14	Arbeitsmarkt - Jahr 2014	4,00
3 B 1 02	B I - j/14	Allgemeinbildende Schulen - Schuljahr 2014/15 - Schuljahresendstatistik	7,50
3 E 1 09	E I - vj-2/15	Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - II. Quartal 2015	2,50
3 E 5 01	E V - j/14	Beschäftigte, Umsatz im Handwerk - Jahr 2014 -	1,50
3 G 4 02	G IV - m-4/15	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe - April 2015 -	1,50
3 H 1 01	H I - m-2/15	Straßenverkehrsunfälle – Februar 2015 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 L 3 02	L III - j/14	Personal im öffentlichen Dienst - Stand: 30.06.2014 -	6,50
3 P 1 02	P I - j/14	Entstehung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts sowie Einkommen der privaten Haushalte - 2000 bis 2014; Stand: Frühjahr 2015 -	8,00

1) Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen