



Gesundheitswesen

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2015



SACHSEN-ANHALT

Herausgabemonat: Dezember 2016

Zu beziehen durch das

Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt

Dezernat Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

Preis: 6,50 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestellnummer: 6A402)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Bildung, Soziales, Gesundheit

Frau Leuchte

Telefon: 0345 2318-205

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777

Telefon: 0345 2318-715

Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>

E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2016

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr - möglichst nach Vereinbarung

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Gestorbene nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Jahr 2015

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkungen	4
Ziel der Statistik	4
Erfassungsgrundlage	4
Rechtsgrundlage	4
Begriffserläuterungen	5
Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2015	6
Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2015 nach Geschlecht	7
Sterbefälle 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
Sterbefälle 1970 bis 2015 nach Geschlecht	8
Sterbefälle 2005 bis 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	10
Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2015	11
Sterbefälle 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	12
Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	14
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht	15
Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	17
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	19
Sterbefälle 2005 bis 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	22
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2005 bis 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	24
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	27
Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2005 bis 2015 nach Geschlecht	28
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2005 bis 2015 nach Geschlecht	29
Sterbefälle durch Neubildungen 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	31
Sterbefälle durch Neubildungen 2005 bis 2015 nach Geschlecht	32
Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2005 bis 2015 nach Geschlecht	33
Nichtnatürliche Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht	35
Unfalltote 2015 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	36
Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2015 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht	36
Unfälle 2005 bis 2015 nach Unfallkategorien und Geschlecht	38
Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2005 bis 2015 nach Unfallkategorien und Geschlecht	38
Nichtnatürliche Sterbefälle 2015 nach äußerer Ursache und Geschlecht	39
Nichtnatürliche Sterbefälle 2015 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht	40
Alkoholbedingte Sterbefälle 2010 und 2015 im Vergleich	43
Alkoholbedingte Sterbefälle 2010 und 2015 nach Altersgruppen im Vergleich	43
Mittleres Sterbealter seit 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	45
Vermeidbare Sterbefälle 2010 und 2015 im Vergleich	47

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2015	47
Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer	47
Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer	48
Säuglingssterblichkeit 2005 bis 2015 nach Geschlecht	48
Säuglingssterbefälle 1970 bis 2015 nach Geschlecht	49
Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2015	51
Säuglingssterbefälle 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	51
Säuglingssterbefälle 2005 bis 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	52
Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2005 bis 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	53
Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2015	54
Kindersterbefälle 2005 bis 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2005 bis 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	54
Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2015	54
Kindersterbefälle 2005 bis 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	55
Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2005 bis 2015 nach Todesursachen und Geschlecht	56
Grafiken:	
Grafik: Sterblichkeit 1970 - 2015 nach Geschlecht	9
Grafik: Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht	13
Grafik: Sterbefälle 2015 nach Todesursachen und Altersgruppen	16
Grafik: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen	21
Grafik: Sterblichkeit 1998 - 2015 nach Todesursachen	26
Grafik: Sterblichkeit durch Krankheiten des Kreislaufsystems 1998 - 2015	30
Grafik: Sterblichkeit durch Neubildungen 1998 - 2015	34
Grafik: Unfalltote 2015 nach Unfallkategorien und Geschlecht	37
Grafik: Suizide 2015 nach der äußeren Ursache und Geschlecht	41
Grafik: Suizidrate 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht	41
Grafik: Suizidrate 1980 - 2015 nach Geschlecht	42
Grafik: Alkoholbedingte Sterblichkeit 1980 - 2015 nach Geschlecht	44
Grafik: Säuglingssterblichkeit 1970 - 2015 nach Geschlecht	50

Vorbemerkungen

Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik ist mangels umfassender Morbiditätsstatistiken die am weitesten verbreitete Statistik zur Analyse der quantitativen Bedeutung einzelner Krankheiten. Aufgabe der Todesursachenstatistik ist es, eine Übersicht über die vorherrschenden Todesursachen einer Region zu geben.

Diese Statistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren und bietet vielfältige Analysemöglichkeiten zur Beurteilung und Bewertung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung.

Sie ermöglicht eine fundierte Todesursachenforschung, die die Einflussfaktoren der todesursachenspezifischen Sterblichkeit, ihre regionalen Besonderheiten und Veränderungen im Laufe der Zeit untersucht.

Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die Gesundheitspolitik und die epidemiologische Forschung abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Erfassungsgrundlage

Erfassungsgrundlage für die Todesursachenstatistik sind die vom Leichenschauarzt ausgestellte Todesbescheinigung sowie die vom Standesbeamten aufgrund der Todesfallanzeige erstellte Sterbefallzählkarte. Totgeburten, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen sind in der Todesursachenstatistik nicht enthalten.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unikausal aufbereitet, d. h. von den Angaben zur Todesursache im Totenschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen und signiert. Dies bedarf jedoch großer Genauigkeit und Korrektheit des Leichenschauarztes bei der Ausstellung der Todesbescheinigung.

Um überregionale Vergleiche der Sterblichkeit zu ermöglichen, ist eine weltweit einheitliche Erfassung und Klassifizierung der Todesursachen unerlässlich. Aus diesem Grund erfolgt die Signierung der Todesursachen anhand der von der WHO verabschiedeten "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme", in der Bundesrepublik Deutschland seit dem

01.01.1998 in der Fassung der 10. Revision (ICD-10).

In der amtlichen Todesursachenstatistik wurden in den Jahren 1980 bis 1997 Todesursachen nach der 9. Revision der ICD signiert. Das bedeutet, dass Zeitreihen nicht (bzw. noch nicht) problemlos fortgesetzt werden können - aus den ehemals 17 Todesursachenklassen wurden jetzt 20 - zumal ein praktikabler „Umsteiger“ nicht vorliegt. Wenn hier trotzdem der Versuch unternommen wird, Zeitreihen beginnend ab dem Jahr 1980 anzubieten, muss man sich der o. g. Unzulänglichkeiten bewusst sein.

Das Kapitel XX "Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität", das in den vorangegangenen Revisionen der ICD als ergänzende Klassifikation bestand, ermöglicht die Klassifizierung von Umweltereignissen und Umständen als Ursache von Verletzungen, Vergiftungen und anderen schädlichen Wirkungen. Dieser Zustand wird mit einer Schlüsselnummer aus dem Kapitel XIX "Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)" klassifiziert.

Neben der Todesursache werden Alter, Geschlecht und letzter Hauptwohnsitz des Verstorbenen sowie bei nichtnatürlichen Todesursachen außerdem die äußeren Ursachen (Unfälle und sonstige Gewaltwirkungen) erfasst. Bei Unfällen werden zusätzlich die Unfallkategorie (z. B. häuslicher Unfall, Verkehrsunfall usw.) registriert.

Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, unabhängig vom Sterbeort.

Für die Berechnung der Mortalitätsraten der Jahre ab 2011 wurden die Bevölkerungszahlen auf Basis der Zensusergebnisse 2011 verwendet. Zur Berechnung der Mortalitätsraten bis einschließlich 2010 sind die Bevölkerungszahlen auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung vom 03.10.1990 herangezogen worden.

Rechtsgrundlage

Bundesstatistikgesetz vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2016 (BGBl. I S. 1768) in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.03.1980 (BGBl. I S. 308). Zu berücksichtigen sind das Meldegesetz des Landes

Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 11.08.2004 (GVBl. LSA S. 506), das Personenstandsgesetz in der im BGBl. III, Gliederungsnr. 211-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, einschließlich späterer Änderungen, das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl. LSA Nr. 8 S. 45) und die Bestattungsverordnung vom 26.01.2005 (GVBl. LSA Nr. 6 S. 35).

Begriffserläuterungen

Allgemeine Sterbeziffern: Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die beim Vergleich von Absolutzahlen auftreten können, lassen sich mit Hilfe der mittleren Jahresbevölkerung nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der gestorbenen Männer bzw. Frauen im Alter a}}{\text{Mittlere männliche bzw. weibliche Bevölkerung im Alter a}} \times 100\,000$$

geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern (Sterbefälle je 100 000 Lebenden gleichen Geschlechts und Alters) für jede Todesursache einzeln und insgesamt berechnen.

Fehlgeburt: Eine Fehlgeburt, auch Abort genannt, ist als eine vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft mit oder ohne Ausstoßung der abgestorbenen Frucht mit einem Gewicht unter 500 g und vor Beginn der 24. Schwangerschaftswoche definiert. Eine Fehlgeburt unterliegt, anders als die Totgeburt, nicht der standesamtlichen Meldepflicht.

Frühsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene in den ersten 7 Lebenstagen angibt. Sie betrifft vor allem Kinder, die frühgeboren und untergewichtig sind, mit Fehlbildungen zur Welt kommen oder unter den Folgen von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen leiden.

Gestorbene: Die Begriffe Gestorbene und Sterbefälle sind inhaltlich identisch. Nicht berücksichtigt werden Totgeborene, nachträglich vom Standesamt beurkundete Sterbefälle aus früheren Jahren (Kriegssterbefälle) und gerichtliche Todeserklärungen.

Grundleiden: Unter Grundleiden versteht man die Krankheit oder Verletzung, die die Kausalkette der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

Kindersterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Kinder im Alter von 1 bis unter 15 Jahren angibt.

Lebendgeborene: Geborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz ge-

schlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat. Die Begriffe Lebendgeborene und Lebendgeburten unterscheiden sich inhaltlich nicht.

Mittleres Sterbealter: Gibt an, wie hoch das durchschnittliche Alter des an einer Todesursache Verstorbenen war.

Müttersterbefall: Als Müttersterbefall gilt der Tod jeder Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach Beendigung der Schwangerschaft, unabhängig von Dauer und Sitz der Schwangerschaft. Dabei gilt jede Ursache, die in Beziehung zur Schwangerschaft oder deren Behandlung steht oder durch diese verschlechtert wird, nicht aber Unfälle oder zufällige Ereignisse.

Nachsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von 28 bis 364 Tagen angibt.

Perinatale Mortalität: Die perinatale Mortalität oder perinatale Sterblichkeit gibt die Anzahl der Todesfälle in der Perinatalperiode an, also dem Zeitraum zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und dem 7. Tag nach der Geburt. Diese Zahl wird dabei auf die Gesamtzahl von 1 000 Lebend- und Totgeborenen bezogen und nach der Formel

$$\frac{\text{Anzahl der Totgeborenen und Zahl der in den ersten 7 Lebenstagen Gestorbenen}}{\text{Anzahl der Lebend- und Totgeborenen}} \times 1\,000$$

berechnet. Die perinatale Sterblichkeit ist eindeutig eine Sterbeziffer. Systematisch steht sie allerdings zwischen Geburten- und Sterbestatistik, da die Totgeborenen definitionsgemäß zu den Geburten und nicht zu den Sterbefällen zählen.

Säuglinge: Kinder im Alter von 0 bis unter 1 Jahr, d. h. Kinder von der Geburt bis vor Vollendung des 1. Lebensjahres.

Säuglingssterblichkeit: Findet ihren Ausdruck in der Säuglingssterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge auf 1 000 Lebendgeborene des gleichen Zeitraumes bezieht. Die Höhe der Säuglingssterblichkeit ist abhängig von zahlreichen biologischen, medizinischen und sozialen Faktoren, die bei einer Analyse als Merkmal benutzt werden, z. B. Geschlecht, Alter, Geburtsgewicht, Todesursache, Legitimität der Mutter.

Spätsterblichkeit: Sterbeziffer, die die Zahl der gestorbenen Säuglinge je 1 000 Lebendgeborene im Alter von sieben bis 27 Tagen angibt.

Totgeborene: Neugeborene, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib weder das Herz geschlagen, die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat, deren Geburtsgewicht aber mindestens 500 g betrug.

Totgeborenenrate: Totgeborene je 1 000 Geborene (Lebend- und Totgeborene).

Vermeidbare Sterbefälle: Als vermeidbare Sterbefälle werden Sterbefälle bezeichnet, die bei angemessener Krankheitsprävention oder Therapie hätten verhindert werden können. Die Kennziffer der vermeidbaren Sterbefälle richtet sich im Wesentlichen nach einem Konzept des Sachverständigenrates für die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Danach gelten spezifische Todesursachen in bestimmten Altersgruppen als vermeidbar. Die vermeidbaren Sterbefälle werden je 100 000 Einwohner angegeben.

Arbeitsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Erwerbstätigen in Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Arbeit. Erfolgt der Verkehrsunfall in der Ausübung der Arbeit (z. B. Busfahren) so ist dieser Unfall als "Arbeitsunfall" anzusehen.

Schulunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten, innerhalb der Schule oder Hochschule oder bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, ausgenommen Unfälle auf dem Weg zur Schule.

Verkehrsunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle im öffentlichen Verkehr, auch auf privaten

Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasser, Luft) einschließlich der Unfälle auf dem Weg zur Arbeit.

Häuslicher Unfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet die Unfälle im häuslichen Bereich, die sich bei hauswirtschaftlicher oder sonstiger Tätigkeit ereignen. Auszugrenzen sind Arbeitsunfälle im häuslichen Bereich (siehe Definition „Arbeitsunfall“). Unfälle von Hausfrauen bei ihrer Tätigkeit sind hingegen häusliche Unfälle.

Sport- oder Spielunfall: Diese Unfallkategorie beinhaltet Unfälle, die sich während der Freizeit, bei Sport und Spiel, bei einer Hobbytätigkeit oder bei einer sonstigen Freizeitbeschäftigung ereignen, sofern diese nicht als Arbeits-, Schul- oder als häuslicher Unfall anzusehen sind.

Sonstiger Unfall: Diese Kategorie umfasst alle sonst nicht einzuordnenden Unfälle bzw. Unfälle unbekannter Kategorie.

Zeichenerklärung:

- Nichts vorhanden, das Zeichen " - " steht für den mathematisch exakten Wert Null.
- 0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
- x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.

Zur Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2015

Im Jahr 2015 starben bundesweit insgesamt 32 369 Personen mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt, davon waren 16 024 männlichen sowie 16 345 weiblichen Geschlechts.

Im aktuellen Berichtsjahr verstarben insgesamt 1 539 Personen, davon 887 Männer und 652 Frauen, mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Sterbefälle stieg gegenüber dem Jahr 2014 damit um 5,0 % an.

Je 100 000 Einwohner Sachsen-Anhalts verstarben im Berichtsjahr 1 445 Personen, im Vorjahr 1 376 Personen und vor zehn Jahren 1 179 Personen. Die Sterblichkeit erreichte im Berichtsjahr nun den höchsten Wert seit 1970. Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre, so stellt man eine Zunahme der Sterblichkeit fest. Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es hierbei keine. Starben 2005 noch 1 156 Männer bzw. 1 202 Frauen je 100 000 der Bevölkerung, so waren es in diesem Berichtsjahr schon 1 455 Männer bzw. 1 435 Frauen.

Insgesamt war auch 2015 - wie in den vergangenen

Jahren - die Sterblichkeit der weiblichen Personen höher als die der männlichen Personen. Bedingt durch die Altersstruktur und einen Frauenüberschuss von 0,8 %, verstarben 1,0 % mehr Frauen als Männer. Allerdings ist der Geschlechterunterschied bei der Sterblichkeit in den letzten Jahren sichtbar zurückgegangen.

Die Entwicklung der Altersstruktur in Sachsen-Anhalt beeinflusst auch die Anteile an den Gesamtsterbefällen in den Altersgruppen. So stellte die Altersgruppe der über 75-Jährigen mit 67,5 % die meisten Sterbefälle, 2005 lag deren Anteil noch bei 58,1 % aller Sterbefälle. Seit Jahren ist in allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 80-Jährigen eine wesentlich höhere Zahl an männlichen Verstorbenen zu beobachten.

Zwischen den Jahren 1980 und 1999 konnte eine sinkende Sterblichkeit beobachtet werden. Auch wenn im aktuellen Berichtsjahr die Sterblichkeit leicht rückläufig gewesen ist, so kann ab dem Jahr 2004 insgesamt von einer tendenziellen Zunahme der Sterblichkeit gesprochen werden.

Anteile der Altersgruppen an den Sterbefällen 2015 nach Geschlecht


Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	65	0,2	37	0,2	28	0,2
1 - 15	30	0,1	18	0,1	12	0,1
15 - 35	232	0,7	159	1,0	73	0,4
35 - 55	1 741	5,4	1 219	7,6	522	3,2
55 - 75	8 449	26,1	5 596	34,9	2 853	17,4
75 und mehr	21 852	67,5	8 995	56,2	12 857	78,7
Insgesamt	32 369	100	16 024	100	16 345	100

Sterbefälle 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	65	37	28	3,72	4,13	3,29
1 - 2	8	3	5	0,46	0,33	0,59
2 - 3	4	4	-	0,23	0,45	-
3 - 4	3	1	2	0,17	0,11	0,24
4 - 5	1	-	1	0,06	-	0,12
5 - 10	6	5	1	0,07	0,11	0,02
10 - 15	8	5	3	0,09	0,11	0,07
15 - 18	7	4	3	0,14	0,15	0,12
18 - 20	16	12	4	0,50	0,71	0,27
20 - 25	35	24	11	0,40	0,51	0,27
25 - 30	66	51	15	0,48	0,69	0,24
30 - 35	108	68	40	0,82	0,96	0,65
35 - 40	131	92	39	1,08	1,42	0,69
40 - 45	224	159	65	1,77	2,38	1,09
45 - 50	463	315	148	2,72	3,60	1,79
50 - 55	923	653	270	4,61	6,46	2,72
55 - 60	1 405	985	420	7,60	10,73	4,51
60 - 65	1 877	1 283	594	10,53	14,75	6,50
65 - 70	1 916	1 277	639	15,17	21,39	9,60
70 - 75	3 251	2 051	1 200	22,32	30,94	15,12
75 - 80	5 265	2 979	2 286	37,27	49,38	28,25
80 - 85	5 798	2 861	2 937	70,48	92,46	57,22
85 - 90	5 821	2 094	3 727	126,66	153,10	115,46
90 - 95	3 795	867	2 928	220,59	245,54	214,14
95 - 100	970	168	802	373,65	418,95	365,38
100 und mehr	203	26	177	579,17	619,05	573,74
Insgesamt	32 369	16 024	16 345	14,45	14,55	14,35

Sterbefälle 1970 - 2015 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle			Sterbefälle je 1 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	44 918	21 570	23 348	13,95	14,45	13,51
1971	43 045	20 355	22 690	13,39	13,65	13,17
1972	43 683	20 712	22 971	13,62	13,88	13,38
1973	42 933	20 201	22 732	13,46	13,60	13,33
1974	42 773	20 159	22 614	13,48	13,63	13,35
1975	44 990	21 020	23 970	14,28	14,28	14,27
1976	43 226	19 999	23 227	13,81	13,67	13,93
1977	41 826	19 620	22 206	13,42	13,45	13,39
1978	43 459	20 207	23 252	13,99	13,87	14,09
1979	43 554	20 243	23 311	14,07	13,93	14,20
1980	44 448	20 623	23 825	14,41	14,23	14,58
1981	43 258	19 780	23 478	14,08	13,67	14,44
1982	42 306	19 350	22 956	13,84	13,45	14,20
1983	41 628	18 762	22 866	13,65	13,05	14,19
1984	41 595	18 766	22 829	13,68	13,07	14,23
1985	41 930	18 966	22 964	13,85	13,25	14,39
1986	41 887	18 528	23 359	13,90	12,98	14,73
1987	40 128	17 835	22 293	13,34	12,48	14,12
1988	40 009	17 998	22 011	13,31	12,55	14,00
1989	38 127	17 301	20 826	12,73	12,07	13,34
1990	38 711	18 118	20 593	13,39	13,14	13,62
1991	38 203	17 859	20 344	13,41	13,13	13,66
1992	35 754	16 726	19 028	12,73	12,43	13,00
1993	34 838	16 546	18 292	12,49	12,34	12,64
1994	33 816	15 929	17 887	12,21	11,93	12,48
1995	33 519	15 816	17 703	12,19	11,89	12,46
1996	32 639	15 539	17 100	11,95	11,74	12,14
1997	30 892	14 294	16 598	11,38	10,85	11,88
1998	31 011	14 496	16 515	11,53	11,10	11,94
1999	30 059	14 076	15 983	11,29	10,88	11,67
2000	30 175	14 298	15 877	11,46	11,17	11,73
2001	29 621	13 954	15 667	11,40	11,04	11,74
2002	30 159	14 250	15 909	11,76	11,41	12,09
2003	29 632	14 062	15 570	11,69	11,38	11,98
2004	29 008	13 892	15 116	11,56	11,34	11,76
2005	29 277	14 002	15 275	11,79	11,56	12,02
2006	29 151	13 980	15 171	11,87	11,65	12,08
2007	29 392	14 059	15 333	12,11	11,84	12,36
2008	29 905	14 344	15 561	12,47	12,23	12,71
2009	30 480	14 690	15 790	12,87	12,67	13,06
2010	30 729	14 781	15 948	13,10	12,87	13,33
2011	30 183	14 780	15 403	13,20	13,23	13,17
2012	30 321	14 786	15 535	13,37	13,34	13,40
2013	31 385	15 411	15 974	13,94	13,99	13,89
2014	30 830	15 137	15 693	13,76	13,80	13,73
2015	32 369	16 024	16 345	14,45	14,55	14,35



Zu den Todesursachen in Sachsen-Anhalt 2015

Die Haupttodesursachenklasse stellte 2015 - wie auch in den vergangenen Jahren - mit 43,8 % aller Todesfälle die **Krankheiten des Kreislaufsystems**. Daran starben insgesamt 6 238 Männer und 7 940 Frauen. Bezogen auf 100 000 Einwohner waren im Jahr 2015 insgesamt 633 Personen einem Herz-Kreislaufleiden erlegen. Im Vorjahr verstarben 613 Personen je 100 000 Einwohner an diesem Leiden. Allein an ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt, verstarben 6 042 Personen. Herzinfarkt führte bei wesentlich mehr Männern (1 349 Sterbefälle) als Frauen (1 006 Sterbefälle) zum Tode. Dagegen waren von zerebrovaskulären Erkrankungen, wozu auch Schlaganfälle gerechnet werden, deutlich mehr Frauen (1 119 Sterbefälle) als Männer (819 Sterbefälle) betroffen.

Als zweithäufigste Todesursachenklasse waren die **Neubildungen** mit 25,9 % vertreten, darunter mit 25,2 % die bösartigen Neubildungen („Krebs“). Bezogen auf 100 000 Einwohner starben im Berichtsjahr 375 Personen an Krebserkrankungen und damit genauso viele wie im Vorjahr. Am häufigsten traten hier bösartige Neubildungen im Bereich der Verdauungsorgane mit 32,2 % aller an Krebs Verstorbenen auf, gefolgt vom Lungenkrebs mit 18,7 %. Bei 14,8 % der im Jahr 2015 an Krebs verstorbenen Frauen wurde Brustkrebs als Todesursache festgestellt.

Mit 1 739 Verstorbenen bzw. 5,4 % aller Sterbefälle folgten an dritter Stelle die **Krankheiten des Atmungssystems**. Dabei waren insbesondere die chronischen Krankheiten der unteren Atemwege auffällig, die mit 57,4 % aller Atemwegserkrankungen deutlich mehr als die Hälfte ausmachten. Das entsprach 3,1 % der Gesamtsterbefälle bzw. 45 Personen je 100 000 Einwohner im Jahr 2015.

Dicht hinter den Krankheiten des Atmungssystems folgten **Krankheiten des Verdauungssystems** mit 1 532 Sterbefällen und einem Anteil von 4,7 % aller Todesfälle im Berichtsjahr. Hier fielen wiederum die Leberkrankheiten auf, wobei der männliche Personenanteil aller an diesem Leiden Verstorbenen im Berichtsjahr knapp drei Viertel ausmachte. Von den Krankheiten der Leber waren 72,1 % alkoholbedingt. Das entsprach 1,6 % der Gesamtsterbefälle bzw. 23 Personen je 100 000 Einwohner.

Die **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten** folgten mit 1 583 Todesfällen bzw. 4,9 % aller Verstorbenen an fünfter Stelle. Diese Klasse wurde insbesondere vom Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit") geprägt. Für 1 333 Frauen und Männer mit Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt war dies die Todesursache. Gegen-

über dem Vorjahr war hierbei ein Zuwachs auf 4,1 % aller Sterbefälle zu verzeichnen. 56,4 % der an Diabetes mellitus Verstorbenen waren Frauen.

Die Zahl derer, die an einem nichtnatürlichen Tod verstarben stieg geringfügig auf 1 296 Sterbefälle an. Das entsprach einem Anteil von 4,0 % aller im Berichtsjahr Verstorbenen. Dabei erlagen mit 805 Sterbefällen deutlich mehr Männer als Frauen an **Verletzungen und Vergiftungen**.

Durch Verkehrsunfälle verstarben im Berichtsjahr 153 Personen, davon 118 Männer und 35 Frauen. Gegenüber dem Vorjahr waren das 11 Verkehrstote mehr. Einem Arbeits- oder Schulunfall mit Todesfolge erlagen im Berichtsjahr 15 Männer. Etwas mehr als die Hälfte aller tödlichen Unfälle konnten den häuslichen Unfällen zugerechnet werden, überwiegend als Folge eines Sturzes älterer Menschen. An einem Sport- und Spielunfall erlagen 7 Personen.

Suizid (Selbsttötung) begingen im Berichtsjahr 373 Einwohner, davon 289 Männer und 84 Frauen.

Die Anzahl der durch Mord und Totschlag Getöteten betrug im Berichtsjahr 23, davon 14 männliche und 9 weibliche Personen.

Die Haupttodesursache in der Altersgruppe der über 75-jährigen Männer und Frauen waren die Krankheiten des Kreislaufsystems mit 51,9 %, gefolgt von den Neubildungen mit 20,1 % und den Krankheiten der Atmungsorgane mit 5,4 %. Bei den unter 75-Jährigen waren hingegen die Neubildungen mit 38,2 % die Haupttodesursache. Erst an zweiter Stelle folgten hier mit 27,2 % die Krankheiten des Kreislaufsystems. Mit einem Anteil von 7,5 % rangierten hier die Krankheiten des Verdauungssystems an dritter Stelle. Verletzungen und Vergiftungen waren mit 43,1 % die häufigste Todesursache bei den unter 35-Jährigen, zum überwiegenden Teil infolge eines Verkehrsunfalls. Mit Anteilen von 14,1 % und 8,0 % folgten hier die Neubildungen bzw. Krankheiten des Kreislaufsystems.

Das mittlere Sterbealter betrug im Jahr 2015 insgesamt 77,2 Jahre (73,4 Jahre bei Männern bzw. 81,0 Jahre bei Frauen). Im Jahr 2003 lag dieses noch bei 74,4 Jahren.


Das mittlere Sterbealter bei den Todesursachenklassen lag im Berichtsjahr für angeborene Fehlbildungen mit 35,8 Jahren am niedrigsten, hingegen mit 82,1 Jahren für Krankheiten des Urogenitalsystems am höchsten.

Sterbefälle 2015 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	340	1,0	149	0,9	191	1,2
II Neubildungen (C00 - D48)	8 395	25,9	4 680	29,2	3 715	22,7
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	8 172	25,2	4 577	28,6	3 595	22,0
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	56	0,2	28	0,2	28	0,2
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 583	4,9	686	4,3	897	5,5
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	1 333	4,1	581	3,6	752	4,6
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	1 025	3,2	488	3,0	537	3,3
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	915	2,8	426	2,7	489	3,0
VII - Krankheiten des Auges und des VIII Ohres (H00 - H95)	2	0,0	2	0,0	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	14 178	43,8	6 238	38,9	7 940	48,6
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	2 355	7,3	1 349	8,4	1 006	6,2
Chron. ischäm. Herzkrankheit (I25)	3 627	11,2	1 771	11,1	1 856	11,4
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	1 938	6,0	819	5,1	1 119	6,8
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	1 739	5,4	970	6,1	769	4,7
dar. Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	999	3,1	581	3,6	418	2,6
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	1 532	4,7	900	5,6	632	3,8
dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	712	2,2	517	3,2	195	1,2
XII - Krankheiten der Haut, des Muskel- XIII Skelett-Systems und des Bindegewebes (L00 - M99)	135	0,4	51	0,3	84	0,5
XIV Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	735	2,3	314	2,0	421	2,6
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	-	-	x	x	-	-
XVI Perinatalperiode (P00 - P96)	27	0,1	14	0,1	13	0,1
XVII Angeb. Fehlbildungen (Q00 - Q99)	66	0,2	40	0,2	26	0,1
XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	345	1,1	233	1,5	112	0,7
XIX Verletzungen, Vergiftungen, Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	1 296	4,0	805	5,0	491	3,0
Insgesamt (A00 - T98)	32 369	100	16 024	100	16 345	100

**Sterbefälle 2015
nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht**

Männer



Frauen




Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	340	1	4	13	82	239
	m	149	1	2	9	52	84
	w	191	-	2	4	30	155
II C00 - D48	i	8 395	4	33	564	3 390	4 402
	m	4 680	3	20	313	2 101	2 243
	w	3 715	1	13	251	1 289	2 159
dar. C00 - C97	i	8 172	4	31	559	3 337	4 240
	m	4 577	3	19	312	2 068	2 175
	w	3 595	1	12	247	1 269	2 065
dar. C15 - C26	i	2 630	-	7	139	1 025	1 458
	m	1 450	-	3	83	670	694
	w	1 180	-	4	56	355	764
IV E00 - E90	i	1 583	3	17	65	392	1 106
	m	686	1	10	44	240	391
	w	897	2	7	21	152	715
dar. E10 - E14	i	1 333	1	4	32	310	986
	m	581	-	4	24	198	355
	w	752	1	-	8	112	631
V F00 - F99	i	1 025	-	9	94	225	697
	m	488	-	6	84	179	219
	w	537	-	3	10	46	478
VI G00 - G99	i	915	4	12	59	200	637
	m	426	3	7	35	113	267
	w	489	1	5	24	87	370
IX I00 - I99	i	14 178	2	19	382	2 437	11 338
	m	6 238	2	11	297	1 686	4 242
	w	7 940	-	8	85	751	7 096
dar. I21, I22	i	2 355	-	2	157	708	1 488
	m	1 349	-	-	133	515	701
	w	1 006	-	2	24	193	787
I60 - I69	i	1 938	-	4	52	359	1 523
	m	819	-	3	33	223	560
	w	1 119	-	1	19	136	963
X J00 - J99	i	1 739	2	4	36	507	1 186
	m	970	1	3	25	351	589
	w	769	1	1	11	156	597
dar. J40 - J47	i	999	1	1	20	359	618
	m	581	-	-	14	249	318
	w	418	1	1	6	110	300
XI K00 - K93	i	1 532	-	8	208	570	746
	m	900	-	5	165	413	317
	w	632	-	3	43	157	429
dar. K70 - K77	i	712	-	6	167	384	155
	m	517	-	5	134	293	85
	w	195	-	1	33	91	70
XIV N00 - N99	i	735	-	1	13	94	627
	m	314	-	-	9	52	253
	w	421	-	1	4	42	374
XIX S00 - T98	i	1 296	7	106	197	338	643
	m	805	3	83	157	257	302
	w	491	4	23	40	81	341
Insgesamt A00 - T98	i	32 369	30	232	1 741	8 449	21 852
	m	16 024	18	159	1 219	5 596	8 995
	w	16 345	12	73	522	2 853	12 857

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2015 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	darunter in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			1 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
I A00 - B99	i	15,2	0,4	0,9	2,1	12,9	82,5
	m	13,5	0,8	0,9	2,8	17,1	77,1
	w	16,8	-	1,0	1,3	9,1	85,8
II C00 - D48	i	374,7	1,7	7,5	91,2	533,7	1 519,8
	m	425,0	2,4	8,5	97,8	689,4	2 059,2
	w	326,1	0,9	6,4	84,2	390,1	1 194,7
dar. C00 - C97	i	364,7	1,7	7,1	90,4	525,3	1 463,9
	m	415,6	2,4	8,1	97,5	678,6	1 996,8
	w	315,6	0,9	5,9	82,8	384,0	1 142,7
dar. C15 - C26	i	117,4	-	1,6	22,5	161,4	503,4
	m	131,7	-	1,3	25,9	219,9	637,1
	w	103,6	-	2,0	18,8	107,4	422,8
IV E00 - E90	i	70,7	1,2	3,9	10,5	61,7	381,9
	m	62,3	0,8	4,3	13,7	78,8	359,0
	w	78,7	1,7	3,4	7,0	46,0	395,7
dar. E10 - E14	i	59,5	0,4	0,9	5,2	48,8	340,4
	m	52,8	-	1,7	7,5	65,0	325,9
	w	66,0	0,9	0,0	2,7	33,9	349,2
V F00 - F99	i	45,7	-	2,1	15,2	35,4	240,6
	m	44,3	-	2,6	26,2	58,7	201,1
	w	47,1	-	1,5	3,4	13,9	264,5
VI G00 - G99	i	40,8	1,7	2,7	9,5	31,5	219,9
	m	38,7	2,4	3,0	10,9	37,1	245,1
	w	42,9	0,9	2,4	8,0	26,3	204,7
IX I00 - I99	i	632,8	0,8	4,3	61,8	383,7	3 914,5
	m	566,5	1,6	4,7	92,8	553,3	3 894,4
	w	696,9	-	3,9	28,5	227,3	3 926,6
dar. I21, I22	i	105,1	-	0,5	25,4	111,5	513,7
	m	122,5	-	0,0	41,5	169,0	643,6
	w	88,3	-	1,0	8,0	58,4	435,5
I60 - I69	i	86,5	-	0,9	8,4	56,5	525,8
	m	74,4	-	1,3	10,3	73,2	514,1
	w	98,2	-	0,5	6,4	41,2	532,9
X J00 - J99	i	77,6	0,8	0,9	5,8	79,8	409,5
	m	88,1	0,8	1,3	7,8	115,2	540,7
	w	67,5	0,9	0,5	3,7	47,2	330,4
dar. J40 - J47	i	44,6	0,4	0,2	3,2	56,5	213,4
	m	52,8	-	-	4,4	81,7	291,9
	w	36,7	0,9	0,5	2,0	33,3	166,0
XI K00 - K93	i	68,4	-	1,8	33,6	89,7	257,6
	m	81,7	-	2,1	51,5	135,5	291,0
	w	55,5	-	1,5	14,4	47,5	237,4
dar. K70 - K77	i	31,8	-	1,4	27,0	60,5	53,5
	m	46,9	-	2,1	41,9	96,1	78,0
	w	17,1	-	0,5	11,1	27,5	38,7
XIV N00 - N99	i	32,8	-	0,2	2,1	14,8	216,5
	m	28,5	-	-	2,8	17,1	232,3
	w	37,0	-	0,5	1,3	12,7	207,0
XIX S00 - T98	i	57,8	2,9	24,2	31,9	53,2	222,0
	m	73,1	2,4	35,4	49,0	84,3	277,3
	w	43,1	3,4	11,3	13,4	24,5	188,7
Insgesamt A00 - T98	i	1 444,7	12,4	52,9	281,6	1 330,1	7 544,6
	m	1 455,1	14,5	67,9	380,8	1 836,3	8 258,0
	w	1 434,7	10,3	35,7	175,0	863,3	7 114,5

Sterbefälle 2015 nach Todesursachen und Altersgruppen in %



Anmerkung: Damit die Grafik übersichtlich bleibt, sind die Anteile der Todesursachenklassen, deren berechnete Werte weniger als 1 ergeben, der Rubrik "Übrige" zugeordnet worden. In der Rubrik "Übrige" sind ebenfalls die hier nicht aufgeführten Todesursachenklassen III, XII, XIII, XV, XVI, XVII und XVIII enthalten. Die Todesursachenklassen V-VIII sind in der Grafik zusammengefasst worden.

Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	II (C00 - D48)			IV (E00 - E90)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	352	185	167	54	21	33
Halle (Saale), Stadt	896	514	382	140	58	82
Magdeburg, Stadt	791	421	370	116	55	61
Altmarkkreis Salzwedel	291	159	132	58	28	30
Anhalt-Bitterfeld	642	355	287	112	49	63
Börde	607	356	251	115	54	61
Burgenlandkreis	689	390	299	140	54	86
Harz	860	467	393	187	76	111
Jerichower Land	334	210	124	95	43	52
Mansfeld-Südharz	572	343	229	133	58	75
Saalekreis	663	358	305	120	49	71
Salzlandkreis	768	408	360	147	66	81
Stendal	439	247	192	91	38	53
Wittenberg	491	267	224	75	37	38
Sachsen-Anhalt	8 395	4 680	3 715	1 583	686	897

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	VI (G00 - G99)			IX (I00 - I99)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	40	23	17	549	236	313
Halle (Saale), Stadt	88	45	43	1 264	522	742
Magdeburg, Stadt	83	42	41	1 203	506	697
Altmarkkreis Salzwedel	30	17	13	496	236	260
Anhalt-Bitterfeld	45	20	25	1 256	541	715
Börde	56	22	34	1 039	488	551
Burgenlandkreis	107	57	50	1 242	560	682
Harz	99	29	70	1 546	648	898
Jerichower Land	46	20	26	541	226	315
Mansfeld-Südharz	63	36	27	888	394	494
Saalekreis	75	31	44	1 105	514	591
Salzlandkreis	58	22	36	1 543	677	866
Stendal	50	27	23	649	288	361
Wittenberg	75	35	40	857	402	455
Sachsen-Anhalt	915	426	489	14 178	6 238	7 940

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	X (J00 - J99)			XI (K00 - K93)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	80	36	44	60	36	24
Halle (Saale), Stadt	176	88	88	146	90	56
Magdeburg, Stadt	198	100	98	142	78	64
Altmarkkreis Salzwedel	85	54	31	49	20	29
Anhalt-Bitterfeld	106	55	51	112	66	46
Börde	104	64	40	97	56	41
Burgenlandkreis	134	75	59	138	83	55
Harz	182	103	79	157	95	62
Jerichower Land	57	31	26	68	37	31
Mansfeld-Südharz	115	80	35	112	77	35
Saalekreis	135	78	57	116	64	52
Salzlandkreis	154	87	67	127	78	49
Stendal	108	57	51	101	61	40
Wittenberg	105	62	43	107	59	48
Sachsen-Anhalt	1 739	970	769	1 532	900	632

Noch: Sterbefälle in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XIX (S00 - T98)			insges. (A00 - T98)		
Land	Sterbefälle					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	51	29	22	1 287	617	670
Halle (Saale), Stadt	106	59	47	3 092	1 517	1 575
Magdeburg, Stadt	120	79	41	2 919	1 421	1 498
Altmarkkreis Salzwedel	52	36	16	1 150	590	560
Anhalt-Bitterfeld	75	45	30	2 548	1 217	1 331
Börde	83	53	30	2 291	1 186	1 105
Burgenlandkreis	134	79	55	2 815	1 403	1 412
Harz	145	94	51	3 474	1 643	1 831
Jerichower Land	56	31	25	1 306	656	650
Mansfeld-Südharz	92	64	28	2 184	1 139	1 045
Saalekreis	110	68	42	2 521	1 257	1 264
Salzlandkreis	113	73	40	3 157	1 535	1 622
Stendal	68	43	25	1 673	854	819
Wittenberg	91	52	39	1 952	989	963
Sachsen-Anhalt	1 296	805	491	32 369	16 024	16 345

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	II (C00 - D48)			IV (E00 - E90)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	424,1	459,7	390,7	65,1	52,2	77,2
Halle (Saale), Stadt	381,7	455,1	313,7	59,6	51,3	67,3
Magdeburg, Stadt	338,0	367,1	310,1	49,6	48,0	51,1
Altmarkkreis Salzwedel	337,9	369,5	306,3	67,3	65,1	69,6
Anhalt-Bitterfeld	389,2	439,0	341,4	67,9	60,6	74,9
Börde	350,6	411,7	289,5	66,4	62,5	70,4
Burgenlandkreis	374,3	428,5	321,3	76,1	59,3	92,4
Harz	390,0	432,0	349,7	84,8	70,3	98,8
Jerichower Land	364,9	460,0	270,3	103,8	94,2	113,4
Mansfeld-Südharz	403,6	490,9	318,6	93,8	83,0	104,4
Saalekreis	355,6	388,3	323,5	64,4	53,1	75,3
Salzlandkreis	390,4	424,9	357,5	74,7	68,7	80,4
Stendal	381,9	434,5	330,4	79,2	66,8	91,2
Wittenberg	381,9	421,9	343,1	58,3	58,5	58,2
Sachsen-Anhalt	374,7	425,0	326,1	70,7	62,3	78,7

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht


Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	VI (G00 - G99)			IX (I00 - I99)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	48,2	57,2	39,8	661,5	586,4	732,2
Halle (Saale), Stadt	37,5	39,8	35,3	538,5	462,1	609,3
Magdeburg, Stadt	35,5	36,6	34,4	514,1	441,2	584,1
Altmarkkreis Salzwedel	34,8	39,5	30,2	576,0	548,5	603,4
Anhalt-Bitterfeld	27,3	24,7	29,7	761,5	668,9	850,5
Börde	32,3	25,4	39,2	600,1	564,4	635,6
Burgenlandkreis	58,1	62,6	53,7	674,8	615,3	732,9
Harz	44,9	26,8	62,3	701,2	599,4	799,0
Jerichower Land	50,3	43,8	56,7	591,1	495,0	686,7
Mansfeld-Südharz	44,5	51,5	37,6	626,5	563,9	687,4
Saalekreis	40,2	33,6	46,7	592,6	557,5	626,9
Salzlandkreis	29,5	22,9	35,7	784,4	705,1	859,9
Stendal	43,5	47,5	39,6	564,5	506,6	621,2
Wittenberg	58,3	55,3	61,3	666,5	635,2	696,8
Sachsen-Anhalt	40,8	38,7	42,9	632,8	566,5	696,9

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	X (J00 - J99)			XI (K00 - K93)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	96,4	89,5	102,9	72,3	89,5	56,1
Halle (Saale), Stadt	75,0	77,9	72,3	62,2	79,7	46,0
Magdeburg, Stadt	84,6	87,2	82,1	60,7	68,0	53,6
Altmarkkreis Salzwedel	98,7	125,5	71,9	56,9	46,5	67,3
Anhalt-Bitterfeld	64,3	68,0	60,7	67,9	81,6	54,7
Börde	60,1	74,0	46,1	56,0	64,8	47,3
Burgenlandkreis	72,8	82,4	63,4	75,0	91,2	59,1
Harz	82,5	95,3	70,3	71,2	87,9	55,2
Jerichower Land	62,3	67,9	56,7	74,3	81,0	67,6
Mansfeld-Südharz	81,1	114,5	48,7	79,0	110,2	48,7
Saalekreis	72,4	84,6	60,5	62,2	69,4	55,2
Salzlandkreis	78,3	90,6	66,5	64,6	81,2	48,7
Stendal	93,9	100,3	87,8	87,9	107,3	68,8
Wittenberg	81,7	98,0	65,9	83,2	93,2	73,5
Sachsen-Anhalt	77,6	88,1	67,5	68,4	81,7	55,5

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2015 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis	Todesursachenklasse (Pos.-Nr. der ICD-10)					
	XIX (S00 - T98)			insges. (A00 - T98)		
Land	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Dessau-Roßlau, Stadt	61,5	72,1	51,5	1 550,8	1 533,2	1 567,4
Halle (Saale), Stadt	45,2	52,2	38,6	1 317,3	1 343,0	1 293,3
Magdeburg, Stadt	51,3	68,9	34,4	1 247,4	1 239,0	1 255,4
Altmarkkreis Salzwedel	60,4	83,7	37,1	1 335,4	1 371,2	1 299,7
Anhalt-Bitterfeld	45,5	55,6	35,7	1 544,7	1 504,8	1 583,2
Börde	47,9	61,3	34,6	1 323,1	1 371,7	1 274,7
Burgenlandkreis	72,8	86,8	59,1	1 529,3	1 541,5	1 517,4
Harz	65,8	87,0	45,4	1 575,6	1 519,8	1 629,2
Jerichower Land	61,2	67,9	54,5	1 426,9	1 436,9	1 417,0
Mansfeld-Südharz	64,9	91,6	39,0	1 540,9	1 630,3	1 454,1
Saalekreis	59,0	73,8	44,6	1 352,0	1 363,3	1 340,8
Salzlandkreis	57,4	76,0	39,7	1 604,8	1 598,7	1 610,6
Stendal	59,1	75,6	43,0	1 455,2	1 502,3	1 409,2
Wittenberg	70,8	82,2	59,7	1 518,1	1 562,7	1 474,8
Sachsen-Anhalt	57,8	73,1	43,1	1 444,7	1 455,1	1 434,7



Sterbefälle 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Sterbefälle										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I A00 - B99	i	132	127	182	270	268	259	299	307	296	291	340
	m	68	63	78	134	122	121	138	158	143	134	149
	w	64	64	104	136	146	138	161	149	153	157	191
II C00 - D48	i	7 683	7 584	7 747	7 931	8 051	8 301	8 187	8 090	8 360	8 311	8 395
	m	4 199	4 140	4 351	4 403	4 514	4 633	4 569	4 495	4 731	4 677	4 680
	w	3 484	3 408	3 396	3 528	3 537	3 668	3 618	3 595	3 629	3 634	3 715
dar. C00 - C97	i	7 497	7 337	7 546	7 721	7 839	8 090	7 996	7 888	8 162	8 112	8 172
	m	4 120	4 060	4 268	4 301	4 414	4 537	4 485	4 416	4 638	4 579	4 577
	w	3 377	3 277	3 278	3 420	3 425	3 553	3 511	3 472	3 524	3 533	3 595
III D50 - D89	i	67	67	109	64	70	65	62	67	61	50	56
	m	24	23	46	22	32	26	24	23	23	23	28
	w	43	44	63	42	38	39	38	44	38	27	28
IV E00 - E90	i	1 439	1 542	1 613	1 146	1 368	1 238	1 317	1 483	1 665	1 345	1 583
	m	522	577	592	453	535	524	559	613	727	562	686
	w	917	965	1 021	693	833	714	758	870	938	783	897
dar. E10 - E14	i	1 319	1 419	1 457	999	1 200	1 039	1 121	1 282	1 445	1 136	1 333
	m	470	527	528	376	468	440	482	552	627	473	581
	w	849	892	929	623	732	599	639	730	818	663	752
dar. E11	i	900	1 026	1 062	734	916	884	975	1 118	1 291	1 018	1 168
	m	331	359	375	272	347	368	414	465	553	417	501
	w	569	667	687	462	569	516	561	653	738	601	667
V F00 - F99	i	191	220	216	380	496	606	600	656	794	941	1 025
	m	155	176	160	186	243	279	326	348	373	438	488
	w	36	44	56	194	253	327	274	308	421	503	537
dar. F10	i	161	181	147	110	142	177	196	212	228	284	281
	m	137	156	130	94	123	150	162	187	193	234	247
	w	24	25	17	16	19	27	34	25	35	50	34
VI G00 - G99	i	576	624	664	607	755	850	803	815	862	911	915
	m	276	304	303	282	366	401	402	395	415	422	426
	w	300	320	361	325	389	449	401	420	447	489	489
dar. G30	i	150	177	190	152	225	271	246	255	231	278	274
	m	54	56	63	41	84	87	86	89	89	95	98
	w	96	121	127	111	141	184	160	166	142	183	176
VII - VIII H00 - H95	i	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	2
	m	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	w	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
IX I00 - I99	i	14 093	14 052	13 388	13 983	14 100	14 289	13 832	13 665	13 764	13 724	14 178
	m	5 809	5 561	5 503	5 797	5 931	5 940	5 922	5 735	5 906	5 972	6 238
	w	8 284	8 191	7 885	8 186	8 169	8 349	7 910	7 930	7 858	7 752	7 940
dar. I25	i	3 587	3 494	3 155	2 953	3 357	3 474	3 435	3 527	3 535	3 434	3 627
	m	1 379	1 393	1 256	1 212	1 378	1 529	1 491	1 561	1 674	1 688	1 771
	w	2 208	2 101	1 899	1 741	1 979	1 945	1 944	1 966	1 861	1 746	1 856

Noch: Sterbefälle 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht


Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
X J00 - J99	i	1 090	1 012	1 186	1 488	1 550	1 431	1 406	1 442	1 676	1 452	1 739
	m	597	532	621	798	819	788	778	831	912	816	970
	w	493	480	565	690	731	643	628	611	764	636	769
dar. J40 - J47	i	602	530	608	707	915	858	837	839	937	832	999
	m	366	304	352	417	525	504	503	502	532	496	581
	w	236	226	256	290	390	354	334	337	405	336	418
XI K00 - K93	i	1 706	1 742	1 679	1 648	1 566	1 585	1 542	1 560	1 553	1 443	1 532
	m	1 013	965	949	905	846	880	859	909	871	815	900
	w	693	777	730	743	720	705	683	651	682	628	632
dar. K70 - K77	i	857	797	732	780	733	755	721	718	779	723	712
	m	630	565	545	550	516	514	511	522	527	496	517
	w	227	232	187	230	217	241	210	196	252	227	195
XII L00 - L99	i	3	6	2	11	14	12	15	16	21	16	24
	m	-	2	-	6	3	3	10	6	8	5	9
	w	3	4	2	5	11	9	5	10	13	11	15
XIII M00 - M99	i	63	60	58	68	95	87	102	115	117	88	111
	m	20	24	16	32	34	35	42	51	48	34	42
	w	43	36	42	36	61	52	60	64	69	54	69
XIV N00 - N99	i	524	558	646	620	567	503	533	561	642	617	735
	m	230	270	265	242	230	187	210	229	243	239	314
	w	294	288	381	378	337	316	323	332	399	378	421
XV O00 - O99	i	2	2	-	3	-	-	2	1	-	-	-
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	2	2	-	3	-	-	2	1	-	-	-
XVI P00 - P96	i	35	27	31	31	19	22	25	22	19	19	27
	m	14	15	20	22	10	16	11	12	16	12	14
	w	21	12	11	9	9	6	14	10	3	7	13
XVII Q00 - Q99	i	48	35	58	52	65	56	44	51	54	48	66
	m	28	14	26	20	30	29	23	32	34	27	40
	w	20	21	32	32	35	27	21	19	20	21	26
XVIII R00 - R99	i	393	442	811	444	305	320	313	286	255	287	345
	m	234	298	478	306	229	232	218	214	169	193	233
	w	159	144	333	138	76	88	95	72	86	94	112
XIX S00 - T98	i	1 232	1 086	1 002	1 158	1 191	1 105	1 101	1 183	1 245	1 285	1 296
	m	813	715	651	735	746	687	689	735	792	767	805
	w	419	371	351	423	445	418	412	448	453	518	491
Insgesamt A00 - T98	i	29 277	29 151	29 392	29 905	30 480	30 729	30 183	30 321	31 385	30 830	32 369
	m	14 002	14 980	14 059	14 344	14 690	14 781	14 780	14 786	15 411	15 137	16 024
	w	15 275	15 171	15 333	15 561	15 790	15 948	15 403	15 535	15 974	15 693	16 345

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I A00 - B99	i	5,3	5,2	7,5	11,3	11,3	11,0	13,1	13,5	13,1	13,0	15,2
	m	5,6	5,3	6,6	11,4	10,5	10,5	12,3	14,2	13,0	12,2	13,5
	w	5,0	5,1	8,4	11,1	12,1	11,5	13,8	12,9	13,3	13,7	16,8
II C00 - D48	i	309,5	307,4	319,1	330,8	340,0	354,0	358,0	356,7	371,2	371,0	374,7
	m	346,6	345,1	366,6	375,3	389,4	403,4	408,9	405,4	429,4	426,3	425,0
	w	274,2	271,3	273,7	288,1	292,6	306,6	309,3	310,1	315,5	318,0	326,1
dar. C00 - C97	i	302,0	298,8	310,8	322,1	331,0	345,0	349,6	347,8	362,4	362,1	364,7
	m	340,0	338,5	359,6	366,7	380,8	395,0	401,4	398,3	421,0	417,3	415,6
	w	265,7	260,9	264,2	279,3	283,4	297,0	300,2	299,5	306,4	309,1	315,6
III D50 - D89	i	2,7	2,7	4,5	2,7	3,0	2,8	2,7	3,0	2,7	2,2	2,5
	m	2,0	1,9	3,9	1,9	2,8	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,5
	w	3,4	3,5	5,1	3,4	3,1	3,3	3,2	3,8	3,3	2,4	2,5
IV E00 - E90	i	58,0	62,8	66,4	47,8	57,8	52,8	57,6	65,4	73,9	60,0	70,7
	m	43,1	48,1	49,9	38,6	46,1	45,6	50,0	55,3	66,0	51,2	62,3
	w	72,2	76,8	82,3	56,6	68,9	59,7	64,8	75,0	81,5	68,5	78,7
dar. E10 - E14	i	53,1	57,8	60,0	41,7	50,7	44,3	49,0	56,5	64,2	50,7	59,5
	m	38,8	43,9	44,5	32,1	40,4	38,3	43,1	49,8	56,9	43,1	52,8
	w	66,8	71,0	74,9	50,9	60,6	50,1	54,6	63,0	71,1	58,0	66,0
dar. E11	i	36,3	41,8	43,7	30,6	38,7	37,7	42,6	49,3	57,3	45,4	52,1
	m	27,3	29,9	31,6	23,2	29,9	32,0	37,0	41,9	50,2	38,0	45,5
	w	44,8	53,1	55,4	37,7	47,1	43,1	48,0	56,3	64,2	52,6	58,5
V F00 - F99	i	7,7	9,0	8,9	15,9	20,9	25,8	26,2	28,9	35,3	42,0	45,7
	m	12,8	14,7	13,5	15,9	21,0	24,3	29,2	31,4	33,9	39,9	44,3
	w	2,8	3,5	4,5	15,8	20,9	27,3	23,4	26,6	36,6	44,0	47,1
dar. F10	i	6,5	7,4	6,1	4,6	6,0	7,5	8,6	9,3	10,1	12,7	12,5
	m	11,3	13,0	11,0	8,0	10,6	13,1	14,5	16,9	17,5	21,3	22,4
	w	1,9	2,0	1,4	1,3	1,6	2,3	2,9	2,2	3,0	4,4	3,0
VI G00 - G99	i	23,2	25,4	27,4	25,3	31,9	36,2	35,1	35,9	38,3	40,7	40,8
	m	22,8	25,3	25,5	24,0	31,6	34,9	36,0	35,6	37,7	38,5	38,7
	w	23,6	25,5	29,1	26,5	32,2	37,5	34,3	36,2	38,9	42,8	42,9
dar. G30	i	6,0	7,2	7,8	6,3	9,5	11,6	10,8	11,2	10,3	12,4	12,2
	m	4,5	4,7	5,3	3,5	7,2	7,6	7,7	8,0	8,1	8,7	8,9
	w	7,6	9,6	10,2	9,1	11,7	15,4	13,7	14,3	12,3	16,0	15,4
VII - VIII H00 - H95	i	-	0,0	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1
	m	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,2
	w	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-
IX I00 - I99	i	567,7	572,2	551,5	583,3	595,5	609,4	604,8	602,5	611,2	612,7	632,8
	m	479,4	488,6	463,6	494,2	511,6	517,2	530,0	517,2	536,0	544,3	566,5
	w	651,9	652,0	635,6	668,6	675,9	697,9	676,3	684,1	683,2	678,3	696,9
dar. I25	i	144,5	142,3	130,0	123,2	141,8	148,2	150,2	155,5	157,0	153,3	161,9
	m	113,8	116,1	105,8	103,3	118,9	133,1	133,4	140,8	151,9	153,8	160,8
	w	173,7	167,2	153,1	142,2	163,7	162,6	166,2	169,6	161,8	152,8	162,9

Noch: Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung										
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
X	J00 - J99	i	43,9	41,2	48,9	62,1	65,5	61,0	61,5	63,6	74,4	64,8	77,6
		m	49,3	44,3	52,3	68,0	70,6	68,6	69,6	74,9	82,8	74,4	88,1
		w	38,8	38,2	45,5	56,4	60,5	53,7	53,7	52,7	66,4	55,7	67,5
dar.	J40 - J47	i	24,3	21,6	25,0	29,5	38,6	36,6	36,6	37,0	41,6	37,1	44,6
		m	30,2	25,3	29,7	35,5	45,3	43,9	45,0	45,3	48,3	45,2	52,8
		w	18,6	18,0	20,6	23,7	32,3	29,6	28,6	29,1	35,2	29,4	36,7
XI	K00 - K93	i	68,7	70,9	69,2	68,7	66,1	67,6	67,4	68,8	69,0	64,4	68,4
		m	83,6	80,4	79,9	77,1	73,0	76,6	76,9	82,0	79,1	74,3	81,7
		w	54,5	61,9	58,8	60,7	59,6	58,9	58,4	56,2	59,3	55,0	55,5
dar.	K70 - K77	i	34,5	32,5	30,2	32,5	31,0	32,2	31,5	31,7	34,6	32,3	31,8
		m	52,0	47,1	45,9	46,9	44,5	44,8	45,7	47,1	47,8	45,2	46,9
		w	17,9	18,5	15,1	18,8	18,0	20,1	18,0	16,9	21,9	19,9	17,1
XII	L00 - L99	i	0,1	0,2	0,1	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,9	0,7	1,1
		m	-	0,2	-	0,5	0,3	0,3	0,9	0,5	0,7	0,5	0,8
		w	0,2	0,3	0,2	0,4	0,9	0,8	0,4	0,9	1,1	1,0	1,3
XIII	M00 - M99	i	2,5	2,4	2,4	2,8	4,0	3,7	4,5	5,1	5,2	3,9	5,0
		m	1,7	2,0	1,3	2,7	2,9	3,0	3,8	4,6	4,4	3,1	3,8
		w	3,4	2,9	3,4	2,9	5,0	4,3	5,1	5,5	6,0	4,7	6,1
XIV	N00 - N99	i	21,1	22,7	26,6	25,9	23,9	21,5	23,3	24,7	28,5	27,5	32,8
		m	19,0	22,5	22,3	20,6	19,8	16,3	18,8	20,7	22,1	21,8	28,5
		w	23,1	22,9	30,7	30,9	27,9	26,4	27,6	28,6	34,7	33,1	37,0
XV	O00 - O99	i	0,1	0,1	-	0,1	-	-	0,1	0,0	-	-	-
		m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w	0,2	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,1	-	-	-
XVI	P00 - P96	i	1,4	1,1	1,3	1,3	0,8	0,9	1,1	1,0	0,8	0,8	1,2
		m	1,2	1,3	1,7	1,9	0,9	1,4	1,0	1,1	1,5	1,1	1,3
		w	1,7	1,0	0,9	0,7	0,7	0,5	1,2	0,9	0,3	0,6	1,1
XVII	Q00 - Q99	i	1,9	1,4	2,4	2,2	2,7	2,4	1,9	2,2	2,4	2,1	2,9
		m	2,3	1,2	2,2	1,7	2,6	2,5	2,1	2,9	3,1	2,5	3,6
		w	1,6	1,7	2,6	2,6	2,9	2,3	1,8	1,6	1,7	1,8	2,3
XVIII	R00 - R99	i	15,8	18,0	33,4	18,5	12,9	13,6	13,7	12,6	11,3	12,8	15,4
		m	19,3	24,8	40,3	26,1	19,8	20,2	19,5	19,3	15,3	17,6	21,2
		w	12,5	11,5	26,8	11,3	6,3	7,4	8,1	6,2	7,5	8,2	9,8
XIX	S00 - T98	i	49,6	44,2	41,3	48,3	50,3	47,1	48,1	52,2	55,3	57,4	57,8
		m	67,1	59,6	54,8	62,7	64,4	59,8	61,7	66,3	71,9	69,9	73,1
		w	33,0	29,5	28,3	34,5	36,8	34,9	35,2	38,6	39,4	45,3	43,1
Insgesamt A00 - T98		i	1 179,4	1 187,0	1 210,7	1 247,4	1 287,2	1 310,5	1 319,7	1 336,9	1 393,7	1 376,3	1 444,7
		m	1 155,6	1 165,4	1 184,4	1 222,8	1 267,2	1 286,9	1 322,7	1 333,5	1 398,8	1 379,6	1 455,1
		w	1 202,0	1 207,7	1 235,9	1 270,9	1 306,4	1 333,1	1 316,9	1 340,1	1 388,8	1 373,1	1 434,7



Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Geschl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Akutes rheumatisches Fieber (I00 - I02)	i	1	-	-	-	1	-
	m	1	-	-	-	1	-
	w	-	-	-	-	-	-
Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09)	i	97	-	-	6	17	74
	m	34	-	-	3	10	21
	w	63	-	-	3	7	53
Hypertonie (I10 - I15)	i	2 309	-	-	23	209	2 077
	m	735	-	-	16	123	596
	w	1 574	-	-	7	86	1 481
Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	6 042	-	4	193	1 280	4 565
	m	3 147	-	-	164	938	2 045
	w	2 895	-	4	29	342	2 520
dar. Myokardinfarkt (I21, I22)	i	2 355	-	2	157	708	1 488
	m	1 349	-	-	133	515	701
	w	1 006	-	2	24	193	787
Pulmonale Herzkrankheiten (I26 - I28)	i	167	-	2	18	41	106
	m	85	-	1	12	28	44
	w	82	-	1	6	13	62
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30 - I52)	i	3 172	1	5	71	420	2 675
	m	1 210	1	4	57	286	862
	w	1 962	-	1	14	134	1 813
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	1 938	-	4	52	359	1 523
	m	819	-	3	33	223	560
	w	1 119	-	1	19	136	963
dar. Schlaganfall nicht als Blutung o. Infarkt bezeichnet (I64)	i	200	-	-	1	33	166
	m	82	-	-	-	19	63
	w	118	-	-	1	14	103
Krankheiten d. Arterien, Arteriolen u. Kapillaren (I70 - I79)	i	363	1	4	11	80	267
	m	176	1	3	6	63	103
	w	187	-	1	5	17	164
dar. Atherosklerose (I70)	i	183	-	-	3	23	157
	m	68	-	-	1	17	50
	w	115	-	-	2	6	107
Krankheiten d. Venen, Lymphgefäße u. -knoten, n. anders klassifiziert (I80 - I89)	i	88	-	-	8	29	51
	m	30	-	-	6	13	11
	w	58	-	-	2	16	40
Sonstige Krankheiten d. Kreislaufsystems (I95 - I99)	i	1	-	-	-	1	-
	m	1	-	-	-	1	-
	w	-	-	-	-	-	-
Krankheiten d. Kreislaufsystems insgesamt (I00 - I99)	i	14 178	2	19	382	2 437	11 338
	m	6 238	2	11	297	1 686	4 242
	w	7 940	-	8	85	751	7 096

Sterbefälle durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2005 - 2015 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I00 - I02	i	-	1	1	2	6	1	-	-	-	-	1
	m	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1
	w	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-
I05 - I09	i	79	87	69	47	73	43	68	52	82	77	97
	m	24	27	16	12	23	13	16	16	22	26	34
	w	55	60	53	35	50	30	52	36	60	51	63
I10 - I15	i	1 479	1 547	1 507	1 416	1 574	1 849	1 985	2 054	2 108	2 183	2 309
	m	484	475	493	409	490	557	635	590	645	642	735
	w	995	1 072	1 014	1 007	1 084	1 292	1 350	1 464	1 463	1 541	1 574
I20 - I25	i	6 653	6 379	5 986	5 974	6 391	6 416	6 152	6 080	5 948	5 779	6 042
	m	3 059	2 997	2 809	2 871	3 094	3 154	3 039	2 963	3 053	3 042	3 147
	w	3 594	3 382	3 177	3 103	3 297	3 262	3 113	3 117	2 895	2 737	2 895
dar. I21, I22	i	2 906	2 717	2 653	2 722	2 817	2 760	2 581	2 452	2 345	2 282	2 355
	m	1 613	1 536	1 478	1 543	1 616	1 559	1 490	1 359	1 346	1 329	1 349
	w	1 293	1 181	1 175	1 179	1 201	1 201	1 091	1 093	999	953	1 006
I26 - I28	i	189	238	225	404	220	258	224	183	190	158	167
	m	79	101	90	171	89	106	87	82	85	72	85
	w	110	137	135	233	131	152	137	101	105	86	82
I30 - I52	i	1 932	2 222	2 216	2 746	2 364	2 670	2 730	2 894	3 056	3 231	3 172
	m	768	890	843	1 038	888	945	1 056	1 113	1 166	1 246	1 210
	w	1 164	1 332	1 373	1 708	1 476	1 725	1 674	1 781	1 890	1 985	1 962
I60 - I69	i	2 930	2 762	2 657	2 692	2 780	2 581	2 165	1 948	1 945	1 818	1 938
	m	1 052	1 045	972	1 014	1 024	938	845	782	768	716	819
	w	1 878	1 717	1 685	1 678	1 756	1 643	1 320	1 166	1 177	1 102	1 119
dar. I64	i	858	800	782	746	677	585	288	222	207	203	200
	m	274	287	269	251	242	187	112	82	78	75	82
	w	584	513	513	495	435	398	176	140	129	128	118
I70 - I79	i	734	740	668	609	581	383	431	368	354	371	363
	m	307	293	258	250	274	192	210	156	135	182	176
	w	427	447	410	359	307	191	221	212	219	189	187
dar. I70	i	472	484	406	349	279	165	195	184	179	163	183
	m	169	159	135	124	111	74	80	69	52	61	68
	w	303	325	271	225	168	91	115	115	127	102	115
I80 - I99	i	97	76	58	93	111	88	77	86	81	107	89
	m	36	33	21	31	47	34	34	33	32	46	31
	w	61	43	37	62	64	51	43	53	49	61	58
Insgesamt I00 - I99	i	14 093	14 052	13 388	13 983	14 100	14 289	13 832	13 665	13 764	13 724	14 178
	m	5 809	5 861	5 503	5 797	5 931	5 940	5 922	5 735	5 906	5 972	6 238
	w	8 284	8 191	7 885	8 186	8 169	8 349	7 910	7 930	7 858	7 752	7 940

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Krankheiten des Kreislaufsystems 2005 - 2015 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I00 - I02	i	-	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	-	-	-	-	0,0
	m	-	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1
	w	-	0,1	0,1	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-
I05 - I09	i	3,2	3,5	2,8	2,0	3,1	1,8	3,0	2,3	3,6	3,4	4,3
	m	2,0	2,3	1,3	1,0	2,0	1,1	1,4	1,4	2,0	2,4	3,1
	w	4,3	4,8	4,3	2,9	4,1	2,5	4,4	3,1	5,2	4,5	5,5
I10 - I15	i	59,6	63,0	62,1	59,1	66,5	78,9	86,8	90,6	93,6	97,5	103,1
	m	39,9	39,6	41,5	34,9	42,3	48,5	56,8	53,2	58,5	58,5	66,7
	w	78,3	85,3	81,7	82,2	89,7	108,0	115,4	126,3	127,2	134,8	138,2
I20 - I25	i	268,0	259,8	246,6	249,2	269,9	273,6	269,0	268,1	264,1	258,0	269,7
	m	252,5	249,8	236,6	244,7	266,9	274,6	272,0	267,2	277,1	277,2	285,8
	w	282,8	269,2	256,1	253,4	272,8	272,7	266,2	268,9	251,7	239,5	254,1
dar. I21, I22	i	117,1	110,6	109,3	113,5	119,0	117,7	112,9	108,1	104,1	101,9	105,1
	m	133,1	128,0	124,5	131,5	139,4	135,7	133,3	122,6	122,2	121,1	122,5
	w	101,7	94,0	94,7	96,3	99,4	100,4	93,3	94,3	86,9	83,4	88,3
I26 - I28	i	7,6	9,7	9,3	16,9	9,3	11,0	9,8	8,1	8,4	7,1	7,5
	m	6,5	8,4	7,6	14,6	7,7	9,2	7,8	7,4	7,7	6,6	7,7
	w	8,7	10,9	10,9	19,0	10,8	12,7	11,7	8,7	9,1	7,5	7,2
I30 - I52	i	77,8	90,5	91,3	114,5	99,8	113,9	119,4	127,6	135,7	144,2	141,6
	m	63,4	74,2	71,0	88,5	76,6	82,3	94,5	100,4	105,8	113,6	109,9
	w	91,6	106,0	110,7	139,5	122,1	144,2	143,1	153,6	164,3	173,7	172,2
I60 - I69	i	118,0	112,5	109,4	112,3	117,4	110,1	94,7	85,9	86,4	81,2	86,5
	m	86,8	87,1	81,9	86,4	88,3	81,7	75,6	70,5	69,7	65,3	74,4
	w	147,8	136,7	135,8	137,0	145,3	137,3	112,9	100,6	102,3	96,4	98,2
dar. I64	i	34,6	32,6	32,2	31,1	28,6	24,9	12,6	9,8	9,2	9,1	8,9
	m	22,6	23,9	22,7	21,4	20,9	16,3	10,0	7,4	7,1	6,8	7,4
	w	46,0	40,8	41,4	40,4	36,0	33,3	15,0	12,1	11,2	11,2	10,4
I70 - I79	i	29,6	30,1	27,5	25,4	24,5	16,3	18,8	16,2	15,7	16,6	16,2
	m	25,3	24,4	21,7	21,3	23,6	16,7	18,8	14,1	12,3	16,6	16,0
	w	33,6	35,6	33,0	29,3	25,4	16,0	18,9	18,3	19,0	16,5	16,4
dar. I70	i	19,0	19,7	16,7	14,6	11,8	7,0	8,5	8,1	7,9	7,3	8,2
	m	13,9	13,3	11,4	10,6	9,6	6,4	7,2	6,2	4,7	5,6	6,2
	w	23,8	25,9	21,8	18,4	13,9	7,6	9,8	9,9	11,0	8,9	10,1
I80 - I99	i	3,9	3,1	2,4	3,9	4,7	3,8	3,4	3,8	3,6	4,8	4,0
	m	3,0	2,8	1,8	2,6	4,1	3,0	3,0	3,0	2,9	4,2	2,8
	w	4,8	3,4	3,0	5,1	5,3	4,3	3,7	4,6	4,3	5,3	5,1
Insgesamt I00 - I99	i	567,7	572,2	551,5	583,3	595,5	609,4	604,8	602,5	611,2	612,7	632,8
	m	479,4	488,6	463,6	494,2	511,6	517,2	530,0	517,2	536,0	544,3	566,5
	w	651,9	652,0	635,6	668,6	675,9	697,9	676,3	684,1	683,2	678,3	696,9



Sterbefälle durch Neubildungen 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht


Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	8 172	5	31	559	3 337	4 240
	m	4 577	3	19	312	2 068	2 175
	w	3 595	2	12	247	1 269	2 065
dar. Lippe, Mundhöhle u. Pharynx (C00 - C14)	i	238	-	-	43	143	52
	m	188	-	-	41	122	25
	w	50	-	-	2	21	27
Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	2 630	1	7	139	1 025	1 458
	m	1 450	-	3	83	670	694
	w	1 180	1	4	56	355	764
Atmungsorgane u. intrathorakale Organe (C30 - C39)	i	1 611	-	-	135	849	627
	m	1 161	-	-	87	633	441
	w	450	-	-	48	216	186
Knochen u. Gelenk- knorpel (C40 - C41)	i	15	-	1	1	4	9
	m	9	-	-	1	2	6
	w	6	-	1	-	2	3
Haut (C43 - C44)	i	110	-	1	13	40	56
	m	69	-	1	8	23	37
	w	41	-	-	5	17	19
Mesotheliales Gewebe u. Weichteilgewebe (C45 - C49)	i	96	2	-	10	37	47
	m	40	2	-	2	18	18
	w	56	-	-	8	19	29
Brustdrüse (C50)	i	540	-	-	58	195	287
	m	8	-	-	1	2	5
	w	532	-	-	57	193	282
Weibliche Genital- organe (C51 - C58)	i	396	-	5	33	160	198
	m	x	x	x	x	x	x
	w	396	-	5	33	160	198
Männliche Genital- organe (C60 - C63)	i	549	-	1	13	164	371
	m	549	-	1	13	164	371
	w	x	x	x	x	x	x
Harnorgane (C64 - C68)	i	622	-	-	27	211	384
	m	393	-	-	19	148	226
	w	229	-	-	8	63	158
Auge, Gehirn u. Teile d. Zentralnerven- systems (C69 - C72)	i	228	2	8	36	101	81
	m	122	1	8	23	54	36
	w	106	1	-	13	47	45
Schilddrüse u. sonstige endokrine Drüsen (C73 - C75)	i	56	-	-	5	21	30
	m	28	-	-	5	11	12
	w	28	-	-	-	10	18
Lymphatische, blutbil- dende Gewebe (C81 - C96)	i	766	-	6	29	283	448
	m	419	-	5	19	166	229
	w	347	-	1	10	117	219
In-situ-Neubildungen (D00 - D09)	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Gutartige Neubildungen (D10 - D36)	i	33	-	1	2	8	22
	m	10	-	-	-	5	5
	w	23	-	1	2	3	17
Neubildungen unbekanntem Verhaltens (D37 - D48)	i	190	1	1	3	45	140
	m	93	-	1	1	28	63
	w	97	1	-	2	17	77
Neubildungen insgesamt (C00 - D48)	i	8 395	6	33	564	3 390	4 402
	m	4 680	3	20	313	2 101	2 243
	w	3 715	3	13	251	1 289	2 159

Sterbefälle durch Neubildungen 2005 - 2015 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
C00 - C97	i	7497	7 337	7 546	7 721	7 839	8 090	7 996	7 888	8 162	8 112	8 172
	m	4120	4 060	4 268	4 301	4 414	4 537	4 485	4 416	4 638	4 579	4 577
	w	3377	3 277	3 278	3 420	3 425	3 553	3 511	3 472	3 524	3 533	3 595
dar.												
C00 - C14	i	173	176	171	195	206	201	206	241	213	214	238
	m	143	148	143	166	173	165	168	192	169	175	188
	w	30	28	28	29	33	36	38	49	44	39	50
C15 - C26	i	2532	2 510	2 544	2 532	2 631	2 668	2 630	2 602	2 686	2 673	2 630
	m	1343	1 358	1 382	1 378	1 424	1 469	1 463	1 481	1 535	1 498	1 450
	w	1189	1 152	1 162	1 154	1 207	1 199	1 167	1 121	1 151	1 175	1 180
C30 - C39	i	1581	1 549	1 637	1 562	1 518	1 609	1 608	1 578	1 684	1 613	1 611
	m	1221	1 178	1 249	1 170	1 145	1 212	1 194	1 165	1 250	1 179	1 161
	w	360	371	388	392	373	397	414	413	434	434	450
C43 - C44	i	109	79	87	96	114	108	140	115	132	129	110
	m	51	46	49	47	71	61	81	63	82	78	69
	w	58	33	38	49	43	47	59	52	50	51	41
C45 - C49	i	73	80	77	76	90	86	85	74	77	85	96
	m	39	38	42	42	47	47	46	33	40	41	40
	w	34	42	35	34	43	39	39	41	37	44	56
C50	i	518	471	491	488	489	563	584	545	544	540	540
	m	6	3	4	5	7	5	6	5	4	9	8
	w	512	468	487	483	482	558	578	540	540	531	532
C51 - C58	i	425	404	377	444	411	397	408	408	365	417	396
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	425	404	377	444	411	397	408	408	365	417	396
C60 - C63	i	389	407	427	415	500	515	507	508	533	516	549
	m	389	407	427	415	500	515	507	508	533	516	549
	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C64 - C68	i	504	474	472	534	582	627	595	584	608	629	622
	m	321	290	296	347	382	384	376	347	361	398	393
	w	183	184	176	187	200	243	219	237	247	231	229
C69 - C72	i	183	179	171	200	211	206	199	175	209	214	228
	m	107	98	92	108	120	106	111	101	95	109	122
	w	76	81	79	92	91	100	88	74	114	105	106
C81 - C96	i	554	566	584	614	611	669	657	669	752	727	766
	m	268	265	298	333	305	342	351	343	405	378	419
	w	286	301	286	281	306	327	306	326	347	349	347
D00 - D09	i	3	4	5	3	3	-	1	2	2	2	-
	m	-	1	2	-	2	-	-	2	1	-	-
	w	3	3	3	3	1	-	1	-	1	2	-
D10 - D36	i	20	29	23	35	46	29	26	22	32	27	33
	m	5	11	8	14	16	11	6	6	11	9	10
	w	15	18	15	21	30	18	20	16	21	18	23
D37 - D48	i	163	178	173	172	163	182	164	178	164	170	190
	m	74	68	73	88	82	85	78	71	81	89	93
	w	89	110	100	84	81	97	86	107	83	81	97
Insgesamt C00 - D48	i	7 683	7 548	7 747	7 931	8 051	8 301	8 187	8 090	8 360	8 311	8 395
	m	4 199	4 140	4 351	4 403	4 514	4 633	4 569	4 495	4 731	4 677	4 680
	w	3 484	3 408	3 396	3 528	3 537	3 668	3 618	3 595	3 629	3 634	3 715

Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung durch Neubildungen 2005 - 2015 nach Geschlecht

Todesursachen Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Sterbefälle										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
C00 - C97	i	302,0	298,8	310,8	322,1	331,0	345,0	349,6	347,8	362,4	362,1	364,7
	m	340,0	338,5	359,6	366,7	380,8	395,0	401,4	398,3	421,0	417,3	415,6
	w	265,7	260,9	264,2	279,3	283,4	297,0	300,2	299,5	306,4	309,1	315,6
dar.												
C00 - C14	i	7,0	7,2	7,0	8,1	8,7	8,6	9,0	10,6	9,5	9,6	10,6
	m	11,8	12,3	12,0	14,2	14,9	14,4	15,0	17,3	15,3	15,9	17,1
	w	2,4	2,2	2,3	2,4	2,7	3,0	3,2	4,2	3,8	3,4	4,4
C15 - C26	i	102,0	102,2	104,8	105,6	111,1	113,8	115,0	114,7	119,3	119,3	117,4
	m	110,8	113,2	116,4	117,5	122,8	127,9	130,9	133,6	139,3	136,5	131,7
	w	93,6	91,7	93,7	94,3	99,9	100,2	99,8	96,7	100,1	102,8	103,6
C30 - C39	i	63,7	63,1	67,4	65,2	64,1	68,6	70,3	69,6	74,8	72,0	71,9
	m	100,8	98,2	105,2	99,7	98,8	105,5	106,9	105,1	113,5	107,5	105,4
	w	28,3	29,5	31,3	32,0	30,9	33,2	35,4	35,6	37,7	38,0	39,5
C43 - C44	i	4,4	3,2	3,6	4,0	4,8	4,6	6,1	5,1	5,9	5,8	4,9
	m	4,2	3,8	4,1	4,0	6,1	5,3	7,2	5,7	7,4	7,1	6,3
	w	4,6	2,6	3,1	4,0	3,6	3,9	5,0	4,5	4,3	4,5	3,6
C45 - C49	i	2,9	3,3	3,2	3,2	3,8	3,7	3,7	3,3	3,4	3,8	4,3
	m	3,2	3,2	3,5	3,6	4,1	4,1	4,1	3,0	3,6	3,7	3,6
	w	2,7	3,3	2,8	2,8	3,6	3,3	3,3	3,5	3,2	3,9	4,9
C50	i	20,9	19,2	20,2	20,4	20,7	24,0	25,5	24,0	24,2	24,1	24,1
	m	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,8	0,7
	w	40,3	37,3	39,3	39,4	39,9	46,6	49,4	46,6	46,9	46,5	46,7
C51 - C58	i	17,1	16,5	15,5	18,5	17,4	16,9	17,8	18,0	16,2	18,6	17,7
	m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w	33,4	32,2	30,4	36,3	34,0	33,2	34,9	35,2	31,7	36,5	34,8
C60 - C63	i	15,7	16,6	17,6	17,3	21,1	22,0	22,2	22,4	23,7	23,0	24,5
	m	32,1	33,9	36,0	35,4	43,1	44,8	45,4	45,8	48,4	47,0	49,9
	w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C64 - C68	i	20,3	19,3	19,4	22,3	24,6	26,7	26,0	25,7	27,0	28,1	27,8
	m	26,5	24,2	24,9	29,6	33,0	33,4	33,6	31,3	32,8	36,3	35,7
	w	14,4	14,6	14,2	15,3	16,5	20,3	18,7	20,4	21,5	20,2	20,1
C69 - C72	i	7,4	7,3	7,0	8,3	8,9	8,8	8,7	7,7	9,3	9,6	10,2
	m	8,8	8,2	7,8	9,2	10,4	9,2	9,9	9,1	8,6	9,9	11,1
	w	6,0	6,4	6,4	7,5	7,5	8,4	7,5	6,4	9,9	9,2	9,3
C81 - C96	i	22,3	23,0	24,1	25,6	25,8	28,5	28,7	29,5	33,4	32,5	34,2
	m	22,1	22,1	25,1	28,4	26,3	29,8	31,4	30,9	36,8	34,5	38,0
	w	22,5	24,0	23,1	23,0	25,3	27,3	26,2	28,1	30,2	30,5	30,5
D00 - D09	i	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	-
	m	-	0,1	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,1	-	-
	w	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,1	-	0,1	0,2	-
D10 - D36	i	0,8	1,2	0,9	1,5	1,9	1,2	1,1	1,0	1,4	1,2	1,5
	m	0,4	0,9	0,7	1,2	1,4	1,0	0,5	0,5	1,0	0,8	0,9
	w	1,2	1,4	1,2	1,7	2,5	1,5	1,7	1,4	1,8	1,6	2,0
D37 - D48	i	6,6	7,2	7,1	7,2	6,9	7,8	7,2	7,8	7,3	7,6	8,5
	m	6,1	5,7	6,1	7,5	7,1	7,4	7,0	6,4	7,4	8,1	8,4
	w	7,0	8,8	8,1	6,9	6,7	8,1	7,4	9,2	7,2	7,1	8,5
Insgesamt C00 - D48	i	309,5	307,4	319,1	330,8	340,0	354,0	358,0	356,7	371,2	371,0	374,7
	m	346,6	345,1	366,6	375,3	389,4	403,4	408,9	405,4	429,4	426,3	425,0
	w	274,2	271,3	273,7	288,1	292,6	306,6	309,3	310,1	315,5	318,0	326,1



Nichtnatürliche Sterbefälle 2015 nach ausgewählten Verletzungen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache Pos.Nr. ICD.10	Ge- schl.	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Verletzungen d. Kopfes (S00 - S09)	i	261	5	12	32	69	143
	m	156	2	10	26	56	62
	w	105	3	2	6	13	81
Verletzungen d. Halses (S10 - S19)	i	52	1	7	7	14	23
	m	32	1	7	5	10	9
	w	20	-	-	2	4	14
Verletzungen d. Thorax (S20 - S29)	i	54	-	4	7	12	31
	m	36	-	3	6	9	18
	w	18	-	1	1	3	13
Verletzungen d. Abdomens, d. Lendenwirbelsäule u. d. Beckens (S30 - S39)	i	39	-	1	2	10	26
	m	20	-	-	1	6	13
	w	19	-	1	1	4	13
Verletzungen d. Extremitäten (S40 - S99)	i	238	-	2	4	22	210
	m	97	-	2	2	18	75
	w	141	-	-	2	4	135
dar. Verletzungen d. Hüfte u. d. Oberschenkels (S70 - S79)	i	215	-	1	3	18	193
	m	86	-	1	1	15	69
	w	129	-	-	2	3	124
Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00 - T07)	i	113	1	27	25	32	28
	m	85	-	21	20	25	19
	w	28	1	6	5	7	9
Verbrennungen o. Ver- ätzungen (T20 - T32)	i	12	-	2	2	3	5
	m	8	-	2	1	2	3
	w	4	-	-	1	1	2
Erfrierungen (T33 - T35)	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen u. biologisch aktive Substanzen (T36 - T50)	i	55	-	14	13	17	11
	m	25	-	9	5	7	4
	w	30	-	5	8	10	7
Toxische Wirkung von nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51 - T65)	i	45	-	4	23	12	6
	m	37	-	4	21	9	3
	w	8	-	-	2	3	3
Sonstige Schäden	i	472	5	37	105	159	166
	m	346	3	29	91	124	99
	w	126	2	8	14	35	67
Verletzungen, Vergiftungen u. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	1 296	12	106	197	338	643
	m	805	6	83	157	257	302
	w	491	6	23	40	81	341

Unfalltote 2015 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	15	-	3	5	7	-
	m	15	-	3	5	7	-
	w	-	-	-	-	-	-
Verkehrsunfall	i	153	4	33	36	45	35
	m	118	1	27	30	37	23
	w	35	3	6	6	8	12
Häuslicher Unfall	i	459	3	16	34	81	325
	m	217	3	12	24	63	115
	w	242	-	4	10	18	210
Sport-/Spielunfall	i	7	-	3	-	3	1
	m	6	-	3	-	3	-
	w	1	-	-	-	-	1
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	256	2	13	16	58	167
	m	140	-	7	11	46	76
	w	116	2	6	5	12	91
Insgesamt	i	890	9	68	91	194	528
	m	496	4	52	70	156	214
	w	394	5	16	21	38	314

Unfalltote je 100 000 der Bevölkerung 2015 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht


Unfallkategorie	Geschlecht	Unfalltote je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Arbeits-/Schulunfall	i	0,7	-	0,1	0,2	0,3	-
	m	1,4	-	0,3	0,5	0,6	-
	w	-	-	-	-	-	-
Verkehrsunfall	i	6,8	0,2	1,5	1,6	2,0	1,6
	m	10,7	0,1	2,5	2,7	3,4	2,1
	w	3,1	0,3	0,5	0,5	0,7	1,1
Häuslicher Unfall	i	20,5	0,1	0,7	1,5	3,6	14,5
	m	19,7	0,3	1,1	2,2	5,7	10,4
	w	21,2	-	0,4	0,9	1,6	18,4
Sport-/Spielunfall	i	0,3	-	0,1	-	0,1	0,0
	m	0,5	-	0,3	-	0,3	-
	w	0,1	-	-	-	-	0,1
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	11,4	0,1	0,6	0,7	2,6	7,5
	m	12,7	-	0,6	1,0	4,2	6,9
	w	10,2	0,2	0,5	0,4	1,1	8,0
Insgesamt	i	39,7	0,4	3,0	4,1	8,7	23,6
	m	45,0	0,4	4,7	6,4	14,2	19,4
	w	34,6	0,4	1,4	1,8	3,3	27,6

Unfalltote 2015 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Männer



Frauen



Unfälle 2005 - 2015 nach Unfallkategorien und Geschlecht

Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeits-/ Schulunfall	i	29	33	28	25	22	26	30	19	23	18	15
	m	26	30	27	24	21	26	30	17	21	18	15
	w	3	3	1	1	1	-	-	2	2	-	-
Verkehrsunfall	i	250	207	180	228	177	158	176	150	157	142	153
	m	187	156	131	169	125	119	120	114	112	103	118
	w	63	51	49	59	52	39	56	36	45	39	35
Häuslicher Unfall	i	285	216	228	267	344	364	356	358	397	444	459
	m	126	96	107	129	155	169	170	156	202	206	217
	w	159	120	121	138	189	195	186	202	195	238	242
Sport-/ Spielunfall	i	4	1	1	4	6	6	7	16	10	5	7
	m	3	1	1	4	5	5	5	12	7	5	6
	w	1	-	-	-	1	1	2	4	3	-	1
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	129	141	98	183	213	192	175	233	247	279	256
	m	78	86	56	96	105	107	92	119	125	139	140
	w	51	55	42	87	108	85	83	114	122	140	116
Insgesamt	i	697	598	535	707	762	746	744	776	834	888	890
	m	420	369	322	422	411	426	417	418	467	471	496
	w	277	229	213	285	351	320	327	358	367	417	394

Unfälle je 100 000 der Bevölkerung 2005 - 2015 nach Unfallkategorien und Geschlecht



Unfallkategorie	Geschl.	Sterbefälle je 100 000 der Bevölkerung										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeits-/ Schulunfall	i	1,2	1,3	1,2	1,0	0,9	1,1	1,3	0,8	1,0	0,8	0,7
	m	2,1	2,5	2,3	2,0	1,8	2,3	2,7	1,5	1,9	1,6	1,4
	w	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-
Verkehrsunfall	i	10,1	8,4	7,4	9,5	7,5	6,7	7,7	6,6	7,0	6,3	6,8
	m	15,4	13,0	11,0	14,4	10,8	10,4	10,7	10,3	10,2	9,4	10,7
	w	5,0	4,1	3,9	4,8	4,3	3,3	4,8	3,1	3,9	3,4	3,1
Häuslicher Unfall	i	11,5	8,8	9,4	11,1	14,5	15,5	15,6	15,8	17,6	19,8	20,5
	m	10,4	8,0	9,0	11,0	13,4	14,7	15,2	14,1	18,3	18,8	19,7
	w	12,5	9,6	9,8	11,3	15,6	16,3	15,9	17,4	17,0	20,8	21,2
Sport-/ Spielunfall	i	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,2	0,3
	m	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,4	1,1	0,6	0,5	0,5
	w	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	-	0,1
Sonstiger Unfall bzw. unbekannt	i	5,2	5,7	4,0	7,6	9,0	8,2	7,7	10,3	11,0	12,5	11,4
	m	6,4	7,2	4,7	8,2	9,1	9,3	8,2	10,7	11,3	12,7	12,7
	w	4,0	4,4	3,4	7,1	8,9	7,1	7,1	9,8	10,6	12,3	10,2
Insgesamt	i	28,1	24,4	22,0	29,5	32,2	31,8	32,5	34,2	37,0	39,6	39,7
	m	34,7	30,8	27,1	36,0	35,5	37,1	37,3	37,7	42,4	42,9	45,0
	w	21,8	18,2	17,2	23,3	29,0	26,7	28,0	30,9	31,9	36,5	34,6


Nichtnatürliche Sterbefälle 2015 nach äußerer Ursache und Geschlecht

Äußere Ursache	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.	absolut	in %	je 100 000 der mittl. Bev.
Transportmittelunfälle (V01- V99)	154	11,9	6,9	119	14,8	10,8	35	7,1	3,1
dar. Fußgänger (V01 - V09)	25	1,9	1,1	16	2,0	1,5	9	1,8	0,8
Radfahrer (V10 - V19)	24	1,9	1,1	20	2,5	1,8	4	0,8	0,4
Krad-Benutzer (V20 - V29)	15	1,2	0,7	15	1,9	1,4	-	-	-
PKW-Benutzer (V40 - V49)	78	6,0	3,5	56	7,0	5,1	22	4,5	1,9
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	5	0,4	0,2	5	0,6	0,5	-	-	-
Autobusbenutzer (V70 - V79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	379	29,2	16,9	180	22,4	16,3	199	40,5	17,5
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	21	1,6	0,9	13	1,6	1,2	8	1,6	0,7
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	33	2,5	1,5	16	2,0	1,5	17	3,5	1,5
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	15	1,2	0,7	9	1,1	0,8	6	1,2	0,5
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	6	0,5	0,3	3	0,4	0,3	3	0,6	0,3
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	40	3,1	1,8	29	3,6	2,6	11	2,3	1,0
Suizide (X60 - X84)	373	28,8	16,6	289	35,9	26,2	84	17,1	7,4
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	23	1,8	1,0	14	1,7	1,3	9	1,9	0,8
Ereignis, dessen nähere Um- stände unbestimmt sind (Y10 - Y34)	9	0,7	0,4	6	0,7	0,5	3	0,6	0,3
Komplikationen bei der medizi- nischen und chirurgischen Behandlung (Y40 - Y84)	74	5,7	3,3	44	5,5	4,0	30	6,1	2,6
Übrige	169	13,0	7,5	83	10,3	7,5	86	17,5	7,5
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	1 296	100	57,8	805	100	73,1	491	100	43,1
dar. Unfälle insgesamt (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	890	68,7	39,7	496	61,6	45,0	394	80,2	34,6

Nichtnatürliche Sterbefälle 2015 nach äußerer Ursache, Altersgruppen und Geschlecht

Äußere Ursache	Ge- schlecht	Sterbefälle					
		insgesamt	davon in den Altersgruppen von ... bis unter ... Jahren				
			0 - 15	15 - 35	35 - 55	55 - 75	75 und mehr
Transportmittelunfälle (V01- V99)	i	154	4	34	36	46	34
	m	119	1	28	30	38	22
	w	35	3	6	6	8	12
dar. Fußgänger (V01 - V09)	i	25	1	6	7	5	6
	m	16	-	6	6	2	2
	w	9	1	-	1	3	4
Radfahrer (V10 - V19)	i	24	1	2	2	9	10
	m	20	1	1	1	9	8
	w	4	-	1	1	-	2
Krad-Benutzer (V20 - V29)	i	15	-	4	4	5	2
	m	15	-	4	4	5	2
	w	-	-	-	-	-	-
PKW-Benutzer (V40 - V49)	i	78	2	22	19	20	15
	m	56	-	17	15	15	9
	w	22	2	5	4	5	6
Benutzer von LKW oder Lieferwagen (V50 - V69)	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Unfallbedingte Stürze (W00 - W19)	i	379	-	5	18	65	291
	m	180	-	4	13	54	109
	w	199	-	1	5	11	182
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65 - W74)	i	21	1	4	4	5	7
	m	13	-	4	4	4	1
	w	8	1	-	-	1	6
Unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75 - W84)	i	33	3	1	5	4	20
	m	16	3	1	1	3	8
	w	17	-	-	4	1	12
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen (X00 - X09)	i	15	-	3	2	5	5
	m	9	-	3	1	4	1
	w	6	-	-	1	1	4
Exposition gegenüber Natur- kräften (X30 - X39)	i	6	-	-	-	4	2
	m	3	-	-	-	3	-
	w	3	-	-	-	1	2
Unfallbedingte akzidentelle Vergiftungen (X40 - X49)	i	40	-	14	12	6	8
	m	29	-	10	11	6	2
	w	11	-	4	1	-	6
Suizide (X60 - X84)	i	373	-	32	100	134	107
	m	289	-	27	81	97	84
	w	84	-	5	19	37	23
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	i	23	3	5	5	6	4
	m	14	2	4	5	2	1
	w	9	1	1	-	4	3
Übrige	i	252	1	8	15	63	165
	m	133	-	2	11	46	74
	w	119	1	6	4	17	91
Nichtnatürliche Sterbefälle insgesamt (V01 - Y98)	i	1 296	12	106	197	338	643
	m	805	6	83	157	257	302
	w	491	6	23	40	81	341






Alkoholbedingte Sterbefälle 2010 und 2015 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Sterbefälle					
	2010			2015		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
E24.4	Durch Alkohol induziertes Pseudo-Cushing-Syndrom	-	-	-	-	-
E52	Niazinmangel [Pellagra]	-	-	-	-	-
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	177	150	27	281	247
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	19	18	1	11	8
G62.1	Alkohol-Polyneuropathie	7	6	1	2	1
G72.1	Alkoholmyopathie	-	-	-	-	-
I42.6	Alkoholische Kardiomyopathie	18	14	4	16	15
K29.2	Alkoholgastritis	3	3	-	3	3
K70	Alkoholische Leberkrankheit	552	403	149	513	413
K85.2	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis	17	13	4	13	10
K86.0	Durch Alkohol induzierte chronische Pankreatitis	10	9	1	14	13
O35.4	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol	-	x	-	-	x
P04.3	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter	-	-	-	-	-
Q86.0	Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)	-	-	-	-	-
R78.0	Nachweis von Alkohol im Blut	-	-	-	-	-
T51.0	Toxische Wirkung: Äthanol	19	13	6	13	13
T51.9	Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet	6	5	1	2	2
Insgesamt		828	634	194	868	725
Anteil aller Sterbefälle in %		2,7	4,3	1,2	2,7	4,5
Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung		35,3	55,2	16,2	38,7	65,8

Alkoholbedingte Sterbefälle 2010 und 2015 nach Altersgruppen im Vergleich

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Sterbefälle			
	2010		2015	
	absolut	in %	absolut	in %
unter 1	-	-	-	-
1 - 15	-	-	-	-
15 - 35	6	0,7	10	1,2
35 - 55	326	39,4	266	30,6
55 - 75	436	52,7	511	58,9
75 und mehr	60	7,2	81	9,3
Insgesamt	828	100	868	100



Mittleres Sterbealter seit 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren						
		2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	i	67,5	70,6	73,4	74,7	77,1	77,5	77,2
	m	62,6	66,7	72,0	71,4	73,5	74,3	73,1
	w	72,2	74,7	74,4	77,4	80,2	80,5	80,5
II Neubildungen (C00 - D48)	i	70,5	71,0	71,5	72,0	72,4	72,8	73,2
	m	68,9	69,6	70,1	70,6	71,1	71,7	72,1
	w	72,6	72,7	73,3	73,7	74,0	74,2	74,7
dar. Bösartige Neubildungen (C00 - C97)	i	70,4	70,9	71,4	71,8	72,2	72,6	73,1
	m	68,8	69,5	70,1	70,5	71,0	71,6	72,0
	w	72,4	72,5	73,1	73,5	73,8	74,0	74,6
dar. Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15 - C26)	i	71,7	72,0	72,5	72,9	73,0	73,4	74,2
	m	68,8	69,6	70,1	70,6	70,8	71,6	72,3
	w	74,8	74,7	75,3	75,5	75,8	75,8	76,5
... der Atmungsorgane (C30 - C39)	i	68,5	68,9	69,2	69,5	70,1	70,1	70,1
	m	67,8	68,5	68,9	69,0	69,8	70,0	69,9
	w	71,3	70,3	70,4	70,8	71,2	70,1	70,4
... der Brustdrüse (C50)	i	68,9	68,9	70,4	70,9	71,7	72,7	73,5
	m	71,3	64,3	79,5	69,3	70,2	72,8	76,1
	w	68,9	68,9	70,3	71,0	71,7	72,7	73,5
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81 - C96)	i	70,2	71,7	71,7	73,5	73,5	73,3	75,1
	m	67,9	70,0	70,0	71,3	72,2	71,8	73,7
	w	72,3	73,2	73,5	75,6	75,0	75,1	76,7
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	i	72,8	76,4	75,8	78,2	76,0	76,6	72,0
	m	71,9	71,5	71,3	73,6	73,2	73,4	65,9
	w	73,4	79,1	79,1	82,1	77,7	78,5	78,0
IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	i	76,8	77,4	77,4	77,1	76,2	77,4	77,7
	m	71,8	71,5	71,1	72,1	72,4	73,1	73,7
	w	79,7	80,7	81,1	80,2	79,0	80,7	80,7
dar. Diabetes mellitus (E10 - E14)	i	77,3	78,3	78,3	78,0	77,2	78,6	79,2
	m	72,6	72,9	72,5	73,3	73,3	74,5	75,4
	w	79,9	81,4	81,6	81,0	80,1	81,8	82,1
V Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	i	59,8	56,4	63,1	76,2	74,5	76,6	77,7
	m	56,8	54,6	60,3	68,4	67,7	67,7	69,7
	w	71,4	64,0	71,3	83,6	82,7	84,5	84,9
dar. ... durch Alkohol (F10)	i	56,3	54,6	57,0	57,3	57,3	58,8	59,0
	m	56,0	54,1	57,7	56,7	56,7	58,5	59,0
	w	58,3	57,5	51,8	61,4	60,1	60,1	59,1
VI Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	i	72,6	70,9	73,6	73,2	74,7	75,8	76,6
	m	67,2	67,1	69,5	69,7	71,7	73,1	73,6
	w	77,5	74,4	77,1	76,6	78,3	78,3	79,1
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	i	79,3	79,4	79,7	80,1	80,6	81,2	81,4
	m	74,0	74,4	74,4	75,2	76,0	76,9	77,2
	w	82,9	82,9	83,3	83,7	84,1	84,5	84,7
dar. Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25)	i	78,5	78,7	78,7	78,8	79,7	79,9	80,0
	m	73,2	73,9	73,7	74,3	75,5	76,2	76,5
	w	82,8	82,8	83,1	83,1	83,7	83,7	83,9
dar. Akuter Myokardinfarkt (I21)	i	73,7	74,7	75,1	74,8	76,1	76,3	76,3
	m	69,5	70,9	70,9	71,1	72,5	72,9	73,1
	w	79,1	79,3	80,1	79,8	80,9	80,8	80,5
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	i	80,8	80,3	80,4	81,0	80,6	81,1	80,8
	m	76,7	76,0	75,7	76,9	76,7	76,9	77,2
	w	83,0	82,6	83,1	83,4	83,1	83,9	83,4

Noch: Mittleres Sterbealter seit 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10		Geschl.	Mittleres Sterbealter in Jahren							
			2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	i	76,8	77,3	77,6	77,5	77,3	77,6	77,6	
		m	74,3	75,3	74,6	75,0	75,3	75,6	75,5	
		w	80,0	79,8	80,9	80,3	79,8	80,1	80,4	
	dar. Grippe und Pneumonie (J09 - J18)	i	79,6	80,6	80,5	79,7	78,4	78,8	79,9	
		m	75,5	77,5	76,1	74,9	73,9	74,9	76,9	
		w	83,6	83,1	83,7	83,4	81,9	82,4	83,2	
	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47)	i	76,2	75,8	75,7	76,7	77,0	77,0	76,3	
		m	74,0	74,4	74,0	75,0	76,1	76,0	74,5	
		w	79,3	78,0	78,1	79,0	78,4	78,5	78,7	
XI	Krankheiten des Verdauungs- systems (K00 - K93)	i	66,5	67,5	69,6	69,7	69,9	70,2	71,5	
		m	61,9	62,5	64,6	64,1	65,2	65,8	67,2	
		w	73,4	74,6	76,2	76,3	75,9	75,7	77,5	
	dar. Krankheiten der Leber (K70 - K77)	i	58,9	59,9	61,5	60,8	61,9	63,6	63,5	
		m	58,3	58,4	60,4	59,3	60,8	61,7	61,9	
		w	60,6	64,2	64,4	64,6	64,5	67,5	67,7	
	XIV	Krankheiten des Urogenital- systems (N00 - N99)	i	78,5	79,5	79,8	80,7	80,9	82,2	82,1
			m	75,5	77,1	77,6	78,2	78,5	80,3	79,9
			w	80,6	81,5	81,3	82,4	82,5	83,4	83,8
XVII	Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	i	30,2	41,0	49,2	42,6	38,0	35,0	35,8	
		m	30,7	35,3	39,8	40,5	36,0	36,1	34,2	
		w	29,8	49,0	56,9	44,4	40,3	33,1	38,2	
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. andere Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	i	54,7	57,6	61,2	62,2	63,8	66,1	68,1	
		m	48,6	52,2	55,9	57,0	58,6	62,0	63,4	
		w	66,8	67,9	71,1	70,9	72,6	73,1	75,6	
	dar. Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70 - S79)	i	84,9	82,9	83,9	83,4	83,8	83,0	84,7	
		m	82,9	80,4	82,5	78,2	80,3	78,8	81,0	
		w	85,6	84,1	84,7	85,9	85,4	85,7	87,2	
	aus XX	Transportmittelunfälle (V01 - V99)	i	40,9	42,6	45,4	46,6	49,0	50,6	53,7
			m	38,8	41,4	43,0	45,5	45,3	49,8	53,2
			w	47,3	45,9	51,9	49,5	57,2	52,7	55,3
Unfälle durch Sturz (W00 - W19)		i	73,8	75,2	76,8	78,3	78,1	78,1	80,2	
		m	64,5	66,7	69,8	72,1	71,7	71,9	74,8	
		w	81,8	80,9	82,4	82,5	82,9	83,4	85,1	
Unfälle durch Ertrinken (W65 - W74)		i	42,2	46,7	53,3	54,8	44,7	53,9	56,0	
		m	30,8	43,0	52,8	53,9	48,8	47,7	47,5	
		w	66,6	57,7	56,0	56,5	31,0	63,7	69,8	
Suizide (X60 - X84)		i	54,2	54,3	57,5	58,1	58,8	59,7	60,9	
		m	51,6	53,2	56,7	57,4	57,9	59,9	60,1	
		w	61,7	57,5	60,5	61,3	61,7	59,0	63,4	
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)		i	35,9	35,9	45,5	39,1	37,8	34,4	49,0	
		m	34,6	30,7	51,9	38,5	32,4	47,3	40,4	
		w	38,1	38,5	38,2	40,1	49,3	8,7	62,4	
Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind (Y10 - Y34)		i	53,0	57,7	63,7	62,6	72,2	67,2	62,1	
		m	50,6	53,3	59,0	59,0	72,7	66,1	66,8	
		w	58,3	70,1	73,1	68,9	70,7	71,0	52,7	
Insgesamt (A00 - T98)		i	74,4	74,6	75,3	75,8	76,2	76,9	77,2	
		m	69,2	69,9	70,7	71,5	72,2	73,0	73,4	
		w	79,1	78,9	79,6	79,9	80,1	80,5	81,0	

Vermeidbare Sterbefälle 2010 und 2015 im Vergleich

Pos.-Nr. der ICD-10	Alter	Sterbefälle je 100 000 der mittleren Bevölkerung					
		2010			2015		
		insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
- Alle Krankheiten (A00 - T98)	unter 1	2,1	3,1	1,1	2,9	3,4	2,5
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten Tuberkulose und deren Folgezustände (A15 - A19, B90)	5 - 65	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1
II Neubildungen Bösartige Neubildungen des Gebärmutterhalses (C53) Hodgkin-Krankheit (C81)	5 - 65 5 - 35	1,4 -	x -	2,8 -	1,8 -	x -	3,5 -
IX Krankheiten des Kreislaufsystems Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05 - I09) Hypertonie (I10 - I15) Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69)	5 - 45 5 - 65 5 - 65	- 3,8 7,0	- 5,7 8,4	- 2,0 5,8	- 4,3 7,6	- 5,6 10,0	- 3,1 5,4
XI Krankheiten des Verdauungssystems Krankheiten der Appendix (K35 - K38) Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege (K80 - K83)	5 - 65 5 - 65	- 0,1	- 0,3	- -	0,0 0,5	0,1 0,5	- 0,5
XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	15 - 50	-	x	-	-	x	-
Insgesamt		14,8	17,8	11,8	17,4	19,9	15,0

Zur Säuglingssterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2015

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 65 Säuglingssterbefälle, davon 37 männliche und 28 weibliche, registriert. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 12 männliche und 11 weibliche Säuglinge mehr. Der Anteil der verstorbenen männlichen Säuglinge an der Gesamtzahl der verstorbenen Säuglinge betrug 56,9 %.

Die Säuglingssterblichkeit lag mit 3,73 ‰ deutlich über dem Wert des Vorjahres und erreichte damit den höchsten Wert seit dem Jahr 2004. Die Anzahl der Lebendgeborenen stieg im Vergleich zum

Vorjahr um 351 an. Die Zahl der Totgeborenen nahm hingegen um 4 Fälle ab. Die Totgeborenenrate fiel allerdings geringfügig auf 3,66 ‰.

Von den 65 verstorbenen Säuglingen verstarben 29 innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt. Das sind 8 frühverstorbene Säuglinge mehr als im Jahr zuvor. Die Frühsterblichkeit betrug 1,67 ‰ und war damit etwas höher gegenüber dem Wert des Vorjahres. Die perinatale Mortalität erreichte 5,32 ‰ und erhöhte sich ebenso leicht gegenüber dem Vorjahr.

Säuglingssterbefälle nach Lebensdauer

Lebensdauer von ... bis unter ...	Gestorbene Säuglinge					
	2015			2014		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Unter 24 Stunden	23	10	13	16	11	5
24 Stunden - 7 Tage	6	3	3	5	2	3
7 Tage - 28 Tage	9	6	3	8	4	4
28 Tage - 1 Jahr	27	18	9	13	8	5
Insgesamt	65	37	28	42	25	17

Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer


Vorgang	2015			2014		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl der Lebendgeborenen	17 415	8 843	8 574	17 064	8 816	8 248
Anzahl der Totgeborenen	64	45	19	68	36	32
Anzahl der gestorbenen Säuglinge	65	37	28	42	25	17
dar. in den ersten 7 Tagen	29	13	16	21	13	8
Säuglingssterblichkeit in ‰	3,73	4,18	3,27	2,46	2,84	2,06
Frühsterblichkeit in ‰	1,67	1,47	1,87	1,23	1,47	0,97
Spätsterblichkeit in ‰	0,34	0,34	1,05	0,47	0,45	0,48
Nachsterblichkeit in ‰	1,03	1,02	3,15	0,76	0,91	0,61
Totgeborenenrate in ‰	3,66	5,06	2,21	3,97	4,07	3,86
Perinatale Mortalität in ‰	5,32	6,53	4,07	5,19	5,54	4,83

Säuglingssterblichkeit 2005 - 2015 nach Geschlecht

Vorgang	Ge- schl.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lebend- geborene	i	17 166	16 927	17 132	17 697	17 144	17 300	16 837	16 888	16 797	17 064	17 415
	m	8 674	8 838	8 868	9 079	8 853	8 802	8 658	8 599	8 542	8 816	8 843
	w	8 492	8 089	8 264	8 618	8 291	8 498	8 179	8 289	8 255	8 248	8 574
Totgeborene	i	66	57	83	66	69	63	69	63	66	68	64
	m	36	25	46	35	29	40	34	31	32	36	45
	w	30	32	37	31	40	23	35	32	34	32	19
Gestorbene Säuglinge	i	53	58	52	61	49	49	51	51	49	42	65
	m	25	24	28	37	29	36	26	30	31	25	37
	w	28	34	24	24	20	13	25	21	18	17	28
dar. in den ersten 7 Tagen	i	30	22	24	24	20	17	10	19	21	21	29
	m	17	11	15	14	10	10	5	8	15	13	13
	w	13	11	9	10	10	7	5	11	6	8	16
Säuglings- sterblichkeit	i	3,09	3,43	2,99	3,45	2,86	2,83	3,03	3,02	2,92	2,46	3,73
	m	2,88	2,72	3,13	4,08	3,28	4,09	3,00	3,49	3,63	2,84	4,18
	w	3,30	4,20	2,84	2,78	2,41	1,53	3,06	2,53	2,18	2,06	3,27
Frühsterblich- keit	i	1,75	1,30	1,38	1,36	1,17	0,98	0,59	1,13	1,25	1,23	1,67
	m	1,96	1,24	1,68	1,54	1,13	1,14	0,58	0,93	1,76	1,47	1,47
	w	1,53	1,36	1,07	1,16	1,21	0,82	0,61	1,33	0,73	0,97	1,87
Totgeborenen- rate	i	3,83	3,36	4,82	3,72	4,01	3,63	4,08	3,72	3,91	3,97	3,66
	m	4,13	2,82	5,16	3,84	3,27	4,52	3,91	3,59	3,73	4,07	5,06
	w	3,52	3,94	4,46	3,58	4,80	2,70	4,26	3,85	4,10	3,86	2,21
Perinatale Mortalität	i	5,57	4,65	6,22	5,07	5,17	4,61	4,67	4,84	5,16	5,19	5,32
	m	6,08	4,06	6,84	5,38	4,39	5,65	4,49	4,52	5,48	5,54	6,53
	w	5,05	5,29	5,54	4,74	6,00	3,52	4,87	5,17	4,83	4,83	4,07

Säuglingssterbefälle 1970 - 2015 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle im ersten Lebensjahr					
	absolut			je 1 000 Lebendgeborene		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1970	861	494	367	19,02	21,36	16,57
1971	831	488	343	18,20	20,73	15,51
1972	725	435	290	18,95	22,11	15,60
1973	531	300	231	15,89	17,35	14,32
1974	578	335	243	17,69	20,06	15,20
1975	523	311	212	16,24	18,64	13,66
1976	469	268	201	13,60	15,16	11,96
1977	548	313	235	13,88	15,43	12,25
1978	592	366	226	14,32	17,14	11,32
1979	566	329	237	13,66	15,39	11,81
1980	534	315	219	12,39	14,23	10,45
1981	550	344	206	13,05	15,81	10,11
1982	486	281	205	11,61	13,12	10,02
1983	437	277	160	10,52	12,93	7,95
1984	414	234	180	10,28	11,32	9,18
1985	394	231	163	9,84	11,24	8,37
1986	400	243	157	10,16	12,09	8,15
1987	348	208	140	8,73	10,19	7,20
1988	320	187	133	8,32	9,42	7,15
1989	285	171	114	8,11	9,42	6,71
1990	254	166	88	7,98	10,07	5,73
1991	177	106	71	9,10	10,64	7,48
1992	128	77	51	7,86	9,12	6,51
1993	84	43	41	5,75	5,73	5,77
1994	91	44	47	6,37	6,01	6,76
1995	90	53	37	6,18	7,04	5,26
1996	92	49	43	5,70	5,89	5,49
1997	86	45	41	5,00	5,03	4,98
1998	93	50	43	5,31	5,57	5,03
1999	70	38	32	3,85	4,03	3,66
2000	79	45	34	4,22	4,63	3,77
2001	73	41	32	4,04	4,40	3,65
2002	87	47	40	4,94	5,16	4,70
2003	72	49	23	4,26	5,63	2,81
2004	70	38	32	4,04	4,22	3,84
2005	53	25	28	3,09	2,88	3,30
2006	58	24	34	3,43	2,72	4,20
2007	52	28	24	2,99	3,13	2,84
2008	61	37	24	3,45	4,08	2,78
2009	49	29	20	2,86	3,28	2,41
2010	49	36	13	2,83	4,09	1,53
2011	51	26	25	3,03	3,00	3,06
2012	51	30	21	3,02	3,49	2,53
2013	49	31	18	2,92	3,63	2,18
2014	42	25	17	2,46	2,84	2,06
2015	65	37	28	3,73	4,18	3,27



Zu den Todesursachen bei den Säuglingen in Sachsen-Anhalt 2015

Die hauptsächlichen Todesursachen, die die Höhe der Säuglingssterblichkeit maßgeblich beeinflussten, waren nach wie vor **Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben** mit 41,5 %.

Angeborenen Fehlbildungen waren mit 24,6 % an den Todesursachen im Säuglingsalter beteiligt. **Plötzlicher Kindstod** (Säuglingssterbefälle, bei

denen die Todesursache nicht bekannt ist bzw. auch durch Autopsie nicht geklärt werden konnte) führte im aktuellen Berichtsjahr bei 4 Säuglingen zum Tod. Weitere 5 Säuglinge kamen durch **nichtnatürliche Todesursachen** ums Leben. Davon verstarben 2 Säuglinge durch Kindstötung und 3 Säuglinge unfallbedingt.

Säuglingssterbefälle 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachenklasse Pos.-Nr. der ICD-10	Gestorbene Säuglinge						
	insgesamt	in %	männlich	weiblich	dar. in den ersten 7 Tagen		
					insg.	männl.	weibl.
I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	1	1,5	1	-	-	-	-
II Neubildungen (C00 - D48)	2	3,1	-	2	1	-	1
III Krankheiten des Blutes und des Immunsystems (D50 - D89)	2	3,1	2	-	-	-	-
IV Endokrine , Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	-	-	-	-	-	-	-
VI- VIII Krankheiten des Nervensystems, der Augen und der Ohren (G00 - H95)	4	6,2	2	2	-	-	-
IX Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	-	-	-	-	-	-	-
X Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	4	6,2	1	3	-	-	-
XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	-	-	-	-	-	-	-
XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00 - P96)	27	41,5	14	13	18	9	9
dar. Frühgeburten (P05, P07)	8	12,3	6	2	4	3	1
Krankheiten des Atmungs- und Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20 - P29)	15	23,1	5	10	11	4	7
XVII Angeborene Fehlbildungen (Q00 - Q99)	16	24,6	10	6	8	3	5
dar. ... des Kreislaufsystems (Q20 - Q28)	10	15,4	8	2	3	2	1
aus							
XVIII Plötzlicher Kindstod (R95)	4	6,2	4	-	1	1	-
XX Äußere Ursache von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	5	7,6	3	2	1	-	1
dar. Unfälle (V01 - X59, Y40 - Y86, Y88)	3	4,6	1	2	1	-	1
Tätlicher Angriff (X85 - Y09)	2	3,1	2	-	-	-	-
Übrige	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt (A00 - T98)	65	100	37	28	29	13	16

Säuglingssterbefälle 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I A00 - B99	i	1	-	2	3	1	1	-	2	2	2	1
	m	1	-	1	1	1	1	-	2	-	2	1
	w	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
VI G00 - G99	i	-	3	-	2	1	2	2	3	2	-	3
	m	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	1
	w	-	3	-	1	-	-	1	3	-	-	2
X J00 - J99	i	2	5	4	3	3	-	3	7	3	-	4
	m	-	1	1	1	3	-	2	5	3	-	1
	w	2	4	3	2	-	-	1	2	-	-	3
XVI P00 - P96	i	35	27	31	31	19	22	25	22	18	19	27
	m	14	15	20	22	10	16	11	12	15	12	14
	w	21	12	11	9	9	6	14	10	3	7	13
dar. P00 - P04	i	5	2	6	2	4	1	-	2	1	2	-
	m	2	1	5	-	2	1	-	1	1	2	-
	w	3	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-
P05, P07	i	9	9	3	9	1	6	7	3	6	7	8
	m	4	5	3	8	-	6	1	-	6	4	6
	w	5	4	-	1	1	-	6	3	-	3	2
P20 - P29	i	-	8	16	12	9	1	10	12	8	7	15
	m	-	5	7	8	6	-	6	8	6	6	5
	w	-	3	9	4	3	1	4	4	2	1	10
XVII Q00 - Q99	i	11	8	7	7	12	15	10	10	17	13	16
	m	9	3	3	4	3	10	5	6	10	6	10
	w	2	5	4	3	9	5	5	4	7	7	6
dar. Q20 - Q28	i	7	4	4	3	6	7	4	5	4	5	10
	m	6	2	2	1	-	4	2	3	2	3	8
	w	1	2	2	2	6	3	2	2	2	2	2
XVIII R95	i	-	3	1	9	3	4	5	2	3	4	4
	m	-	2	-	6	3	4	1	1	-	3	4
	w	-	1	1	3	-	-	4	1	3	1	-
XIX S00 - T98	i	1	3	2	3	6	4	4	3	4	4	5
	m	1	1	1	1	5	3	4	1	1	2	3
	w	-	2	1	2	1	1	-	2	3	2	2
Insgesamt A00 - T98	i	53	58	52	61	49	49	51	51	49	42	65
	m	25	24	28	37	29	36	26	30	31	25	37
	w	28	34	24	24	20	13	25	21	18	17	28
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	1	1	1	1	3	2	2	1	1	3	3
	m	1	1	1	1	3	1	2	1	-	2	1
	w	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
dar. W75 - W84	i	1	1	-	-	2	-	1	1	1	-	1
	m	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
aus XX X85 - Y09	i	-	-	-	2	2	2	2	2	3	1	2
	m	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	2
	w	-	-	-	2	1	-	-	2	2	1	-

Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborene 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Säuglinge je 100 000 Lebendgeborene										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I A00 - B99	i	5,8	-	11,7	17,0	5,8	5,8	-	11,8	11,9	11,7	5,7
	m	11,1	-	11,3	11,0	11,3	11,4	-	23,3	-	22,7	11,3
	w	-	-	12,1	23,2	-	-	-	-	24,2	-	-
VI G00 - G99	i	-	5,9	-	11,3	5,8	11,6	11,9	17,8	11,9	-	17,2
	m	-	-	-	11,0	11,3	22,7	11,6	-	23,4	-	11,3
	w	-	12,4	-	11,6	-	-	12,2	36,2	-	-	23,3
X J00 - J99	i	11,5	29,5	23,3	17,0	17,5	-	17,8	41,4	17,9	-	23,0
	m	-	11,3	11,3	11,0	33,9	-	23,1	58,1	35,1	-	11,3
	w	24,0	49,4	36,3	23,2	-	-	12,2	24,1	-	-	35,0
XVI P00 - P96	i	201,9	159,5	180,9	175,2	110,8	127,2	148,5	130,3	107,2	111,3	155,0
	m	155,3	169,7	225,5	242,3	113,0	181,8	127,1	139,6	175,6	136,1	158,3
	w	252,3	148,3	133,1	104,4	108,6	70,6	171,2	120,6	36,3	84,9	151,6
dar. P00 - P04	i	28,8	11,8	35,0	11,3	23,3	5,8	-	11,8	6,0	11,7	-
	m	22,2	11,3	56,4	-	22,6	11,4	-	11,6	11,7	22,7	-
	w	36,0	12,4	12,1	23,2	24,1	-	-	12,1	-	-	-
P05, P07	i	51,9	53,2	17,5	50,9	5,8	34,7	41,6	17,8	35,7	41,0	45,9
	m	44,4	56,6	33,8	88,1	-	68,2	11,6	-	70,2	45,4	67,9
	w	60,1	49,4	-	11,6	12,1	-	73,4	36,2	-	36,4	23,3
P20 - P29	i	-	47,3	93,4	67,8	52,5	5,8	59,4	71,1	47,6	41,0	86,1
	m	-	56,6	78,9	88,1	67,8	-	69,3	93,0	70,2	68,1	56,5
	w	-	37,1	108,9	46,4	36,2	11,8	48,9	48,3	24,2	12,1	116,6
XVII Q00 - Q99	i	63,4	47,3	40,9	39,6	70,0	86,7	59,4	59,2	101,2	76,2	91,9
	m	99,9	33,9	33,8	44,1	33,9	113,6	57,8	69,8	117,1	68,1	113,1
	w	24,0	61,8	48,4	34,8	108,6	58,8	61,1	48,3	84,8	84,9	70,0
dar. Q20 - Q28	i	40,4	23,6	23,3	17,0	35,0	40,5	23,8	29,6	23,8	29,3	57,4
	m	66,6	22,6	22,6	11,0	-	45,4	23,1	34,9	23,4	34,0	90,5
	w	12,0	24,7	24,2	23,2	72,4	35,3	24,5	24,1	24,2	24,2	23,3
XVIII R95	i	-	17,7	5,8	50,9	17,5	23,1	29,7	11,8	17,9	23,4	23,0
	m	-	22,6	-	66,1	33,9	45,4	11,6	11,6	-	34,0	45,2
	w	-	12,4	12,1	34,8	-	-	48,9	12,1	36,3	12,1	-
XIX S00 - T98	i	5,8	17,7	11,7	17,0	35,0	23,1	23,8	17,8	23,8	23,4	28,7
	m	11,1	11,3	11,3	11,0	56,5	34,1	46,2	11,6	11,7	22,7	33,9
	w	-	24,7	12,1	23,2	12,1	11,8	-	24,1	36,3	24,2	23,3
Insgesamt A00 - T98	i	305,7	342,6	303,5	344,7	285,8	283,2	302,9	302,0	291,7	246,1	373,2
	m	277,4	271,6	315,7	407,5	327,6	409,0	300,3	348,9	362,9	283,6	418,4
	w	336,3	420,3	290,4	278,5	241,2	153,0	305,7	253,3	218,0	206,1	326,6
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	5,8	5,9	5,8	5,7	17,5	11,6	11,9	5,9	6,0	17,6	17,2
	m	11,1	11,3	11,3	11,0	33,9	11,4	23,1	11,6	-	22,7	11,3
	w	-	-	-	-	-	11,8	-	-	12,1	12,1	23,3
dar. W75 - W84	i	5,8	5,9	-	-	11,7	-	5,9	5,9	6,0	-	5,7
	m	11,1	11,3	-	-	22,6	-	11,6	11,6	-	-	11,3
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-
aus XX X85 - Y09	i	-	-	-	11,3	11,7	11,6	11,9	11,8	17,9	5,9	11,5
	m	-	-	-	-	11,3	22,7	23,1	-	11,7	-	22,6
	w	-	-	-	23,2	12,1	-	-	24,1	24,2	12,1	-

Zur Kindersterblichkeit in Sachsen-Anhalt 2015

Im Jahr 2015 verstarben insgesamt 30 Kinder, davon 18 Jungen und 12 Mädchen, im Alter zwischen ein bis unter 15 Jahren. Gegenüber

dem Vorjahr war damit 1 Kindersterbefall mehr zu dokumentieren.

Kindersterbefälle 2005 - 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Geschl.	Gestorbene Kinder										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - 5	i	21	8	15	16	18	18	14	10	7	12	16
	m	12	3	9	10	10	10	8	4	6	5	8
	w	9	5	6	6	8	8	6	6	1	7	8
5 - 10	i	2	2	7	10	9	9	6	10	5	9	6
	m	1	-	3	6	6	4	5	6	3	7	5
	w	1	2	4	4	3	5	1	4	2	2	1
10 - 15	i	12	12	6	9	9	15	8	4	5	8	8
	m	7	6	3	5	5	8	6	2	3	4	5
	w	5	6	3	4	4	7	2	2	2	4	3
Insgesamt	i	35	22	28	35	36	42	28	24	17	29	30
	m	20	9	15	21	21	22	19	12	12	16	18
	w	15	13	13	14	15	20	9	12	5	13	12

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2005 - 2015 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Geschl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 - 5	i	30,1	11,6	22,0	23,6	26,4	26,2	20,5	14,6	10,2	17,5	22,9
	m	33,4	8,5	25,7	28,6	28,5	28,3	22,8	11,4	17,2	14,3	22,4
	w	26,7	15,0	18,2	18,3	24,2	24,0	18,0	17,9	3,0	20,9	23,5
5 - 10	i	2,4	2,4	8,2	11,7	10,5	10,6	7,2	12,1	6,0	10,6	6,9
	m	2,4	-	6,8	13,5	13,6	9,1	11,7	14,1	7,0	16,1	11,2
	w	2,5	4,9	9,6	9,6	7,3	12,2	2,5	10,0	4,9	4,9	2,4
10 - 15	i	14,1	15,9	8,2	12,1	11,7	18,7	9,8	4,8	6,0	9,5	9,5
	m	15,9	15,5	7,9	13,1	12,7	19,4	14,3	4,7	6,9	9,2	11,4
	w	12,1	16,4	8,4	11,1	10,7	18,0	5,1	5,0	5,0	9,9	7,4
Insgesamt	i	14,8	9,6	12,3	15,3	15,6	18,0	12,0	10,2	7,2	12,2	12,4
	m	16,4	7,6	12,8	17,9	17,7	18,3	15,8	9,9	9,9	13,1	14,5
	w	13,0	11,7	11,8	12,7	13,4	17,7	8,0	10,6	4,4	11,3	10,3

Zu den Todesursachen bei den Kindern in Sachsen-Anhalt 2015

In diesem Berichtsjahr waren die **nichtnatürlichen Todesursachen** (23,3 %) gefolgt von den **angeborenen Fehlbildungen** (16,7 %) im Wesentlichen für den Tod im Kindesalter verantwortlich. Bei den nichtnatürlichen Todesfällen waren hauptsächlich Verkehrsunfälle (42,9 %) für den Tod ursächlich.

Neubildungen und Krankheiten des Nervensystems führten zu je 13,3 % im Kindesalter zum Tod. Jedes zehnte verstorbene Kind erlag an **Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**.

Kindersterbefälle 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Ge- schl.	Gestorbene Kinder										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I A00 - B99	i	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	w	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
II C00 - D48	i	3	4	3	12	3	6	5	4	4	4	4
	m	2	1	2	7	3	1	4	2	2	3	3
	w	1	3	1	5	-	5	1	2	2	1	1
dar. C81 - C96	i	1	-	1	3	-	2	1	1	2	-	-
	m	1	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-
	w	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
IV E00 - E90	i	-	2	5	2	1	3	-	1	1	-	3
	m	-	1	4	1	1	2	-	1	1	-	1
	w	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2
VI G00 - G99	i	9	4	4	4	5	6	4	-	-	8	4
	m	4	2	-	2	2	4	3	-	-	3	3
	w	5	2	4	2	3	2	1	-	-	5	1
IX I00 - I99	i	3	-	-	2	2	3	-	-	1	-	2
	m	2	-	-	1	1	3	-	-	-	-	2
	w	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
X J00 - J99	i	2	1	2	3	2	4	4	2	1	4	2
	m	-	1	1	2	-	2	2	1	1	2	1
	w	2	-	1	1	2	2	2	1	-	2	1
XVII Q00 - Q99	i	3	6	4	4	7	6	2	7	2	4	5
	m	1	1	4	3	6	3	1	5	1	1	4
	w	2	5	-	1	1	3	1	2	1	3	1
XIX S00 - T98	i	11	5	7	8	15	12	12	7	7	5	7
	m	9	3	4	5	7	7	8	2	6	4	3
	w	2	2	3	3	8	5	4	5	1	1	4
Insgesamt A00 - T98	i	35	22	28	35	36	42	28	24	17	29	30
	m	20	9	15	21	21	22	19	12	12	16	18
	w	15	13	13	14	15	20	9	12	5	13	12
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	10	3	7	7	13	10	11	6	7	4	6
	m	8	2	4	5	6	5	7	2	6	3	3
	w	2	1	3	2	7	5	4	4	1	1	3
dar. V01 - V99	i	5	2	4	2	3	6	3	2	3	2	3
	m	4	2	1	1	1	2	2	-	2	2	1
	w	1	-	3	1	2	4	1	2	1	-	2
W65 - W74	i	1	1	1	2	3	2	3	3	3	1	1
	m	1	-	1	2	1	1	2	1	3	-	-
	w	-	1	-	-	2	1	1	2	-	1	1
X00 - X09	i	-	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-
	m	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	w	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-

Kindersterblichkeit je 100 000 Kinder 2005 - 2015 nach Todesursachen und Geschlecht

Todesursachen- klasse Pos.-Nr. der ICD-10	Geschl.	Gestorbene Kinder je 100 000 Kinder										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I A00 - B99	i	0,4	-	-	-	-	0,4	-	-	0,4	0,4	0,4
	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8
	w	0,8	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-
II C00 - D48	i	1,3	1,7	1,3	5,3	1,3	2,6	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7
	m	1,6	0,8	1,7	6,0	2,5	0,8	3,3	1,7	1,6	2,5	2,4
	w	0,9	2,7	0,9	4,5	-	4,4	0,9	1,8	1,8	0,9	0,9
dar. C81 - C96	i	0,4	-	0,4	1,3	-	0,9	0,4	0,4	0,8	-	-
	m	0,8	-	0,9	2,6	-	0,8	-	-	0,8	-	-
	w	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	-	-
IV E00 - E90	i	-	0,9	2,2	0,9	0,4	1,3	-	0,4	0,4	-	1,2
	m	-	0,8	3,4	0,9	0,8	1,7	-	0,8	0,8	-	0,8
	w	-	0,9	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-	-	1,7
VI G00 - G99	i	3,8	1,7	1,8	1,8	2,2	2,6	1,7	-	-	3,4	1,7
	m	1,7	1,7	-	1,7	1,7	3,3	2,5	-	-	2,5	2,4
	w	4,3	1,8	3,6	1,8	2,7	1,8	0,9	-	-	4,3	0,9
IX I00 - I99	i	1,3	-	-	0,9	0,9	1,3	-	-	0,4	-	0,8
	m	1,6	-	-	0,9	0,8	2,5	-	-	-	-	1,6
	w	0,9	-	-	0,9	0,9	-	-	-	0,9	-	-
X J00 - J99	i	0,8	0,4	0,9	1,3	0,9	1,7	1,7	0,9	0,4	1,7	0,8
	m	-	0,8	0,9	1,7	-	1,7	1,7	0,8	0,8	1,6	0,8
	w	1,7	-	0,9	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	-	1,7	0,9
XVII Q00 - Q99	i	2,8	2,6	1,8	1,8	3,0	2,6	0,9	3,0	0,8	1,7	2,1
	m	0,8	0,8	3,4	2,6	5,0	2,5	0,8	4,1	0,8	0,8	3,2
	w	1,7	4,5	-	0,9	0,9	2,7	0,9	1,8	0,9	2,6	0,9
XIX S00 - T98	i	4,6	2,2	3,1	3,5	6,5	5,1	5,2	3,0	3,0	2,1	2,9
	m	7,4	2,5	3,4	4,3	5,9	5,8	6,7	1,7	4,9	3,3	2,4
	w	1,7	1,8	2,7	2,7	7,2	4,4	3,5	4,4	0,9	0,9	3,4
Insgesamt A00 - T98	i	14,8	9,6	12,3	15,3	15,6	18,0	12,0	10,2	7,2	12,2	12,4
	m	16,4	7,6	12,8	17,9	17,7	18,3	15,8	9,9	9,9	13,1	14,5
	w	13,0	11,7	11,8	12,7	13,4	17,7	8,0	10,6	4,4	11,3	10,3
aus XX V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	i	4,2	1,3	3,1	3,1	5,6	4,3	4,7	2,6	3,0	1,7	2,5
	m	6,5	1,7	3,4	4,3	5,0	4,2	5,8	1,7	4,9	2,5	2,4
	w	1,7	0,9	2,7	1,8	6,3	4,4	3,5	3,5	0,9	0,9	2,6
dar. V01 - V99	i	2,1	0,9	1,8	0,9	1,3	2,6	1,3	0,9	1,3	0,8	1,2
	m	3,3	1,7	0,9	0,9	0,8	1,7	1,7	-	1,6	1,6	0,8
	w	0,9	-	2,7	0,9	1,8	3,5	0,9	1,8	0,9	-	1,7
W65 - W74	i	0,4	0,4	0,4	0,9	1,3	0,9	1,3	1,3	1,3	0,4	0,4
	m	0,8	-	0,9	1,7	0,8	0,8	1,7	0,8	2,5	-	-
	w	-	0,9	-	-	1,8	0,9	0,9	1,8	-	0,9	0,9
X00 - X09	i	-	-	0,9	0,4	1,7	0,4	-	-	-	-	-
	m	-	-	0,9	0,9	1,7	0,8	-	-	-	-	-
	w	-	-	0,9	-	1,8	-	-	-	-	-	-

Veröffentlichungen ¹⁾ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat November 2016 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 11/16	5,50
4 S 0 36	S	6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose Land Sachsen-Anhalt Annahmen und Ergebnisse	4,00
3 A 1 08	A I, A II - j/15	Bevölkerung und Natürliche Bevölkerungsbewegung - 1990 bis 2015 -	9,00
3 A 1 15	A I, AVI - j/15	Ergebnisse des Mikrozensus - Ergebnisse nach Kreisen - 2015	5,00
3 A 3 01	A III - j/15	Wanderungen und Wanderungsströme - Jahr 2015 -	7,50
3 A 6 05	A VI - j/15	Arbeitsmarkt	4,00
3 B 1 02	B I - j/15	Allgemeinbildende Schulen - Schuljahr 2015/16 - Schuljahresendstatistik	8,00
3 E 1 09	E I - vj-1/16	Produktion ausgewählter Erzeugnisse im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - I. Quartal 2016	2,50
3 E 1 02	E I - m-5/16	Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Mai 2016 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 2 01	E II, E III - m-6/16	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Juni 2016	2,50
3 E 2 01	E II - m-7/16	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Juli 2016	2,50
3 E 2 01	E II - m-8/16	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe August 2016	2,50
3 G 1 01	G I - m-5/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - Mai 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-6/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - Juni 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-7/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - Juli 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 01	G I - m-8/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel - August 2016 - Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 1 03	G I - m-4/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel - April 2016 -	1,50
3 G 1 03	G I - m-5/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel - Mai 2016 -	1,50
3 G 1 03	G I - m-6/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel - Juni 2016 -	1,50
3 G 1 03	G I - m-7/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel - Juli 2016 -	1,50
3 G 4 01	G IV - m-5/16	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Mai 2016, Januar - Mai 2016 - Vorläufige Ergebnisse -	6,00
3 G 4 01	G IV - m-6/16	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Juni 2016, Januar - Juni 2016 - Vorläufige Ergebnisse -	6,00

Noch Veröffentlichungen ¹⁾ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat November 2016 erschienen:

Bestell-Nr.	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
3 G 4 01	G IV - m-7/16	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Juli 2016, Januar - Juli 2016 - Vorläufige Ergebnisse -	6,00
3 G 4 02	G IV - m-5/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe - Mai 2016 - Vorläufige Ergebnisse	1,50
3 G 4 02	G IV - m-6/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe - Juni 2016 - Vorläufige Ergebnisse	1,50
3 G 4 02	G IV - m-7/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe - Juli 2016 - Vorläufige Ergebnisse	1,50
3 G 4 02	G IV - m-8/16	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe - August 2016 - Vorläufige Ergebnisse	1,50
3 H 1 01	H I - m-1/16	Straßenverkehrsunfälle - Januar 2016 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I - m-2/16	Straßenverkehrsunfälle - Februar 2016 - Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 2 01	H II - m-5/16	Binnenschifffahrt - Mai 2016 -	4,00
3 L 2 03	L II - j/15	Realsteuervergleich - Jahr 2015 - Realsteuern und kommunale Steuerbeteiligung	11,50
3 L 4 01	L IV - j/14	Die Umsätze und ihre Besteuerung - Ergebnisse 2014 - Umsatzsteuerstatistik Veranlagungen	17,50
3 L 4 04	L IV - j/10	Einkommen der Körperschaftsteuerpflichtigen und die Besteuerung Ergebnisse 2010 - Körperschaftsteuerstatistik	6,50
3 L 4 05	L IV - j/11	Gewerbsteuerpflichtige, Besteuerungsgrundlagen und Steuermessbeträge Ergebnisse 2011 - Gewerbesteuerstatistik	7,50
3 L 4 06	L IV - j/15	Vererben, Erben und Schenken - Ergebnisse 2015 - Erbschaft- und Schenkungssteuerstatistik	3,00
3 M 1 01	M I - vj-2/16	Verbraucherpreisindex - Juni 2016	5,00
3 M 1 02	M I - vj-3/16	Preisindizes für Bauwerke - August 2016	3,00
3 O 2 02	O II - 5j/13	Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte - Jahr 2013 -	3,00
3 P 1 04	P I - j/14	Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und Landkreisen - 2000 - 2014; Stand: Frühjahr 2016	7,50
3 P 1 05	P I - j/14	Primäreinkommen und Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen - 2000 bis 2014; Stand: Frühjahr 2016 -	3,50
3 P 1 06	P I - j/14	Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den kreisfreien Städten und Landkreisen - 2000 - 2014; Stand: Februar 2016	11,00
3 Q 2 01	Q II - j/14	Abfallwirtschaft - Jahr 2014	9,50

1) Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen