

**Landesamt für  
Datenverarbeitung und Statistik**



# **Statistische Berichte**

---

A IV 5-j/92

**Tuberkulose  
im Land Brandenburg**

**1992**

**Erarbeitet:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

**Herausgeber:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52  
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405  
Fax: (0331) 39 418  
BTX: \*47474#

Erschienen im Oktober 1993  
Preis: 4,00 DM

**Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !**

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellen	
1. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Geschlecht 1988 bis 1992	7
2. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht 1992	8
3. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht 1992	9
4. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Kreisen 1992	10
5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht 1992	11
6. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht 1992	12
7. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren und Kreisen 1992	13
8. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht 1992	14
9. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht 1992	15
10. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung und Kreisen 1992	16
11. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken nach Gründen und Geschlecht 1992	17
12. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht 1992	18

## **Erläuterungen**

### **Ziel der Statistik**

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht. Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepaßte Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

### **Rechtsgrundlage**

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2555).

### **Berichtskreis**

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

### **Methodische Hinweise**

Das aufbereitete Datenmaterial beruht für Angaben von 1980 bis 1987 auf der Auswertung der drei Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam. Hierfür war eine kreisliche Bereinigung nicht möglich. Für 1988 bis 1990 wurden die Einzelfallmeldungen an das Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, Außenstelle Berlin-Buch, zugrunde gelegt. Ab 1991 sind die Meldebögen der Gesundheitsämter Grundlage der Auswertung. Bis 1990 erfolgte keine Untergliederung nach der Staatsangehörigkeit. Diese Aussage wird für Ergebnisse ab 1991 getroffen. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Angaben zur mittleren Bevölkerung nach Altersgruppen für 1992 noch nicht zur Verfügung standen, konnten Berechnungen absoluter Zahlen, bezogen auf 100 000 der Bevölkerung, nur für die Bevölkerung insgesamt erfolgen.

### **Systematiken**

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

## Allgemeiner Überblick

Als Tuberkulose im Sinne der statistischen Erfassung gelten Erkrankungen, die durch

- Mycobacterium tuberculosis,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium africanum oder
- Mycobacterium avium

verursacht werden.

Zu den aktiven Tuberkuloseerkrankungen zählen die Tuberkulosen mit Bakteriennachweis, sonst mit entsprechendem Röntgen- oder Organbefund bei in der Regel positiver Tuberkulinreaktion.

Als Zugang an Tuberkulose gelten Erst- und Wiedererkrankte. Nicht gemeldet sind Konvertoren sowie überwachungsbedürftige Tuberkulosen der Atmungsorgane, überwachungsbedürftige Tuberkulosen anderer Organe sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Die Übersicht über die Jahre 1980 bis 1987 wird durch die Summe der drei Bezirke Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam gebildet. Ergebnisse nach Diagnosegruppen, Alter und Geschlecht können für das Land Brandenburg über diesen Zeitraum noch nicht ausgewiesen werden, da hierfür die Rückrechnung nicht abgeschlossen ist. Insgesamt wurden folgende Neuerkrankungen an Tuberkulose erfaßt:

Jahr	Neuerkrankungen	
	absolut	je 100 000 der Bevölkerung
1980	659	24,4
1981	605	22,3
1982	557	20,6
1983	540	19,9
1984	478	17,7
1985	482	17,8
1986	495	18,3
1987	455	16,7

Der dabei erkennbare rückläufige Trend setzt sich auch in den Jahren ab 1988 fort.

Von den Zugängen an Tuberkulose insgesamt entfallen 1992 87,3 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei 12,7 Prozent aller Zugänge wurden Tuberkulosen anderer Organe diagnostiziert. An Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankten mehr männliche Personen, während bei Tuberkulose anderer Organe Erkrankungsfälle weiblicher Personen überwiegen.

Die Zahl der an Tuberkulose erkrankten Ausländer betrug 1991 11 Zugänge. 1992 wurden 21 männliche und 5 weibliche Ausländer mit Erkrankungen an Tuberkulose der Atmungsorgane erfaßt. 2 Erkrankungsfälle betrafen Tuberkulose anderer Organe.

Die im Land Brandenburg ausgewerteten Meldebögen beinhalten bei Zugängen an Tuberkulose auch Aussagen zu festgestellten Risikofaktoren nach Diagnosegruppen, Alter und Geschlecht. Dabei sind bei zwei Drittel aller Zugänge keine Risikofaktoren genannt, für 18 Prozent werden sonstige Risikofaktoren aufgeführt und je 8 Prozent aller Zugänge an Tuberkulose sind neben der erfaßten Erkrankung Diabetes mellitus oder Alkohol Risikofaktoren. Diese Faktoren konzentrieren sich vorrangig auf die umfangreichste Diagnosegruppe der Tuberkulose der Atmungsorgane.

Der größte Teil der 322 Zugänge insgesamt erfolgte als Ersterkrankung (78,6 Prozent). 14 Prozent der Zugänge sind durch Wiedererkrankung der Patienten begründet. Reichlich 7 Prozent der Meldungen besagen, daß erst durch Autopsie die Erkrankung bekannt wurde.

Die Aussagen zum Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken aus der Betreuung durch Tod weisen für 1992 mit 42 Sterbefällen eine höhere Anzahl aus als bei der Todesursachenstatistik registriert wurde. Gründe dafür sind die Meldungen über solche Sterbefälle, wo Tuberkulose nicht als Diagnose des Grundleidens angegeben wurde, diese Patienten jedoch bisher in Betreuung waren.

1. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Geschlecht  
1988 bis 1992

Jahr	Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
		Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
		insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
i = insgesamt m = männlich w = weiblich							
Anzahl							
1988 i	454	364	208	156	330	34	90
m	271	237	134	103	215	22	34
w	183	127	74	53	115	12	56
1989 i	439	362	223	139	322	40	77
m	258	227	140	87	203	24	31
w	181	135	83	52	119	16	46
1990 i	386	325	183	142	306	19	61
m	229	206	114	92	193	13	23
w	157	119	69	50	113	6	38
1991 i	327	291	195	96	282	9	36
m	199	182	130	52	175	7	17
w	128	109	65	44	107	2	19
1992 i	322	281	192	89	273	8	41
m	196	181	123	58	178	3	15
w	126	100	69	31	95	5	26
je 100 000 der Bevölkerung							
1988 i	16,7	13,4	7,6	5,7	12,1	1,2	3,3
m	20,6	18,0	10,2	7,8	16,3	1,7	2,6
w	13,0	9,0	5,3	3,8	8,2	0,9	4,0
1989 i	16,1	13,3	8,2	5,1	11,8	1,5	2,8
m	19,6	17,2	10,6	6,6	15,4	1,8	2,3
w	12,9	9,6	5,9	3,7	8,5	1,1	3,3
1990 i	14,9	12,5	7,1	5,5	11,8	0,7	2,4
m	18,3	16,4	9,1	7,3	15,4	1,0	1,8
w	11,7	8,9	5,2	3,7	8,4	0,4	2,8
1991 i	12,8	11,4	7,6	3,7	11,0	0,4	1,4
m	16,1	14,7	10,5	4,2	14,1	0,6	1,4
w	9,7	8,2	4,9	3,3	8,1	0,2	1,4
1992 i	12,7	11,0	7,5	3,5	10,7	0,3	1,6
m	15,9	14,7	10,0	4,7	14,4	0,2	1,2
w	9,6	7,6	5,3	2,4	7,3	0,4	2,0

## 2. Zugänge der an Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	2	-	1	-	1	-	2	-	-
5 - 10	3	1	-	-	3	1	3	1	-	-
10 - 15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
15 - 20	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
20 - 25	5	6	5	5	-	1	5	6	-	-
25 - 30	13	10	10	8	3	2	13	9	-	1
30 - 35	29	10	18	7	11	3	29	10	-	-
35 - 40	13	6	8	3	5	3	13	6	-	-
40 - 45	8	1	6	-	2	1	8	1	-	-
45 - 50	9	1	7	1	2	-	9	1	-	-
50 - 55	21	4	12	3	9	1	21	3	-	1
55 - 60	10	2	8	1	2	1	10	2	-	-
60 - 65	23	7	14	4	9	3	22	7	1	-
65 - 70	8	9	6	5	2	4	8	8	-	1
70 - 75	12	10	9	8	3	2	12	9	-	1
75 und älter	26	29	20	23	6	6	24	29	2	-
Insgesamt	181	100	123	69	58	31	178	95	3	5

3. Zugänge der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Altersgruppen und Geschlecht 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		Meningen		Urogenital- trakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich
unter 5	2	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
35 - 40	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
40 - 45	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
45 - 50	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
50 - 55	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55 - 60	3	4	-	-	1	1	2	-	-	3	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - 70	2	4	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2
70 - 75	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
75 und älter	3	7	-	-	1	-	1	-	-	6	1	1
Insgesamt	15	26	1	-	6	5	4	-	1	14	3	7

#### 4. Zugänge der an Tuberkulose Erkrankten nach Diagnosegruppen und Kreisen 1992

Verwaltungsbezirk	Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose insgesamt je 100 000 der Bevölkerung	Tuberkulose nach Diagnosegruppen		
			Lungen- tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe
Brandenburg					
an der Havel, Stadt	11	12,4	9	-	2
Cottbus, Stadt	12	9,8	10	1	1
Eisenhüttenstadt, Stadt	14	29,2	12	-	2
Frankfurt(Oder), Stadt	25	29,4	22	2	1
Potsdam, Stadt	20	14,4	17	-	3
Schwedt/Oder, Stadt	2	4,0	2	-	-
Angermünde	3	9,1	3	-	-
Bad Freienwalde	5	14,1	4	-	1
Bad Liebenwerda	5	9,8	4	-	1
Beeskow	7	19,6	7	-	-
Belzig	12	37,2	10	-	2
Bernau	5	7,1	5	-	-
Brandenburg, Land	1	2,8	1	-	-
Calau	1	1,9	1	-	-
Cottbus, Land	5	12,0	4	-	1
Eberswalde	8	10,3	7	-	1
Eisenhüttenstadt, Land	2	10,2	2	-	-
Finsterwalde	4	7,6	4	-	-
Forst	3	8,2	3	-	-
Fürstenwalde	23	22,9	22	-	1
Gransee	1	2,4	-	-	1
Guben	2	5,2	2	-	-
Herzberg	1	2,8	1	-	-
Jüterbog	4	11,5	3	-	1
Königs Wusterhausen	17	20,3	13	2	2
Kyritz	1	3,1	1	-	-
Lübben	5	15,9	4	-	1
Luckau	6	21,4	6	-	-
Luckenwalde	5	12,0	4	-	1
Nauen	14	19,9	13	-	1
Neuruppin	10	16,0	7	-	3
Oranienburg	8	6,4	7	-	1
Perleberg	7	9,8	4	-	3
Potsdam, Land	10	10,3	10	-	-
Prenzlau	4	8,3	4	-	-
Pritzwalk	2	6,5	1	-	1
Rathenow	4	6,8	3	-	1
Seelow	3	7,9	3	-	-
Senftenberg	16	14,9	14	-	2
Spremberg	6	14,8	4	1	1
Strausberg	10	11,5	4	2	4
Templin	5	14,6	4	-	1
Wittstock	4	17,1	3	-	1
Zossen	9	12,3	9	-	-
Land insgesamt	322	12,7	273	8	41

5. Zugänge an Tuberkulose insgesamt nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich	Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
			ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen- erkrankung	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
unter 5	i	5	4	-	-	-	1
	m	2	2	-	-	-	-
	w	3	2	-	-	-	1
5 - 10	i	3	3	-	-	-	-
	m	2	2	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
10 - 15	i	1	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
15 - 20	i	2	2	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
20 - 25	i	12	8	-	-	-	4
	m	5	4	-	-	-	1
	w	7	4	-	-	-	3
25 - 30	i	23	13	-	-	3	7
	m	13	6	-	-	2	5
	w	10	7	-	-	1	2
30 - 35	i	41	33	-	1	4	3
	m	30	23	-	1	4	2
	w	11	10	-	-	-	1
35 - 40	i	21	13	-	-	4	4
	m	14	9	-	-	2	3
	w	7	4	-	-	2	1
40 - 45	i	10	8	-	1	-	1
	m	8	6	-	1	-	1
	w	2	2	-	-	-	-
45 - 50	i	14	6	-	-	7	1
	m	11	3	-	-	7	1
	w	3	3	-	-	-	-
50 - 55	i	26	13	-	-	5	8
	m	21	10	-	-	5	6
	w	5	3	-	-	-	2
55 - 60	i	19	11	-	4	-	4
	m	13	7	-	4	-	2
	w	6	4	-	-	-	2
60 - 65	i	30	19	2	2	3	4
	m	23	15	2	1	1	4
	w	7	4	-	1	2	-
65 - 70	i	23	17	-	4	-	2
	m	10	9	-	-	-	1
	w	13	8	-	4	-	1
70 - 75	i	27	14	1	6	1	5
	m	14	7	1	2	1	3
	w	13	7	-	4	-	2
75 und älter	i	65	40	2	9	-	14
	m	29	23	2	1	-	3
	w	36	17	-	8	-	11
Insgesamt	i	322	205	5	27	27	58
	m	196	127	5	10	22	32
	w	126	78	-	17	5	26

### 3. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht 1992

Diagnose- gruppe	Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich	Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
			ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen- erkrankung	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tb-Bakterien							
direkt im Sputumausstrich	i	143	78	3	19	16	27
	m	95	56	3	7	12	17
	w	48	22	-	12	4	10
in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	i	49	30	1	3	2	13
	m	28	20	1	-	1	6
	w	21	10	-	3	1	7
Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tb-Bakterien							
Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	59	43	-	1	6	9
	m	38	26	-	1	6	5
	w	21	17	-	-	-	4
Pleuritis tuberculosa	i	8	6	1	-	-	1
	m	3	1	1	-	-	1
	w	5	5	-	-	-	-
postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	22	14	-	2	3	3
	m	17	10	-	1	3	3
	w	5	4	-	1	-	-
Tuberkulose anderer Organe							
Tuberkulose der Meningen	i	1	1	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose des Urogenitaltraktes	i	11	9	-	1	-	1
	m	6	5	-	1	-	-
	w	5	4	-	-	-	1
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	i	4	4	-	-	-	-
	m	4	4	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	i	15	11	-	-	-	4
	m	1	1	-	-	-	-
	w	14	10	-	-	-	4
Tuberkulose sonstiger Organe	i	10	9	-	1	-	-
	m	3	3	-	-	-	-
	w	7	6	-	1	-	-
Tuberkulose insgesamt	i	322	205	5	27	27	58
	m	196	127	5	10	22	32
	w	126	78	-	17	5	26

7. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren und Kreisen 1992

Verwaltungsbezirk	Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
		ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen- erkrankungen	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
Brandenburg an der Havel,Stadt	11	7	-	2	1	1
Cottbus,Stadt	12	9	-	2	1	-
Eisenhüttenstadt,Stadt	14	11	-	-	3	-
Frankfurt(Oder),Stadt	25	19	-	1	2	3
Potsdam,Stadt	20	13	-	4	2	1
Schwedt/Oder,Stadt	2	1	-	-	-	1
Angermünde	3	3	-	-	-	-
Bad Freienwalde	5	3	-	-	2	-
Bad Liebenwerda	5	4	-	1	-	-
Beeskow	7	-	-	-	3	4
Belzig	12	11	1	-	-	-
Bernau	5	4	-	-	-	1
Brandenburg,Land	1	1	-	-	-	-
Calau	1	-	-	-	-	1
Cottbus,Land	5	4	-	-	1	-
Eberswalde	8	5	-	2	1	-
Eisenhüttenstadt,Land	2	2	-	-	-	-
Finsterwalde	4	2	-	-	-	2
Forst	3	1	-	1	1	-
Fürstenwalde	23	7	-	-	1	15
Gransee	1	1	-	-	-	-
Guben	2	1	1	-	-	-
Herzberg	1	-	-	-	-	1
Jüterbog	4	1	-	-	3	-
Königs Wusterhausen	17	11	1	2	2	1
Kyritz	1	-	-	-	1	-
Lübben	5	3	-	-	-	2
Luckau	6	5	-	-	1	-
Luckenwalde	5	5	-	-	-	-
Nauen	14	8	-	5	-	1
Neuruppin	10	4	-	2	1	3
Oranienburg	8	4	-	-	-	4
Perleberg	7	4	-	3	-	-
Potsdam,Land	10	5	-	-	-	5
Prenzlau	4	2	-	-	-	2
Pritzwalk	2	2	-	-	-	-
Rathenow	4	3	-	-	-	1
Seelow	3	3	-	-	-	-
Senftenberg	16	16	-	-	-	-
Spremberg	6	3	1	-	-	2
Strausberg	10	8	1	1	-	-
Templin	5	2	-	-	-	3
Wittstock	4	1	-	1	1	1
Zossen	9	6	-	-	-	3
Land insgesamt	322	205	5	27	27	58

# 8. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich	Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
			Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
					insgesamt	darunter in laufender Überwachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
unter 5	i	5	5	-	-	-	-
	m	2	2	-	-	-	-
	w	3	3	-	-	-	-
5 - 10	i	3	3	-	-	-	-
	m	2	2	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
10 - 15	i	1	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
15 - 20	i	2	2	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
20 - 25	i	12	11	-	1	1	1
	m	5	5	-	-	-	-
	w	7	6	-	1	1	1
25 - 30	i	23	21	1	1	-	-
	m	13	12	-	1	-	-
	w	10	9	1	-	-	-
30 - 35	i	41	39	-	2	-	2
	m	30	28	-	2	-	2
	w	11	11	-	-	-	-
35 - 40	i	21	19	-	2	1	1
	m	14	13	-	1	-	-
	w	7	6	-	1	1	1
40 - 45	i	10	9	-	1	1	1
	m	8	7	-	1	1	1
	w	2	2	-	-	-	-
45 - 50	i	14	13	1	-	-	-
	m	11	10	1	-	-	-
	w	3	3	-	-	-	-
50 - 55	i	26	22	1	3	2	2
	m	21	17	1	3	2	2
	w	5	5	-	-	-	-
55 - 60	i	19	14	1	4	1	3
	m	13	10	-	3	1	3
	w	6	4	1	1	-	-
60 - 65	i	30	22	3	5	-	1
	m	23	16	3	4	-	-
	w	7	6	-	1	-	1
65 - 70	i	23	12	4	7	5	5
	m	10	5	1	4	3	3
	w	13	7	3	3	2	2
70 - 75	i	27	20	-	7	3	4
	m	14	9	-	5	2	3
	w	13	11	-	2	1	1
75 und älter	i	65	40	13	12	9	6
	m	29	20	5	4	3	2
	w	36	20	8	8	6	4
Insgesamt	i	322	253	24	45	23	26
	m	196	157	11	28	12	16
	w	126	96	13	17	11	10

9. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht 1992

Diagnose- gruppe	Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich	Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
			Erst- erkrank- ung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
					insge- samt	darunter in laufender Überwa- chung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
<b>Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tb-Bakterien</b>							
direkt im Sputumausstrich	i	143	122	4	17	10	13
	m	95	79	4	12	6	8
	w	48	43	-	5	4	5
in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	i	49	28	10	11	6	6
	m	28	16	4	8	3	4
	w	21	12	6	3	3	2
<b>Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tb-Bakterien</b>							
Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	59	53	1	5	3	2
	m	38	37	-	1	1	1
	w	21	16	1	4	2	1
Pleuritis tuberculosa	i	8	7	-	1	1	1
	m	3	3	-	-	-	-
	w	5	4	-	1	1	1
postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	22	11	2	9	3	4
	m	17	9	1	7	2	3
	w	5	2	1	2	1	1
<b>Tuberkulose anderer Organe</b>							
Tuberkulose der Meningen	i	1	1	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose des Urogenitaltraktes	i	11	10	-	1	-	-
	m	6	6	-	-	-	-
	w	5	4	-	1	-	-
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	i	4	3	1	-	-	-
	m	4	3	1	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	i	15	11	4	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	14	10	4	-	-	-
Tuberkulose sonstiger Organe	i	10	7	2	1	-	-
	m	3	2	1	-	-	-
	w	7	5	1	1	-	-
<b>Tuberkulose insgesamt</b>	i	322	253	24	45	23	26
	m	196	157	11	28	12	16
	w	126	96	13	17	11	10

# 10. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung und Kreisen 1992

Verwaltungsbezirk	Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
		Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
				insgesamt	darunter in laufender Überwachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
Brandenburg an der Havel, Stadt	11	9	1	1	1	1
Cottbus, Stadt	12	10	1	1	-	1
Eisenhüttenstadt, Stadt	14	13	1	-	-	-
Frankfurt(Oder), Stadt	25	19	2	4	3	3
Potsdam, Stadt	20	19	-	1	-	-
Schwedt/Oder, Stadt	2	2	-	-	-	-
Angermünde	3	2	-	1	-	1
Bad Freienwalde	5	2	2	1	-	-
Bad Liebenwerda	5	5	-	-	-	-
Beeskow	7	7	-	-	-	-
Belzig	12	9	-	3	2	1
Bernau	5	2	1	2	1	1
Brandenburg, Land	1	1	-	-	-	-
Calau	1	1	-	-	-	-
Cottbus, Land	5	5	-	-	-	-
Eberswalde	8	6	-	2	1	1
Eisenhüttenstadt, Land	2	1	-	1	1	1
Finstertal	4	4	-	-	-	-
Forst	3	3	-	-	-	-
Fürstentum	23	17	2	4	2	2
Gransee	1	1	-	-	-	-
Guben	2	2	-	-	-	-
Herzberg	1	-	-	1	-	-
Jüterbog	4	3	-	1	1	1
Königs Wusterhausen	17	15	-	2	2	-
Kyritz	1	1	-	-	-	-
Lübben	5	3	2	-	-	-
Luckau	6	6	-	-	-	-
Luckenwalde	5	3	-	2	-	2
Nauen	14	11	1	2	-	2
Neuruppin	10	3	4	3	-	1
Oranienburg	8	7	-	1	-	-
Perleberg	7	6	1	-	-	-
Potsdam, Land	10	8	-	2	2	1
Prenzlau	4	2	2	-	-	-
Pritzwalk	2	1	1	-	-	-
Rathenow	4	3	-	1	1	1
Seelow	3	2	-	1	1	1
Senftenberg	16	16	-	-	-	-
Spremberg	6	3	1	2	2	1
Strausberg	10	8	1	1	1	1
Templin	5	3	-	2	1	1
Wittstock	4	3	1	-	-	-
Zossen	9	6	-	3	1	2
Land insgesamt	322	253	24	45	23	26

11. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken nach Gründen und Geschlecht 1992

Veränderungen/ Ausscheiden nach Gründen	insgesamt	männlich	weiblich
Übergang als über- wachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane	182	103	79
Übergang als über- wachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe	26	10	16
Tod an Tuberkulose	13	9	4
Tod an Tuberkulose, erst durch Autopsie erfaßt	25	12	13
Tod an Spätfolgen der Tuberkulose	4	3	1
Fortzug	10	10	-
Diagnoseberichtigung	5	3	2
Abgang aus sonstigen Gründen	35	20	15

12. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht 1992

Alter von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose insgesamt		Tuberkulose nach Diagnosegruppen							
			Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			insgesamt		Lungen- tuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 45	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
50 - 55	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-
55 - 60	3	1	3	1	3	1	-	-	-	-
60 - 65	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
65 - 70	3	3	2	2	2	2	-	-	1	1
70 - 75	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-
75 und älter	5	11	4	7	4	7	-	-	1	4
Insgesamt	24	18	22	13	22	13	-	-	2	5



