



Statistische Berichte

A IV 5 - j / 96

**Tuberkulose
im Land Brandenburg**

1996

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#
E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im Mai 1997
Preis: 4,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1996 nach Diagnosegruppen und Geschlecht	6
2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1996 nach Diagnosegruppen und Geschlecht	7
3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht	8
4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht	9
5. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken	10
6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1996 nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht	11
7. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht	12
8. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach Risikofaktoren und Verwaltungsbezirken	13
9. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht	14
10. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht	15
11. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach dem Grund der Meldung und Verwaltungsbezirken	16
12. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken 1996 nach Gründen und Geschlecht	17
13. Gestorbene an Tuberkulose 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht	18

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht. Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepaßte Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262, 1980 BGBl. I S. 151), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bundesseuchengesetzes (BSeuchÄndG) vom 25.05.1995 (BGBl. I S. 746) und durch Art. 10 des Gesetzes vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Art. 7 der Statistikänderungsverordnung (StatÄndV) vom 20.11.1996 (BGBl. I S. 1804).

Berichtskreis

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

Methodische Hinweise

Grundlage der Auswertung sind die Meldebögen der Gesundheitsämter. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Als Tuberkulose im Sinne der statistischen Erfassung gelten Erkrankungen, die durch

- Mycobacterium tuberculosis,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium africanum oder
- Mycobacterium avium

verursacht werden.

Zu den aktiven Tuberkuloseerkrankungen zählen die Tuberkulosen mit Bakteriennachweis, sonst mit entsprechendem Röntgen- oder Organbefund bei in der Regel positiver Tuberkulinreaktion.

Als Zugang an Tuberkulose gelten Erst- und Wiedererkrankte. Nicht gemeldet sind Konvertoren sowie überwachungsbedürftige Tuberkulosen der Atmungsorgane, überwachungsbedürftige Tuberkulosen anderer Organe sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Die Zahl der für das Land Brandenburg gemeldeten Zugänge an Tuberkulose betrug 1996 314. Von den neu gemeldeten Erkrankungen entfallen 87,3 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei 12,7 Prozent aller Tuberkulosen wurde Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Männer erkrankten weitaus häufiger an Tuberkulose als Frauen. 13,4 Prozent aller Zugänge an Tuberkulose (42 Personen) waren Ausländer.

Die im Land Brandenburg ausgewerteten Meldebogen beinhalten bei Zugängen an Tuberkulose auch Aussagen zu festgestellten Risikofaktoren nach Diagnosegruppen, Alter und Geschlecht. Für 59,9 Prozent aller Zugänge sind keine Risikofaktoren aufgeführt, für 4,8 Prozent wurde Diabetes mellitus als Risikofaktor genannt. 1,3 Prozent der Tuberkulosekranken wiesen den Risikofaktor Staublungenerkrankung aus. 11,8 Prozent bzw. 22,3 Prozent aller Neuzugänge an Tuberkulose sind mit dem Risikofaktor Alkohol oder sonstigen Risikofaktoren erfaßt worden.

Die größte Zahl der 314 Zugänge an Tuberkulose erfolgte als Ersterkrankung (86,9 %). 10,8 Prozent der Zugänge sind durch Wiedererkrankung der Patienten begründet.

Die Aussagen zum Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken aus der Betreuung durch Tod weisen mit 9 Sterbefällen eine hohe Differenz zu den Angaben der Todesursachenstatistik der Diagnose-Nr. 011 - 018 und 137 ICD/9. aus.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)/Abkürzungen

- nichts vorhanden (genau null)
- 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- i insgesamt
- m männlich
- w weiblich

1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1996 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
			Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
1991	i	327	291	195	96	282	9	36
	m	199	182	130	52	175	7	17
	w	128	109	65	44	107	2	19
1992	i	322	281	192	89	273	8	41
	m	196	181	123	58	178	3	15
	w	126	100	69	31	95	5	26
1993	i	394	356	233	123	345	11	38
	m	253	239	161	78	230	9	14
	w	141	117	72	45	115	2	24
1994	i	348	307	216	91	294	13	41
	m	238	220	157	63	210	10	18
	w	110	87	59	28	84	3	23
1995	i	323	282	213	69	268	14	41
	m	204	185	142	43	176	9	19
	w	119	97	71	26	92	5	22
1996	i	314	274	206	68	265	9	40
	m	209	187	144	43	182	5	22
	w	105	87	62	25	83	4	18

2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1996 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					
			Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien			
1991	i	12,8	11,4	7,6	3,7	11,0	0,4	1,4
	m	16,1	14,7	10,5	4,2	14,1	0,6	1,4
	w	9,7	8,2	4,9	3,3	8,1	0,2	1,4
1992	i	12,7	11,0	7,5	3,5	10,7	0,3	1,6
	m	15,9	14,7	10,0	4,7	14,4	0,2	1,2
	w	9,6	7,6	5,3	2,4	7,3	0,4	2,0
1993	i	15,5	14,0	9,2	4,8	13,6	0,4	1,5
	m	20,4	19,2	13,0	6,3	18,5	0,7	1,1
	w	10,8	9,0	5,5	3,5	8,8	0,2	1,8
1994	i	13,7	12,1	8,5	3,6	11,6	0,5	1,6
	m	19,2	17,7	12,7	5,1	16,9	0,8	1,5
	w	8,5	6,7	4,6	2,2	6,5	0,2	1,8
1995	i	12,7	11,1	8,4	2,7	10,6	0,6	1,6
	m	16,4	14,9	11,4	3,5	14,1	0,7	1,5
	w	9,2	7,5	5,5	2,0	7,1	0,4	1,7
1996	i	12,3	10,8	8,1	2,7	10,4	0,4	1,6
	m	16,7	14,9	11,5	3,4	14,5	0,4	1,8
	w	8,1	6,7	4,8	1,9	6,4	0,3	1,4

3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
5 - 10	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	5	4	4	2	1	2	5	4	-	-
20 - 25	4	3	3	3	1	-	3	3	1	-
25 - 30	15	7	14	5	1	2	15	7	-	-
30 - 35	9	9	6	7	3	2	8	8	1	1
35 - 40	16	7	12	6	4	1	16	7	-	-
40 - 45	28	5	24	4	4	1	28	5	-	-
45 - 50	12	3	10	2	2	1	12	3	-	-
50 - 55	13	4	8	4	5	-	13	4	-	-
55 - 60	15	4	9	1	6	3	14	3	1	1
60 - 65	23	1	17	-	6	1	23	1	-	-
65 - 70	13	5	12	4	1	1	13	5	-	-
70 - 75	11	5	6	4	5	1	9	4	2	1
75 und älter	21	29	19	20	2	9	21	28	-	1
Insgesamt	187	87	144	62	43	25	182	83	5	4

4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		davon									
			Meningen		Urogenitaltrakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
30 - 35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
45 - 50	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50 - 55	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
55 - 60	3	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
60 - 65	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
65 - 70	3	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
70 - 75	1	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
75 und älter	4	9	-	-	1	1	-	-	1	5	2	3
Insgesamt	22	18	1	-	8	5	1	2	6	8	6	3

5. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge		Tuberkulose nach Diagnosegruppen			Neuerkrankungen insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	darunter Ausländer	Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe	
Kreisfreie Städte						
Brandenburg an der Havel	13	4	8	1	4	15,3
Cottbus	13	1	11	1	1	10,6
Frankfurt (Oder)	19	2	14	1	4	23,6
Potsdam	16	1	12	1	3	11,8
Landkreise						
Barnim	14	1	10	-	4	9,2
Dahme-Spreewald	19	2	12	3	4	13,0
Elbe-Elster	14	1	12	-	2	10,2
Havelland	15	2	14	-	1	11,3
Märkisch-Oderland	21	-	18	-	3	12,1
Oberhavel	25	5	24	-	1	14,5
Oberspreewald-Lausitz	18	1	17	-	1	11,5
Oder-Spree	35	13	33	-	2	18,3
Ostprignitz-Ruppin	14	3	12	-	2	12,0
Potsdam-Mittelmark	21	-	19	1	1	11,5
Prignitz	8	1	8	-	-	7,9
Spree-Neiße	23	4	20	1	2	15,0
Teltow-Fläming	11	1	8	-	3	7,4
Uckermark	15	-	13	-	2	9,4
Land Brandenburg	314	42	265	9	40	12,3

6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1996 nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
			ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen erkrankung	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
unter 5	i	1	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
5 - 10	i	2	1	-	-	-	1
	m	2	1	-	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-
10 - 15	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
15 - 20	i	10	9	-	-	-	1
	m	6	5	-	-	-	1
	w	4	4	-	-	-	-
20 - 25	i	7	4	-	-	-	3
	m	4	2	-	-	-	2
	w	3	2	-	-	-	1
25 - 30	i	26	19	-	-	1	6
	m	18	11	-	-	1	6
	w	8	8	-	-	-	-
30 - 35	i	20	15	-	-	1	4
	m	11	7	-	-	1	3
	w	9	8	-	-	-	1
35 - 40	i	23	15	-	-	8	-
	m	16	8	-	-	8	-
	w	7	7	-	-	-	-
40 - 45	i	34	17	-	1	11	5
	m	29	14	-	-	10	5
	w	5	3	-	1	1	-
45 - 50	i	16	10	-	-	4	2
	m	12	7	-	-	3	2
	w	4	3	-	-	1	-
50 - 55	i	19	7	-	-	3	9
	m	15	7	-	-	3	5
	w	4	-	-	-	-	4
55 - 60	i	23	10	1	2	4	6
	m	18	8	1	2	4	3
	w	5	2	-	-	-	3
60 - 65	i	28	18	-	1	4	5
	m	25	15	-	1	4	5
	w	3	3	-	-	-	-
65 - 70	i	23	12	1	2	1	7
	m	16	8	1	1	1	5
	w	7	4	-	1	-	2
70 - 75	i	19	11	2	3	-	3
	m	12	6	2	1	-	3
	w	7	5	-	2	-	-
75 und älter	i	63	39	-	6	-	18
	m	25	13	-	2	-	10
	w	38	26	-	4	-	8
Insgesamt	i	314	188	4	15	37	70
	m	209	112	4	7	35	51
	w	105	76	-	8	2	19

7. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht

Diagnosegruppe		Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
			ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen erkrankung	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
Tuberkulose der Atmungs- organe mit Nachweis von Tb-Bakterien							
direkt im Sputumausstrich	i	135	70	1	7	26	31
	m	97	44	1	4	24	24
	w	38	26	-	3	2	7
in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	i	71	43	1	4	4	19
	m	47	24	1	3	4	15
	w	24	19	-	1	-	4
Tuberkulose der Atmungs- organe ohne Nachweis von Tb-Bakterien							
Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	38	27	1	1	3	6
	m	24	16	1	-	3	4
	w	14	11	-	1	-	2
Pleuritis tuberculosa	i	9	6	-	1	-	2
	m	5	4	-	-	-	1
	w	4	2	-	1	-	1
postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	21	9	1	-	3	8
	m	14	5	1	-	3	5
	w	7	4	-	-	-	3
Tuberkulose anderer Organe							
Tuberkulose der Meningen	i	1	1	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose des Urogenitaltraktes	i	13	11	-	1	1	-
	m	8	7	-	-	1	-
	w	5	4	-	1	-	-
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	i	3	3	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	2	2	-	-	-	-
Tuberkulose der peripheren Lymph- knoten	i	14	10	-	1	-	3
	m	6	4	-	-	-	2
	w	8	6	-	1	-	1
Tuberkulose sonstiger Organe	i	9	8	-	-	-	1
	m	6	6	-	-	-	-
	w	3	2	-	-	-	1
Tuberkulose insgesamt							
	i	314	188	4	15	37	70
	m	209	112	4	7	35	51
	w	105	76	-	8	2	19

8. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach Risikofaktoren und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
		ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen- erkrankungen	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
Kreisfreie Städte						
Brandenburg an der Havel	13	10	-	1	2	-
Cottbus	13	8	-	-	1	4
Frankfurt (Oder)	19	11	-	2	5	1
Potsdam	16	9	-	-	3	4
Landkreise						
Barnim	14	9	2	1	1	1
Dahme-Spreewald	19	13	-	2	2	2
Elbe-Elster	14	10	-	3	1	-
Havelland	15	13	-	1	1	-
Märkisch-Oderland	21	6	-	1	5	9
Oberhavel	25	3	1	1	-	20
Oberspreewald-Lausitz	18	9	-	-	2	7
Oder-Spree	35	27	-	1	2	5
Ostprignitz-Ruppin	14	9	-	1	3	1
Potsdam-Mittelmark	21	15	-	-	1	5
Prignitz	8	2	1	-	-	5
Spree-Neiße	23	14	-	1	2	6
Teltow-Fläming	11	9	-	-	2	-
Uckermark	15	11	-	-	4	-
Land Brandenburg	314	188	4	15	37	70

9. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
			Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
					insgesamt	darunter in laufender Überwachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
unter 5	i	1	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
5 - 10	i	2	2	-	-	-	-
	m	2	2	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
10 - 15	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
15 - 20	i	10	10	-	-	-	-
	m	6	6	-	-	-	-
	w	4	4	-	-	-	-
20 - 25	i	7	7	-	-	-	-
	m	4	4	-	-	-	-
	w	3	3	-	-	-	-
25 - 30	i	26	24	-	2	2	2
	m	18	17	-	1	1	1
	w	8	7	-	1	1	1
30 - 35	i	20	19	-	1	1	1
	m	11	10	-	1	1	1
	w	9	9	-	-	-	-
35 - 40	i	23	23	-	-	-	-
	m	16	16	-	-	-	-
	w	7	7	-	-	-	-
40 - 45	i	34	29	1	4	4	4
	m	29	25	1	3	3	3
	w	5	4	-	1	1	1
45 - 50	i	16	15	-	1	1	1
	m	12	11	-	1	1	1
	w	4	4	-	-	-	-
50 - 55	i	19	15	1	3	-	2
	m	15	12	1	2	-	1
	w	4	3	-	1	-	1
55 - 60	i	23	19	-	4	1	2
	m	18	16	-	2	1	1
	w	5	3	-	2	-	1
60 - 65	i	28	21	-	7	2	6
	m	25	18	-	7	2	6
	w	3	3	-	-	-	-
65 - 70	i	23	18	1	4	-	2
	m	16	11	1	4	-	2
	w	7	7	-	-	-	-
70 - 75	i	19	14	-	5	2	3
	m	12	9	-	3	1	2
	w	7	5	-	2	1	1
75 und älter	i	63	56	4	3	3	2
	m	25	22	2	1	1	-
	w	38	34	2	2	2	2
Insgesamt	i	314	273	7	34	16	25
	m	209	179	5	25	11	18
	w	105	94	2	9	5	7

10. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht

Diagnosegruppe		Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
			Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
					insgesamt	darunter in laufender Über- wachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
Tuberkulose der Atmungs- organe mit Nachweis von Tb-Bakterien							
direkt im Sputumausstrich	i	135	123	-	12	5	9
	m	97	87	-	10	4	7
	w	38	36	-	2	1	2
in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	i	71	64	1	6	3	4
	m	47	40	1	6	3	4
	w	24	24	-	-	-	-
Tuberkulose der Atmungs- organe ohne Nachweis von Tb-Bakterien							
Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	38	34	2	2	1	2
	m	24	22	1	1	-	1
	w	14	12	1	1	1	1
Pleuritis tuberculosa	i	9	6	-	3	2	2
	m	5	4	-	1	1	1
	w	4	2	-	2	1	1
postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	21	11	2	8	3	6
	m	14	6	2	6	2	4
	w	7	5	-	2	1	2
Tuberkulose anderer Organe							
Tuberkulose der Meningen	i	1	-	1	-	-	-
	m	1	-	1	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose des Urogenitaltraktes	i	13	11	-	2	2	2
	m	8	7	-	1	1	1
	w	5	4	-	1	1	1
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	i	3	2	-	1	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	2	1	-	1	-	-
Tuberkulose der peripheren Lymph- knoten	i	14	13	1	-	-	-
	m	6	6	-	-	-	-
	w	8	7	1	-	-	-
Tuberkulose sonstiger Organe	i	9	9	-	-	-	-
	m	6	6	-	-	-	-
	w	3	3	-	-	-	-
Tuberkulose insgesamt	i	314	273	7	34	16	25
	m	209	179	5	25	11	18
	w	105	94	2	9	5	7

11. Zugänge an Tuberkulose 1996 nach dem Grund der Meldung und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
		Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
				insgesamt	darunter in laufender Überwachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
Kreisfreie Städte						
Brandenburg an der Havel	13	11	-	2	2	2
Cottbus	13	11	-	2	-	1
Frankfurt (Oder)	19	12	2	5	5	5
Potsdam	16	13	-	3	-	1
Landkreise						
Barnim	14	11	1	2	-	1
Dahme-Spreewald	19	16	-	3	3	3
Elbe-Elster	14	13	1	-	-	-
Havelland	15	15	-	-	-	-
Märkisch-Oderland	21	20	-	1	1	1
Oberhavel	25	24	-	1	1	1
Oberspreewald-Lausitz	18	17	-	1	1	-
Oder-Spree	35	34	-	1	1	1
Ostprignitz-Ruppin	14	11	1	2	-	2
Potsdam-Mittelmark	21	17	-	4	1	3
Prignitz	8	6	-	2	-	1
Spree-Neiße	23	21	1	1	1	1
Teltow-Fläming	11	10	-	1	-	-
Uckermark	15	11	1	3	-	2
Land Brandenburg	314	273	7	34	16	25

12. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken 1996 nach Gründen und Geschlecht

Veränderungen/ Ausscheiden nach Gründen	Insgesamt	männlich	weiblich
Übergang als überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane	233	162	71
Übergang als überwachungsbedürftige Tuberkulose der anderer Organe	47	20	27
Tod an Tuberkulose	7	4	3
Tuberkulose, erst durch Autopsie erfaßt	7	5	2
davon			
Todesursache Tuberkulose	2	2	-
andere Todesursachen	5	3	2
Tod an Spätfolgen der Tuberkulose	-	-	-
Tod aus anderer Ursache	41	28	13
Fortzug	30	21	9
Diagnoseberichtigung	11	7	4
Abgang aus sonstigen Gründen	18	10	8

13. Gestorbene an Tuberkulose 1996 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose insgesamt		Tuberkulose nach Diagnosegruppen							
			Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			insgesamt	davon						
				Lungen- tuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane				
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 - 65	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
65 - 70	2	1	1	1	1	1	-	-	1	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 und älter	1	2	1	2	1	2	-	-	-	-
Insgesamt	6	3	5	3	5	3	-	-	1	-

