



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 04003

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 7/04

(Erscheint nur für Mai bis Oktober)

12.08.2004

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 2004

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 2000 bis 2004

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	2004		dagegen							
			2003		2002		2001		2000	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	2,3	2,3	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0
Württembergisch Unterland	2,4	2,2	1,9	2,1	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8
Kocher-Jagst-Tauber	2,5	2,3	2,1	2,3	2,9	2,4	2,3	2,0	2,0	1,9
Württemberg 2)	2,4	2,2	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8
Badische Bergstraße	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,4	2,1	2,0	2,1
Kraichgau	2,3	2,3	1,9	2,3	2,2	2,2	2,4	2,1	1,8	2,1
Tauberfranken	2,4	2,3	2,0	2,2	2,7	2,5	2,2	2,1	1,9	1,9
Bodensee	2,3	2,4	2,4	1,9	1,7	1,7	2,6	2,3	1,4	2,2
Markgräflerland	2,2	2,7	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,0	2,1
Kaiserstuhl	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3	1,8	2,0
Tuniberg	2,3	2,3	2,1	2,0	2,2	2,1	2,2	2,3	1,9	1,9
Breisgau	2,2	2,3	1,9	1,9	2,2	2,2	2,4	2,3	2,1	2,4
Ortenau	2,3	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	2,1	1,8	2,0
Baden	2,2	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	1,9	2,1
Baden-Württemberg	2,3	2,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	1,9	2,0

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche Württembergischer Bodensee und Oberer Neckar.

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 2004

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
29	70	1	4	70	26	3	71	26	0	43	57
Baden											
67	33	-	1	66	33	7	79	14	5	44	51
Baden-Württemberg											
46	53	1	3	68	29	5	75	20	3	44	53

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden
- . = Kein Nachweis vorhanden
- / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 2004

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke
Württemberg 2)				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	87	12	1	-
Riesling	79	18	3	0
Silvaner	95	5	0	-
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	92	7	1	-
Weißer Burgunder	91	9	0	-
Kerner	91	8	1	-
Gewürztraminer	86	14	0	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	93	6	1	-
Blauer Spätburgunder	86	12	2	-
Portugieser	89	11	0	0
Lemberger	80	18	2	0
Schwarzriesling	85	14	1	-
Baden				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	79	20	1	0
Riesling	72	22	6	0
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	63	27	5	5
Ruländer	69	27	4	0
Weißer Burgunder	70	28	2	0
Auxerrois	78	16	6	0
Kerner	88	12	0	-
Gewürztraminer	74	22	4	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	86	14	-	-
Blauer Spätburgunder	66	29	5	0
Portugieser	76	24	-	-
Lemberger	94	6	0	-
Schwarzriesling	89	11	0	-
Baden-Württemberg				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	80	19	1	0
Riesling	76	20	4	0
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	63	27	5	5
Ruländer	71	26	3	0
Weißer Burgunder	71	27	2	0
Auxerrois	78	16	6	0
Kerner	90	9	1	-
Gewürztraminer	76	21	3	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	93	6	1	-
Blauer Spätburgunder	70	26	4	0
Portugieser	87	13	0	0
Lemberger	80	18	2	0
Schwarzriesling	85	14	1	-

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".