



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 04001

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 5/04 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

29.06.2004

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 2004

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 2000 bis 2004

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	2004	dagegen			
		2003	2002	2001	2000
Remstal-Stuttgart	2,1	2,5	2,5	2,4	2,0
Württembergisch Unterland	2,1	2,3	2,5	2,2	1,8
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	2,4	3,3	2,4	1,9
Württemberg 2)	2,1	2,3	2,5	2,2	1,8
Badische Bergstraße	2,3	2,6	2,6	2,7	1,8
Kraichgau	2,3	2,4	2,5	2,3	1,9
Tauberfranken	2,1	2,4	3,2	2,1	1,9
Bodensee	1,9	2,1	2,2	2,2	1,6
Markgräflerland	2,1	2,6	2,4	2,5	2,1
Kaiserstuhl	2,2	2,4	2,5	2,5	2,0
Tuniberg	2,3	2,9	2,4	2,2	2,0
Breisgau	2,3	2,4	2,4	2,5	2,2
Ortenau	2,2	2,5	2,3	2,7	1,9
Baden	2,2	2,5	2,5	2,5	2,0
Baden-Württemberg	2,2	2,4	2,5	2,4	1,9

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche Württembergischer Bodensee und Oberer Neckar.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 2004

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)								
Winterfeuchtigkeit als			Niederschläge als			Temperaturverlauf als		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg
82 18 - 58 42 - 2 67 31

Baden
84 16 - 76 24 0 5 70 25

Baden-Württemberg
83 17 - 68 32 0 4 69 27

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden
- . = Kein Nachweis vorhanden
- / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 2004

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	-	-	-	9	91
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	4	96
Kocher-Jagst-Tauber	97	3	-	-	-	28	72
Württemberg 1)	100	0	-	-	-	8	92
Badische Bergstraße	100	-	-	-	-	15	85
Kraichgau	99	1	-	-	-	33	67
Tauberfranken	100	-	-	-	-	4	96
Bodensee	100	-	-	-	-	21	79
Markgräflerland	100	0	-	-	2	19	79
Kaiserstuhl	100	-	-	-	-	5	95
Tuniberg	98	2	-	-	-	14	86
Breisgau	100	-	-	-	-	33	67
Ortenau	100	-	-	-	-	18	82
Baden	100	0	-	-	0	21	79
Baden-Württemberg	100	0	-	-	0	15	85

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar"

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 2004

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	-	2	98
Württembergisch Unterland	100	0	0	-	-	4	96
Kocher-Jagst-Tauber	95	4	1	0	-	20	80
Württemberg 1)	100	0	0	0	-	6	94
Badische Bergstraße	100	-	-	-	-	8	92
Kraichgau	100	0	0	0	-	24	
Tauberfranken	99	1	-	0	-	11	89
Bodensee	100	0	-	-	-	14	86
Markgräflerland	100	-	-	-	-	13	87
Kaiserstuhl	100	-	-	-	-	5	95
Tuniberg	100	-	-	-	-	14	86
Breisgau	100	-	-	-	-	15	85
Ortenau	99	-	1	-	-	10	90
Baden	100	0	0	0	-	14	86
Baden-Württemberg	100	0	0	0	-	10	90

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".