



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 03003

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 7/03 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

14.08.2003

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 2003

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1999 bis 2003

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	2003		dagegen							
			2002		2001		2000		1999	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	1,9	2,1	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,3	2,1
Württembergisch Unterland	1,9	2,1	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,1	2,3	2,9	2,4	2,3	2,0	2,0	1,9	2,4	1,9
Württemberg 2)	1,9	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	1,9
Badische Bergstraße	2,1	2,2	2,2	2,2	2,4	2,1	2,0	2,1	2,2	1,9
Kraichgau	1,9	2,3	2,2	2,2	2,4	2,1	1,8	2,1	2,3	2,1
Tauberfranken	2,0	2,2	2,7	2,5	2,2	2,1	1,9	1,9	2,4	2,1
Bodensee	2,4	1,9	1,7	1,7	2,6	2,3	1,4	2,2	2,5	2,4
Markgräflerland	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,0	2,1	2,7	2,4
Kaiserstuhl	2,1	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3	1,8	2,0	2,4	2,2
Tuniberg	2,1	2,0	2,2	2,1	2,2	2,3	1,9	1,9	2,5	2,0
Breisgau	1,9	1,9	2,2	2,2	2,4	2,3	2,1	2,4	2,6	2,4
Ortenau	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4	2,1	1,8	2,0	2,2	1,8
Baden	2,1	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	1,9	2,1	2,4	2,2
Baden-Württemberg	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	1,9	2,0	2,3	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergisch Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 2003

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
94	6	-	6	10	84	-	2	98	2	39	59
Baden											
98	2	-	6	8	86	-	1	99	3	35	62
Baden-Württemberg											
96	4	-	6	9	85	-	1	99	2	37	61

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden

. = Kein Nachweis vorhanden

/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 2003

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	89	10	1	0
Riesling	86	11	2	1
Silvaner	95	5	0	-
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	95	4	0	1
Weißer Burgunder	91	9	0	-
Kerner	92	6	0	2
Gewürztraminer	91	6	0	3

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	5	0	1
Blauer Spätburgunder	94	6	0	-
Portugieser	89	11	0	0
Lemberger	83	13	3	1
Schwarzriesling	95	5	0	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	93	7	0	0
Riesling	92	8	0	0
Silvaner	93	7	-	0
Gutedel	88	10	1	1
Ruländer	96	4	0	0
Weißer Burgunder	90	10	0	0
Auxerrois	88	12	-	-
Kerner	97	2	0	1
Gewürztraminer	87	11	1	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	-	-	-
Blauer Spätburgunder	91	8	1	0
Portugieser	100	0	-	-
Lemberger	43	57	-	-
Schwarzriesling	98	1	0	1

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	93	7	0	0
Riesling	88	10	1	1
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	88	10	1	1
Ruländer	96	4	0	0
Weißer Burgunder	90	10	0	0
Auxerrois	88	12	-	-
Kerner	94	5	0	1
Gewürztraminer	87	10	1	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	5	0	1
Blauer Spätburgunder	91	8	1	0
Portugieser	91	9	0	0
Lemberger	82	14	3	1
Schwarzriesling	95	4	0	1

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".