



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 03001

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 5/03 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

17.06.2003

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 2003

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1999 bis 2003

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	2003	dagegen			
		2002	2001	2000	1999
Remstal-Stuttgart	2,5	2,5	2,4	2,0	2,3
Württembergisch Unterland	2,3	2,5	2,2	1,8	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	2,4	3,3	2,4	1,9	2,1
Württemberg 2)	2,3	2,5	2,2	1,8	2,1
Badische Bergstraße	2,6	2,6	2,7	1,8	2,3
Kraichgau	2,4	2,5	2,3	1,9	2,3
Tauberfranken	2,4	3,2	2,1	1,9	2,1
Bodensee	2,1	2,2	2,2	1,6	2,1
Markgräflerland	2,6	2,4	2,5	2,1	2,4
Kaiserstuhl	2,4	2,5	2,5	2,0	2,4
Tuniberg	2,9	2,4	2,2	2,0	2,1
Breisgau	2,4	2,4	2,5	2,2	2,6
Ortenau	2,5	2,3	2,7	1,9	2,2
Baden	2,5	2,5	2,5	2,0	2,3
Baden-Württemberg	2,4	2,5	2,4	1,9	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 2003

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die {den}								
Winterfeuchtigkeit als			Niederschläge als			Temperaturverlauf als		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
16	81	3	69	31	-	2	52	46
Baden								
16	84	0	42	56	2	5	61	34
Baden-Württemberg								
16	82	2	55	44	1	4	56	40

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden
- . = Kein Nachweis vorhanden
- / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 2003

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	75	13	10	2	-	52	48
Württembergisch Unterland	86	9	4	1	-	34	66
Kocher-Jagst-Tauber	84	13	2	1	5	36	59
Württemberg 1)	84	10	5	1	0	39	61
Badische Bergstraße	94	6	0	-	-	31	69
Kraichgau	92	8	0	-	-	42	58
Tauberfranken	92	5	2	1	-	31	69
Bodensee	98	2	-	-	-	47	53
Markgräflerland	85	13	2	-	-	40	60
Kaiserstuhl	97	3	0	-	-	37	63
Tuniberg	93	3	4	-	-	25	75
Breisgau	88	10	1	1	-	60	40
Ortenau	88	8	4	0	-	45	55
Baden	91	7	2	0	-	42	58
Baden-Württemberg	88	8	3	1	0	40	60

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 2003

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	74	12	13	1	5	60	35
Württembergisch Unterland	85	11	4	0	5	60	35
Kocher-Jagst-Tauber	97	3	-	-	4	35	61
Württemberg 1)	84	11	5	0	5	57	38
Badische Bergstraße	96	4	-	-	-	69	31
Kraichgau	90	8	2	-	6	45	49
Tauberfranken	98	2	-	-	3	45	52
Bodensee	100	-	-	-	-	47	53
Markgräflerland	91	9	0	-	5	61	34
Kaiserstuhl	99	1	0	-	-	21	79
Tuniberg	100	-	-	-	-	62	38
Breisgau	93	7	-	-	-	51	49
Ortenau	95	4	1	-	-	71	29
Baden	96	4	0	-	3	53	44
Baden-Württemberg	90	7	3	0	4	55	41

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".