



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 02003

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 7/02 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

26.08.2002

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 2002

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1998 bis 2002

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	2002		dagegen							
			2001		2000		1999		1998	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	2,0	2,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,3	2,1	2,2	2,1
Württembergisch Unterland	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	1,9	2,2	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	2,9	2,4	2,3	2,0	2,0	1,9	2,4	1,9	2,3	2,2
Württemberg 2)	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	2,1	1,9	2,2	2,1
Badische Bergstraße	2,2	2,2	2,4	2,1	2,0	2,1	2,2	1,9	2,3	2,4
Kraichgau	2,2	2,2	2,4	2,1	1,8	2,1	2,3	2,1	2,2	2,2
Tauberfranken	2,7	2,5	2,2	2,1	1,9	1,9	2,4	2,1	2,1	2,3
Bodensee	1,7	1,7	2,6	2,3	1,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,1
Markgräflerland	2,1	2,2	2,3	2,3	2,0	2,1	2,7	2,4	2,3	2,2
Kaiserstuhl	2,1	2,1	2,3	2,3	1,8	2,0	2,4	2,2	2,1	2,1
Tuniberg	2,2	2,1	2,2	2,3	1,9	1,9	2,5	2,0	2,3	2,1
Breisgau	2,2	2,2	2,4	2,3	2,1	2,4	2,6	2,4	2,2	2,3
Ortenau	2,0	2,0	2,4	2,1	1,8	2,0	2,2	1,8	2,1	2,2
Baden	2,1	2,1	2,3	2,2	1,9	2,1	2,4	2,2	2,2	2,2
Baden-Württemberg	2,1	2,1	2,2	2,1	1,9	2,0	2,3	2,1	2,2	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 2002

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
4	83	13	4	54	42	4	71	25	1	22	77
Baden											
6	86	8	2	51	47	6	66	28	1	27	72
Baden-Württemberg											
5	84	11	3	53	44	5	69	26	1	24	75

Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden

. = Kein Nachweis vorhanden

/ = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart,
Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 2002

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	88	12	0	0
Riesling	85	14	1	0
Silvaner	96	4	0	0
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	88	10	2	0
Weißer Burgunder	85	11	4	-
Kerner	92	8	0	0
Gewürztraminer	94	6	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	0	0
Blauer Spätburgunder	91	9	0	0
Portugieser	87	13	0	0
Lemberger	77	19	4	0
Schwarzriesling	93	6	1	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	87	12	1	-
Riesling	84	14	2	-
Silvaner	93	7	0	-
Gutedel	81	17	2	0
Ruländer	86	12	2	-
Weißer Burgunder	85	13	2	0
Auxerrois	90	10	0	-
Kerner	94	5	1	-
Gewürztraminer	79	21	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	-	-
Blauer Spätburgunder	84	15	1	0
Portugieser	94	6	-	-
Lemberger	92	8	-	-
Schwarzriesling	95	5	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	87	12	1	0
Riesling	84	14	2	0
Silvaner	94	6	0	0
Gutedel	81	17	2	0
Ruländer	86	12	2	0
Weißer Burgunder	85	13	2	0
Auxerrois	90	10	0	-
Kerner	93	7	0	0
Gewürztraminer	82	18	0	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	0	0
Blauer Spätburgunder	84	15	1	0
Portugieser	88	12	0	0
Lemberger	77	19	4	0
Schwarzriesling	94	6	0	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".