

# Statistische Berichte XX 1544

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B




## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

\*A IV 3 - j / 63

15. Januar 1965

Sterbefälle 1963 nach  
Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen 1952 bis 1963



\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1544



## Die häufigsten Todesursachen im Jahr 1963

In Baden-Württemberg starben im Berichtsjahr 85 975 Personen, das sind 5335 (+6,6%) mehr als im Jahr 1962. Die Sterbefälle der männlichen Personen erhöhten sich um 2365 (+5,7%) auf 43 935, die der weiblichen Personen um 2970 (+7,6%) auf 42 040. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung bezogene Sterbeziffer stieg ebenfalls, und zwar beim männlichen Geschlecht von 110,2 auf 114,0, beim weiblichen Geschlecht von 94,1 auf 99,8 und insgesamt von 101,8 auf 106,6. Sowohl bei der absoluten als auch bei der relativen Zunahme der Gesamtsterblichkeit wirkte sich vor allem die Steigerung der Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane Gestorbenen aus. Die Ursache für diese Zunahme ist in erster Linie für die in den Monaten Februar und März aufgetretenen Grippeerkrankungen und ihren Folgeerscheinungen zurückzuführen. An Grippe selbst starben im Jahr 1963 1546 Personen gegenüber 382 im Vorjahr. Die Sterbeziffer stieg von 0,5 auf 1,9. Auch bei Lungenentzündung der über vier Wochen alten Personen und bei sonstigen Krankheiten der Atmungsorgane sind Zunahmen der Sterbefälle um 365 auf 2533 bzw. um 655 auf 2338 festzustellen; demzufolge stiegen die Sterbeziffern von 2,7 auf 3,1 bzw. von 2,1 auf 2,9.

Wie in früheren "Grippe"-Jahren, zum Beispiel 1960, 1957 und 1953, zeigt sich auch im Berichtsjahr, daß im Zusammenwirken mit den Grippeerkrankungen eine Zunahme der Sterblichkeit auch bei Herzkrankheiten und Gefäßstörungen des Zentralnervensystems einhergeht. Bei Herzkrankheiten ist die Zahl der Sterbefälle um 1313 auf 16 584 und die Sterbeziffer von 19,3 auf 20,6 gestiegen. An Gefäßstörungen des Zentralnervensystems starben 13 905 Personen, das waren 399 mehr als im Vorjahr; die Sterbeziffer belief sich auf 17,2 gegenüber 17,0 im Jahr 1962.

Der Krankheitsgruppe "Bösartige Neubildungen" mußten 15 241 Sterbefälle zugeordnet werden (1962: 14 502), wobei sich eine Sterbeziffer von 18,9 (1962: 18,3) ergab.

Zugenommen haben auch die unnatürlichen Sterbefälle. Im Berichtsjahr wurden 6118 (Sterbeziffer 7,6) ausgezählt gegenüber 5762 (Sterbeziffer 7,3) im Vorjahr. Die Zunahme erstreckt sich besonders auf die Todesursachen: Sturz (+135), Vergiftung (+40) und Selbstmord (+132). Bei letzterem ist die Sterbeziffer entsprechend von 1,7 auf 1,9 gestiegen. Nahezu unverändert blieb die Zahl der tödlichen Unfälle durch Kraftfahrzeuge; mit 1777 waren es sechs weniger als im Jahr zuvor. Durch die Bevölkerungszunahme ergab sich aber auch eine geringere Sterbeziffer, nämlich 2,2 gegenüber 2,3 im Jahr 1962.

Bei Altersschwäche ist nach geringfügiger Zunahme vom Jahr 1961 auf das Jahr 1962 wieder ein Rückgang der Sterbefälle um 94 auf 3002 zu verzeichnen. Verfolgt man die Entwicklung seit 1953, als die Sterbeziffer noch 8,2 betrug, so ist, abgesehen von der eben erwähnten Zunahme,

eine stetig fallende Entwicklungstendenz festzustellen. Für das Berichtsjahr wurden auf 10 000 Einwohner noch 3,7 an Altersschwäche Gestorbene errechnet. Dieser Rückgang ist z.T. darauf zurückzuführen, daß die Laienleichen-schauer nach und nach durch Ärzte ersetzt werden, so daß für die Bearbeitung der Todesursachenstatistik genauere Diagnosen zur Verfügung stehen. Viele Sterbefälle alter Leute werden dann entsprechend den Aufbereitungsrichtlinien anderen Todesursachengruppen zugeordnet.

Die Tuberkulosesterblichkeit hat sich nur bei der Grundzahl um 42 auf 1049 erhöht, die Verhältniszahl ist jedoch auf dem gleichen Stand wie im Vorjahr (1,3) geblieben.

### Geringere Säuglings- und Müttersterblichkeit

Der seit Jahren beobachtete Rückgang der Säuglingssterblichkeit setzte sich auch im Jahr 1963 fort. Betrug die Säuglingssterbeziffer, auf 1000 Lebendgeborene berechnet, im Jahresdurchschnitt 1936/38 noch 56,1, so ergab sich im Jahr 1962 eine Sterbeziffer von 26,7 und im Jahr 1963 von 25,5. Allerdings nahm die Ziffer der während der ersten 24 Lebensstunden Gestorbenen nur wenig ab: von 15,3 im Jahresdurchschnitt 1936/38 auf 12,6 im Jahr 1963.

Im Jahr 1963 starben 4044 Kinder und zwar 2364 Knaben und 1680 Mädchen, bevor sie das erste Lebensjahr vollendet hatten. Die Sterbeziffer der männlichen Säuglinge ist dementsprechend mit 29,0 beachtlich höher als die der weiblichen mit 21,7. Fast die Hälfte der im ersten Lebensjahr Gestorbenen wurde nicht älter als 24 Stunden. Von diesen 2001 Säuglingen starben 820 infolge von Frühgeburt, 350 an Asphyxie, 323 durch Geburtsverletzungen, 190 an angeborenen Mißbildungen und 62 an Lebensschwäche.

Die Entwicklung der absoluten Zahlen der Müttersterblichkeit zeigt eine abnehmende Tendenz, wenn diese auch infolge der verhältnismäßig kleinen Zahlen beim Vergleich von Jahr zu Jahr etwas verwischt wird. Im Jahr 1938 starben in Baden-Württemberg noch 314 Frauen infolge Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett oder an Fehlgeburt, im Jahr 1950 waren es 202, acht Jahre später 133. Im Jahr 1963 sind 119 Frauen - ebenso viel wie im Jahr zuvor - an den erwähnten Krankheiten gestorben.

Die Sterbeziffer, bezogen auf 10 000 Lebendgeborene, läßt den Rückgang der Müttersterblichkeit noch deutlicher erkennen. Im Jahr 1963 betrug die relative Müttersterblichkeit 7,5. Dagegen kamen im Jahr 1938 auf 10 000 Lebendgeborene 28,4 Müttersterbefälle, im Jahr 1950 18,8, im Jahr 1958 9,9 und im Jahr 1962 7,7. Die Müttersterblichkeit in Baden-Württemberg liegt seit Jahren unter der des Bundesgebiets; im Jahr 1962 wurde für das Bundesgebiet eine Sterbeziffer von 8,7 festgestellt.



## 1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1959 bis 1963

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im Jahr										
	1959	1960	1961	1962	1963	1959	1960	1961	1962	1963	
	Grundzahlen					Verhältniszahlen <sup>1)</sup>					
Männliche und weibliche Personen zusammen											
Sterbefälle insgesamt	76 640	82 251	79 197	80 640	85 975	102,2	107,6	102,1	101,8	106,6	
Davon infolge											
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen	(37,40-49)	30 312	32 779	32 546	32 954	34 834	40,4	42,9	42,0	41,6	43,2
Darunter											
Herzkrankheiten	(42-45)	13 640	14 925	14 825	15 271	16 584	18,2	19,5	19,1	19,3	20,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	(37)	12 460	13 671	13 450	13 506	13 905	16,6	17,9	17,3	17,0	17,2
Bösartiger Neubil- dungen	(20-24)	13 667	14 102	14 410	14 502	15 241	18,2	18,5	18,6	18,3	18,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	(90-99)	5 770	5 705	5 871	5 762	6 118	7,7	7,5	7,6	7,3	7,6
Darunter											
Kraftfahrzeugunfälle	(90)	1 885	1 907	1 919	1 783	1 777	2,5	2,5	2,5	2,3	2,2
Selbstmorde	(97)	1 416	1 420	1 432	1 375	1 507	1,9	1,9	1,8	1,7	1,9
Krankheiten der Ver- dauungsorgane	(60-69)	4 653	4 913	5 060	5 362	5 390	6,2	6,4	6,5	6,8	6,7
Krankheiten der Atmungsorgane	(50-57)	4 480	6 507	3 697	4 233	6 417	6,0	8,5	4,8	5,3	8,0
Altersschwäche	(891)	3 391	3 425	2 962	3 096	3 002	4,5	4,5	3,8	3,9	3,7
Tuberkulose	(00-03)	1 133	1 108	994	1 007	1 049	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
Männliche Personen											
Sterbefälle insgesamt		39 184	41 749	40 603	41 570	43 935	110,9	115,3	110,6	110,2	114,0
Davon infolge											
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen	(37,40-49)	14 380	15 593	15 609	15 886	16 662	40,7	43,1	42,5	42,1	43,2
Darunter											
Herzkrankheiten	(42-45)	7 010	7 705	7 829	8 104	8 769	19,8	21,3	21,3	21,5	22,8
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	(37)	5 480	6 110	5 941	6 012	6 017	15,5	16,9	16,2	15,9	15,6
Bösartiger Neubil- dungen	(20-24)	6 534	6 743	6 902	7 054	7 361	18,5	18,6	18,8	18,7	19,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	(90-99)	3 885	3 742	3 885	3 781	3 920	11,0	10,3	10,6	10,0	10,2
Darunter											
Kraftfahrzeugunfälle	(90)	1 498	1 516	1 506	1 410	1 368	4,2	4,2	4,1	3,7	3,6
Selbstmorde	(97)	929	907	896	900	1 011	2,6	2,5	2,4	2,4	2,6
Krankheiten der Ver- dauungsorgane	(60-69)	2 682	2 729	2 830	3 102	3 106	7,6	7,5	7,7	8,2	8,1
Krankheiten der Atmungs- organe	(50-57)	2 430	3 443	2 115	2 303	3 450	6,9	9,5	5,8	6,1	9,0
Altersschwäche	(891)	1 349	1 334	1 173	1 201	1 170	3,8	3,7	3,2	3,2	3,0
Tuberkulose	(00-03)	791	797	699	767	748	2,2	2,2	1,9	2,0	1,9
Weibliche Personen											
Sterbefälle insgesamt		37 456	40 502	38 594	39 070	42 040	94,4	100,7	94,5	94,1	99,8
Davon infolge											
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen	(37,40-49)	15 932	17 186	16 937	17 068	18 172	40,2	42,7	41,5	41,1	43,1
Darunter											
Herzkrankheiten	(42-45)	6 630	7 220	6 996	7 167	7 815	16,7	18,0	17,1	17,3	18,6
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	(37)	6 980	7 561	7 509	7 494	7 888	17,6	18,8	18,4	18,1	18,7
Bösartiger Neubil- dungen	(20-24)	7 133	7 359	7 508	7 448	7 880	18,0	18,3	18,4	17,9	18,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	(90-99)	1 885	1 963	1 986	1 981	2 198	4,8	4,9	4,9	4,8	5,2
Darunter											
Kraftfahrzeugunfälle	(90)	387	391	413	373	409	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0
Selbstmorde	(97)	487	513	536	475	496	1,2	1,3	1,3	1,1	1,2
Krankheiten der Ver- dauungsorgane	(60-69)	1 971	2 184	2 230	2 260	2 284	5,0	5,4	5,5	5,4	5,4
Krankheiten der Atmungs- organe	(50-57)	2 050	3 064	1 582	1 930	2 967	5,2	7,6	3,9	4,7	7,0
Altersschwäche	(891)	2 042	2 091	1 789	1 895	1 832	5,1	5,2	4,4	4,6	4,3
Tuberkulose	(00-03)	342	311	295	240	301	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung



2. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen,  
Grund

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbe- fälle ins- gesamt	männliche			
			ins- gesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	969	703	-	1	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	80	45	-	1	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 049	748	-	2	2
11	Diphtherie	1	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	20	18	-	2	4
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	302	150	20	15	5
20-24	Bösartige Neubildungen	15 241	7 361	5	12	8
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	899	471	1	18	19
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 286	559	3	8	7
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	796	294	-	-	2
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13 905	6 017	6	1	1
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 349	1 285	75	50	46
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	16 584	8 769	3	5	3
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 343	1 876	-	1	-
52	Grippe	1 546	750	25	11	1
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 533	1 258	90	29	1
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2 338	1 442	45	27	5
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	474	356	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3 050	1 818	1	3	-
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 866	932	62	26	9
70	Nephritis und Nephrose	475	240	2	-	2
75	Komplikationen der Schwangerschaft	22	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	18	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	79	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 603	1 177	2	2	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	329	125	-	-	1
83	Angeborene Mißbildungen	825	453	381	30	22
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 685	1 577	1 577	-	-
891	Altersschwäche	3 002	1 170	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	180	57	-	-	-
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 055	1 112	13	8	8
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 777	1 368	1	42	69
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	175	133	-	4	6
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 408	1 257	42	76	49
96	Vergiftungen (Unfälle)	139	75	1	5	3
97	Selbstmord	1 507	1 011	-	-	4
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	112	76	9	4	4
00-99	Sterbefälle insgesamt	85 975	43 935	2 364	381	281

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.



Geschlecht und Altersgruppen 1963  
zahlen

D a v o n																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
13	87	200	140	103	159	266	1	-	-	12	39	58	32	28	96	00,01	
7	3	11	5	7	9	35	1	-	-	3	6	4	3	4	14	02,03	
20	90	211	145	110	168	301	2	-	-	15	45	62	35	32	110	00-03	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	11	
6	4	1	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	151,152	
11	9	31	16	15	28	152	18	16	3	2	13	29	22	10	39	05-10,12-14, 153,154,16-19	
63	158	1 366	1 213	1 282	3 254	7 880	1	15	10	44	383	1 798	1 028	1 138	3 463	20-24	
39	44	113	59	65	113	428	2	17	13	26	39	115	57	72	87	25	
19	39	114	78	72	219	727	3	4	11	22	51	147	65	77	347	26,27	
3	16	37	48	49	139	502	-	-	2	3	12	53	62	78	292	33	
17	56	480	579	730	4 147	7 888	-	2	4	10	44	444	513	828	6 043	37	
47	96	239	159	172	401	1 064	52	27	21	53	111	230	111	112	347	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	40	
45	238	1 541	1 216	1 270	4 448	7 815	4	2	4	22	138	587	604	975	5 479	42-45	
10	24	198	167	196	1 280	2 467	1	-	2	2	30	149	145	264	1 874	41,46-49	
12	9	60	59	59	514	796	20	13	1	4	5	36	30	65	622	52	
10	18	94	92	125	799	1 275	57	17	4	6	10	58	46	89	988	53	
9	16	162	170	202	806	896	25	21	4	5	14	60	38	80	649	50,51,54-57	
10	36	90	79	50	91	118	-	-	-	4	2	24	6	16	66	61	
7	76	482	313	290	646	1 232	1	-	1	13	54	204	134	189	636	67,68	
34	51	187	98	122	343	934	35	22	11	20	40	113	84	96	513	60,62-66,69	
22	35	68	37	24	50	235	-	1	6	14	27	59	27	36	65	70	
-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	11	11	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	9	9	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	27	52	-	-	-	-	77	
4	15	63	89	124	878	426	2	-	-	10	20	73	48	68	205	71-74,78-79	
6	9	25	10	11	63	204	1	-	1	3	5	21	16	20	137	80-82	
14	4	-	1	-	1	372	295	41	12	10	8	6	-	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	1 108	1 108	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	13	1 157	1 832	-	-	-	-	-	-	-	12	1 820	891	
-	-	-	-	5	52	123	-	-	-	-	-	1	-	8	114	892	
29	50	220	123	160	501	943	10	5	5	12	30	107	75	111	588	86-88, 893-899	
486	198	245	101	74	152	409	2	21	37	83	41	72	37	29	87	90	
22	22	37	15	8	19	42	-	2	2	4	4	15	1	6	8	91	
157	146	175	91	92	429	1 151	32	43	10	14	11	32	39	61	909	92-95	
16	12	12	6	4	16	64	1	5	3	4	4	11	4	5	27	96	
187	217	323	112	73	95	496	-	-	4	76	100	164	38	49	65	97	
15	12	17	4	3	8	36	8	2	2	5	6	10	1	1	1	98,99	
1 320	1 700	6 591	5 081	5 400	20 817	42 040	1 680	276	174	534	1 320	4 680	3 268	4 527	25 581	00-99	



Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbefälle				
		ins- gesamt	ins- gesamt	männliche		
				im Alter		
				0-1 <sup>2)</sup>	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,2	1,8	-	0,03	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,1	0,1	-	0,03	0,03
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,3	1,9	-	0,07	0,03
11	Diphtherie	0,0	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,02	0,05	-	0,07	0,07
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,4	0,2	0,5	0,08
20-24	Bösartige Neubildungen	18,9	19,1	0,06	0,4	0,1
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,1	1,2	0,01	0,6	0,3
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,6	1,5	0,04	0,3	0,1
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,0	0,8	-	-	0,03
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,2	15,6	0,07	0,03	0,02
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2,9	3,3	0,9	1,7	0,8
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,0	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	20,6	22,8	0,04	0,2	0,05
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,4	4,9	-	0,03	-
52	Grippe	1,9	1,9	0,3	0,4	0,02
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	3,1	3,3	1,1	1,0	0,02
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,9	3,7	0,6	0,9	0,08
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,6	0,9	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,8	4,7	0,01	0,1	-
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,3	2,4	0,8	0,9	0,2
70	Nephritis und Nephrose	0,6	0,6	0,02	-	0,03
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>3)</sup>	1,4	-	-	-	-
76	Fehlgeburt <sup>3)</sup>	1,1	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	5,0	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	2,0	3,1	0,02	0,07	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,3	-	-	0,02
83	Angeborene Mißbildungen	1,0	1,2	4,7	1,0	0,4
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,3	4,1	19,4	-	-
891	Altersschwäche	3,7	3,0	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,1	-	-	-
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2,5	2,9	0,2	0,3	0,1
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,2	3,6	0,01	1,4	1,2
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,2	0,3	-	0,1	0,1
92-95	Alle sonstigen Unfälle	3,0	3,3	0,5	2,6	0,8
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,2	0,2	0,01	0,2	0,05
97	Selbstmord	1,9	2,6	-	-	0,07
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,07
00-99	Sterbefälle insgesamt	106,6	114,0	29,0	13,1	4,7

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Auf 1000 Lebend-



## Geschlecht und Altersgruppen 1963

-zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 <sup>2)</sup>	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
0,1	1,1	3,1	7,1	7,9	8,1	0,6	0,01	-	-	0,1	0,5	0,7	1,3	1,4	3,1	00,01	
0,07	0,04	0,2	0,3	0,5	0,5	0,08	0,01	-	-	0,03	0,07	0,05	0,1	0,2	0,4	02,03	
0,2	1,2	3,3	7,4	8,5	8,6	0,7	0,03	-	-	0,2	0,5	0,8	1,4	1,6	3,5	00-03	
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	11	
0,06	0,05	0,02	0,05	-	-	0,0	-	-	0,02	0,01	-	-	-	-	-	151,152	
0,1	0,1	0,5	0,8	1,2	1,4	0,4	0,2	0,6	0,05	0,02	0,2	0,4	0,9	0,5	1,2	05-10,12-14, 153,154,16-19	
0,7	2,1	21,5	61,7	98,9	166,0	18,7	0,01	0,5	0,2	0,5	4,6	22,0	42,0	57,5	110,6	20-24	
0,4	0,6	1,8	3,0	5,0	5,8	1,0	0,03	0,6	0,2	0,3	0,5	1,4	2,3	3,6	2,8	25	
0,2	0,5	1,8	4,0	5,6	11,2	1,7	0,04	0,1	0,2	0,2	0,6	1,8	2,7	3,9	11,1	26,27	
0,03	0,2	0,6	2,4	3,8	7,1	1,2	-	-	0,04	0,03	0,1	0,6	2,5	3,9	9,3	33	
0,2	0,7	7,5	29,5	56,3	211,5	18,7	-	0,07	0,07	0,1	0,5	5,4	21,0	41,9	193,1	37	
0,5	1,3	3,8	8,1	13,3	20,5	2,5	0,7	1,0	0,4	0,6	1,3	2,8	4,5	5,7	11,1	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	40	
0,5	3,1	24,2	61,9	98,0	226,9	18,6	0,05	0,07	0,07	0,2	1,6	7,2	24,7	49,3	175,0	42-45	
0,1	0,3	3,1	8,5	15,1	65,3	5,9	0,01	-	0,04	0,02	0,4	1,8	5,9	13,3	59,9	41,46-49	
0,1	0,1	0,9	3,0	4,6	26,2	1,9	0,3	0,5	0,02	0,05	0,06	0,4	1,2	3,3	19,9	52	
0,1	0,2	1,5	4,7	9,6	40,8	3,0	0,7	0,6	0,07	0,07	0,1	0,7	1,9	4,5	31,6	53	
0,09	0,2	2,5	8,7	15,6	41,1	2,1	0,3	0,8	0,07	0,06	0,2	0,7	1,6	4,0	20,7	50,51,54-57	
0,1	0,5	1,4	4,0	3,9	4,6	0,3	-	-	-	0,05	0,02	0,3	0,2	0,8	2,1	61	
0,07	1,0	7,6	15,9	22,4	32,9	2,9	0,01	-	0,02	0,1	0,6	2,5	5,5	9,6	20,3	67,68	
0,4	0,7	2,9	5,0	9,4	17,5	2,2	0,5	0,8	0,2	0,2	0,5	1,4	3,4	4,9	16,4	60,62-66,69	
0,2	0,5	1,1	1,9	1,9	2,6	0,6	-	0,04	0,1	0,2	0,3	0,7	1,1	1,8	2,1	70	
-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	1,0	2,3	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	0,8	1,9	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	2,4	10,9	-	-	-	-	77	
0,04	0,2	1,0	4,5	9,6	44,8	1,0	0,03	-	-	0,1	0,2	0,9	2,0	3,4	6,5	71-74,78,79	
0,06	0,1	0,4	0,5	0,8	3,2	0,5	0,01	-	0,02	0,03	0,06	0,3	0,7	1,0	4,4	80-82	
0,1	0,05	-	0,05	-	0,05	0,9	3,8	1,5	0,2	0,1	0,1	0,07	-	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	2,6	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	1,0	59,0	4,3	-	-	-	-	-	-	-	0,6	58,1	891	
-	-	-	-	0,4	2,7	0,3	-	-	-	-	-	0,01	-	0,4	3,6	892	
0,3	0,7	3,5	6,3	12,3	25,6	2,2	0,1	0,2	0,09	0,1	0,4	1,3	3,1	5,6	18,8	86-88, 893-899	
5,0	2,6	3,9	5,1	5,7	7,8	1,0	0,03	0,8	0,7	0,9	0,5	0,9	1,5	1,5	2,8	90	
0,2	0,3	0,6	0,8	0,6	1,0	0,1	-	0,07	0,04	0,05	0,05	0,2	0,04	0,3	0,3	91	
1,6	1,9	2,8	4,6	7,1	21,9	2,7	0,4	1,6	0,2	0,2	0,1	0,4	1,6	3,1	29,0	92-95	
0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	0,2	0,01	0,2	0,05	0,05	0,05	0,1	0,2	0,3	0,9	96	
1,9	2,8	5,1	5,7	5,6	4,8	1,2	-	-	0,07	0,9	1,2	2,0	1,6	2,5	2,1	97	
0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,09	0,1	0,07	0,04	0,06	0,07	0,1	0,04	0,05	0,03	98,99	
13,7	22,2	103,6	258,6	416,7	1061,7	99,8	21,7	10,0	3,1	6,0	15,7	57,2	133,5	228,9	817,2	00-99	

geborene (Säuglingssterblichkeit). - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene (Müttersterblichkeit).



#### 4. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1963

Jahr	insgesamt	Säuglingssterbefälle																	
		davon		Frühgeburt (852)		angeborene Lebens- schwäche (851)		angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533,538,844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- erkrankungen, Ernährungs- störungen (661,843,847)		alle übrigen Todes- ursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1959	4 274	2 438	1 836	671	549	74	70	360	276	318	159	219	168	31	26	89	82	676	506
1960	4 400	2 483	1 917	625	512	64	52	367	309	301	174	188	152	24	41	109	69	805	608
1961	4 393	2 517	1 876	672	535	67	49	437	323	337	214	198	144	22	23	76	51	708	537
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1963	4 044	2 364	1 680	586	463	41	32	381	295	336	189	131	82	20	20	59	38	810	561
Auf 1000 Lebendgeborene																			
1938	53,7	60,6	46,4	10,9	8,9	13,6	10,9	4,5	3,5	3,5	2,3	7,6	5,5	3,9	2,9	7,0	5,4	9,5	7,0
1950	50,9	57,9	43,6	17,3	14,7	7,1	5,0	5,9	4,4	3,9	1,8	7,2	5,2	2,5	2,4	5,3	3,4	8,8	6,8
1954	38,9	43,2	34,4	11,1	9,2	5,1	4,5	5,7	4,8	4,1	2,5	5,3	4,5	0,8	0,8	3,1	2,0	8,0	6,1
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1959	30,3	33,7	26,8	9,3	8,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,4	2,3	3,0	2,5	0,4	0,4	1,2	1,2	9,3	7,4
1960	30,3	33,3	27,1	8,4	7,2	0,9	0,7	4,9	4,4	4,0	2,5	2,5	2,1	0,3	0,6	1,5	1,0	10,8	8,6
1961	28,8	32,2	25,3	8,6	7,2	0,9	0,7	5,6	4,3	4,3	2,9	2,5	1,9	0,3	0,3	1,0	0,7	9,1	7,2
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1963	25,5	29,0	21,7	7,2	6,0	0,5	0,4	4,7	3,8	4,1	2,4	1,6	1,1	0,2	0,3	0,7	0,5	10,0	7,3

#### 5. Müttersterblichkeit 1938 bis 1963

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwan- gerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwan- gerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0