

Statistische Berichte

XX 1545

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR


*A IV 3 - j/64

14. Dezember 1965

Sterbefälle 1964 nach

Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Sterbeziffern nach wichtigsten Todesursachen 1952 bis 1964
auf 10 000 der mittleren Bevölkerung



*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1545

Die häufigsten Todesursachen im Jahr 1964

In Baden-Württemberg starben im Berichtsjahr 81 615 Personen, das sind 4360 (- 5,1%) weniger als im Jahr 1963. Von den Gestorbenen waren 51,3% männlichen und 48,7% weiblichen Geschlechts. Die Sterbefälle der männlichen Personen nahmen um 2049 (- 4,7%) und die der weiblichen Personen um 2311 (- 5,5%) ab. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung bezogenen Sterbeziffern gingen ebenfalls zurück, und zwar beim männlichen Geschlecht von 114,0 auf 106,8, beim weiblichen Geschlecht von 99,8 auf 92,9 und insgesamt von 106,6 auf 99,6. Damit hat die relative Sterblichkeit den bisher niedrigsten Stand erreicht.

Der Rückgang der Gesamtzahl der Sterbefälle ist in der Hauptsache bedingt durch die Abnahme der Zahl der an Krankheiten der Atmungsorgane gestorbenen Männer um 1323 (-38,3%) und Frauen um 1159 (- 39,1%). An Grippe starben im Berichtsjahr 1331 Personen (658 Männer und 673 Frauen) weniger (insgesamt -86,1%, Männer -87,7%, Frauen -84,5%) als im Jahr 1963. Während im Jahr 1963 der Anteil der 70 und mehr Jahre alten Personen 73,5% an der Gesamtzahl der an Grippe Gestorbenen betrug, machte diese Quote im Jahr 1964 61,9% aus. Die Sterbeziffer der an Grippe Gestorbenen ging von 1,9 auf 0,3, beim männlichen Geschlecht sogar auf 0,2 zurück. Große relative Abnahmen der Sterbefälle verzeichnen auch die beiden Todesursachen "Altersschwäche" und "Tuberkulose". Es ergeben sich gegenüber dem Vorjahr folgende Veränderungen: Bei den Männern Altersschwäche -23,0%, Tuberkulose -11,2%, bei den Frauen Altersschwäche -15,5%, Tuberkulose -23,9%. Die seit Jahren fallende Tendenz der Sterbeziffern dieser beiden Todesursachen setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Von 10 000 Einwohnern starben 3,0 an Altersschwäche und 1,1 an Tuberkulose.

Trotz kleiner relativer Abnahme der Sterbefälle infolge Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen (- 1,7%) steht diese Krankheitsgruppe mit 34 241 Sterbefällen nach wie vor an erster Stelle unter den Todesursachen. An Herzkrankheiten starben 16 540 (- 0,3%) und an Gefäßstörungen des Zentralnervensystems 13 614 (- 2,1%) Personen. Die entsprechenden Sterbeziffern gingen bei beiden Geschlechtern leicht zurück.

Bösartige Neubildungen sind auch im Jahr 1964 wieder die zweithäufigste Todesursachengruppe. Bei 7505 Männern (+ 2,0%) und bei 7982 Frauen (+ 1,3%) wurden Krebs und andere bösartige Neubildungen als Todesursache angegeben. Die Sterbeziffern beim männlichen Geschlecht mit 19,1 und beim weiblichen mit 18,7 haben sich gegenüber dem Jahr 1963 nicht verändert. Von den an bösartigen Neubildungen gestorbenen Männern waren 2662 (35,5%) 45 bis unter 65 Jahre alt und 4588 (61,1%) älter gewesen; von den an dieser Todesursache gestorbenen Frauen hatten 2719 (34,1%) und 4775 (59,8%) den beiden Altersgruppen angehört.

Fast gleich geblieben ist die Zahl der Sterbefälle durch Krankheiten der Verdauungsorgane; sie betrug 5404, 14 mehr als im Jahr 1963 (+ 0,3%). 3117 Personen, darunter 1886 (60,5%) Männer, starben an Krankheiten der Leber und der Gallenwege.

Unter den unnatürlichen Sterbefällen, deren Gesamtzahl gegenüber 1963 um 3,2% auf 6315 gestiegen ist, nahmen die Kraftfahrzeugunfälle um 9,8% und die Selbstmorde um 6,6% zu. Im Jahr 1964 wurden 1528 Männer, darunter 526 (34,4%) im Alter von 15 bis unter 30 Jahren, und 423 Frauen, darunter 77 (18,2%) zwischen 15 bis unter 30 Jahre alt, Opfer von Kraftfahrzeugunfällen. Die Zahl der Selbstmorde erhöhte sich von Jahr zu Jahr mit wenigen Ausnahmen. Im Jahr 1964 kamen 1050 (+ 3,9%) Männer und 557 (+ 12,3%) Frauen durch Selbstmord ums Leben. Von den Selbstmördern waren 467 (44,5%) und von den Selbstmörderinnen 216 (38,4%) noch nicht 45 Jahre alt. Durch fremde Hand wurden im Jahr 1964 101 (im Jahr 1963: 112) Personen, darunter 33 Kinder unter 15 Jahre alt, getötet. Auf 10 000 der mittleren Bevölkerung kamen 7,7 Sterbefälle infolge unnatürlicher Todesursachen (Unfall, Gewalteinwirkung, Vergiftung, Selbstmord), durch Kraftfahrzeugunfälle allein 2,4, durch Selbstmord 2,0 und durch Mord, Totschlag u.ä. 0,1.

Geringere Säuglings- und Müttersterblichkeit

Im Jahr 1964 starben 3785 Kinder, und zwar 2146 Knaben und 1639 Mädchen, bevor sie das erste Lebensjahr vollendet hatten. Von den so früh gestorbenen Knaben waren 1511 (70,4%) und von den Mädchen 1137 (69,4%) nicht einmal sieben Tage alt geworden. Gegenüber dem vorangegangenen Jahr betrug die Abnahme der Säuglingssterbefälle bei den Knaben 218 (- 9,2%) und bei den Mädchen 41 (- 2,4%), insgesamt 259 (- 6,4%). Dementsprechend ging auch die Sterbeziffer der männlichen Säuglinge im Berichtsjahr stärker zurück von 29,0 auf 25,9 als die der weiblichen (von 21,7 auf 21,0). Starben im Jahr 1950 noch 50,9 Säuglinge auf 1000 Lebendgeborene, so waren es im Jahr 1963 25,5 und im letzten Jahr 23,5.

Unter den Todesursachen steht an erster Stelle die Frühgeburt (22,2%), dann folgen Asphyxie während und nach der Geburt (16,4%), angeborene Mißbildungen (16,2%) und Geburtsverletzungen (12,4%).

Die Zahl der Frauen, die infolge Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett oder an Fehlgeburt starben, ging von 119 im Jahr 1963 auf 89 im Berichtsjahr zurück; das entspricht einer Abnahme der Sterbeziffer, bezogen auf 10 000 Lebendgeborene, im gleichen Zeitraum von 7,5 auf 5,5. Von den 89 gestorbenen Müttern gehörten 33 der Altersgruppe der 15 bis unter 30 jährigen an und 55 waren zwischen 30 und 45 Jahre alt.

1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1960 bis 1964

T o d e s u r s a c h e (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im Jahr											Grundz. %
	1960	1961	1962	1963	1964	1960	1961	1962	1963	1964	1963 zu 64	
	Grundzahlen					Verhältniszahlen 1)						
Männliche und weibliche Personen zusammen												
Sterbefälle insgesamt		82 251	79 197	80 640	85 975	81 615	107,6	102,1	101,8	106,6	99,6	- 5,1
Darunter infolge												
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen	(37,40-49)	32 779	32 546	32 954	34 834	34 241	42,9	42,0	41,6	43,2	41,8	- 1,7
Darunter												
Herzkrankheiten	(42-45)	14 925	14 825	15 271	16 584	16 540	19,5	19,1	19,3	20,6	20,2	- 0,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	(37)	13 671	13 450	13 506	13 905	13 614	17,9	17,3	17,0	17,2	16,6	- 2,1
Bösartiger Neubil- dungen	(20-24)	14 102	14 410	14 502	15 241	15 487	18,5	18,6	18,3	18,9	18,9	+ 1,6
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	(90-99)	5 705	5 871	5 762	6 118	6 315	7,5	7,6	7,3	7,6	7,7	+ 3,2
Darunter												
Kraftfahrzeugunfälle	(90)	1 907	1 919	1 783	1 777	1 951	2,5	2,5	2,3	2,2	2,4	+ 9,8
Selbstmorde	(97)	1 420	1 432	1 375	1 507	1 607	1,9	1,8	1,7	1,9	2,0	+ 6,6
Krankheiten der Ver- dauungsorgane	(60-69)	4 913	5 060	5 362	5 390	5 404	6,4	6,5	6,8	6,7	6,6	+ 0,3
Krankheiten der Atmungsorgane	(50-57)	6 507	3 697	4 233	6 417	3 935	8,5	4,8	5,3	8,0	4,8	- 38,7
Altersschwäche	(891)	3 425	2 962	3 096	3 002	2 449	4,5	3,8	3,9	3,7	3,0	- 18,4
Tuberkulose	(00-03)	1 108	994	1 007	1 049	893	1,4	1,3	1,3	1,3	1,1	- 14,9
Männliche Personen												
Sterbefälle insgesamt		41 749	40 603	41 570	43 935	41 886	115,3	110,6	110,2	114,0	106,8	- 4,7
Darunter infolge												
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen	(37,40-49)	15 593	15 609	15 886	16 662	16 474	43,1	42,5	42,1	43,2	42,0	- 1,1
Darunter												
Herzkrankheiten	(42-45)	7 705	7 829	8 104	8 769	8 845	21,3	21,3	21,5	22,8	22,6	+ 0,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	(37)	6 110	5 941	6 012	6 017	5 927	16,9	16,2	15,9	15,6	15,1	- 1,5
Bösartiger Neubil- dungen	(20-24)	6 743	6 902	7 054	7 361	7 505	18,6	18,8	18,7	19,1	19,1	+ 2,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	(90-99)	3 742	3 885	3 781	3 920	4 160	10,3	10,6	10,0	10,2	10,6	+ 6,1
Darunter												
Kraftfahrzeugunfälle	(90)	1 516	1 506	1 410	1 368	1 528	4,2	4,1	3,7	3,6	3,9	+ 11,7
Selbstmorde	(97)	907	896	900	1 011	1 050	2,5	2,4	2,4	2,6	2,7	+ 3,9
Krankheiten der Ver- dauungsorgane	(60-69)	2 729	2 830	3 102	3 106	3 214	7,5	7,7	8,2	8,1	8,2	+ 3,5
Krankheiten der Atmungs- organe	(50-57)	3 443	2 115	2 303	3 450	2 127	9,5	5,8	6,1	9,0	5,4	- 38,3
Altersschwäche	(891)	1 334	1 173	1 201	1 170	901	3,7	3,2	3,2	3,0	2,3	- 23,0
Tuberkulose	(00-03)	797	699	767	748	664	2,2	1,9	2,0	1,9	1,7	- 11,2
Weibliche Personen												
Sterbefälle insgesamt		40 502	38 594	39 070	42 040	39 729	100,7	94,5	94,1	99,8	92,9	- 5,5
Darunter infolge												
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen	(37,40-49)	17 186	16 937	17 068	18 172	17 767	42,7	41,5	41,1	43,1	41,6	- 2,2
Darunter												
Herzkrankheiten	(42-45)	7 220	6 996	7 167	7 815	7 695	18,0	17,1	17,3	18,6	18,0	- 1,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	(37)	7 561	7 509	7 494	7 888	7 687	18,8	18,4	18,1	18,7	18,0	- 2,5
Bösartiger Neubil- dungen	(20-24)	7 359	7 508	7 448	7 880	7 982	18,3	18,4	17,9	18,7	18,7	+ 1,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	(90-99)	1 963	1 986	1 981	2 198	2 155	4,9	4,9	4,8	5,2	5,0	- 2,0
Darunter												
Kraftfahrzeugunfälle	(90)	391	413	373	409	423	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	+ 3,4
Selbstmorde	(97)	513	536	475	496	557	1,3	1,3	1,1	1,2	1,3	+ 12,3
Krankheiten der Ver- dauungsorgane	(60-69)	2 184	2 230	2 260	2 284	2 190	5,4	5,5	5,4	5,4	5,1	- 4,1
Krankheiten der Atmungs- organe	(50-57)	3 064	1 582	1 930	2 967	1 808	7,6	3,9	4,7	7,0	4,2	- 39,1
Altersschwäche	(891)	2 091	1 789	1 895	1 832	1 548	5,2	4,4	4,6	4,3	3,6	- 15,5
Tuberkulose	(00-03)	311	295	240	301	229	0,8	0,7	0,6	0,7	0,5	- 23,9

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

2. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen,
Grund

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbe- fälle ins- gesamt	männliche			
			ins- gesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	825	631	-	-	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	68	33	-	3	1
00-03	Tuberkulose insgesamt	893	664	-	3	1
11	Diphtherie	-	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	6	6	-	1	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	349	164	23	16	10
20-24	Bösartige Neubildungen	15 487	7 505	2	9	21
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	929	491	2	29	26
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 082	463	1	6	7
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	706	246	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13 614	5 927	14	8	5
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	1 949	1 019	63	39	24
40	Pieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	1	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	16 540	8 845	3	3	8
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 085	1 701	-	-	-
52	Grippe	215	92	13	5	1
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 140	1 072	82	16	6
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 580	963	29	16	1
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	451	350	1	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3 117	1 886	4	-	1
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 836	978	52	22	6
70	Nephritis und Nephrose	485	251	1	2	6
75	Komplikationen der Schwangerschaft	20	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	9	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	60	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 540	1 077	1	1	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	292	84	-	1	-
83	Angeborene Mißbildungen	750	392	322	32	16
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 548	1 471	1 471	-	-
891	Altersschwäche	2 449	901	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	129	34	-	-	-
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 037	1 143	5	14	11
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 951	1 528	5	31	100
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	197	160	-	4	10
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 339	1 281	42	65	62
96	Vergiftungen (Unfälle)	120	73	1	7	2
97	Selbstmord	1 607	1 050	-	-	10
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	101	68	9	5	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	81 615	41 886	2 146	335	339

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Geschlecht und Altersgruppen 1964
zahlen

D a v o n																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958		
Personen						weibliche Personen												
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre											
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr			
15	78	190	110	93	145	194	-	-	-	6	25	34	23	21	85	00,01		
1	2	11	3	6	6	35	-	-	-	3	3	7	4	3	15	02,03		
16	80	201	113	99	151	229	-	-	-	9	28	41	27	24	100	00-03		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,152		
6	11	27	27	19	25	185	22	17	12	9	11	28	13	16	57	05-10,12-14, 153,154,16-19		
47	176	1 366	1 296	1 316	3 272	7 982	2	13	11	50	412	1 706	1 013	1 189	3 586	20-24		
48	43	105	74	58	106	438	3	14	18	34	48	89	60	59	113	25		
22	32	98	65	73	159	619	3	8	7	15	47	137	55	71	276	26,27		
2	9	41	29	33	132	460	-	2	-	2	13	52	51	72	268	33		
17	54	503	546	745	4 035	7 687	3	4	6	11	44	375	449	848	5 947	37		
52	85	206	140	112	298	930	64	24	25	59	83	188	115	98	274	30-32,34-36, 38,39		
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	40		
40	274	1 487	1 282	1 312	4 436	7 695	1	1	2	25	101	619	585	912	5 449	42-45		
4	26	155	160	202	1 154	2 384	2	-	-	4	19	132	157	252	1 818	41,46-49		
6	3	5	7	10	42	123	9	2	3	-	2	6	4	6	91	52		
11	27	98	77	111	644	1 068	59	15	5	7	16	57	47	89	773	53		
6	25	111	127	149	499	617	32	21	1	9	15	35	41	59	404	50,51,54-57		
7	38	98	61	52	93	101	-	-	-	1	6	19	12	11	52	61		
12	111	489	343	301	625	1 231	1	1	2	8	65	179	154	175	646	67,68		
27	54	150	120	110	437	858	26	13	9	15	40	117	72	100	466	60,62-66,69		
34	30	69	29	25	55	234	-	2	5	18	17	55	34	34	69	70		
-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	8	12	-	-	-	-	75		
-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	4	5	-	-	-	-	76		
-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	21	38	1	-	-	-	77		
10	11	68	84	116	786	463	1	2	1	9	16	82	54	67	231	71 - 74,78-79		
8	3	14	8	9	41	208	-	1	1	3	4	22	22	26	129	80-82		
10	6	6	-	-	-	358	292	24	11	10	9	9	2	-	1	83		
-	-	-	-	-	-	1 077	1 077	-	-	-	-	-	-	-	-	84, 85		
-	-	-	-	12	889	1 548	-	-	-	-	-	-	-	16	1 532	891		
-	-	-	1	-	33	95	-	-	-	-	-	-	3	4	88	892		
36	67	206	126	157	521	894	7	12	1	11	32	105	64	92	570	86-88, 893-899		
526	226	264	114	89	173	423	2	21	43	77	53	68	28	36	95	90		
55	13	31	14	14	19	37	1	2	2	5	4	4	5	4	10	91		
178	144	152	91	91	456	1 058	25	32	18	13	19	46	35	53	817	92-95		
10	12	18	11	1	11	47	-	5	-	4	2	7	3	7	19	96		
211	246	336	104	67	76	557	-	-	-	79	137	176	74	38	53	97		
7	15	17	1	3	6	33	7	4	3	8	1	3	1	2	4	98,99		
1 412	1 821	6 322	5 050	5 287	19 174	39 729	1 639	240	186	528	1 299	4 359	3 180	4 360	23 938	00-99		

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	T o d e s u r s a c h e	Sterbefälle				
		ins- gesamt	ins- gesamt	männliche		
				im Alter		
				0-1 ²⁾	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,0	1,6	-	-	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,08	0,08	-	0,1	0,02
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,1	1,7	-	0,1	0,02
11	Diphtherie	-	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,01	0,02	-	0,03	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,4	0,3	0,5	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	18,9	19,1	0,02	0,3	0,3
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,1	1,3	0,02	1,0	0,4
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,3	1,2	0,01	0,2	0,1
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,9	0,6	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	16,6	15,1	0,2	0,3	0,08
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2,4	2,6	0,8	1,3	0,4
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,0	0,0	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	20,2	22,6	0,04	0,1	0,1
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,0	4,3	-	-	-
52	Grippe	0,3	0,2	0,2	0,2	0,02
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2,6	2,7	1,0	0,5	0,1
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1,9	2,5	0,4	0,5	0,02
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,6	0,9	0,01	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,8	4,8	0,05	-	0,02
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,2	2,5	0,6	0,7	0,1
70	Nephritis und Nephrose	0,6	0,6	0,01	0,07	0,1
75	Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾	1,2	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ³⁾	0,6	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾	3,7	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,9	2,7	0,01	0,03	-
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,2	-	0,03	-
83	Angeborene Mißbildungen	0,9	1,0	3,9	1,1	0,3
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,1	3,8	17,8	-	-
891	Altersschwäche	3,0	2,3	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,09	-	-	-
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2,5	2,9	0,06	0,5	0,2
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,4	3,9	0,06	1,0	1,6
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,2	0,4	-	0,1	0,2
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2,9	3,3	0,5	2,2	1,0
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,2	0,01	0,2	0,03
97	Selbstmord	2,0	2,7	-	-	0,2
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,2	0,1	0,2	0,08
00-99	Sterbefälle insgesamt	99,6	106,8	25,9	11,1	5,6

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Auf 1000 Lebend-

Geschlecht und Altersgruppen 1964

-zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	
Personen							weibliche Personen										
von ... bis unter ... Jahre							ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr	0-1 ²⁾		1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
0,2	1,0	3,1	5,4	6,8	7,3	0,5	-	-	-	0,07	0,3	0,4	0,9	1,0	2,6	00,01	
0,01	0,02	0,2	0,1	0,4	0,3	0,08	-	-	-	0,03	0,04	0,09	0,2	0,1	0,5	02,03	
0,2	1,0	3,3	5,6	7,2	7,6	0,5	-	-	-	0,1	0,3	0,5	1,1	1,2	3,1	00-03	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
0,04	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,152	
0,06	0,1	0,4	1,3	1,4	1,3	0,4	0,3	0,6	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,8	1,8	05-10,12-14, 153,154,16-19	
0,5	2,2	22,1	64,2	95,8	165,3	18,7	0,03	0,5	0,2	0,6	4,8	21,2	40,4	58,1	110,4	20-24	
0,5	0,5	1,7	3,7	4,2	5,4	1,0	0,04	0,5	0,3	0,4	0,6	1,1	2,4	2,9	3,5	25	
0,2	0,4	1,6	3,2	5,3	8,0	1,4	0,04	0,3	0,1	0,2	0,6	1,7	2,2	3,5	8,5	26,27	
0,02	0,1	0,7	1,4	2,4	6,7	1,1	-	0,07	-	0,02	0,2	0,6	2,0	3,5	8,2	33	
0,2	0,7	8,1	27,0	54,2	203,9	18,0	0,04	0,1	0,1	0,1	0,5	4,7	17,9	41,4	183,0	37	
0,5	1,1	3,3	6,9	8,2	15,1	2,2	0,8	0,8	0,4	0,7	1,0	2,3	4,6	4,8	8,4	30-32,34-36, 38,39	
-	-	0,02	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	40	
0,4	3,4	24,1	63,5	95,5	224,1	18,0	0,01	0,03	0,03	0,3	1,2	7,7	23,4	44,6	167,7	42-45	
0,04	0,3	2,5	7,9	14,7	58,3	5,6	0,03	-	-	0,04	0,2	1,6	6,3	12,3	56,0	41,46-49	
0,06	0,04	0,08	0,3	0,7	2,1	0,3	0,1	0,07	0,05	-	0,02	0,07	0,2	0,3	2,8	52	
0,1	0,3	1,6	3,8	8,1	32,5	2,5	0,8	0,5	0,09	0,08	0,2	0,7	1,9	4,3	23,8	53	
0,06	0,3	1,8	6,3	10,8	25,2	1,4	0,4	0,7	0,02	0,1	0,2	0,4	1,6	2,9	12,4	50,51,54-57	
0,07	0,5	1,6	3,0	3,8	4,7	0,2	-	-	-	0,01	0,07	0,2	0,5	0,5	1,6	61	
0,1	1,4	7,9	17,0	21,9	31,6	2,9	0,01	0,03	0,03	0,09	0,8	2,2	6,1	8,5	19,9	67,68	
0,3	0,7	2,4	5,9	8,0	22,1	2,0	0,3	0,5	0,2	0,2	0,5	1,5	2,9	4,9	14,3	60,62-66,69	
0,3	0,4	1,1	1,4	1,8	2,8	0,5	-	0,07	0,09	0,2	0,2	0,7	1,4	1,7	2,1	70	
-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	0,7	2,5	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,4	1,0	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	1,9	7,9	53,8	-	-	-	77	
0,1	0,1	1,1	4,2	8,4	39,7	1,1	0,01	0,07	0,02	0,1	0,2	1,0	2,2	3,3	7,1	71-74,78,79	
0,08	0,04	0,2	0,4	0,6	2,1	0,5	-	0,03	0,02	0,03	0,05	0,3	0,9	1,3	4,0	80-82	
0,1	0,07	0,1	-	-	-	0,8	3,7	0,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,08	-	0,03	83	
-	-	-	-	-	-	2,5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	0,9	44,9	3,6	-	-	-	-	-	-	-	0,8	47,2	891	
-	-	-	0,05	-	1,7	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	2,7	892	
0,4	0,8	3,3	6,2	11,4	26,3	2,1	0,09	0,4	0,02	0,1	0,4	1,3	2,6	4,5	17,5	86-88, 893-899	
5,4	2,8	4,3	5,6	6,5	8,7	1,0	0,03	0,7	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,8	2,9	90	
0,6	0,2	0,5	0,7	1,0	1,0	0,09	0,01	0,07	0,03	0,06	0,05	0,05	0,2	0,2	0,3	91	
1,8	1,8	2,5	4,5	6,6	23,0	2,5	0,3	1,1	0,3	0,1	0,2	0,6	1,4	2,6	25,1	92-95	
0,1	0,1	0,3	0,5	0,07	0,6	0,1	-	0,2	-	0,04	0,02	0,09	0,1	0,3	0,6	96	
2,2	3,1	5,4	5,1	4,9	3,8	1,3	-	-	-	0,9	1,6	2,2	3,0	1,9	1,6	97	
0,07	0,2	0,3	0,05	0,2	0,3	0,08	0,09	0,1	0,05	0,09	0,01	0,04	0,04	0,1	0,1	98,99	
14,5	22,7	102,3	250,0	384,9	968,8	92,9	21,0	8,4	3,2	5,9	15,2	54,1	127,0	213,0	736,8	00-99	

geborene (Säuglingssterblichkeit). - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene (Müttersterblichkeit).

4. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1964

Jahr Alters- abschnitt	ins- gesamt	Säuglingssterbefälle																	
		davon		Frühgeburt (852)		angeborene Lebens- schwäche (851)		angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533,538,844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- erkrankungen, Ernährungs- störungen (661,843,847)		alle übrigen Todes- ursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1959	4 274	2 438	1 836	671	549	74	70	360	276	318	159	219	168	31	26	89	82	676	506
1960	4 400	2 483	1 917	625	512	64	52	367	309	301	174	188	152	24	41	109	69	805	608
1961	4 393	2 517	1 876	672	535	67	49	437	323	337	214	198	144	22	23	76	51	708	537
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1963	4 044	2 364	1 680	586	463	41	32	381	295	336	189	131	82	20	20	59	38	810	561
1964	3 785	2 146	1 639	479	361	36	32	322	292	282	186	107	90	23	22	57	37	840	619
Davon bis 24 Std	1 906	1 088	818	386	287	34	27	98	94	169	115	3	6	-	1	-	-	398	288
24 Std bis 7 Tage	742	423	319	77	61	2	3	71	56	102	62	9	10	2	1	-	-	160	126
7 bis 28 Tage	246	126	120	13	11	-	2	41	53	10	6	13	15	-	5	7	5	42	23
28 Tage bis 1 Jahr	891	509	382	3	2	-	-	112	89	1	3	82	58	21	15	50	32	240	182
Auf 1000 Lebendgeborene																			
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1959	30,3	33,7	26,8	9,3	8,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,4	2,3	3,0	2,5	0,4	0,4	1,2	1,2	9,3	7,4
1960	30,3	33,3	27,1	8,4	7,2	0,9	0,7	4,9	4,4	4,0	2,5	2,5	2,1	0,3	0,6	1,5	1,0	10,8	8,6
1961	28,8	32,2	25,3	8,6	7,2	0,9	0,7	5,6	4,3	4,3	2,9	2,5	1,9	0,3	0,3	1,0	0,7	9,1	7,2
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1963	25,5	29,0	21,7	7,2	6,0	0,5	0,4	4,7	3,8	4,1	2,4	1,6	1,1	0,2	0,3	0,7	0,5	10,0	7,3
1964	23,5	25,9	21,0	5,8	4,6	0,4	0,4	3,9	3,7	3,4	2,4	1,3	1,2	0,3	0,3	0,7	0,5	10,1	7,9

5. Müttersterblichkeit 1938 bis 1964

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwan- gerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwan- gerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7