

**BAND
219**

STATISTIK VON BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Tuberkulose 1959 - 1974

**HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN - WÜRTTEMBERG
STUTTGART 1976**

Vorwort

Im Jahr 1961 veröffentlichte das Statistische Landesamt eine Dokumentation über die Tuberkulose in Baden-Württemberg in den Jahren 1954 bis 1959.

Der nun vorliegende Bericht schließt zeitlich an diese Dokumentation an. Er gibt Aufschluß über die Entwicklung dieser Krankheit, die vor allem mittels der Chemotherapie so wirksam bekämpft werden konnte, daß ihr heute bei weitem nicht mehr diese Bedeutung zukommt wie in früheren Jahren.

Der vorliegende Band wurde in der Abteilung "Bevölkerungs- und Kulturstatistik" des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zusammengestellt. Die einführenden Vorbemerkungen verfaßte Professor Dr. Gerhard Neumann, Obermedizinaldirektor und Leiter des Städtischen Gesundheitsamtes Stuttgart.

Stuttgart, im November 1976

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg

Professor Dr. Klaus Szameitat
Präsident

Inhalt

Seite

Vorwort	3
Vorbemerkungen	7
Erläuterungen	9

Angaben für 1974

1. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember 1974	11
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1974	11
3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1974	12
4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1974	14
5. An aktiver Tuberkulose erkrankte Ausländer am 31. Dezember 1974	15
6. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1974	15
7. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1974	16

Angaben für 1973 und 1972

8. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember 1973	18
9. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1973	18
10. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1973	19
11. An aktiver Tuberkulose erkrankte Ausländer am 31. Dezember 1973	20
12. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1973	20
13. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember 1972	21
14. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1972	21
15. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1972	22
16. An aktiver Tuberkulose erkrankte Ausländer am 31. Dezember 1972	23
17. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1972	23

Bestand 1959 bis 1971

18. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1959 bis 1971	24
19. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken 1959 bis 1971	26
20. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1959 und 1971	28
21. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1971	32
22. Bestand der an sonstiger aktiver endothorakaler Tuberkulose Erkrankten nach Form der Tuberkulose am 31. Dezember 1971	33
23. Bestand der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Form der Tuberkulose 1959	33
24. Bestand der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Form der Tuberkulose 1971	33

	Seite
25. Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Nationalität 1968 bis 1971	34
26. Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1971	35
27. Perkutane Tuberkulinproben bei Kindern 1968 bis 1973	35
 Zugänge 1959 bis 1971	
28. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1959 bis 1971	36
29. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1971	38
30. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter, Geschlecht und Art des Zugangs 1971	39
31. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken 1959 bis 1971	40
32. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1959 und 1971	42
33. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken nach Art des Zugangs 1971	46
34. Zugänge der an sonstiger aktiver endothorakaler Tuberkulose Erkrankten nach Form der Tuberkulose und Geschlecht 1971	47
35. Zugänge der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Form der Tuberkulose und Geschlecht 1971	47
36. Zugänge der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Alter und Geschlecht 1971	48
 Übergänge und Sterbefälle 1959 bis 1974	
37. Diagnoseübergänge von der Gruppe nicht ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane (Ic) nach der Gruppe ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane (Ia) in den Kreisen 1968 und 1971	49
38. Überwachungs- und Beobachtungsfälle am 31. Dezember	50
39. Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit nach der Todesursachenstatistik 1959 bis 1974	50
40. Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit in den Regierungsbezirken nach der Todesursachenstatistik 1959 bis 1972	51
 Tuberkulosefürsorge 1968 bis 1974	
41. Anzahl der Tuberkulosefürsorgestellen am 31. Dezember 1971	52
42. Personal der Fürsorgestellen am 31. Dezember 1971	52
43. Leistungen der Fürsorgestellen 1968 bis 1971	52
44. Personal der Fürsorgestellen 1974	53
45. Leistungen der Fürsorgestellen 1974	53
46. Unterbringung der ansteckungsfähigen Tuberkulösen (Ia) 1968 bis 1971	53
 Tuberkulose-Krankenhäuser 1959 bis 1974	
47. Tuberkulose-Krankenhäuser 1959 und 1966 bis 1974	54
48. Ärzte in den Tuberkulose-Krankenhäusern am 31. Dezember 1973	54
49. Pflegepersonen und sonstiges Personal in den Tuberkulose-Krankenhäusern am 31. Dezember 1973	55
 Tuberkulosehilfe 1963 bis 1974	
50. Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe 1963 bis 1974	55

Vorbemerkungen

Für das langfristige Seuchengeschehen, den säkularen Gang, besagen 15 Jahre, wie der jetzige Berichtszeitraum, nicht viel. Dennoch ist gerade diese Epoche des Tuberkuloseablaufs nicht ohne grundsätzliches Interesse: Sie bestätigt definitiv den Übergang von der seuchenhaft auftretenden Volkskrankheit mit nur begrenzten Heilungsaussichten zu einer seltener werdenden, vorwiegend individual-medizinisch bedeutsamen, in einem ungewöhnlich hohen Prozentsatz heilbaren Erkrankung.

Der Rückgang aller Erkrankungsformen im Berichtszeitraum ist ebenso unübersehbar wie anhaltend. In keinem Land der Welt wurde bisher eine Umkehr der Morbiditätskurven beobachtet, auch wenn sie bereits auf wesentlich niedrigerem Niveau als jetzt in Baden-Württemberg verlaufen. Ein weiterhin absinkender Trend darf deshalb auch für unser Land weiterhin unterstellt werden.

Die medikamentöse Behandlung der Tuberkulose hat im Berichtszeitraum durch Einführung neuer, hochwirksamer Substanzen wie Rifampicin und Ethambutol eine weitere, wesentliche Verbesserung erfahren. Die Ansteckungsfähigkeit wird mit großer Regelmäßigkeit innerhalb weniger Wochen beseitigt, korrekte Einnahme, sachgemäße Dosierung und sinnvolle Kombination vorausgesetzt. Die Dauer der Ansteckungsfähigkeit wird so erheblich verkürzt. Dadurch verringert sich das gesamte Keimangebot in der Bevölkerung beträchtlich, das Risiko einer Weiterverbreitung durch bekannte Kranke nimmt ständig ab. Der Prozeß der Selbstelimination der Tuberkulose, schon lange vor Anwendung irgendwelcher Bekämpfungsmaßnahmen wirksam, wird so nachhaltig beschleunigt, Neuansteckungen erfolgen heute im wesentlichen vor Diagnosestellung. Alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Diagnose vorzuverlegen, sind deshalb unverändert wichtig, ja, gewinnen eher noch an Gewicht. Unter diesem Gesichtspunkt kommt der Röntgenreihenuntersuchung nach wie vor große Bedeutung zu.

Das Epidemiegeschehen ist durch die Zuwanderung ausländischer Arbeitnehmer im Berichtszeitraum ohne Zweifel beeinflusst worden. Die Zahl der Ausländer stieg von 94 064 im Jahre 1959 auf 914 162 im Jahr 1974 (Stand jeweils 30. September). Bevölkerungsverschiebungen solchen Umfangs haben bislang immer und überall zu einem gewissen Anstieg der Tuberkulosehäufigkeit geführt. Pathogenetisch ergeben sich folgende Möglichkeiten:

1. Der Ausländer ist bei Einreise in das Bundesgebiet noch nicht tuberkuloseinfiziert, weil er aus einer Gegend mit wenig Kontaktgelegenheit stammt. Für ihn eröffnet sich in den Ballungsgebieten erstmals

das Risiko einer Infektion mit Tuberkulose. In diesen Fällen ist mit späten Erstinfektionen zu rechnen, die auch tatsächlich beobachtet werden.

2. Der Ausländer reist tuberkuloseinfiziert ein; es können röntgenologisch erfassbare Veränderungen vorhanden sein oder fehlen. Bei größerer Ausdehnung wird in der Regel die Aufenthaltserlaubnis versagt. Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis stellen eine Auslese von Fällen eines geringeren Tuberkulose-risikos dar.

Reaktivierungen von Altherden oder Erstmanifestationen nach bisher folgender Infektion treten in einem gewissen Prozentsatz auf. Dieses Aufklackern kann nach herkömmlicher Lehrmeinung durch ungünstige Lebensbedingungen, auch psychosoziale Stresssituationen, begünstigt werden. Solche Bedingungen sind für ausländische Arbeitnehmer durchaus gegeben.

Die erhöhte Tuberkulosemorbidity beruht aber weitgehend darauf, daß sich die meisten Herkunftsländer in einer ungünstigeren epidemiologischen Phase als die Bundesrepublik befinden. Es herrscht heute Einigkeit darüber, daß Zuwanderer immer ihre spezielle Tuberkuloseepidemiologie in das Zielland mitnehmen. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit ist bis zu einem gewissen Grade vorbestimmt und kann nur begrenzt verändert werden.

Ausländer müssen wegen ihrer erhöhten Erkrankungsfrequenz als klassische Risikogruppe aufgefaßt werden. Andererseits stellen sie keine gesundheitliche Gefährdung der Gesamtbevölkerung dar. Diese beiden scheinbar gegensätzlichen Wertungen auseinanderzuhalten bereitet mitunter begriffliche Schwierigkeiten. Immerhin verzögert die erhöhte Morbidity der Ausländer den Rückgang an Tuberkulose: Was jetzt in vier Jahren eintritt, wäre ohne Ausländer in drei Jahren zu erreichen. Berücksichtigt man allerdings die soziale Schichtung, so schwinden die Unterschiede weitgehend.

Im Berichtszeitraum wurden die Regeln für die Tuberkulosestatistik zweimal geändert:

1. Ab 1968 wurden nur auf Landesebene die bundeseinheitlich vorgeschriebenen Diagnosegruppen nach epidemiologischen und pathogenetischen Gesichtspunkten zusätzlich gegliedert. Besonders wichtig ist dies bei der bakteriologisch bestätigten Tuberkulose. Hier wird zwischen Fällen mit Erregernachweis im direkten Ausstrich des Auswurfs und solchen mit Nachweis durch andere Methoden (Kultur, Tierversuch) oder in anderem Material (Kehlkopfabstrich, Magenspülwasser usw.) unterschieden. Das Prinzip dieser Gliederung ist quantitativer Art. Bei hohem Bakteriengehalt im Auswurf genügt bereits der einfache Ausstrich, bei geringem bedarf es verfeiner-

ter Nachweismethoden. Die Umgebung ist bei großer Bakterienzahl stärker gefährdet als bei kleiner. Das Risiko einer Resistenzentwicklung ist erhöht, es muß deshalb intensiver behandelt werden. Diese seuchenhygienisch wie individualmedizinisch gleich bedeutsame Trennung kann sich nur dann in der Statistik niederschlagen, wenn die Fürsorgestellten die Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchungen ermitteln und für die Statistik berücksichtigen.

Bei der bakteriologisch nicht bestätigten Tuberkulose wird zwischen Tuberkuloseformen, die vorwiegend nach einer erst kurz zurückliegenden Infektion auftreten, und anderen getrennt. Außerdem werden Fälle, die mutmaßlich innerhalb der letzten 12 Monate frisch infiziert wurden (erkenntlich am erstmalig positivem Ausfall der Tuberkulinreaktion bei bekanntem früher negativen Ergebnis), gesondert ausgewiesen. Hier handelt es sich nicht um Kranke sondern um Krankheitsverdächtige.

Formal wurde mit der Erfassung der Nationalität begonnen, eine unerläßliche Maßnahme. Die ebenfalls aufgenommene Registrierung des Wohnortes konnte infolge der Gemeinde- und Gebietsreform nicht zu voller Geltung gelangen. Dabei werden solche wohnortsbezogenen Daten für eine sinnvolle Kleinraum-epidemiologie und die praktische Tuberkulosebekämpfung immer wichtiger und sollten daher genauestens ausgewertet werden.

2. Am 1.1. 1972 trat im ganzen Bundesgebiet eine Neuordnung der Tuberkulosestatistik in Kraft. Für Baden-Württemberg ergaben sich nur geringe Änderungen, da die Neuregelung weitgehend auf den Erfahrungen der 1968er-Regelung des Landes aufbaute. Wichtig sind folgende Bestimmungen:

a) Der Schwerpunkt der Statistik wird auf die Zugänge gelegt, die praktisch mit der Inzidenz gleichzusetzen sind.

b) Erst nach Abschluß der Untersuchungsverfahren darf ein Fall in die Statistik aufgenommen werden. Bis einschließlich 1971 wurden Fälle mit negativem Ausstrich zunächst als "geschlossene" Tuberkulose registriert. Wurde später ein positives Kulturergebnis bekannt, so wurde der Übergang zur Gruppe der bakteriologisch bestätigten Tuberkulosen nur beim Bestand statistisch wirksam. Dabei lag von Anfang an eine mit erfaßbarer Tuberkulosebakterienausscheidung einhergehende Tuberkulose vor. Wenn man die Kulturergebnisse abwartet, so dient dies einer wahrheitsgemäßen Aussage. Diese Regeländerung, erfreulicherweise aber auch eine Ausweitung der bakteriologischen Diagnostik, hat zu einem Anstieg der Zahl von bakteriologisch bestätigten Tuberkulosen der Atmungsorgane seit 1971

geführt. Eine echte Zunahme liegt nicht vor, da die Zahl der bakteriologisch nicht bestätigten behandlungsbedürftigen Tuberkulosen weit stärker zurückgegangen ist. Diese Umschichtung wird bei Deutung der Tuberkulosestatistik vielfach übersehen. Möglicherweise ist das Ende der aufgezeigten Entwicklung noch nicht erreicht. In Ländern mit sehr intensiver bakteriologischer Diagnostik und kritischer Einstellung zur nicht bakteriologisch bestätigten Tuberkulose werden bis zu viermal soviel bakteriologisch bestätigte wie andere Tuberkulosen registriert, eine Relation, von der Baden-Württemberg noch weit entfernt ist. Dabei liegt 1973 der Anteil der nur kulturell (oder anderweitig) bestätigten Lungentuberkulosen in Baden-Württemberg höher als im Bundesdurchschnitt und wird von keinem anderen Flächenstaat erreicht.

c) Der Bestand orientiert sich nicht mehr an dem abstrakten, objektiv nicht erfaßbaren Begriff der Aktivität (wenn man vom positiven Erregernachweis absieht), sondern an der "Behandlungsbedürftigkeit". Auch hier fehlt es zwar an objektiven Kriterien, trotzdem stellt die Neuerung einen Fortschritt dar, da die Behandlungsbedürftigkeit weitgehend mit der tatsächlichen Verordnung von Medikamenten einhergeht. Allein durch die neue Definition müssen sich die Bestandszahlen beachtlich verringern. Der neue Bestand ist weit eher als bisher mit "Kranken" gleichzusetzen.

d) Ferner wurde der erfolgreichen Chemotherapie Rechnung getragen und das Umsetzen von der bakteriologisch bestätigten in eine andere Form erleichtert.

Schließlich muß erwähnt werden, daß seit der Statistikordnung von 1968 die statistische Bearbeitung der aktiven bzw. behandlungsbedürftigen Formen zentral durch das Statistische Landesamt erfolgt. Die Gesundheitsämter füllen für diese Fälle lediglich Lochkartenbelege aus. Für die übrigen in Überwachung stehenden Gruppen (behandlungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane oder andere Organe, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige, Sarkoidosekranke, Sonstige) wird von den Gesundheitsämtern eine sehr vereinfachte Reststatistik erstellt. Nur über die zentrale Datenerfassung und Datenverarbeitung war und ist es möglich, eine epidemiologisch und pathogenetisch so tief gegliederte Statistik zu liefern, wie es in den letzten Jahren geschehen ist. Es gibt keine andere Erkrankung, über die im Rahmen einer Vollerhebung so viele Daten verfügbar sind, wie es bei der Tuberkulose der Fall ist. Diese Statistik gewinnt dadurch Modellcharakter auf dem Gebiet der Morbiditätsstatistik. Unter diesem übergeordneten Gesichtspunkt ist die Herausgabe des Berichtsbandes besonders zu begrüßen.

Erläuterungen

Klassifikation der aktiven Tuberkulose in den Fürsorgestellen der Gesundheitsämter bis 31. Dezember 1967

- I a Ansteckende (offene) Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis
- I b Ansteckende (offene) Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Bakteriennachweis
- I c Aktive, nicht ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane
- I d Aktive Tuberkulose anderer Organe :
 - K Tuberkulose der Knochen und Gelenke
 - D Tuberkulose der peripheren Lymphknoten
 - H Tuberkulose der Haut
 - M Tuberkulose der Meningen
 - U Tuberkulose des Urogenitaltraktes
 - S Tuberkulose sonstiger Organe

Klassifikation der aktiven Tuberkulose 1. Januar 1968 bis 31. Dezember 1971

- I a Ansteckungsfähige endothorakale Tuberkulose mit Bakteriennachweis
 - 11 Im Ausstrich durch direkte mikroskopische Untersuchung
 - 12 In sonstiger Weise
- I c Sonstige aktive endothorakale Tuberkulose
 - 21 Nicht BCG-geschützte tuberkulinpositive Reagenten bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, ohne sonst nachweisbare tuberkulöse Veränderungen
 - 22 Endothorakale Lymphknotentuberkulose
 - 23 Pleuritis exsudativa tuberkulöser Ursache oder ohne Nachweis anderer Ursache
 - 24 Miliartuberkulose
 - 25 Sonstige endothorakale Tuberkulose
- I d Aktive extrapulmonale Tuberkulose
 - 31 Knochen- und Gelenktuberkulose
 - 32 Tuberkulose der peripheren Lymphknoten
 - 33 Hauttuberkulose
 - 34 Tuberkulöse Meningitis
 - 35 Uro- und Genitaltuberkulose
 - 36 Sonstige Organtuberkulose

Klassifikation der aktiven Tuberkulose seit 1. Januar 1972

1. Tuberkulose der Atmungsorgane

1.1 mit Nachweis von Tuberkulosebakterien

1.1.1 Direkt im Sputumausstrich ¹⁾

1.1.2 In sonstigem Material oder mit anderen Methoden ¹⁾

1.1.0 Nicht chronische Tuberkulose ²⁾

1.1.9 Chronische Tuberkulose ²⁾

1.2 ohne Nachweis von Tuberkulosebakterien

1.2.1 Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberkulosa)

1.2.2 Pleuritis tuberkulosa

1.2.8 Postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberkulosa)

2. Tuberkulose anderer Organe

2.1 Tuberkulose der Meningen

2.2 Tuberkulose des Urogenitaltraktes

2.3 Tuberkulose der Knochen und Gelenke

2.4 Tuberkulose der peripheren Lymphknoten

2.8 Tuberkulose sonstiger Organe

3. Konvertoren

1) Zugang. – 2) Bestand.

1. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember 1974

Tuberkulosegruppen	Land Regierungsbezirk	Anzahl			Auf 100 000 der Bevölkerung
		männlich	weiblich	insgesamt	
Tuberkulose der Atmungsorgane					
mit Bakteriennachweis (1.1) darunter Chroniker	Baden-Württemberg	1 620 296	454 55	2 074 351	22,5 3,8
	Stuttgart	582	132	714	20,5
	Karlsruhe	550	141	691	28,8
	Freiburg	325	110	435	23,3
	Tübingen	163	71	234	15,8
ohne Bakteriennachweis (1.2)	Baden-Württemberg	5 987	2 994	8 981	97,3
	Stuttgart	2 086	1 027	3 113	89,4
	Karlsruhe	1 921	922	2 843	118,6
	Freiburg	1 208	627	1 835	98,4
	Tübingen	772	418	1 190	80,3
Tuberkulose anderer Organe (2)	Baden-Württemberg	880	988	1 868	20,3
	Stuttgart	340	396	736	21,1
	Karlsruhe	202	254	456	19,0
	Freiburg	191	189	380	20,4
	Tübingen	147	149	296	20,0
Aktive Tuberkulose, alle Formen (1 + 2)	Baden-Württemberg	8 487	4 436	12 923	140,1
	Stuttgart	3 008	1 555	4 563	131,1
	Karlsruhe	2 673	1 317	3 990	166,5
	Freiburg	1 724	926	2 650	142,0
	Tübingen	1 082	638	1 720	116,1

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1974

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tbk der Atmungsorgane mit ohne Bakteriennachweis				Tbk anderer Organe		alle Formen		Tbk der Atmungsorgane mit ohne Bakteriennachweis				Tbk anderer Organe		alle Formen	
	(1.1)		(1.2)		(2)		(1 + 2)		(1.1)		(1.2)		(2)		(1 + 2)	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0	2,0
1 - 5	7	5	62	50	5	7	74	62	3,0	2,2	26,4	22,2	2,1	3,1	31,5	27,5
5 - 10	11	5	248	187	7	12	266	204	2,8	1,3	63,5	50,3	1,8	3,2	68,1	54,9
10 - 15	5	5	174	168	10	21	189	194	1,3	1,3	43,4	44,0	2,5	5,5	47,2	50,8
15 - 20	35	34	205	238	15	24	255	296	9,9	10,1	57,9	70,7	4,2	7,1	72,0	88,0
20 - 25	85	60	491	380	40	48	616	488	26,1	17,9	150,5	113,6	12,3	14,4	188,8	145,9
25 - 30	102	39	398	283	82	75	582	397	32,0	13,3	124,8	96,4	25,7	25,5	182,5	135,2
30 - 35	137	28	471	230	97	88	705	346	36,6	8,3	125,8	68,1	25,9	26,1	188,3	102,5
35 - 40	163	32	584	217	105	101	852	350	41,2	9,0	147,5	61,1	26,5	28,4	215,2	98,6
40 - 45	174	24	522	158	101	89	797	271	55,7	8,6	167,0	56,7	32,3	31,9	255,0	97,2
45 - 50	175	31	505	148	85	94	765	273	63,3	10,9	182,6	51,9	30,7	33,0	276,6	95,7
50 - 55	135	26	459	163	93	92	687	281	61,2	8,4	208,0	52,9	42,1	29,9	311,3	91,3
55 - 60	102	17	290	107	48	74	440	198	76,0	8,8	216,0	55,2	35,8	38,2	327,7	102,2
60 - 65	121	29	489	161	64	76	674	266	60,0	9,9	242,4	54,7	31,7	25,8	334,1	90,3
65 - 70	153	29	482	156	64	66	699	251	83,2	10,8	262,0	58,0	34,8	24,5	379,9	93,3
70 und mehr	215	90	606	347	64	121	885	558	80,4	19,3	226,7	74,4	24,0	25,9	331,1	119,6
Insgesamt	1 620	454	5 987	2 994	880	988	8 487	4 436	36,5	9,5	134,7	62,6	19,8	20,7	191,0	92,8

3. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1974

Kreis Regionalverband (RV) Regierungsbezirk Land	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	mit Bakteriennachweis (1.1)					ohne Bakteriennachweis (1.2)				
	unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt		unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt	
		männlich	weiblich	Anzahl	auf 100 000		männlich	weiblich	Anzahl	auf 100 000
Stadtkreis Stuttgart	2	152	28	182	29,7	23	375	157	555	90,5
Landkreise										
Böblingen	-	54	8	62	20,2	7	110	50	167	54,4
Esslingen	4	42	9	55	12,6	24	201	62	287	65,9
Göppingen	-	25	5	30	13,0	7	137	67	211	91,1
Ludwigsburg	1	65	17	83	19,4	29	217	95	341	79,8
Rems-Murr-Kreis	2	95	20	117	33,3	48	285	149	482	137,1
RV Mittlerer Neckar	9	433	87	529	22,4	138	1 325	580	2 043	86,3
Stadtkreis Heilbronn	-	22	6	28	24,2	8	91	45	144	124,2
Landkreise										
Heilbronn	1	33	14	48	20,4	14	136	90	240	102,0
Hohenlohekreis	-	12	1	13	15,4	6	32	9	47	55,5
Schwäbisch Hall	1	17	5	23	15,3	6	50	45	101	67,3
Main-Tauber-Kreis	2	13	2	17	13,4	11	83	49	143	113,0
RV Franken	4	97	28	129	18,1	45	392	238	675	94,7
Landkreise										
Heidenheim	-	13	3	16	12,6	4	29	9	42	33,2
Ostalbkreis	2	32	6	40	14,5	37	218	98	353	127,7
RV Ostwürttemberg	2	45	9	56	13,9	41	247	107	395	98,0
Regierungsbezirk Stuttgart	15	575	124	714	20,5	224	1 964	925	3 113	89,4
Stadtkreise										
Baden-Baden	-	8	2	10	21,4	3	15	2	20	42,8
Karlsruhe	-	32	14	46	17,3	10	188	90	288	108,3
Landkreise										
Karlsruhe	-	48	11	59	16,0	133	278	118	529	143,3
Rastatt	1	54	18	73	37,8	79	196	109	384	198,8
RV Mittlerer Oberrhein	1	142	45	188	21,5	225	677	319	1 221	139,6
Stadtkreise										
Heidelberg	-	17	6	23	19,0	5	87	33	125	103,0
Mannheim	1	138	33	172	56,8	73	263	125	461	143,8
Landkreise										
Neckar-Odenwald-Kreis	1	17	2	20	15,1	12	40	20	72	54,4
Rhein-Neckar-Kreis	2	43	14	59	12,8	41	253	101	395	86,0
RV Unterer Neckar	4	215	55	274	26,5	131	643	279	1 053	101,9
Stadtkreis Pforzheim	-	40	9	49	49,4	16	87	50	153	154,1
Landkreise										
Calw	4	71	9	84	66,5	13	103	44	160	126,7
Enzkreis	-	52	12	64	38,9	28	111	36	175	106,4
Freudenstadt	1	23	8	32	32,7	7	57	17	81	82,7
RV Nordschwarzwald	5	186	38	229	46,9	64	358	147	569	116,6
Regierungsbezirk Karlsruhe	10	543	138	691	28,8	420	1 678	745	2 843	118,6
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	-	27	13	40	22,3	5	75	49	129	72,0
Landkreise										
Breisgau-Hochschwarzwald	-	27	16	43	23,3	10	108	43	161	87,1
Emmendingen	-	10	3	13	10,1	7	53	21	81	62,6
Ortenaukreis	1	76	24	101	28,3	32	375	189	596	167,0
RV Südlicher Oberrhein	1	140	56	197	23,2	54	611	302	967	113,7
Landkreise										
Rottweil	2	27	11	40	30,6	8	83	30	121	92,6
Schwarzwald-Baar-Kreis	-	27	6	33	16,4	9	83	49	141	69,9
Tuttlingen	1	33	11	45	40,4	22	68	45	135	121,2
RV Schwarzwald-Baar-Heuberg	3	87	28	118	26,6	39	234	124	397	89,5
Landkreise										
Konstanz	-	47	9	56	24,2	11	112	47	170	73,3
Lörrach	1	19	10	30	15,3	31	103	45	179	91,4
Waldshut	-	29	5	34	23,6	4	78	40	122	84,7
RV Hochrhein-Bodensee	1	95	24	120	21,0	46	293	132	471	82,4
Regierungsbezirk Freiburg	5	322	108	435	23,3	139	1 138	558	1 835	98,4
Landkreise										
Reutlingen	-	16	10	26	11,0	28	123	59	210	88,8
Tübingen	-	17	11	28	16,9	8	51	31	90	54,4
Zollernalbkreis	-	16	5	21	12,0	6	45	14	65	37,1
RV Neckar-Alb	-	49	26	75	13,0	42	219	104	365	63,2
Stadtkreis Ulm	2	21	4	27	27,8	12	57	32	101	104,1
Landkreise										
Alb-Donau-Kreis	3	15	8	26	16,6	7	70	36	113	72,2
Biberach	-	20	11	31	20,7	5	80	34	119	79,4
RV Donau-Iller ¹⁾	5	56	23	84	20,8	24	207	102	333	82,5
Landkreise										
Bodenseekreis	1	11	4	16	9,9	5	86	36	127	78,3
Ravensburg	1	28	12	41	18,2	23	122	65	210	93,0
Sigmaringen	1	13	4	18	15,9	14	88	53	155	136,8
RV Bodensee-Oberschwaben	3	52	20	75	15,0	42	296	154	492	98,1
Regierungsbezirk Tübingen	8	157	69	234	15,8	108	722	360	1 190	80,3
Baden-Württemberg	38	1 597	439	2 074	22,5	891	5 502	2 588	8 981	97,3

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Andere Organe (2)					Alle Formen (1 + 2)					Kreis Regionalverband (RV) Regierungsbezirk Land
unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt auf		unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt auf		
	männlich	weiblich	Anzahl	100 000		männlich	weiblich	Anzahl	100 000	
2	65	50	117	19,1	27	592	235	854	139,3	Stadtkreis Stuttgart
-	21	15	36	11,7	7	185	73	265	86,3	Landkreise
2	40	41	83	19,1	30	283	112	425	97,6	Böblingen
-	16	31	47	20,3	7	178	103	288	124,4	Esslingen
3	36	50	89	20,8	33	318	162	513	120,1	Göppingen
8	48	60	116	33,0	58	428	229	715	203,3	Ludwigsburg
15	226	247	488	20,6	162	1 984	914	3 060	129,3	Rems-Murr-Kreis
										RV Mittlerer Neckar
1	17	19	37	31,9	9	130	70	209	180,3	Stadtkreis Heilbronn
2	31	27	60	25,5	17	200	131	348	147,9	Landkreise
4	9	13	26	30,7	10	53	23	86	101,6	Heilbronn
1	8	16	25	16,7	8	75	66	149	99,3	Hohenlohekreis
2	10	9	21	16,6	15	106	60	181	143,0	Schwäbisch Hall
10	75	84	169	23,7	59	564	350	973	136,6	Main-Tauber-Kreis
										RV Franken
-	5	3	8	6,3	4	47	15	66	52,1	Landkreise
2	26	43	71	25,7	41	276	147	464	167,9	Heidenheim
2	31	46	79	19,6	45	323	162	530	131,5	Ostalbkreis
27	332	377	736	21,1	266	2 871	1 426	4 563	131,1	RV Ostwürttemberg
										Regierungsbezirk Stuttgart
-	2	4	6	12,9	3	25	8	36	77,1	Stadtkreise
2	35	49	86	32,3	12	255	153	420	158,0	Baden-Baden
										Karlsruhe
1	21	22	44	11,9	134	347	151	632	171,2	Landkreise
2	12	11	25	12,9	82	262	138	482	249,6	Karlsruhe
5	70	86	161	18,4	231	889	450	1 570	179,4	Rastatt
										RV Mittlerer Oberrhein
-	9	13	22	18,1	5	113	52	170	140,1	Stadtkreise
1	27	31	59	18,4	75	428	189	692	215,9	Heidelberg
										Mannheim
2	5	14	21	15,9	15	62	36	113	85,4	Landkreise
-	19	28	47	10,2	43	315	143	501	109,0	Neckar-Odenwald-Kreis
3	60	86	149	14,4	138	918	420	1 476	142,8	Rhein-Neckar-Kreis
										RV Unterer Neckar
1	16	17	34	34,3	17	143	76	236	237,8	Stadtkreis Pforzheim
2	22	21	45	35,6	19	196	74	289	228,8	Landkreise
1	19	20	40	24,3	29	182	68	279	169,7	Calw
1	9	17	27	27,6	9	89	42	140	142,9	Enzkreis
5	66	75	146	29,9	74	610	260	944	193,5	Freudenstadt
13	196	247	456	19,0	443	2 417	1 130	3 990	166,5	RV Nordschwarzwald
										Regierungsbezirk Karlsruhe
-	16	19	35	19,5	5	118	81	204	113,8	Stadtkreis Freiburg im Breisgau
3	14	16	33	17,9	13	149	75	237	128,3	Landkreise
-	5	6	11	8,5	7	68	30	105	81,2	Breisgau-Hochschwarzwald
2	58	43	103	28,9	35	509	256	800	224,2	Emmendingen
5	93	84	182	21,4	60	844	442	1 346	158,3	Ortenaukreis
										RV Südlicher Oberrhein
1	14	14	29	22,2	11	124	55	190	145,5	Landkreise
-	18	24	42	20,8	9	128	79	216	107,1	Rottweil
3	23	21	47	42,2	26	124	77	227	203,8	Schwarzwald-Baar-Kreis
4	55	59	118	26,6	46	376	211	633	142,6	Tuttlingen
										RV Schwarzwald-Baar-Heuberg
1	22	22	45	19,4	12	181	78	271	116,9	Landkreise
-	8	9	17	8,7	32	130	64	226	115,5	Konstanz
1	11	6	18	12,5	5	118	51	174	120,7	Lörrach
2	41	37	80	14,0	49	429	193	671	117,4	Waldshut
11	189	180	380	20,4	155	1 649	846	2 650	142,0	RV Hochrhein-Bodensee
										Regierungsbezirk Freiburg
1	11	12	24	10,2	29	150	81	260	110,0	Landkreise
-	13	6	19	11,5	8	81	48	137	82,8	Reutlingen
2	23	14	39	22,2	8	84	33	125	71,3	Tübingen
3	47	32	82	14,2	45	315	162	522	90,4	Zollernalbkreis
										RV Neckar-Alb
1	10	14	25	25,8	15	88	50	153	157,7	Stadtkreis Ulm
-	12	16	28	17,9	10	97	60	167	106,7	Landkreise
-	12	27	39	26,0	5	112	72	189	126,1	Alb-Donau-Kreis
1	34	57	92	22,8	30	297	182	509	126,2	Biberach
										RV Donau-Iller ¹⁾
2	22	9	33	20,3	8	119	49	176	108,5	Landkreise
5	19	22	46	20,4	29	169	99	297	131,5	Bodenseekreis
-	19	24	43	38,0	15	120	81	216	190,6	Ravensburg
7	60	55	122	24,3	52	408	229	689	137,4	Sigmaringen
11	141	144	296	20,0	127	1 020	573	1 720	116,1	RV Bodensee-Oberschwaben
62	858	948	1 868	20,3	991	7 957	3 975	12 923	140,1	Regierungsbezirk Tübingen
										Baden-Württemberg

4. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1974

Tuberkulosegruppe	Art des Zugangs Land/Regierungsbezirk	Anzahl			Auf 100 000 der Bevölkerung
		männlich	weiblich	insgesamt	
Tuberkulose der Atmungs- organe mit Bakteriennachweis (1.1)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	798	314	1 112	12,0
	darunter durch Röntgenreihenuntersuchung	78	27	105	1,1
	Wiedererkrankte	370	105	475	5,1
	darunter Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	240	67	307	3,3
	Insgesamt	1 168	419	1 587	17,2
	Stuttgart	424	131	555	15,9
	Karlsruhe	344	112	456	19,0
	Freiburg	243	97	340	18,2
	Tübingen	157	79	236	15,9
ohne Bakteriennachweis (1.2)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	1 564	971	2 535	27,4
	darunter durch Röntgenreihenuntersuchung	320	209	529	5,7
	Wiedererkrankte	739	332	1 071	11,6
	darunter Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	557	225	782	8,5
	Insgesamt	2 303	1 303	3 606	39,0
	Stuttgart	626	408	1 034	29,6
	Karlsruhe	820	427	1 247	52,0
	Freiburg	484	262	746	40,0
	Tübingen	373	206	579	39,0
Tuberkulose anderer Organe (2)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	292	396	688	7,5
	Wiedererkrankte	98	110	208	2,3
	darunter Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	66	60	126	1,4
	Insgesamt	390	506	896	9,7
	Stuttgart	129	171	300	8,6
	Karlsruhe	114	142	256	10,7
	Freiburg	78	104	182	9,8
	Tübingen	69	89	158	10,7
Aktive Tuberkulose Alle Formen (1+2)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	2 654	1 681	4 335	46,9
	darunter durch Röntgenreihenuntersuchung 1.1 und 1.2 Fälle	398	236	634	6,9
	Wiedererkrankte	1 207	547	1 754	19,0
	darunter Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	863	352	1 215	13,2
	Insgesamt	3 861	2 228	6 089	65,9
	Stuttgart	1 179	710	1 889	54,1
	Karlsruhe	1 278	681	1 959	81,7
	Freiburg	805	463	1 268	68,0
	Tübingen	599	374	973	65,6

1) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.

5. An aktiver Tuberkulose erkrankte Ausländer am 31. Dezember 1974

Staatsangehörigkeit	Tuberkulose				
	der Atmungsorgane mit ohne Bakteriennachweis		anderer Organe	alle Formen	auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung ¹⁾
	(1.1)	(1.2)	(2)	(1+2)	
Griechenland	18	116	29	163	157,8
Italien	47	217	65	329	160,4
Jugoslawien	83	395	79	557	258,8
Spanien	9	52	18	79	168,5
Türkei	65	415	120	600	319,1
Sonstige europäische Staaten	17	57	20	94	84,9
Außereuropäische Staaten	3	41	16	60	157,9
Staatenlose	11	27	1	39	.
Ohne Angabe	-	2	1	3	.
Insgesamt	253	1 322	349	1 924	210,5

1) Nach dem Ausländerzentralregister, Stand 30.9.1974.

6. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1974

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne (1.2)			(2)		(1+2)		mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne (1.2)			(2)		(1+2)	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1,9	2,0	-	-	1,9	2,0
1 - 5	2	3	49	34	3	7	54	44	0,8	1,3	20,0	14,5	1,2	3,0	22,1	18,8
5 - 10	4	4	149	123	5	5	158	132	1,0	1,1	37,6	32,7	1,3	1,3	39,8	35,1
10 - 15	1	4	110	103	10	9	121	116	0,3	1,1	27,8	27,3	2,5	2,4	30,6	30,8
15 - 20	28	34	130	119	11	16	169	169	8,0	10,2	37,0	35,8	3,1	4,8	48,2	50,8
20 - 25	89	63	211	171	22	31	322	265	26,8	18,8	63,6	51,1	6,6	9,3	97,0	79,2
25 - 30	92	44	159	116	43	47	294	207	28,6	15,1	49,5	39,8	13,4	16,1	91,4	71,0
30 - 35	123	33	176	97	52	55	351	185	31,7	9,5	45,3	28,0	13,4	15,9	90,4	53,4
35 - 40	125	32	196	96	48	50	369	178	32,0	9,2	50,1	27,6	12,3	14,4	94,4	51,2
40 - 45	128	14	188	63	41	40	357	117	41,1	5,1	60,4	22,8	13,2	14,5	114,6	42,3
45 - 50	108	19	166	55	37	36	311	110	40,1	6,6	61,6	19,2	13,7	12,6	115,3	38,4
50 - 55	81	19	140	60	30	49	251	128	37,0	6,2	64,0	19,7	13,7	16,1	114,8	42,0
55 - 60	62	10	105	44	22	36	189	90	45,0	5,0	76,2	22,1	16,0	18,1	137,1	45,3
60 - 65	83	23	158	64	16	31	257	118	40,7	7,8	77,4	21,7	7,8	10,5	125,9	40,0
65 - 70	100	23	159	61	21	34	280	118	54,3	8,6	86,4	22,9	11,4	12,8	152,1	44,3
70 und mehr	142	94	206	96	29	60	377	250	54,0	20,5	78,4	20,9	11,0	13,1	143,4	54,5
Insgesamt	1 168	419	2 303	1 303	390	506	3 861	2 228	26,2	8,8	51,6	27,3	8,7	10,6	86,5	46,7

7. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1974

Kreis Regionalverband (RV) Regierungsbezirk Land	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	mit Bakteriennachweis (1.1)					ohne Bakteriennachweis (1.2)				
	unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt		unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt	
		männlich	weiblich	Anzahl	auf 100 000		männlich	weiblich	Anzahl	auf 100 000
Stadtkreis Stuttgart	3	124	37	164	26,5	16	100	62	178	28,8
Landkreise	-	43	8	51	16,7	4	25	13	42	13,7
Böblingen	1	39	11	51	11,7	18	66	19	103	23,7
Esslingen	-	21	8	29	12,5	3	20	20	43	18,5
Göppingen	-	50	15	65	15,2	15	44	28	87	20,4
Ludwigsburg	1	44	14	59	16,7	19	95	60	174	49,4
Rems-Murr-Kreis	5	321	93	419	17,7	75	350	202	627	26,4
RV Mittlerer Neckar	-	12	4	16	14,2	1	24	14	39	34,5
Stadtkreis Heilbronn	-	15	9	24	10,0	4	45	43	92	38,4
Landkreise	-	11	1	12	14,1	3	11	4	18	21,2
Heilbronn	-	17	8	25	16,6	2	30	23	55	36,6
Hohenlohekreis	1	7	-	8	6,3	8	13	15	36	28,3
Schwäbisch Hall	1	62	22	85	11,9	18	123	99	240	33,6
Main-Tauber-Kreis	-	13	2	15	11,8	4	16	7	27	21,3
RV Franken	1	28	7	36	13,0	25	74	41	140	50,6
Landkreise	1	41	9	51	12,6	29	90	48	167	41,4
Heidenheim	7	424	124	555	15,9	122	563	349	1 034	29,6
Ostalbkreis	-	10	1	11	23,5	4	4	4	12	25,7
RV Ostwürttemberg	-	22	7	29	10,9	8	71	33	112	42,1
Landkreise	-	46	16	62	16,8	90	107	35	232	62,7
Karlsruhe	1	38	19	58	30,0	42	96	52	190	98,2
Rastatt	1	116	43	160	18,3	144	278	124	546	62,3
RV Mittlerer Oberrhein	1	14	10	25	20,7	4	36	10	50	41,3
Stadtkreise	-	101	24	125	38,7	41	98	66	205	63,5
Heidelberg	-	12	4	16	12,1	14	26	11	51	38,5
Mannheim	3	36	10	49	10,7	27	122	67	216	47,2
Landkreise	4	163	48	215	20,8	86	282	154	522	50,5
Neckar-Odenwald-Kreis	-	15	5	20	20,3	9	34	9	52	52,8
Rhein-Neckar-Kreis	-	16	2	18	14,3	4	20	11	35	27,8
RV Unterer Neckar	-	18	6	24	14,5	17	43	10	70	42,4
Stadtkreis Pforzheim	1	11	7	19	19,3	5	10	7	22	22,3
Landkreise	1	60	20	81	16,6	35	107	37	179	36,7
Calw	6	339	111	456	19,0	265	667	315	1 247	52,0
Enzkreis	-	23	10	33	17,7	2	33	13	48	25,8
Freudenstadt	-	15	5	20	15,6	3	28	10	41	31,9
RV Nordschwarzwald	3	54	29	86	24,1	19	126	55	200	56,0
Nordschwarzwald	3	116	52	171	20,2	25	210	93	328	38,7
Regierungsbezirk Karlsruhe	-	15	6	21	16,1	3	26	8	37	28,3
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	-	26	11	37	18,3	11	18	17	46	22,7
Landkreise	-	16	3	19	17,0	8	14	11	33	29,6
Breisgau-Hochschwarzwald	-	57	20	77	17,3	22	58	36	116	26,1
Emmendingen	-	41	11	52	22,4	6	51	27	84	36,1
Ortenaukreis	1	17	6	24	12,3	33	75	38	146	74,5
RV Südlicher Oberrhein	-	11	5	16	11,1	5	44	23	72	50,0
Südlicher Oberrhein	1	69	22	92	16,1	44	170	88	302	52,8
Landkreise	4	242	94	340	18,2	91	438	217	746	40,0
Rottweil	-	18	14	32	13,5	39	33	22	94	39,7
Schwarzwald-Baar-Kreis	-	23	18	41	24,9	5	33	16	54	32,8
Tuttlingen	-	24	7	31	17,6	5	23	10	38	21,6
RV Schwarzwald-Baar-Heuberg	-	65	39	104	18,0	49	89	48	186	32,2
Landkreise	-	14	7	21	22,2	5	47	19	71	75,0
Konstanz	1	17	6	24	12,3	33	75	38	146	74,5
Lörrach	-	11	5	16	11,1	5	44	23	72	50,0
Waldshut	1	69	22	92	16,1	44	170	88	302	52,8
RV Hochrhein-Bodensee	4	242	94	340	18,2	91	438	217	746	40,0
Regierungsbezirk Freiburg	-	18	14	32	13,5	39	33	22	94	39,7
Landkreise	-	23	18	41	24,9	5	33	16	54	32,8
Reutlingen	-	24	7	31	17,6	5	23	10	38	21,6
Tübingen	-	65	39	104	18,0	49	89	48	186	32,2
Zollernalbkreis	-	14	7	21	22,2	5	47	19	71	75,0
RV Neckar-Alb	1	17	6	24	12,3	33	75	38	146	74,5
Stadtkreis Ulm	-	11	5	16	11,1	5	44	23	72	50,0
Landkreise	1	69	22	92	16,1	44	170	88	302	52,8
Alb-Donau-Kreis	4	242	94	340	18,2	91	438	217	746	40,0
Biberach	-	18	14	32	13,5	39	33	22	94	39,7
RV Donau-Iller ¹⁾	-	23	18	41	24,9	5	33	16	54	32,8
Landkreise	-	24	7	31	17,6	5	23	10	38	21,6
Bodenseekreis	-	65	39	104	18,0	49	89	48	186	32,2
Ravensburg	-	14	7	21	22,2	5	47	19	71	75,0
Sigmaringen	1	17	6	24	12,3	33	75	38	146	74,5
RV Bodensee-Oberschwaben	-	11	5	16	11,1	5	44	23	72	50,0
Regierungsbezirk Tübingen	1	69	22	92	16,1	44	170	88	302	52,8
Landkreise	4	242	94	340	18,2	91	438	217	746	40,0
Bodensee-Oberschwaben	-	18	14	32	13,5	39	33	22	94	39,7
Regierungsbezirk Tübingen	-	23	18	41	24,9	5	33	16	54	32,8
Landkreise	-	24	7	31	17,6	5	23	10	38	21,6
Bodensee-Oberschwaben	-	65	39	104	18,0	49	89	48	186	32,2
Regierungsbezirk Tübingen	1	156	79	236	15,9	92	326	161	579	39,0
Baden-Württemberg	18	1 161	408	1 587	17,2	570	1 994	1 042	3 606	39,0

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Andere Organe (2)					Alle Formen (1 + 2)					Kreis Regionalverband (RV) Regierungsbezirk Land
unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt auf		unter 15 Jahre	15 Jahre und älter		insgesamt auf		
	männlich	weiblich	Anzahl	100 000		männlich	weiblich	Anzahl	100 000	
1	28	26	55	8,9	20	252	125	397	64,2	Stadtkreis Stuttgart
-	8	7	15	4,9	4	76	28	108	35,3	Landkreise
-	21	16	37	8,5	19	126	46	191	44,0	Böblingen
-	7	19	26	11,2	3	48	47	98	42,1	Esslingen
2	19	21	42	9,8	17	113	64	194	45,4	Göppingen
1	12	21	34	9,7	21	151	95	267	75,7	Ludwigsburg
4	95	110	209	8,8	84	766	405	1 255	52,9	Rems-Murr-Kreis
-	5	7	12	10,6	1	41	25	67	59,3	RV Mittlerer Neckar
1	3	14	24	10,0	5	69	66	140	58,5	Stadtkreis Heilbronn
1	2	4	7	8,2	4	24	9	37	43,6	Landkreise
1	2	7	10	6,7	3	49	38	90	59,8	Heilbronn
2	2	4	8	6,3	11	22	19	52	40,9	Hohenlohekreis
5	20	36	61	8,5	24	205	157	386	54,0	Schwäbisch Hall
-	3	3	6	4,7	4	32	12	48	37,8	Main-Tauber-Kreis
1	10	13	24	8,7	27	112	61	200	72,3	RV Franken
1	13	16	30	7,4	31	144	73	248	61,4	Landkreise
10	128	162	300	8,6	139	1 115	635	1 889	54,1	Heidenheim
-	1	7	8	17,1	4	15	12	31	66,4	Ostalbkreis
1	10	18	29	10,9	9	103	58	170	63,9	RV Ostwürttemberg
1	20	24	45	12,2	91	173	75	339	91,6	Stadtkreise
2	8	4	14	7,2	45	142	75	262	135,4	Baden-Baden
4	39	53	96	11,0	149	433	220	802	91,5	Karlsruhe
-	10	9	19	15,7	5	60	29	94	77,6	Landkreise
-	14	18	32	9,9	41	213	108	362	112,2	Karlsruhe
-	4	8	12	9,1	14	42	23	79	59,6	Rastatt
1	17	26	44	9,6	31	175	103	309	67,5	RV Mittlerer Oberrhein
1	45	61	107	10,4	91	490	263	844	81,6	Heidelberg
1	5	4	10	10,1	10	54	18	82	83,2	Mannheim
3	7	4	14	11,1	7	43	17	67	53,1	Landkreise
-	7	8	15	9,1	17	68	24	109	66,0	Calw
1	4	9	14	14,2	7	25	23	55	55,8	Enzkreis
5	23	25	53	10,9	41	190	82	313	64,1	Freudenstadt
10	107	139	256	10,7	281	1 113	565	1 959	81,7	RV Nordschwarzwald
-	8	10	18	10,3	1	55	33	89	50,7	Regierungsbezirk Karlsruhe
1	7	8	16	8,6	3	63	31	97	52,1	Stadtkreis Freiburg im Breisgau
-	5	6	11	8,6	3	48	21	72	56,0	Landkreise
-	11	15	26	7,3	22	191	99	312	87,4	Breisgau-Hochschwarzwald
1	31	39	71	8,4	29	357	184	570	67,3	Emmendingen
-	5	3	8	6,1	3	46	17	66	50,5	Ortenaukreis
-	6	14	20	9,9	11	50	42	103	50,8	RV Südlicher Oberrhein
4	8	7	19	17,0	12	38	21	71	63,6	Landkreise
4	19	24	47	10,6	26	134	80	240	53,9	Rottweil
2	15	22	39	16,8	8	107	60	175	75,3	Schwarzwald-Baar-Kreis
-	3	9	12	6,1	34	95	53	182	92,9	Tuttlingen
-	8	5	13	9,0	5	63	33	101	70,1	RV Schwarzwald-Baar-Heuberg
2	26	36	64	11,2	47	265	146	458	80,0	Landkreise
7	76	99	182	9,8	102	756	410	1 268	68,0	Konstanz
1	7	8	16	6,8	40	58	44	142	60,0	Lörrach
1	8	4	13	7,9	6	64	38	108	65,6	Waldshut
1	9	10	20	11,4	6	56	27	89	50,5	RV Hochrhein-Bodensee
3	24	22	49	8,5	52	178	109	339	58,7	Regierungsbezirk Freiburg
2	6	6	14	14,8	7	67	32	106	112,0	Landkreise
-	5	10	15	9,4	4	47	38	89	55,7	Reutlingen
1	6	19	26	17,3	4	79	51	134	89,2	Tübingen
3	17	35	55	13,6	15	193	121	329	81,3	Zollernalbkreis
3	7	4	14	8,6	12	54	19	85	52,5	RV Neckar-Alb
3	5	11	19	8,4	11	50	33	94	41,7	Stadtkreis Ulm
-	8	13	21	18,5	15	68	43	126	111,1	Landkreise
6	20	28	54	10,8	38	172	95	305	60,9	Bodenseekreis
12	61	85	158	10,7	105	543	325	973	65,6	Ravensburg
39	372	485	896	9,7	627	3 527	1 935	6 089	65,9	Sigmaringen
										RV Bodensee-Oberschwaben
										Regierungsbezirk Tübingen
										Baden-Württemberg

8. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember 1973

Tuberkulosegruppe	Land Regierungsbezirk	Anzahl			Auf 100 000 der Bevölkerung
		männlich	weiblich	insgesamt	
Tuberkulose der Atmungsorgane					
mit Bakteriennachweis (1.1) darunter Chroniker	Baden-Württemberg	2 046	628	2 674	28,9
		243	50	293	3,2
	Stuttgart	734	180	914	26,2
	Karlsruhe	680	208	888	37,0
	Freiburg	430	157	587	31,5
	Tübingen	202	83	285	19,2
ohne Bakteriennachweis (1.2)	Baden-Württemberg	6 861	3 392	10 253	111,0
	Stuttgart	2 374	1 117	3 491	99,9
	Karlsruhe	2 213	1 018	3 231	134,6
	Freiburg	1 336	782	2 118	113,7
	Tübingen	938	475	1 413	95,3
Tuberkulose anderer Organe (2)	Baden-Württemberg	1 108	1 263	2 371	25,7
	Stuttgart	403	483	886	25,4
	Karlsruhe	286	309	595	24,8
	Freiburg	239	281	520	27,9
	Tübingen	180	190	370	25,0
Aktive Tuberkulose, alle Formen	Baden-Württemberg	10 015	5 283	15 298	165,6
	Stuttgart	3 511	1 780	5 291	151,5
	Karlsruhe	3 179	1 535	4 714	196,4
	Freiburg	2 005	1 220	3 225	173,1
	Tübingen	1 320	748	2 068	139,5

9. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1973

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe				Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe			
	mit Bakteriennachweis (1.1)		ohne (1.2)		(2)		alle Formen		mit Bakteriennachweis (1.1)		ohne (1.2)		(2)		alle Formen	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	-	1	2	-	-	1	2	2	-	2,0	3,9	-	-	2,0	3,9	4,0
1 - 5	4	6	93	63	3	6	100	75	1,6	2,5	36,6	25,9	1,2	2,5	39,3	30,9
5 - 10	9	9	310	245	17	16	336	270	2,2	2,4	77,2	64,2	4,2	4,2	83,7	70,8
10 - 15	9	19	181	163	9	22	199	204	2,3	5,1	46,4	43,8	2,3	5,9	51,0	54,8
15 - 20	63	49	251	233	22	31	336	313	18,2	14,9	72,3	70,8	6,3	9,4	96,8	95,1
20 - 25	125	70	548	415	55	74	728	559	37,1	20,9	162,7	124,2	16,3	22,1	216,1	167,2
25 - 30	123	50	462	276	93	90	678	416	38,0	17,3	142,9	95,4	28,8	31,1	209,7	143,8
30 - 35	177	43	556	250	116	112	849	405	44,1	12,1	138,6	70,3	28,9	31,5	211,6	113,9
35 - 40	228	36	607	247	152	127	987	410	59,2	10,6	157,6	72,7	39,5	37,4	256,2	120,6
40 - 45	197	46	542	201	123	120	862	367	63,6	16,8	175,0	73,3	39,7	43,8	278,3	133,9
45 - 50	204	35	540	198	121	110	865	343	77,8	12,2	205,9	68,8	46,1	38,2	329,8	119,2
50 - 55	185	39	524	190	111	120	820	349	85,6	12,9	242,4	62,9	51,4	39,7	379,4	115,5
55 - 60	114	18	363	135	54	88	531	241	80,8	8,8	257,2	66,3	38,3	43,2	376,3	118,3
60 - 65	187	45	608	192	97	101	892	338	90,7	15,2	295,0	65,0	47,1	34,2	432,8	114,4
65 - 70	185	43	539	191	59	102	783	336	100,6	16,3	293,2	72,6	32,1	38,8	425,9	127,7
70 und mehr	236	119	735	393	76	143	1 047	655	91,5	26,4	285,0	87,3	29,5	31,8	406,0	145,4
Insgesamt	2 046	628	6 861	3 392	1 108	1 263	10 015	5 283	45,8	13,2	153,5	71,1	24,8	26,5	224,1	110,7

10. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1973

Tuberkulosegruppe	Art des Zugangs Land/Regierungsbezirk	Anzahl			auf 100 000 der Bevölkerung
		männlich	weiblich	insgesamt	
Tuberkulose der Atmungs- organe mit Bakteriennachweis (1.1)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	824	321	1 145	12,4
	darunter				
	durch Röntgenreihenuntersuchung	84	30	114	1,2
	Wiedererkrankte	353	111	464	5,0
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 1)	268	77	345	3,8
	Insgesamt	1 177	432	1 609	17,5
	Stuttgart	454	117	571	16,4
	Karlsruhe	304	128	432	18,1
	Freiburg	247	123	370	20,0
	Tübingen	172	64	236	16,0
ohne Bakteriennachweis (1.2)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	1 646	1 026	2 672	29,0
	darunter				
	durch Röntgenreihenuntersuchung	315	172	487	5,3
	Wiedererkrankte	746	371	1 117	12,1
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 1)	587	289	876	9,5
	Insgesamt	2 392	1 397	3 789	41,2
	Stuttgart	700	404	1 104	31,7
	Karlsruhe	841	463	1 307	54,6
	Freiburg	487	307	794	42,8
	Tübingen	361	223	584	39,5
Tuberkulose anderer Organe (2)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	327	412	739	8,0
	Wiedererkrankte	102	105	207	2,3
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 1)	54	68	122	1,3
	Insgesamt	429	517	946	10,3
	Stuttgart	146	198	344	9,9
	Karlsruhe	129	125	254	10,6
	Freiburg	82	103	185	10,0
	Tübingen	72	91	163	11,0
Aktive Tuberkulose Alle Formen	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	2 797	1 759	4 556	49,5
	darunter				
	durch Röntgenreihenuntersuchung				
	1.1 und 1.2 Fälle	399	202	601	6,5
	Wiedererkrankte	1 201	587	1 788	19,4
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 1)	909	434	1 343	14,6
	Insgesamt	3 998	2 346	6 344	68,9
	Stuttgart	1 300	719	2 019	58,0
	Karlsruhe	1 277	716	1 993	83,3
	Freiburg	816	533	1 349	72,8
	Tübingen	605	378	983	66,6

1) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.

11. An aktiver Tuberkulose erkrankte Ausländer am 31. Dezmebr 1973

Staatsangehörigkeit	Tuberkulose				
	der Atmungsorgane		anderer Organe	alle Formen	auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung1)
	mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne Bakteriennachweis (1.2)			
Griechenland	25	114	33	172	170,5
Italien	47	234	64	345	166,4
Jugoslawien	124	403	96	623	292,0
Spanien	9	53	23	85	173,6
Türkei	80	408	137	625	364,4
Sonstige europäische Staaten	31	79	17	127	119,1
Ausser europäische Staaten	7	38	19	64	177,8
Staatenlose	13	34	-	47	.
Ohne Angabe	3	11	8	22	.
Insgesamt	339	1 374	397	2 110	236,7

1) Nach dem Ausländerzentralregister, Stand 30.9.1973.

12. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1973

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne Bakteriennachweis (1.2)			(2)				mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne Bakteriennachweis (1.2)			(2)			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	-	1	2	-	-	1	2	2	-	1,9	3,7	-	-	1,9	3,7	3,8
1 - 5	-	1	62	41	3	5	65	47	-	0,4	23,5	16,3	1,1	2,0	24,6	18,7
5 - 10	4	3	187	141	8	9	199	153	1,0	0,8	46,3	36,8	2,0	2,4	49,2	40,0
10 - 15	4	8	86	90	5	12	95	110	1,0	2,2	22,4	24,6	1,3	3,3	24,7	30,1
15 - 20	50	35	148	136	13	19	211	190	14,7	10,8	43,4	42,1	3,8	5,9	61,9	58,8
20 - 25	99	58	253	178	33	31	385	267	29,6	17,6	75,8	53,9	9,9	9,4	115,3	80,9
25 - 30	87	45	171	105	36	48	294	198	27,2	15,7	53,4	36,5	11,2	16,7	91,8	68,9
30 - 35	127	33	186	108	49	46	362	187	31,2	9,2	45,7	30,0	12,0	12,8	88,9	51,9
35 - 40	136	23	208	88	69	50	413	161	36,2	7,0	55,4	26,8	18,4	15,2	110,0	48,9
40 - 45	134	25	168	68	42	46	344	139	43,1	9,1	54,1	24,6	13,5	16,7	110,7	50,3
45 - 50	101	17	180	67	43	29	324	113	39,7	5,9	70,7	23,2	16,9	10,0	127,3	39,1
50 - 55	82	19	159	72	38	48	279	139	39,6	6,6	76,8	24,9	18,3	16,6	134,7	48,0
55 - 60	49	12	118	54	18	32	185	98	32,3	5,5	77,7	24,8	11,9	14,7	121,8	45,0
60 - 65	73	26	163	75	26	36	262	137	35,2	8,8	78,5	25,4	12,5	12,2	126,2	46,4
65 - 70	91	34	125	67	19	42	235	143	49,6	13,1	68,1	25,9	10,4	16,2	128,0	55,2
70 und mehr	140	92	176	107	27	63	343	262	55,1	20,8	69,3	24,1	10,6	14,2	135,0	59,1
Insgesamt	1 177	432	2 392	1 397	429	517	3 998	2 346	26,4	9,1	53,7	29,4	9,6	10,9	89,8	49,4

13. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember 1972

Tuberkulosegruppe	Land Regierungsbezirk	Anzahl			Auf 100 000 der Bevölkerung
		männlich	weiblich	insgesamt	
Tuberkulose der Atmungsorgane					
mit Bakteriennachweis (1.1) darunter Chroniker	Baden-Württemberg	2 356	734	3 090	33,8
		313	68	381	4,2
	Nordwürttemberg	833	236	1 069	29,8
	Nordbaden	580	180	760	38,9
	Südbaden	507	174	681	34,7
ohne Bakteriennachweis (1.2)	Südwestfalen-Hohenz.	436	144	580	35,3
	Baden-Württemberg	7 522	3 920	11 442	125,0
	Nordwürttemberg	2 827	1 396	4 223	117,5
	Nordbaden	1 854	932	2 786	142,6
	Südbaden	1 621	950	2 571	130,9
Tuberkulose anderer Organe (2)	Südwestfalen-Hohenz.	1 220	642	1 862	113,4
	Baden-Württemberg	1 239	1 421	2 660	29,1
	Nordwürttemberg	469	552	1 021	28,4
	Nordbaden	252	268	520	26,6
	Südbaden	262	299	561	28,6
Aktive Tuberkulose, alle Formen (1+2)	Südwestfalen-Hohenz.	256	302	558	34,0
	Baden-Württemberg	11 117	6 075	17 192	187,8
	Nordwürttemberg	4 129	2 184	6 313	175,7
	Nordbaden	2 686	1 380	4 066	208,1
	Südbaden	2 390	1 423	3 813	194,1
	Südwestfalen-Hohenz.	1 912	1 088	3 000	182,6

14. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1972

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe				Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe			
	mit Bakteriennachweis (1.1)		ohne (1.2)		(2)		alle Formen		mit Bakteriennachweis (1.1)		ohne (1.2)		(2)		alle Formen	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	1	-	3	-	-	1	4	1	1,8	-	5,3	-	-	-	7,1	1,8
1 - 5	8	6	107	94	5	9	120	109	2,9	2,3	39,3	36,2	1,8	3,5	44,0	41,9
5 - 10	5	13	330	290	15	21	350	324	1,2	3,4	81,2	75,2	3,7	5,5	86,2	84,0
10 - 15	13	25	212	207	14	23	239	255	3,5	7,0	56,1	57,5	3,7	6,4	63,3	70,9
15 - 20	69	51	247	265	31	31	347	347	20,6	16,1	73,8	83,3	9,3	9,8	103,7	109,1
20 - 25	124	81	582	461	57	87	763	629	37,5	24,8	176,0	141,1	17,3	26,6	230,8	192,5
25 - 30	134	47	461	311	104	97	699	455	42,3	16,5	145,5	108,6	32,8	33,9	220,7	159,0
30 - 35	204	62	614	342	130	144	948	548	49,5	17,0	148,8	93,3	31,5	39,3	229,8	149,5
35 - 40	218	39	622	259	148	144	988	442	59,7	12,3	170,3	81,2	40,5	45,2	270,6	138,5
40 - 45	232	54	630	232	143	148	1 005	434	74,5	19,3	202,4	83,2	46,0	53,1	322,7	155,5
45 - 50	209	38	620	237	142	138	971	413	84,8	13,1	251,4	81,6	57,5	47,5	393,8	142,1
50 - 55	193	40	540	205	110	125	843	370	97,5	14,5	273,0	73,9	55,6	45,1	426,1	133,3
55 - 60	182	28	407	177	76	105	665	310	112,0	12,1	250,5	76,1	46,8	45,2	409,3	133,2
60 - 65	260	52	743	212	113	106	1 116	370	124,5	17,6	355,7	71,7	54,1	35,8	534,3	125,1
65 - 70	241	61	641	193	63	101	945	355	131,7	23,8	350,5	75,5	34,4	39,5	516,6	138,8
70 und mehr	263	137	763	435	88	141	1 114	713	105,6	31,4	306,3	99,8	35,3	32,3	447,2	163,5
Insgesamt	2 356	734	7 522	3 920	1 239	1 421	11 117	6 075	53,2	15,5	169,6	82,6	27,9	29,9	250,7	128,1

15. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1972

Tuberkulosegruppe	Art des Zugangs Land/Regierungsbezirk	Anzahl			Auf 100 000 der Bevölkerung
		männlich	weiblich	insgesamt	
Tuberkulose der Atmungsorgane mit Bakteriennachweis (1.1)	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	816	335	1 151	12,6
	darunter				
	durch Röntgenreihenuntersuchung	116	38	154	1,7
	Wiedererkrankte	413	141	554	6,1
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	285	98	383	4,2
	Insgesamt	1 229	476	1 705	18,7
	Nordwürttemberg	483	162	645	18,0
	Nordbaden	282	106	388	19,9
ohne Bakteriennachweis (1.2)	Südbaden	279	127	406	20,8
	Südwestfalen-Lippe	185	81	266	16,3
	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	1 686	1 202	2 888	31,7
	darunter				
	durch Röntgenreihenuntersuchung	377	214	591	6,5
	Wiedererkrankte	799	412	1 211	13,3
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	633	307	940	10,3
	Insgesamt	2 485	1 614	4 099	45,0
Tuberkulose anderer Organe (2)	Nordwürttemberg	751	475	1 226	34,3
	Nordbaden	793	487	1 280	65,7
	Südbaden	555	372	927	47,5
	Südwestfalen-Lippe	386	280	666	40,8
	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	314	432	746	8,2
	Wiedererkrankte	116	136	252	2,8
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	76	81	157	1,7
	Insgesamt	430	568	998	11,0
Aktive Tuberkulose, alle Formen	Nordwürttemberg	159	198	357	10,0
	Nordbaden	94	118	212	10,9
	Südbaden	96	123	219	11,2
	Südwestfalen-Lippe	81	129	210	12,9
	Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose	2 816	1 969	4 785	52,5
	darunter				
	durch Röntgenreihenuntersuchung				
	1.1 und 1.2 Fälle	493	252	745	8,2
	Wiedererkrankte	1 328	689	2 017	22,1
	darunter				
	Übergänge aus 4 und 5 ¹⁾	994	486	1 480	16,2
	Insgesamt	4 144	2 658	6 802	74,7
	Nordwürttemberg	1 393	835	2 228	62,3
	Nordbaden	1 169	711	1 880	96,6
	Südbaden	930	622	1 552	79,5
	Südwestfalen-Lippe	652	490	1 142	69,9

1) 4: Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane, 5: Überwachungsbedürftige Tuberkulose anderer Organe.

16. An aktiver Tuberkulose erkrankte Ausländer am 31. Dezember 1972

Staatsangehörigkeit	Tuberkulose				
	der Atmungsorgane		anderer Organe	alle Formen	auf 100 000 der jeweiligen ausländischen Bevölkerung ¹⁾
	mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne Bakteriennachweis (1.2)			
Griechenland	22	132	45	199	206,9
Italien	42	249	76	367	189,2
Jugoslawien	134	364	90	588	305,3
Spanien	13	59	20	92	198,9
Türkei	72	349	135	556	403,9
Sonstige europäische Staaten	31	96	19	146	153,0
Außereuropäische Staaten	10	31	13	54	165,1
Staatenlose	17	30	3	50	.
Ohne Angabe	2	10	10	22	.
Insgesamt	343	1 320	411	2 074	258,6

1) Nach dem Ausländerzentralregister, Stand 30.9.1972.

17. Zugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1972

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen	
	mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne Bakteriennachweis (1.2)			(2)				mit Bakteriennachweis (1.1)	ohne Bakteriennachweis (1.2)			(2)			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	1	-	3	-	-	1	4	1	1,7	-	5,0	-	-	1,8	6,7	1,8
1 - 5	1	3	80	73	3	7	84	83	0,4	1,1	28,5	27,3	1,1	2,6	30,0	31,1
5 - 10	-	1	211	215	7	8	218	224	-	0,3	52,0	55,8	1,7	2,1	53,7	58,2
10 - 15	4	7	109	118	8	7	121	132	1,1	2,0	29,3	33,4	2,2	2,0	32,6	37,4
15 - 20	52	43	141	125	10	16	203	184	15,8	13,7	42,9	39,9	3,0	5,1	61,6	58,6
20 - 25	93	65	231	210	31	42	355	317	28,5	20,2	70,8	65,5	9,5	13,1	108,8	98,8
25 - 30	97	41	172	101	47	41	316	183	30,7	14,4	54,4	35,4	14,9	14,4	99,9	64,1
30 - 35	134	44	207	125	55	54	396	223	32,2	11,9	49,8	33,8	13,3	14,6	95,2	60,3
35 - 40	129	20	176	94	55	56	360	170	36,2	6,5	49,4	30,3	15,5	18,1	101,0	54,8
40 - 45	115	29	170	82	40	61	325	172	37,2	10,4	55,0	29,2	13,0	21,7	105,0	61,4
45 - 50	90	18	198	85	43	58	331	161	37,2	6,1	81,8	28,9	17,8	19,7	136,6	54,9
50 - 55	74	16	151	63	34	45	259	124	39,5	6,1	80,6	23,9	18,2	17,2	138,1	47,2
55 - 60	75	18	114	72	23	40	212	130	42,9	7,3	65,2	29,0	13,2	16,2	121,4	52,5
60 - 65	105	34	164	78	28	32	297	144	50,1	11,6	78,3	26,5	13,4	10,9	141,7	49,0
65 - 70	107	43	170	65	19	35	296	143	58,6	17,1	93,2	25,7	10,4	13,9	162,4	56,6
70 und mehr	152	94	188	108	27	65	367	267	62,0	22,0	76,7	25,2	11,0	15,2	149,8	62,4
Insgesamt	1 229	476	2 485	1 614	430	568	4 144	2 658	27,8	10,1	56,3	34,2	9,8	12,1	93,8	56,2

1) Ersterkrankte und Wiedererkrankte ohne Zugänge.

18. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1959 bis 1971

Diagnosegruppe	Alter Geschlecht		Stand 31. Dezember						
			1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
			Anzahl						
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	unter 15 Jahre	m	37	46	47	34	31	37	45
		w	48	51	43	39	45	45	48
	15 J. und älter	m	6 775	6 621	6 359	6 145	5 819	5 666	5 369
		w	2 501	2 214	1 997	1 868	1 815	1 722	1 547
	zusammen		9 361	8 932	8 446	8 086	7 710	7 470	7 009
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	unter 15 Jahre	m	1	2	2	1	3	2	5
		w	8	6	4	6	5	9	11
	15 J. und älter	m	963	912	832	777	755	805	715
		w	496	455	351	339	361	326	290
	zusammen		1 468	1 375	1 189	1 123	1 124	1 142	1 021
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	unter 15 Jahre	m	2 020	1 948	1 776	1 666	1 567	1 631	1 666
		w	1 852	1 760	1 719	1 638	1 526	1 518	1 451
	15 J. und älter	m	11 659	11 323	10 708	10 378	10 103	9 816	9 748
		w	8 557	7 804	7 150	6 692	6 233	5 981	5 999
	zusammen		24 068	22 835	21 333	20 374	19 419	18 946	18 864
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	unter 15 Jahre	m	2 058	1 996	1 825	1 701	1 601	1 670	1 716
		w	1 888	1 817	1 766	1 683	1 576	1 572	1 510
	15 J. und älter	m	19 397	18 856	17 899	17 300	16 677	16 287	15 852
		w	11 554	10 473	9 478	8 899	8 399	8 029	7 836
	zusammen		34 897	33 142	30 968	29 583	28 253	27 558	26 894
Tuberkulose anderer Organe (Id)	unter 15 Jahre	m	351	295	264	251	188	168	161
		w	318	271	242	200	172	145	133
	15 J. und älter	m	2 445	2 436	2 379	2 317	2 282	2 144	2 094
		w	3 046	3 014	2 876	2 733	2 626	2 557	2 413
	zusammen		6 158	6 016	5 761	5 481	5 268	5 012	4 801
Aktive Tuberkulose Alle Formen	unter 15 Jahre	m	2 389	2 291	2 089	1 932	1 789	1 838	1 877
		w	2 206	2 088	2 008	1 883	1 748	1 715	1 643
	15 J. und älter	m	21 840	21 292	20 278	19 617	18 959	18 431	17 926
		w	14 600	13 487	12 354	11 632	11 025	10 586	10 249
	zusammen		41 035	39 158	36 729	35 064	33 521	32 570	31 695
Verhältniszahlen auf									
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	unter 15 Jahre	m	4,4	5,2	5,1	3,6	3,2	3,7	4,4
		w	5,9	6,1	4,9	4,3	4,8	4,7	4,9
	15 J. und älter	m	249,2	237,5	227,0	214,6	201,1	191,9	177,6
		w	78,5	68,9	61,5	57,0	54,8	51,4	45,5
	zusammen		123,8	115,6	107,7	101,2	95,1	90,5	83,2
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	unter 15 Jahre	m	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,5
		w	1,0	0,7	0,5	0,7	0,5	0,9	1,1
	15 J. und älter	m	35,4	32,7	29,7	27,1	26,1	27,3	23,7
		w	15,6	14,2	10,8	10,3	10,9	9,7	8,5
	zusammen		19,4	17,8	15,2	14,1	13,9	13,8	12,1
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	unter 15 Jahre	m	238,3	220,1	193,9	176,4	161,2	163,3	162,4
		w	226,7	208,8	196,5	181,5	164,3	159,1	148,3
	15 J. und älter	m	428,9	406,2	382,2	362,4	349,1	332,5	322,5
		w	268,6	243,0	219,6	204,0	187,8	178,4	176,5
	zusammen		518,3	495,5	472,2	455,0	439,5	429,4	423,9
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	unter 15 Jahre	m	242,7	225,5	199,3	180,0	164,7	167,2	167,2
		w	233,6	215,6	201,9	186,5	169,7	164,8	154,4
	15 J. und älter	m	713,5	676,5	638,8	604,1	576,2	551,6	523,8
		w	362,6	326,1	292,0	271,3	253,5	239,5	230,5
	zusammen		461,6	428,9	395,1	370,2	348,4	333,7	319,2
Tuberkulose anderer Organe (Id)	unter 15 Jahre	m	39,0	33,3	28,8	24,4	19,3	16,8	15,7
		w	39,4	32,2	27,7	22,2	18,5	15,0	13,6
	15 J. und älter	m	89,9	87,4	84,9	80,9	78,8	72,6	69,3
		w	95,6	93,9	88,6	83,3	79,3	76,3	71,0
	zusammen		81,2	77,9	73,5	68,6	65,0	60,7	57,0
Aktive Tuberkulose Alle Formen	unter 15 Jahre	m	281,7	258,8	228,1	204,5	184,1	184,0	182,9
		w	273,0	247,7	229,6	208,7	188,2	179,8	168,0
	15 J. und älter	m	803,4	763,9	723,7	685,0	655,1	624,3	593,1
		w	458,1	420,0	380,6	354,6	332,7	315,8	301,5
	zusammen		542,7	506,8	468,6	438,8	413,4	394,4	376,1

Stand 31.Dezember						Alter Geschlecht	Diagnosegruppe
1966	1967	1968	1969	1970	1971		
Anzahl							
40	36	52	42	42	44	unter 15 Jahre	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
48	37	66	66	53	41	15 J.und älter	
5 200	4 622	4 425	4 096	3 799	3 479		
1 502	1 245	1 220	1 157	1 075	978		
6 790	5 940	5 763	5 361	4 969	4 542	zusammen	
2	unter 15 Jahre	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
3	15 J.und älter	
595		
256		
856	zusammen	
1 578	1 373	1 318	1 215	982	860	unter 15 Jahre	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
1 394	1 114	1 139	1 071	951	804	15 J.und älter	
9 345	8 730	8 815	8 636	8 283	7 858		
5 335	4 641	4 637	4 535	4 111	3 862		
17 650	15 858	15 909	15 457	14 327	13 384	zusammen	
1 620	1 409	1 370	1 257	1 024	904	unter 15 Jahre	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
1 445	1 151	1 205	1 157	1 004	845	15 J.und älter	
15 140	13 352	13 240	12 732	12 082	11 337		
7 091	5 886	5 857	5 692	5 186	4 840		
25 296	21 798	21 672	20 818	19 296	17 926	zusammen	
144	95	94	89	62	51	unter 15 Jahre	Tuberkulose anderer Organe (Id)
135	78	78	73	61	60	15 J.und älter	
2 018	1 725	1 740	1 686	1 556	1 455		
2 369	2 013	2 083	1 949	1 744	1 644		
4 666	3 911	3 995	3 797	3 423	3 210	zusammen	
1 764	1 504	1 464	1 346	1 086	955	unter 15 Jahre	Aktive Tuberkulose Alle Formen
1 580	1 229	1 283	1 210	1 065	905	15 J.und älter	
17 158	15 077	14 980	14 418	13 638	12 792		
9 460	7 899	7 940	7 641	6 930	6 484		
29 962	25 709	25 667	24 615	22 719	21 136	zusammen	
100 000 der Bevölkerung							
3,8	3,4	4,8	3,8	3,8	3,9	unter 15 Jahre	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
4,8	3,6	6,3	6,2	5,0	3,9	15 J.und älter	
171,2	153,0	143,5	128,6	118,8	107,1		
43,7	36,1	34,9	32,6	30,0	27,0		
79,6	69,3	66,1	60,2	55,5	50,2	zusammen	
0,2	unter 15 Jahre	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
0,3	15 J.und älter	
19,6		
7,4		
10,0	zusammen	
149,9	128,1	120,4	109,2	88,2	77,0	unter 15 Jahre	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
138,9	108,9	109,2	101,1	89,7	75,7	15 J.und älter	
307,6	289,1	285,8	271,2	258,9	241,8		
155,1	134,5	132,8	127,6	114,8	106,5		
206,8	185,1	182,6	173,5	160,0	147,8	zusammen	
155,8	131,4	125,2	113,0	92,0	81,0	unter 15 Jahre	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
143,9	112,6	115,5	107,3	94,7	79,5	15 J.und älter	
498,4	442,1	429,2	399,8	377,7	348,9		
206,2	170,6	167,8	160,2	144,8	133,5		
296,4	254,5	248,7	233,7	215,5	198,0	zusammen	
13,7	8,9	8,6	8,0	5,6	4,6	unter 15 Jahre	Tuberkulose anderer Organe (Id)
13,4	7,6	7,5	6,9	5,8	5,7	15 J.und älter	
66,4	57,1	56,4	52,9	48,6	44,8		
68,9	58,3	59,7	54,9	48,7	45,3		
54,7	45,7	45,8	42,6	38,2	35,5	zusammen	
167,5	140,3	133,7	121,0	97,6	85,5	unter 15 Jahre	Aktive Tuberkulose Alle Formen
157,4	120,2	123,0	114,2	100,5	85,2	15 J.und älter	
564,8	499,2	485,6	452,8	426,3	393,6		
275,1	228,9	227,4	215,0	193,5	178,8		
351,1	300,1	294,6	276,3	253,7	233,4	zusammen	

19. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken 1959 bis 1971

Diagnosegruppe	Regierungsbezirk Land	Stand 31. Dezember						
		1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
		Anzahl						
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	Nordwürttemberg	3 954	3 766	3 375	3 203	3 033	2 911	2 715
	Nordbaden	1 911	1 908	1 817	1 766	1 682	1 618	1 471
	Südbaden	1 959	1 852	1 898	1 887	1 842	1 790	1 717
	SüdWürttbg. -Hohenz.	1 537	1 406	1 356	1 250	1 153	1 151	1 106
	Baden-Württemberg	9 361	8 932	8 446	8 086	7 710	7 470	7 009
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	Nordwürttemberg	357	333	347	337	345	327	254
	Nordbaden	562	506	444	388	361	399	345
	Südbaden	281	329	222	227	230	268	282
	SüdWürttbg. -Hohenz.	268	207	176	171	188	148	140
	Baden-Württemberg	1 468	1 375	1 189	1 123	1 124	1 142	1 021
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	Nordwürttemberg	9 598	9 243	8 157	7 559	6 949	6 638	6 627
	Nordbaden	5 010	4 649	4 143	4 069	4 078	4 191	3 952
	Südbaden	5 140	4 980	5 077	5 058	4 933	4 992	5 014
	SüdWürttbg. -Hohenz.	4 320	3 963	3 956	3 688	3 459	3 125	3 271
	Baden-Württemberg	24 068	22 835	21 333	20 374	19 419	18 946	18 864
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	Nordwürttemberg	13 909	13 342	11 879	11 099	10 327	9 876	9 596
	Nordbaden	7 483	7 063	6 404	6 223	6 121	6 208	5 768
	Südbaden	7 380	7 161	7 197	7 172	7 005	7 050	7 013
	SüdWürttbg. -Hohenz.	6 125	5 576	5 488	5 089	4 800	4 424	4 517
	Baden-Württemberg	34 897	33 142	30 968	29 583	28 253	27 558	26 894
Tuberkulose anderer Organe (Id)	Nordwürttemberg	2 209	2 177	2 131	2 050	2 038	1 940	1 905
	Nordbaden	1 600	1 515	1 445	1 329	1 299	1 150	967
	Südbaden	1 348	1 398	1 296	1 279	1 099	1 117	1 073
	SüdWürttbg. -Hohenz.	981	926	869	823	832	805	856
	Baden-Württemberg	6 138	6 016	5 761	5 481	5 268	5 012	4 801
Aktive Tuberkulose Alle Formen	Nordwürttemberg	16 118	15 519	14 050	13 149	12 365	11 816	11 501
	Nordbaden	9 083	8 578	7 849	7 552	7 420	7 358	6 735
	Südbaden	8 728	8 559	8 493	8 451	8 104	8 167	8 086
	SüdWürttbg. -Hohenz.	7 106	6 502	6 337	5 912	5 632	5 229	5 373
	Baden-Württemberg	41 035	39 158	36 729	35 064	33 521	32 570	31 695
Verhältniszahlen auf								
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	Nordwürttemberg	134,2	124,7	109,9	102,3	95,6	90,1	82,4
	Nordbaden	115,2	112,9	106,0	101,3	95,2	90,2	80,6
	Südbaden	125,3	114,4	115,6	112,8	108,2	103,0	96,8
	SüdWürttbg. -Hohenz.	112,2	100,6	96,0	85,2	78,6	76,9	72,2
	Baden-Württemberg	123,8	115,6	107,7	101,2	95,1	90,5	83,2
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	Nordwürttemberg	12,1	11,0	11,3	10,8	10,9	10,1	7,7
	Nordbaden	53,9	29,9	25,9	22,3	20,4	22,2	18,9
	Südbaden	17,7	20,3	13,5	13,6	13,5	15,4	15,9
	SüdWürttbg. -Hohenz.	19,6	14,8	12,5	11,8	12,8	9,9	9,1
	Baden-Württemberg	19,4	17,8	15,2	14,1	13,9	13,8	12,1
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	Nordwürttemberg	325,8	306,1	265,7	241,5	219,0	205,5	201,2
	Nordbaden	302,1	275,1	241,7	237,4	230,8	233,5	216,4
	Südbaden	324,0	307,7	309,3	302,3	289,8	287,3	282,6
	SüdWürttbg. -Hohenz.	315,4	283,3	279,9	253,3	233,9	208,9	213,5
	Baden-Württemberg	318,3	293,5	272,2	255,0	239,5	229,4	223,9
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	Nordwürttemberg	472,1	441,8	387,0	354,6	325,4	305,8	291,3
	Nordbaden	451,2	417,9	373,6	357,0	346,5	345,9	315,9
	Südbaden	465,2	442,4	438,5	428,6	411,5	403,8	393,3
	SüdWürttbg. -Hohenz.	447,2	398,8	388,3	352,3	327,4	295,8	294,9
	Baden-Württemberg	461,6	428,9	395,1	370,2	348,4	333,7	319,2
Tuberkulose anderer Organe (Id)	Nordwürttemberg	73,0	72,1	70,1	65,5	64,2	60,1	57,8
	Nordbaden	96,5	89,6	84,3	76,2	73,5	64,1	53,0
	Südbaden	85,0	86,4	79,0	76,4	64,6	64,3	60,5
	SüdWürttbg. -Hohenz.	71,6	66,2	61,5	57,0	56,7	53,8	55,9
	Baden-Württemberg	81,2	77,9	73,5	68,6	65,0	60,7	57,0
Aktive Tuberkulose Alle Formen	Nordwürttemberg	547,1	513,9	457,0	420,1	389,7	365,9	349,1
	Nordbaden	547,7	507,6	457,9	433,2	420,0	410,0	368,9
	Südbaden	550,2	528,8	517,4	503,1	476,0	470,1	455,8
	SüdWürttbg. -Hohenz.	518,8	465,1	449,8	409,3	384,1	349,6	350,8
	Baden-Württemberg	542,7	506,8	468,6	438,8	413,4	394,4	376,1

Stand 31.Dezember						Regierungsbezirk Land	Diagnosegruppe
1966	1967	1968	1969	1970	1971		
Anzahl							
2 592	2 193	2 093	2 056	1 947	1 767	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
1 423	1 318	1 278	1 176	1 045	973	Nordbaden	
1 677	1 437	1 363	1 231	1 165	1 050	Südbaden	
1 098	992	1 029	898	812	752	Südwürttbg.-Hohenz.	
6 790	5 940	5 763	5 361	4 969	4 542	Baden-Württemberg	
195	Nordwürttemberg	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
338	Nordbaden	
230	Südbaden	
93	Südwürttbg.-Hohenz.	
856	Baden-Württemberg	
6 280	5 485	5 439	5 118	4 737	4 664	Nordwürttemberg	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
3 583	3 161	3 209	3 223	3 131	2 914	Nordbaden	
4 816	4 462	4 418	4 264	3 898	3 400	Südbaden	
2 971	2 750	2 843	2 852	2 561	2 406	Südwürttbg.-Hohenz.	
17 650	15 858	15 909	15 457	14 327	13 384	Baden-Württemberg	
9 067	7 678	7 532	7 174	6 684	6 431	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
5 344	4 479	4 487	4 399	4 176	3 887	Nordbaden	
6 723	5 899	5 781	5 495	5 063	4 450	Südbaden	
4 162	3 742	3 872	3 750	3 373	3 158	Südwürttbg.-Hohenz.	
25 296	21 798	21 672	20 818	19 296	17 926	Baden-Württemberg	
1 821	1 564	1 607	1 572	1 406	1 268	Nordwürttemberg	Tuberkulose anderer Organe (Id)
924	677	656	599	591	590	Nordbaden	
1 059	915	956	889	799	721	Südbaden	
862	755	796	737	627	631	Südwürttbg.-Hohenz.	
4 666	3 911	3 995	3 797	3 423	3 210	Baden-Württemberg	
10 888	9 242	9 139	8 746	8 090	7 699	Nordwürttemberg	Aktive Tuberkulose Alle Formen
6 268	5 156	5 123	4 998	4 767	4 477	Nordbaden	
7 782	6 814	6 757	6 384	5 862	5 171	Südbaden	
5 024	4 497	4 668	4 487	4 000	3 789	Südwürttbg.-Hohenz.	
29 962	25 709	25 667	24 615	22 719	21 136	Baden-Württemberg	
100 000 der Bevölkerung							
77,9	65,8	61,6	59,0	55,3	49,7	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
77,0	71,3	68,2	61,6	54,4	50,2	Nordbaden	
93,1	79,1	73,8	65,3	61,9	55,1	Südbaden	
70,6	63,3	64,6	55,2	49,7	45,4	Südwürttbg.-Hohenz.	
79,6	69,3	66,1	60,2	55,5	50,2	Baden-Württemberg	
5,9	Nordwürttemberg	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
18,3	Nordbaden	
12,8	Südbaden	
6,0	Südwürttbg.-Hohenz.	
10,0	Baden-Württemberg	
188,6	164,5	159,9	146,8	134,6	131,2	Nordwürttemberg	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
194,0	171,0	171,2	168,8	163,0	150,3	Nordbaden	
267,3	245,6	239,3	226,2	207,2	178,4	Südbaden	
190,9	175,6	178,5	175,2	156,8	143,3	Südwürttbg.-Hohenz.	
206,8	185,1	182,6	173,5	160,0	147,8	Baden-Württemberg	
272,3	230,3	221,5	205,7	189,9	180,9	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
289,3	242,3	239,3	230,4	217,4	200,5	Nordbaden	
373,1	324,7	313,2	291,5	269,2	233,6	Südbaden	
267,5	238,9	243,1	230,4	206,6	190,7	Südwürttbg.-Hohenz.	
296,4	254,5	248,7	233,7	215,5	198,0	Baden-Württemberg	
54,7	46,9	47,3	45,1	40,0	35,7	Nordwürttemberg	Tuberkulose anderer Organe (Id)
50,0	36,6	33,9	31,4	30,8	30,4	Nordbaden	
58,8	50,4	51,8	47,2	42,5	37,8	Südbaden	
55,4	48,2	50,0	45,3	38,4	38,1	Südwürttbg.-Hohenz.	
54,7	45,7	45,8	42,6	38,2	35,5	Baden-Württemberg	
327,0	277,2	268,8	250,8	229,9	216,5	Nordwürttemberg	Aktive Tuberkulose Alle Formen
339,4	278,9	273,3	261,8	248,2	230,9	Nordbaden	
431,9	375,0	365,0	338,6	311,7	271,4	Südbaden	
322,9	287,1	293,1	275,7	245,0	228,9	Südwürttbg.-Hohenz.	
351,1	300,1	294,6	276,3	253,7	233,4	Baden-Württemberg	

20. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1959 und 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Ansteckungsfähig I a				Nicht ansteckungsfähig I c				Verhältnis von I a zu I c	
	Anzahl		auf 100 000 der Bevölkerung		Anzahl		auf 100 000 der Bevölkerung			
	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971
Stadtkreise										
Stuttgart	1 157	470	184,2	74,3	2 579	883	410,6	139,5	1: 2,2	1: 1,9
Heilbronn ¹⁾	355	45	145,4	44,1	1 084	146	444,0	143,1	3,1	3,2
Ulm 1)	280	63	163,2	67,2	577	141	336,3	150,4	2,1	2,2
Landkreise										
Aalen	125	51	89,8	31,6	221	292	158,7	181,0	1,8	5,7
Backnang	121	32	139,4	28,8	252	138	290,2	124,1	2,1	4,3
Böblingen	161	82	118,8	37,9	266	175	196,3	80,8	1,7	2,1
Crailsheim	63	45	98,8	65,3	167	66	261,9	95,8	2,7	1,5
Esslingen	262	128	137,5	49,7	378	198	198,4	76,3	1,4	1,6
Göppingen	303	85	153,8	37,2	412	270	209,1	118,0	1,4	3,2
Heidenheim	118	75	107,3	59,3	187	147	170,1	116,2	1,6	2,0
Heilbronn	.	67	.	33,8	.	233	.	117,6	.	3,5
Künzelsau	39	11	126,3	32,5	52	51	168,4	150,7	1,3	4,6
Leonberg	76	67	81,7	48,8	283	147	304,1	107,1	3,7	2,2
Ludwigsburg	346	148	147,9	47,4	847	476	362,1	152,4	2,4	3,2
Mergentheim	40	45	99,9	105,6	80	113	199,8	265,1	2,0	2,5
Nürtingen	227	74	180,0	45,1	429	198	340,2	120,5	1,9	2,7
Öhringen	44	21	101,8	42,5	68	97	157,4	196,1	1,5	4,6
Schwäbisch Gmünd	177	45	179,2	40,2	507	161	513,4	143,8	2,9	3,6
Schwäbisch Hall	63	18	106,9	27,8	147	68	249,4	105,1	2,3	3,8
Ulm	.	47	.	48,7	.	109	.	112,9	.	2,3
Vaihingen	113	36	156,4	37,9	265	144	366,9	151,5	2,3	4,0
Waiblingen	241	112	132,1	44,8	797	411	436,9	164,3	3,3	3,7
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	4 311	1 767	146,3	49,7	9 598	4 664	325,8	131,2	2,2	2,6
Stadtkreise										
Karlsruhe ¹⁾	575	117	145,1	45,3	951	387	239,9	149,8	1: 1,7	1: 3,3
Heidelberg ¹⁾	364	51	134,9	41,8	1 043	146	386,5	119,6	2,9	2,9
Mannheim 1)	653	256	142,0	77,4	1 613	601	350,7	181,8	2,5	2,4
Pforzheim 1)	174	44	123,2	47,3	236	96	167,1	103,1	1,4	2,2
Landkreise										
Bruchsal	156	82	134,5	57,2	262	277	225,9	193,2	1,7	3,4
Buchen	166	27	269,2	40,4	417	92	676,3	137,7	2,5	3,4
Heidelberg	.	67	.	35,7	.	240	.	127,9	.	3,6
Karlsruhe	.	80	.	38,1	.	269	.	128,0	.	3,4
Mannheim	.	101	.	50,2	.	254	.	126,1	.	2,5
Mosbach	145	45	231,4	57,8	251	155	400,5	199,2	1,7	3,4
Pforzheim	.	29	.	39,5	.	69	.	94,1	.	2,4
Sinsheim	85	30	113,5	33,1	110	137	146,9	151,0	1,3	4,6
Tauberbischofsheim	155	44	206,9	53,0	127	191	169,6	230,1	0,8	4,3
Reg.-Bez. Nordbaden	2 473	973	149,1	50,2	5 010	2 914	302,1	150,3	2,0	3,0
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	199	87	143,2	51,7	658	233	473,5	138,5	1: 3,3	1: 2,7
Baden-Baden	50	20	125,1	54,2	75	34	187,6	92,1	1,5	1,7
Landkreise										
Bühl	102	68	130,2	73,1	229	80	292,2	86,0	2,2	1,2
Donaueschingen	52	34	80,1	44,4	170	74	262,0	96,7	3,3	2,2
Emmendingen	171	26	169,8	21,3	359	222	356,5	182,0	2,1	8,5
Freiburg	172	65	230,5	68,7	359	181	481,1	191,3	2,1	2,8
Hochschwarzwald	40	19	95,5	41,1	180	72	429,6	155,9	4,5	3,8
Kehl	79	64	150,7	101,5	134	227	255,6	359,9	1,7	3,6
Konstanz	251	91	163,4	46,8	420	230	273,4	118,2	1,7	2,5
Lahr	90	35	114,0	39,0	288	204	364,9	227,2	3,2	5,8
Lörrach	146	53	109,5	33,7	260	345	195,1	219,1	1,8	6,5
Müllheim	56	35	105,1	53,6	183	121	343,3	185,2	3,3	3,5
Offenburg	166	75	169,4	65,7	282	400	287,8	350,6	1,7	5,3
Rastatt	145	92	126,8	64,0	228	320	199,3	222,5	1,6	3,5
Säckingen	92	35	143,0	45,9	108	100	167,9	131,1	1,2	2,9
Stockach	60	39	131,9	74,6	235	103	516,5	197,0	3,9	2,6
Überlingen	47	48	83,3	62,2	249	142	441,1	183,9	5,3	3,0
Villingen	130	69	161,5	67,6	420	106	521,8	103,9	3,2	1,5
Waldshut	117	46	181,2	62,1	169	95	261,7	128,2	1,4	2,1
Wolfach	75	49	145,2	84,8	134	111	259,4	192,1	1,8	2,3
Reg.-Bez. Südbaden	2 240	1 050	141,2	55,1	5 140	3 400	324,0	178,4	2,3	3,2
Landkreise										
Balingen	73	51	75,7	44,3	92	124	95,4	107,7	1: 1,3	1: 2,4
Biberach	108	37	110,7	31,6	501	206	513,7	175,7	4,6	5,6
Calw	280	108	243,2	72,2	401	157	348,3	104,9	1,4	1,5
Ehingen	51	16	118,8	31,0	184	80	428,7	155,0	3,6	5,0
Freudenstadt	55	27	95,1	40,4	87	87	150,5	130,1	1,6	3,2
Hechingen	81	23	162,0	40,5	89	75	178,0	131,9	1,1	3,3
Horb	51	25	123,4	50,4	71	94	171,8	189,5	1,4	3,8
Münsingen	50	12	129,4	28,7	60	108	155,3	258,5	1,2	9,0
Ravensburg	125	64	120,9	51,3	387	213	374,3	170,8	3,1	3,3
Reutlingen	187	75	120,8	38,6	577	258	372,8	132,7	3,1	3,4
Rottweil	170	96	140,8	69,1	238	166	197,1	119,4	1,4	1,7
Saulgau	97	19	148,3	26,1	314	130	480,1	178,7	3,2	6,8
Sigmaringen	53	11	111,4	19,7	313	124	658,0	222,0	5,9	11,3
Tettnang	64	43	90,1	46,5	231	137	325,1	148,1	3,6	3,2
Tübingen	168	34	138,4	22,2	158	106	130,2	69,2	0,9	3,1
Tuttlingen	101	79	132,3	86,0	335	180	438,9	196,0	3,3	2,3
Wangen	91	32	131,2	38,8	282	161	406,7	195,2	3,1	5,0
Reg.-Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern	1 805	752	131,8	45,4	4 320	2 406	315,4	145,3	2,4	3,2
Baden-Württemberg	10 829	4 542	143,2	50,2	24 068	13 384	318,3	147,8	2,2	3,0

1) 1959 einschließlich Landkreis.

Andere Organe I d				Aktive Tuberkulose Ia - Id zusammen				Kreis Regierungsbezirk Land
Anzahl		auf 100 000 der Bevölkerung		Anzahl		auf 100 000 der Bevölkerung		
1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	
416	237	66,2	37,4	4 152	1 590	661,1	251,2	Stadtkreise
279	48	114,3	47,0	1 718	239	703,7	234,2	Stuttgart
175	42	102,0	44,8	1 032	246	601,5	262,4	Heilbronn ¹⁾
								Ulm ¹⁾
82	45	58,9	27,9	428	388	307,3	240,5	Landkreise
50	32	57,6	28,8	423	202	487,2	181,7	Aalen
70	53	51,7	24,5	497	310	366,9	143,2	Backnang
21	15	32,9	21,8	251	126	393,7	182,9	Böblingen
117	79	61,4	30,7	757	405	397,3	157,4	Craillsheim
124	134	62,9	58,6	839	489	425,8	213,8	Esslingen
58	28	52,7	22,1	363	250	330,1	197,7	Göppingen
	67	.	33,8	.	367	.	185,3	Heidenheim
11	15	35,6	44,3	102	77	330,3	227,5	Heilbronn
53	34	57,0	24,8	412	248	442,8	180,6	Künzelsau
219	115	93,6	36,8	1 412	739	603,6	236,7	Leonberg
40	28	99,9	65,7	160	186	399,5	436,4	Ludwigsburg
94	51	74,5	31,1	750	323	594,7	196,7	Mergentheim
24	19	55,5	38,4	136	137	314,8	276,9	Nürtingen
102	53	103,3	47,4	786	259	795,9	231,4	Öhringen
39	13	66,2	20,1	249	99	422,5	153,0	Schwäbisch Gmünd
	33	.	34,2	.	189	.	195,8	Schwäbisch Hall
75	34	103,8	35,8	453	214	627,2	225,1	Ulm
160	93	87,7	37,2	1 198	616	656,7	246,3	Vaihingen
2 209	1 268	75,0	35,7	16 118	7 699	547,1	216,5	Waiblingen
								Reg.-Bez. Nordwürttemberg
265	119	66,8	46,1	1 791	623	451,8	241,1	Stadtkreise ¹⁾
558	20	206,8	16,4	1 965	217	728,2	177,7	Karlsruhe ¹⁾
343	89	74,6	26,9	2 609	946	567,3	286,1	Heidelberg ¹⁾
31	14	21,9	15,0	441	154	312,3	165,4	Mannheim ¹⁾
								Pforzheim ¹⁾
61	43	52,6	30,0	479	402	412,9	280,4	Landkreise
127	28	206,0	41,9	710	147	1 151,6	220,1	Bruchsal
	33	.	17,6	.	340	.	181,1	Buchen
	56	.	26,6	.	405	.	192,6	Heidelberg
	35	.	17,4	.	390	.	193,7	Karlsruhe
116	69	185,1	88,7	512	269	816,9	345,7	Mannheim
	14	.	19,1	.	112	.	152,7	Mosbach
45	33	60,1	36,4	240	200	320,4	220,5	Pforzheim
54	37	72,1	44,6	336	272	448,6	327,6	Sinsheim
1 600	590	96,5	30,4	9 083	4 477	547,7	230,9	Tauberbischofsheim
								Reg.-Bez. Nordbaden
89	61	64,0	36,3	946	381	680,7	226,5	Stadtkreise
13	9	32,5	24,4	138	63	345,1	170,7	Freiburg im Breisgau
								Baden-Baden
35	14	44,7	15,1	366	162	467,1	174,2	Landkreise
49	30	75,5	39,2	271	138	417,6	180,3	Bühl
109	38	108,2	31,2	639	286	634,5	234,5	Donaueschingen
53	50	71,0	52,8	584	296	782,7	312,8	Emmendingen
16	15	38,2	32,5	236	106	563,2	229,5	Freiburg
27	62	51,5	98,3	240	353	457,7	559,6	Hochschwarzwald
129	60	84,0	30,8	800	381	520,7	195,8	Kehl
89	24	112,8	26,7	467	263	591,6	292,9	Konstanz
92	32	69,0	20,3	498	430	373,6	273,0	Lahr
79	24	148,2	36,7	318	180	596,6	275,5	Lörrach
172	120	175,5	105,2	620	595	632,8	521,5	Müllheim
68	33	59,4	22,9	441	445	385,5	309,4	Offenburg
47	7	73,1	9,2	247	142	384,0	186,2	Rastatt
64	24	140,7	45,9	359	166	789,0	317,4	Säckingen
41	31	72,6	40,2	337	221	597,0	286,3	Stockach
118	50	146,6	49,0	668	225	830,0	220,6	Überlingen
47	15	72,8	20,2	333	156	515,7	210,4	Villingen
11	22	21,3	38,1	220	182	425,9	315,0	Waldshut
1 348	721	85,0	37,8	8 728	5 171	550,2	271,4	Wolfach
								Reg.-Bez. Südbaden
40	57	41,5	49,5	205	232	212,6	201,4	Landkreise
68	45	69,7	38,4	677	288	694,1	245,7	Balingen
91	43	79,0	28,7	772	308	670,5	205,8	Biberach
41	13	95,5	25,2	276	109	643,0	211,2	Calw
13	20	22,5	29,9	155	134	268,1	200,4	Ehingen
10	34	20,0	59,8	180	132	360,1	232,2	Freudenstadt
20	25	48,4	50,4	142	144	343,7	290,3	Hechingen
5	13	12,9	31,1	115	133	297,6	318,3	Horb
116	58	112,2	46,5	628	335	607,4	268,6	Münsingen
120	53	77,5	27,3	884	386	571,2	198,5	Ravensburg
42	52	34,8	37,4	450	314	372,7	225,8	Reutlingen
68	31	104,0	42,6	479	180	732,4	247,4	Rottweil
49	41	103,0	73,4	415	176	872,5	315,1	Saulgau
84	44	118,2	47,6	379	224	533,4	242,2	Sigmaringen
52	36	42,8	23,5	378	176	311,4	114,9	Tettnang
83	52	108,7	56,6	519	311	680,0	338,7	Tübingen
79	14	113,9	17,0	452	207	651,9	250,9	Tuttlingen
								Wangen
981	631	71,6	38,1	7 106	3 789	518,8	228,9	Reg.-Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern
6 138	3 210	81,2	35,5	41 035	21 136	542,7	233,4	Baden-Württemberg

Noch: 20. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1959 und 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Davon								Inaktive der Atmungs-	
	Kinder unter 15 Jahren				über 15 Jahren				Anzahl	
	männlich		weiblich		männlich		weiblich			
	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971
Stadtkreise										
Stuttgart	119	39	124	39	2 397	1 021	1 512	491	11 509	12 249
Heilbronn 1)	104	7	106	9	895	134	613	89	4 746	1 607
Ulm 1)	60	9	44	14	563	137	365	86	2 550	1 529
Landkreise										
Aalen	31	27	33	21	216	230	148	110	1 243	969
Backnang	15	5	16	5	232	125	160	67	1 128	1 137
Böblingen	25	11	32	10	271	198	169	91	2 126	2 837
Crailsheim	16	2	10	3	146	81	79	40	798	834
Esslingen	22	11	24	20	430	246	281	128	3 096	3 728
Göppingen	44	13	34	8	482	305	279	163	2 240	2 725
Heidenheim	11	9	5	11	214	160	133	70	1 290	1 284
Heilbronn	.	13	.	8	.	225	.	121	.	2 577
Künzelsau	4	6	2	3	53	42	43	26	495	384
Leonberg	20	8	36	8	227	165	129	67	1 501	1 271
Ludwigsburg	57	33	59	23	832	456	464	227	2 525	2 433
Mergentheim	4	16	2	8	93	92	61	70	728	300
Nürtingen	24	19	17	12	446	205	263	87	2 739	1 399
Öhringen	5	3	4	4	89	80	38	50	685	464
Schwäbisch Gmünd	58	12	61	11	355	170	312	66	1 431	1 176
Schwäbisch Hall	11	5	10	5	106	55	122	34	657	689
Ulm	.	6	.	13	.	112	.	58	.	955
Vaihingen	33	5	28	8	226	136	166	65	1 096	813
Waiblingen	33	24	33	28	676	386	456	178	2 414	2 784
Reg.-Bez.Nordwürttemberg	696	283	680	271	8 949	4 761	5 793	2 384	44 997	45 144
Stadtkreise										
Karlsruhe 1)	108	10	92	13	987	373	604	227	10 088	9 151
Heidelberg 1)	109	3	103	7	976	134	777	73	7 509	2 421
Mannheim 1)	150	32	142	40	1 439	624	878	250	13 427	5 618
Pforzheim 1)	40	10	25	4	274	94	102	46	1 195	948
Landkreise										
Bruchsal	40	64	28	37	267	195	144	106	1 321	3 094
Buchen	94	6	107	3	287	89	222	49	1 299	429
Heidelberg	.	18	.	15	.	200	.	107	.	3 305
Karlsruhe	.	7	.	14	.	281	.	103	.	3 069
Mannheim	.	13	.	16	.	249	.	112	.	2 721
Mosbach	32	14	54	11	258	161	168	83	691	1 493
Pforzheim	.	6	.	3	.	71	.	32	.	573
Sinsheim	13	10	4	16	146	115	77	59	778	1 122
Tauberbischofsheim	17	13	12	10	204	160	103	89	869	848
Reg.-Bez.Nordbaden	603	206	567	189	4 838	2 746	3 075	1 336	37 177	34 792
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	60	9	58	12	437	216	391	144	1 146	1 432
Baden-Baden	20	9	12	2	67	34	39	18	621	271
Landkreise										
Bühl	58	13	57	14	151	101	100	34	843	556
Donaueschingen	17	3	14	3	129	91	111	41	450	542
Emmendingen	36	10	39	17	292	169	272	90	1 446	858
Freiburg	43	11	35	11	296	186	210	88	612	743
Hochschwarzwald	6	1	11	3	142	65	77	37	313	348
Kehl	11	7	15	9	142	223	72	114	506	1 089
Konstanz	45	16	45	15	426	230	284	120	1 587	2 008
Lahr	30	18	30	12	213	148	194	85	2 128	939
Lörrach	35	47	22	49	288	225	153	109	1 582	1 766
Müllheim	26	6	23	3	160	110	109	61	776	572
Offenburg	26	14	16	13	316	337	262	231	1 247	1 705
Rastatt	43	38	28	42	244	236	126	129	399	1 010
Säckingen	11	-	9	3	136	91	91	48	536	356
Stockach	25	10	20	12	195	98	119	46	1 634	625
Überlingen	22	9	18	12	162	133	135	67	1 064	681
Villingen	29	8	30	9	330	141	279	67	770	477
Waldshut	24	3	20	6	186	102	103	45	613	548
Wolfach	17	9	8	6	111	118	84	49	465	490
Reg.-Bez.Südbaden	584	241	510	253	4 423	3 054	3 211	1 623	18 738	17 016
Landkreise										
Balingen	8	12	7	3	114	151	76	66	1 223	1 421
Biberach	51	1	57	8	350	185	219	94	991	1 165
Calw	33	8	32	5	426	219	281	76	1 961	1 634
Ehingen	13	2	22	3	142	75	99	29	491	554
Freudenstadt	8	8	8	9	81	76	58	41	422	847
Hechingen	12	2	4	3	102	86	62	41	656	798
Horb	13	4	10	9	65	89	54	42	257	703
Münsingen	2	19	5	18	62	61	46	35	209	453
Ravensburg	51	23	45	15	322	171	210	126	1 259	1 852
Reutlingen	38	48	37	27	438	196	371	115	2 407	1 092
Rottweil	29	15	21	10	250	189	150	100	974	898
Saulgau	28	9	39	10	227	97	185	64	1 081	1 054
Sigmaringen	47	8	31	12	174	94	163	62	1 090	650
Tett nang	42	23	32	21	193	123	112	57	865	1 024
Tübingen	13	10	8	13	226	103	131	50	1 272	347
Tuttlingen	69	20	53	16	243	184	154	91	1 717	1 803
Wangen	49	13	38	10	215	132	150	52	702	933
Reg.-Bez.Südwestfalen- Hohenzollern	506	225	449	192	3 630	2 231	2 521	1 141	17 577	17 228
Baden-Württemberg	2 389	955	2 206	905	21 840	12 792	14 600	6 484	118 489	114 180

1) 1959 einschließlich Landkreis.

Tuberkulose organe II a		Überwachungs- fälle		Beobachtungs- fälle		Gesamtbestand I - V				Kreis Regierungsbezirk Land
auf 100 000 der Bevölkerung		II a - II d		III + V		Anzahl		auf 100 000 der Bevölkerung		
1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	
1 832,6	1 935,2	21 880	14 947	803	574	26 835	17 111	4 272,9	2 703,4	Stadtkreise
1 944,0	1 574,7	7 337	2 665	233	85	9 288	2 989	3 804,4	2 928,9	Stuttgart
1 486,4	1 630,7	4 306	2 638	164	101	5 502	2 985	3 207,0	3 183,6	Heilbronn 1)
										Ulm 1)
892,6	600,5	2 095	1 828	123	206	2 646	2 422	1 900,1	1 501,1	Landkreise
1 299,1	1 022,8	2 143	2 278	174	62	2 740	2 542	3 155,7	2 464,8	Aalen
1 569,3	1 310,5	3 658	5 023	135	476	4 290	5 809	3 166,6	2 683,3	Backnang
1 251,7	1 210,3	1 154	1 444	85	56	1 490	1 626	2 337,1	2 359,6	Böblingen
1 624,8	1 448,5	5 250	6 086	160	309	6 167	6 800	3 236,5	2 642,1	Crailsheim
1 136,9	1 191,3	3 347	3 458	343	340	4 529	4 287	2 298,6	1 874,1	Eßlingen
1 173,2	1 805,9	2 844	3 151	53	58	3 260	3 459	2 964,8	2 734,9	Göppingen
	1 301,1		4 409		170		4 946		2 497,2	Heidenheim
1 602,8	1 134,7	898	556	19	28	1 019	661	3 299,4	1 953,1	Heilbronn
1 613,1	925,7	2 636	1 945	297	116	3 345	2 309	3 594,9	1 681,7	Künzelsau
1 079,5	779,1	4 998	6 016	180	220	6 590	6 975	2 817,3	2 233,6	Leonberg
1 817,7	703,9	1 139	460	53	17	1 352	663	3 375,8	1 555,6	Ludwigsburg
2 171,9	851,7	4 162	2 082	117	89	5 029	2 494	3 987,8	1 518,4	Mergentheim
1 585,4	938,0	1 141	744	87	75	1 364	956	3 156,8	1 932,5	Nürtingen
1 448,9	1 050,6	2 958	1 796	48	65	3 792	2 120	3 839,5	1 893,9	Öhringen
1 114,7	1 064,6	878	1 137	204	297	1 331	1 533	2 258,3	2 368,7	Schwäbisch Gmünd
	989,2		1 646		84		1 919		1 987,6	Schwäbisch Hall
1 517,4	855,2	1 663	1 388	113	61	2 229	1 663	3 086,1	1 749,2	Ulm
1 323,3	1 113,0	4 506	4 821	321	413	6 025	5 850	3 302,7	2 338,8	Vaihingen
1 527,3	1 269,7	78 993	70 518	3 712	3 902	98 823	82 119	3 354,3	2 309,6	Waiblingen
										Reg.-Bez. Nordwürttemberg
2 544,8	3 541,3	12 982	16 116	459	342	15 232	17 081	3 842,5	6 610,1	Stadtkreise
2 782,6	1 982,9	13 467	4 131	483	139	15 915	4 487	5 897,6	3 675,0	Karlsruhe 1)
2 919,6	1 699,2	23 956	10 101	1 556	224	28 121	11 271	6 114,8	3 408,9	Heidelberg 1)
846,1	1 018,4	2 287	1 907	155	45	2 883	2 106	2 041,3	2 262,4	Mannheim 1)
										Pforzheim 1)
1 138,8	2 158,3	1 889	5 812	71	620	2 439	6 834	2 102,7	4 767,2	Landkreise
2 106,9	642,3	2 595	1 251	408	102	3 713	1 500	6 022,1	2 245,6	Bruchsal
	1 760,7		4 989		214		5 543		2 803,6	Buchen
	1 459,7		4 448		239		5 092		2 422,0	Heidelberg
	1 351,2		4 897		126		5 413		2 688,0	Karlsruhe
1 102,5	1 905,8	1 667	4 335	30	70	2 209	4 674	3 524,6	6 006,5	Mannheim
	781,1		1 335		77		1 524		2 077,5	Mosbach
1 038,7	1 236,9	1 253	1 558	69	177	1 562	1 935	2 085,5	2 133,1	Pforzheim
1 160,2	1 021,5	1 983	1 323	105	120	2 424	1 715	3 236,4	2 065,8	Sinsheim
2 241,8	1 794,7	62 079	62 203	3 336	2 495	74 498	69 175	4 492,2	3 568,3	Tauberbischofsheim
										Reg.-Bez. Nordbaden
824,6	851,4	2 001	2 039	30	141	2 977	2 561	2 142,2	1 522,6	Stadtkreise
1 553,1	734,1	809	415	7	6	954	484	2 386,0	1 311,1	Freiburg im Breisgau
										Baden-Baden
1 075,8	597,9	1 265	884	5	15	1 636	1 061	2 087,9	1 140,9	Landkreise
693,4	708,0	930	803	111	26	1 312	967	2 021,8	1 263,2	Bühl
1 435,8	703,4	2 429	1 005	50	142	3 118	1 433	3 096,0	1 174,8	Donauesschingen
820,2	785,1	1 325	1 301	15	60	1 924	1 657	2 578,5	1 750,9	Emmendingen
747,0	753,4	516	691	58	30	810	827	1 933,1	1 790,4	Freiburg
965,0	1 726,4	1 269	3 714	70	564	1 579	4 631	3 011,5	7 341,4	Hochschwarzwald
1 033,0	1 031,8	2 605	3 071	53	174	3 458	3 626	2 250,8	1 863,2	Kehl
2 696,0	1 045,7	3 673	1 121	1 820	112	5 960	1 496	7 550,8	1 666,0	Konstanz
1 186,8	1 121,3	3 211	2 286	19	77	3 728	2 793	2 796,8	1 773,4	Lahr
1 455,8	875,6	1 412	1 079	30	69	1 760	1 328	3 301,9	2 032,9	Lörrach
1 272,7	1 494,5	2 734	2 943	198	376	3 552	3 914	3 625,2	3 430,8	Müllheim
348,8	702,2	865	1 600	44	77	1 350	2 122	1 180,2	1 475,3	Offenburg
833,3	466,8	742	586	12	57	1 001	785	1 556,1	1 029,2	Rastatt
3 591,3	1 195,1	3 042	1 049	505	47	3 906	1 262	8 584,8	2 413,1	Säckingen
1 884,9	882,1	2 174	1 070	848	82	3 359	1 373	5 950,6	1 778,5	Stockach
956,7	467,6	2 199	1 893	94	43	2 961	2 161	3 678,9	2 118,5	Überlingen
949,3	739,2	927	958	38	43	1 298	1 157	2 010,2	1 560,8	Villingen
900,2	848,0	607	701	65	25	892	908	1 726,8	1 571,5	Waldshut
1 181,2	893,1	34 735	29 209	4 072	2 166	47 535	36 546	2 996,4	1 918,0	Wolfach
										Reg.-Bez. Südbaden
1 268,1	1 233,6	1 564	1 765	18	61	1 787	2 058	1 852,9	1 786,6	Landkreise
1 016,0	993,7	2 187	2 111	68	159	2 932	2 558	3 006,1	2 181,8	Balingen
1 703,1	1 091,8	4 846	2 220	244	91	5 862	2 619	5 091,0	1 750,0	Biberach
1 143,9	1 073,3	1 034	1 016	53	71	1 363	1 196	3 175,5	2 317,0	Calw
729,9	1 266,9	633	1 257	16	117	804	1 508	1 390,6	2 255,6	Ehingen
1 312,3	1 403,7	847	1 004	49	47	1 076	1 183	2 152,6	2 080,9	Freudenstadt
622,0	1 417,2	386	864	2	63	530	1 071	1 282,7	2 159,0	Hechingen
540,9	1 084,2	260	789	13	35	388	957	1 004,1	2 290,5	Horb
1 217,6	1 485,1	2 091	2 831	70	220	2 789	3 386	2 697,3	2 715,1	Münsingen
1 555,3	561,5	3 535	1 400	71	144	4 490	1 930	2 901,2	992,3	Ravensburg
806,6	645,9	1 773	1 475	31	91	2 254	1 880	1 866,6	1 352,2	Reutlingen
1 652,9	1 448,6	1 531	1 442	88	171	2 098	1 793	3 207,9	2 464,3	Rottweil
2 291,5	1 163,7	1 396	820	141	65	1 952	1 061	4 103,7	1 899,5	Saulgau
1 217,4	1 107,1	1 385	1 517	57	90	1 821	1 831	2 562,9	1 979,6	Sigmaringen
1 047,2	226,6	2 050	994	270	115	2 698	1 285	2 223,0	839,1	Tettang
2 249,6	1 963,4	2 804	2 634	13	42	3 336	2 987	4 370,0	3 252,6	Tübingen
1 012,4	1 130,9	1 611	2 702	86	161	2 149	3 070	3 099,2	3 721,2	Tuttlingen
										Wangen
1 283,2	1 040,6	29 933	26 841	1 290	1 743	38 329	32 373	2 798,2	1 955,3	Reg.-Bez. Südwürttemberg- Hohenzollern
1 567,2	1 260,9	205 740	188 771	12 410	10 306	259 185	220 213	3 428,1	2 431,9	Baden-Württemberg

21. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1971

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		alle Formen	
	ansteckungs- fähig		nicht ansteckungs- fähig						ansteckungs- fähig		nicht ansteckungs- fähig					
	I a		I c		I d				I a		I c		I d			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	-	-	3	2	-	1	3	3	-	-	4,8	3,4	-	1,7	4,8	5,1
1 - 5	10	7	135	132	8	6	153	145	3,5	2,6	47,0	48,2	2,8	2,2	53,1	52,9
5 - 10	19	13	455	408	23	25	497	446	4,7	3,4	112,8	106,5	5,7	6,5	123,2	116,4
10 - 15	15	21	267	262	20	28	302	311	4,1	6,1	73,5	75,7	5,5	8,1	83,1	89,8
15 - 20	79	70	319	315	43	39	441	424	24,6	22,7	99,2	102,1	13,4	12,6	137,1	137,4
20 - 25	198	116	672	454	71	97	941	667	61,9	37,0	210,1	144,8	22,2	30,9	294,2	212,7
25 - 30	202	77	490	385	114	149	806	611	64,4	27,1	156,2	135,6	36,4	52,5	257,0	215,1
30 - 35	303	91	701	379	166	177	1 170	647	72,8	24,5	168,5	101,8	39,9	47,6	281,2	173,8
35 - 40	309	70	703	299	171	173	1 183	542	89,5	23,3	203,6	99,4	49,5	57,5	342,7	180,1
40 - 45	326	67	717	297	178	151	1 221	515	106,6	23,9	234,5	105,9	58,2	53,8	399,4	183,6
45 - 50	322	61	662	302	182	158	1 166	521	136,2	20,6	280,0	102,1	77,0	53,4	493,3	176,1
50 - 55	287	62	534	218	111	147	932	427	121,4	21,0	225,9	73,7	47,0	49,7	394,3	144,3
55 - 60	285	64	688	240	115	140	1 088	444	153,4	24,4	370,4	91,4	61,9	53,3	585,7	169,1
60 - 65	424	66	867	250	133	125	1 424	441	203,0	22,6	415,1	85,8	63,7	42,9	681,8	151,3
65 - 70	342	58	704	231	66	119	1 112	408	189,4	23,3	389,8	92,8	36,5	47,8	615,7	163,9
70 und mehr	402	176	801	492	105	169	1 308	837	167,5	41,9	333,8	117,2	43,8	40,3	545,1	199,3
Insgesamt	3 523	1 019	8 718	4 666	1 506	1 704	13 747	7 389	80,7	21,7	199,7	99,5	34,5	36,3	314,9	157,6

22. Bestand der an sonstiger aktiver endothorakaler Tuberkulose Erkrankten nach Form der Tuberkulose am 31. Dezember 1971

Diagnosegruppe	Personen				Davon im Alter von ...			
					unter 15 Jahren		15 Jahren und darüber	
	insgesamt	%	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Nicht BCG geschützte Tuberkulinpos Reagenten	44	0,3	23	21	23	21	-	-
Endothorakale Lymphknoten-Tuberkulose	1 160	8,7	642	518	549	465	93	53
Pleuritis exsudatira tuberkulöser Ursache	659	4,9	395	264	19	18	376	246
Miliartuberkulose	30	0,2	13	17	3	5	10	12
Sonstige aktive endothorakale Tuberkulose	11 491	85,9	7 645	3 846	266	295	7 379	3 551
Nicht ansteckungsfähige endothorakale Tuberkulose insgesamt	13 384	100	8 718	4 666	860	804	7 858	3 862

23. Bestand der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Form der Tuberkulose 1959¹⁾

Diagnosegruppe	Personen				Davon im Alter von ...			
					unter 15 Jahren		15 Jahren und darüber	
	insgesamt	%	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Knochen- und Gelenk-Tuberkulose	1 605	26,1	828	777	100	81	728	696
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	1 101	17,9	385	716	120	132	265	584
Hauttuberkulose	514	8,4	178	336	9	9	169	327
Meningitis-Tuberkulose	157	2,6	82	75	47	43	35	32
Uro- und Genital-Tuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Organtuberkulose	2 761	45,0	1 301	1 460	55	53	1 246	1 407
Extrapulmonale Tuberkulose insgesamt	6 138	100	2 774	3 364	331	318	2 443	3 046

1) Stand 31. Dezember.

24. Bestand der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Form der Tuberkulose 1971¹⁾

Diagnosegruppe	Personen				Davon im Alter von ...			
					unter 15 Jahren		15 Jahren und darüber	
	insgesamt	%	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Knochen- und Gelenk-Tuberkulose	531	16,5	304	227	12	9	292	218
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	624	19,4	192	432	22	23	170	409
Hauttuberkulose	153	4,8	61	92	-	4	61	88
Meningitis-Tuberkulose	70	2,2	31	39	11	16	20	23
Uro- und Genital-Tuberkulose	1 283	40,0	682	601	4	2	678	599
Sonstige Organtuberkulose	549	17,1	236	313	2	6	234	307
Extrapulmonale Tuberkulose insgesamt	3 210	100	1 506	1 704	51	60	1 455	1 644

1) Stand 31. Dezember.

25. Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Nationalität 1968 bis 1971

Diagnosegruppe	Jahr ¹⁾	Ausländer				Staatsangehörigkeit			
						Griechenland		Italien	
		insgesamt	auf 100 000	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Tuberkulose der Atmungsorgane ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis I a	1968	329	67,1	263	66	23	11	55	10
	1969	363	57,4	303	60	25	7	61	11
	1970	392	57,6	318	74	23	9	57	16
	1971	435	57,9	349	86	27	9	53	11
nicht ansteckungsfähig I c	1968	933	190,4	642	291	65	42	217	68
	1969	1 048	165,6	704	344	74	52	204	75
	1970	1 163	171,0	792	371	71	46	219	79
	1971	1 305	173,7	875	430	87	49	200	100
Tuberkulose anderer Organe I d	1968	293	59,8	157	136	18	17	51	41
	1969	326	51,5	164	162	20	20	41	41
	1970	403	59,3	222	181	23	26	48	39
	1971	437		226	211	25	30	46	48
Aktive Tuberkulose, alle Formen	1968	1 555	317,2	1 062	493	106	70	323	119
	1969	1 737	274,5	1 171	566	119	79	306	127
	1970	1 958	287,9	1 332	626	117	81	324	134
	1971	2 177	289,8	1 450	727	139	88	299	159

1) Jeweils am 31. Dezember.

Noch: 25. Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Nationalität 1968 bis 1971

Diagnosegruppe	Jahr ¹⁾	Staatsangehörigkeit									
		Jugoslawien		Spanien		Türkei		sonst. europäische und außereuro- päische Staaten		Staatenlose und ohne Angabe	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Tuberkulose der Atmungsorgane ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis I a	1968	45	15	17	5	34	13	54	7	35	5
	1969	62	12	17	2	49	18	58	5	31	5
	1970	87	22	21	3	49	20	57	3	24	1
	1971	106	34	14	2	59	20	69	9	21	1
nicht ansteckungsfähig I c	1968	76	54	54	31	93	50	95	31	42	15
	1969	96	88	50	32	137	66	90	20	53	11
	1970	143	106	51	25	164	85	90	19	54	11
	1971	186	126	50	19	200	105	109	24	43	7
Tuberkulose anderer Organe I d	1968	15	21	19	21	33	25	13	8	8	3
	1969	21	33	24	20	36	36	15	10	7	2
	1970	41	29	22	20	58	54	26	13	4	-
	1971	48	50	12	13	67	55	20	15	8	-
Aktive Tuberkulose, alle Formen	1968	136	90	90	57	160	88	162	46	85	23
	1969	179	133	91	54	222	120	163	35	91	18
	1970	271	157	94	48	271	159	173	35	82	12
	1971	340	210	76	34	326	180	198	48	72	8

1) Jeweils am 31. Dezember.

26. Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Alter und Geschlecht am 31. Dezember 1971

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Aktive Tuberkulose															
	Grundzahlen								Verhältniszahlen auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe							
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe				Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe			
	ansteckungs- fähig		nicht ansteckungs- fähig				alle Formen		ansteckungs- fähig		nicht ansteckungs- fähig				alle Formen	
	I a		I c		I d				I a		I c		I d			
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10,7	-	-	-	10,7
1 - 5	3	1	33	27	1	3	37	31	11,1	3,9	121,8	105,7	3,7	11,8	136,6	121,4
5 - 10	2	-	56	47	3	2	61	49	8,0	-	224,5	202,9	12,0	8,6	244,5	211,6
10 - 15	-	-	18	15	-	3	18	18	-	-	103,2	87,8	-	17,6	103,2	105,3
15 - 20	11	7	33	32	5	5	49	44	38,0	26,2	113,9	119,6	17,3	18,7	169,2	164,4
20 - 25	46	25	86	69	16	24	148	118	87,5	49,2	163,6	135,7	30,4	47,2	281,5	232,1
25 - 30	48	18	109	72	31	54	188	144	68,4	43,8	155,2	175,3	44,2	131,5	267,8	350,7
30 - 35	59	15	127	57	51	44	237	116	80,6	45,7	173,5	173,7	69,7	134,1	323,8	353,4
35 - 40	45	4	123	38	59	40	227	82	75,9	16,2	207,3	153,6	99,5	161,6	382,7	331,4
40 - 45	37	8	94	29	30	17	161	54	93,9	45,9	238,5	166,5	76,1	97,6	408,5	309,9
45 - 50	43	3	80	21	15	12	138	36	187,6	25,3	349,0	177,1	65,4	101,2	602,0	303,5
50 - 55	19	1	42	8	9	6	70	15	167,8	17,5	370,9	140,1	79,5	105,1	618,1	262,7
55 - 60	12	3	35	6	1	1	48	10	165,5	81,9	482,8	163,8	13,8	27,3	662,1	273,1
60 - 65	14	-	22	2	1	-	37	2	350,9	-	551,4	70,7	25,1	-	927,3	70,7
65 - 70	4	-	10	2	-	-	14	2	213,9	-	534,8	94,3	-	-	748,7	94,3
70 und mehr	6	1	7	4	4	-	17	5	253,2	27,1	295,4	108,5	168,8	-	717,3	135,6
Insgesamt	349	86	875	430	226	211	1 450	727	77,1	28,8	193,3	144,0	49,9	70,7	320,3	243,4

27. Perkutane Tuberkulinproben bei Kindern 1968 bis 1973

Jahr	Untersuchte Kinder			Davon				
	insgesamt	darunter mit positiver Reaktion		Schüler			sonstige Kinder	
		Anzahl	%	insgesamt	darunter mit positiver Reaktion		insgesamt	darunter mit positiver Reaktion
					Anzahl	%		Anzahl
1968	296 299	12 200	4,1	215 627	8 972	4,2	80 672	3 228
1969	309 543	14 078	4,5	222 353	10 362	4,7	87 190	3 716
1970	288 685	16 571	5,7	211 627	11 669	5,5	77 058	4 902
1971	278 019	18 316	6,6	218 501	13 500	6,2	59 518	4 816
1972	297 253	19 273	6,5	250 710	16 128	6,4	46 543	3 145
1973	282 180	21 234	7,5	234 422	17 046	7,3	47 758	4 188

28. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten 1959 bis 1971

Diagnosegruppe	Bevölkerungs- gruppe		Neuzugänge im Jahr ¹⁾						
			1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
			Anzahl						
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	unter 15 Jahre	m	11	16	12	5	9	11	16
		w	9	16	14	6	8	16	11
	15 J.und älter	m	1 213	1 180	1 054	1 089	1 150	1 169	1 184
		w	545	434	431	355	446	399	398
	zusammen		1 778	1 646	1 511	1 455	1 593	1 595	1 609
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	unter 15 Jahre	m	-	1	2	4	3	5	3
		w	5	2	3	3	3	4	3
	15 J.und älter	m	274	244	251	191	250	243	264
		w	126	110	86	90	117	102	86
	zusammen		405	357	342	388	373	354	356
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	unter 15 Jahre	m	950	904	852	687	697	717	788
		w	780	759	818	624	611	608	669
	15 J.und älter	m	2 659	2 578	2 400	2 230	2 379	2 421	2 640
		w	1 998	1 768	1 707	1 437	1 497	1 477	1 610
	zusammen		6 387	6 009	5 777	4 978	5 184	5 223	5 707
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	unter 15 Jahre	m	961	921	866	696	709	733	807
		w	794	777	835	633	622	628	683
	15 J.und älter	m	4 146	4 002	3 705	3 510	3 759	3 833	4 088
		w	2 669	2 312	2 224	1 882	2 060	1 978	2 094
	zusammen		8 570	8 012	7 630	6 721	7 150	7 172	7 672
Tuberkulose anderer Organe (Id)	unter 15 Jahre	m	137	101	82	70	49	67	63
		w	119	105	85	71	56	52	50
	15 J.und älter	m	646	651	664	622	557	570	564
		w	847	858	850	781	736	782	742
	zusammen		1 749	1 715	1 681	1 544	1 398	1 471	1 419
Aktive Tuberkulose Alle Formen	unter 15 Jahre	m	1 098	1 022	948	766	758	800	870
		w	913	882	920	704	678	680	733
	15 J.und älter	m	4 792	4 653	4 569	4 132	4 316	4 403	4 652
		w	3 516	3 170	3 074	2 663	2 796	2 760	2 836
	zusammen		10 319	9 727	9 311	8 265	8 548	8 643	9 091
Verhältniszahlen auf									
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	unter 15 Jahre	m	1,3	1,8	1,5	0,5	0,9	1,1	1,6
		w	1,1	1,9	1,6	0,7	0,9	1,7	1,1
	15 J.und älter	m	45,0	42,7	38,0	38,5	39,1	39,8	39,5
		w	17,2	13,5	15,4	10,9	13,5	11,9	11,8
	zusammen		23,7	21,5	19,5	18,4	19,7	19,4	19,2
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	unter 15 Jahre	m	-	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3
		w	0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
	15 J.und älter	m	10,2	8,8	9,1	6,7	8,6	8,3	8,8
		w	4,0	3,4	2,7	2,8	3,5	3,1	2,5
	zusammen		5,4	4,7	4,4	3,6	4,6	4,3	4,3
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	unter 15 Jahre	m	113,2	104,0	94,9	73,7	72,4	72,3	77,5
		w	97,6	91,8	95,4	70,3	66,7	64,4	69,3
	15 J.und älter	m	98,7	93,3	86,5	78,5	82,3	82,3	88,0
		w	63,1	55,2	52,9	44,1	45,4	44,2	47,7
	zusammen		85,1	78,4	74,5	62,8	64,3	63,6	68,3
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	unter 15 Jahre	m	114,6	105,9	96,5	74,6	73,7	74,0	79,3
		w	99,4	94,0	97,4	71,3	67,9	66,5	70,7
	15 J.und älter	m	155,8	144,9	133,6	123,6	130,9	130,4	136,2
		w	84,2	72,1	68,9	57,7	62,5	59,2	62,0
	zusammen		114,2	104,5	98,4	84,8	88,6	87,3	91,8
Tuberkulose anderer Organe (Id)	unter 15 Jahre	m	16,3	11,6	9,1	7,5	5,1	6,8	6,2
		w	14,9	12,7	9,9	8,0	6,1	5,5	5,2
	15 J.und älter	m	24,0	23,6	23,9	21,9	19,3	19,4	18,8
		w	26,7	26,8	26,3	23,9	22,3	23,4	22,0
	zusammen		23,3	22,4	21,7	19,5	17,3	17,9	17,0
Aktive Tuberkulose Alle Formen	unter 15 Jahre	m	130,9	117,5	105,6	82,1	78,8	80,7	85,5
		w	114,2	106,7	107,3	79,3	74,0	72,0	75,9
	15 J.und älter	m	177,8	168,4	157,5	145,5	149,3	149,8	155,0
		w	111,0	98,9	95,3	81,6	84,8	82,6	84,0
	zusammen		137,6	126,9	120,1	104,3	106,0	105,2	108,7

1) Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ohne Wiedererkrankte.

Neuzugänge im Jahr ¹⁾						Bevölkerungs- gruppe	Diagnosegruppe
1966	1967	1968	1969	1970	1971		
Anzahl							
16 19 1 053 386 1 474	11 15 916 379 1 321	5 10 833 308 1 156	5 7 903 295 1 210	4 8 919 337 1 268	12 10 1 004 356 1 382	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
2 - 210 86 298	5 - 123 51 179	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
749 645 2 321 1 340 5 055	735 594 2 008 1 317 4 654	598 563 1 945 1 171 4 277	568 504 1 878 1 138 4 088	458 486 1 743 1 013 3 700	452 386 1 594 988 3 420	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
767 664 3 584 1 812 6 827	751 609 3 047 1 747 6 154	603 573 2 778 1 479 5 433	573 511 2 781 1 433 5 298	462 494 2 662 1 350 4 968	464 396 2 598 1 344 4 802	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
44 52 521 743 1 360	47 46 506 739 1 338	32 32 381 571 1 016	36 36 375 521 968	14 27 389 482 912	24 32 377 459 892	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Tuberkulose anderer Organe (Id)
811 716 4 105 2 555 8 187	798 655 3 553 2 486 7 492	635 605 3 159 2 050 6 449	609 547 3 156 1 954 6 266	476 521 3 051 1 832 5 880	488 428 2 975 1 803 5 694	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Aktive Tuberkulose Alle Formen
100 000 der Bevölkerung							
1,5 1,9 34,5 11,3 17,3	1,0 1,5 30,2 11,0 15,5	0,5 1,0 27,2 8,9 13,4	0,5 0,7 28,8 8,4 13,7	0,4 0,3 28,9 9,5 14,1	1,1 0,9 31,1 9,9 15,3	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
0,2 - 6,9 2,5 3,5	0,5 - 4,1 1,5 2,1	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
71,6 65,0 76,1 39,2 59,4	69,2 58,6 66,3 38,2 54,4	55,1 54,4 63,6 33,7 49,4	51,4 47,9 59,8 32,3 46,4	41,4 46,1 54,8 28,5 41,1	40,5 36,4 49,3 27,4 37,9	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
73,3 67,0 117,6 53,0 80,2	70,7 60,1 100,6 50,7 72,0	55,5 55,4 90,8 42,5 62,8	51,8 48,6 88,6 40,7 60,1	41,8 46,9 83,7 38,0 55,2	41,5 37,3 80,4 37,3 53,3	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
4,2 5,2 17,1 21,7 16,0	4,4 4,5 16,7 21,5 15,7	2,9 3,1 12,5 16,4 11,7	3,3 3,4 11,9 14,8 11,0	1,3 2,6 12,2 13,6 10,1	2,2 3,0 11,7 12,7 9,9	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Tuberkulose anderer Organe (Id)
77,6 72,2 134,7 74,7 96,2	75,1 64,7 117,3 72,2 87,6	58,5 58,5 103,2 58,9 74,5	55,1 52,0 100,5 55,5 71,1	43,1 49,5 95,9 51,5 65,4	43,7 40,3 92,1 50,0 63,2	unter 15 Jahre m w 15 J.und älter m w zusammen	Aktive Tuberkulose Alle Formen

29. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht 1971

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane								Tuberkulose anderer Organe insgesamt		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	mit Bakteriennachweis						ohne Bakterien- nachweis					
	im Ausstrich		in sonstiger Weise		insgesamt							
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Grundzahlen

unter 1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	3	3
1 - 5	2	-	1	1	3	1	87	77	5	6	95	84
5 - 10	2	3	2	1	4	4	256	230	10	11	270	245
10 - 15	1	6	5	2	6	8	138	117	9	15	153	140
15 - 20	38	36	12	9	50	45	169	172	23	21	242	238
20 - 25	102	52	17	14	119	66	276	198	34	45	429	309
25 - 30	102	42	16	4	118	46	173	145	51	55	342	246
30 - 35	130	45	19	4	149	49	235	150	63	63	447	262
35 - 40	118	26	18	4	136	30	214	107	69	50	419	187
40 - 45	118	27	14	6	132	33	232	93	58	52	422	178
45 - 50	91	20	24	11	115	31	180	99	48	55	343	185
50 - 55	68	20	15	7	83	27	137	73	23	44	243	144
55 - 60	72	18	21	6	93	24	166	80	27	41	286	145
60 - 65	89	21	35	4	124	25	211	77	33	43	368	145
65 - 70	81	24	26	5	107	29	147	52	17	36	271	117
70 und mehr	104	66	44	26	148	92	200	120	39	67	387	279
Insgesamt	1 118	406	269	104	1 387	510	2 824	1 792	509	605	4 720	2 907

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

unter 1	-	-	-	-	-	-	4,8	3,3	-	1,7	4,8	5,0
1 - 5	0,7	-	0,3	0,4	1,0	0,4	29,4	27,4	1,7	2,1	32,1	29,9
5 - 10	0,5	0,8	0,5	0,3	1,0	1,1	63,7	60,4	2,5	2,9	67,2	64,4
10 - 15	0,3	1,8	1,4	0,6	1,7	2,4	38,7	34,5	2,5	4,4	42,9	41,3
15 - 20	12,0	11,8	3,8	3,0	15,8	14,8	53,4	56,5	7,3	6,9	76,5	78,2
20 - 25	32,4	17,0	5,4	4,6	37,8	21,6	87,7	64,7	10,8	14,7	136,3	100,9
25 - 30	31,5	14,4	4,9	1,4	36,5	15,7	53,4	49,5	15,8	18,8	105,7	84,0
30 - 35	31,4	12,2	4,6	1,1	36,0	13,3	56,7	40,7	15,2	17,1	107,9	71,1
35 - 40	35,0	8,9	5,3	1,4	40,3	10,2	63,4	36,5	20,5	17,0	124,2	63,7
40 - 45	39,0	9,6	4,6	2,1	43,7	11,7	76,8	33,0	19,2	18,4	139,6	63,1
45 - 50	38,8	6,7	10,2	3,7	49,0	10,3	76,7	33,0	20,4	18,3	146,1	61,7
50 - 55	41,1	8,6	9,1	3,0	50,1	11,6	82,7	31,4	13,9	19,0	146,7	62,0
55 - 60	36,7	6,5	10,7	2,2	47,3	8,7	84,5	29,1	13,8	14,9	145,6	52,7
60 - 65	42,4	7,2	16,7	1,4	59,1	8,6	100,5	26,5	15,7	14,8	175,3	49,9
65 - 70	44,8	9,8	14,4	2,0	59,2	11,8	81,4	21,1	9,4	14,6	150,0	47,5
70 und mehr	44,1	16,1	18,7	6,3	62,8	22,3	84,8	29,1	16,5	16,3	164,1	67,7
Insgesamt	25,7	8,7	6,2	2,2	31,9	10,9	64,9	38,4	11,7	13,0	108,5	62,3

30. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter, Geschlecht und Art des Zugangs 1971

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane											
	ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis I a						nicht ansteckungsfähig I c					
	Neuzugänge				Wiedererkrankte		Neuzugänge				Wiedererkrankte	
	erstmalig bekannt gewordene		Zuzüge aus Kreisen ¹⁾				erstmalig bekannt gewordene		Zuzüge aus Kreisen ¹⁾			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Grundzahlen												
unter 1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
1 - 5	3	1	-	-	-	-	85	72	2	2	-	3
5 - 10	3	3	-	-	1	1	239	209	4	2	13	19
10 - 15	6	6	-	-	-	2	118	98	1	1	19	18
15 - 20	49	41	-	-	1	4	146	155	2	4	21	13
20 - 25	109	60	2	3	8	3	238	164	14	10	24	24
25 - 30	100	40	5	2	13	4	145	120	11	8	17	17
30 - 35	123	40	2	-	24	9	173	110	14	8	48	32
35 - 40	103	14	3	-	30	16	138	68	16	1	60	38
40 - 45	88	23	6	1	38	9	134	57	14	5	84	31
45 - 50	72	12	3	1	40	18	93	55	7	6	80	38
50 - 55	53	17	3	-	27	10	70	41	9	2	58	30
55 - 60	51	7	2	-	40	17	78	42	7	2	81	36
60 - 65	72	14	6	-	46	11	111	32	1	1	99	44
65 - 70	68	15	3	-	36	14	67	28	2	-	78	24
70 und mehr	78	66	3	-	67	26	101	67	3	2	96	51
Insgesamt	978	359	38	7	371	144	1 939	1 320	107	54	778	418

1) Außerhalb Baden-Württembergs.

Noch: 30. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter, Geschlecht und Art des Zugangs 1971

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe I d						Tuberkulose aller Formen insgesamt					
	Neuzugänge				Wiedererkrankte		Neuzugänge				Wiedererkrankte	
	erstmalig bekannt gewordene		Zuzüge aus Kreisen ¹⁾				erstmalig bekannt gewordene		Zuzüge aus Kreisen ¹⁾			
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Grundzahlen												
unter 1	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
1 - 5	5	6	-	-	-	-	93	79	2	2	-	3
5 - 10	10	11	-	-	-	-	252	223	4	2	14	20
10 - 15	9	14	-	-	-	1	133	118	1	1	19	21
15 - 20	21	21	-	-	2	-	216	217	2	4	24	17
20 - 25	29	37	1	2	4	6	376	261	17	15	36	33
25 - 30	42	47	3	2	6	6	287	207	19	12	36	27
30 - 35	44	51	2	2	17	10	340	201	18	10	89	51
35 - 40	55	38	1	2	13	10	296	120	20	3	103	64
40 - 45	38	35	-	-	20	17	260	115	20	6	142	57
45 - 50	31	40	-	1	17	14	196	107	10	8	137	70
50 - 55	16	35	-	-	7	9	139	93	12	2	92	49
55 - 60	18	30	-	1	9	10	147	79	9	3	130	63
60 - 65	25	32	-	1	8	10	208	78	7	2	153	65
65 - 70	14	30	-	-	3	6	149	73	5	-	117	44
70 und mehr	36	52	1	-	2	15	215	185	7	2	165	92
Insgesamt	393	480	8	11	108	114	3 310	2 159	153	72	1 257	676

1) Außerhalb Baden-Württembergs.

31. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken 1959 bis 1971

Diagnosegruppe	Regierungsbezirk Land	Neuzugänge im Jahr ¹⁾						
		1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
		Anzahl						
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	Nordwürttemberg	730	688	629	595	632	652	683
	Nordbaden	310	284	262	275	322	288	263
	Südbaden	384	364	338	353	378	368	379
	SüdWürttbg.-Hohenz.	354	310	282	232	261	287	284
	Baden-Württemberg	1 778	1 646	1 511	1 455	1 593	1 595	1 609
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)	Nordwürttemberg	172	116	160	138	164	155	136
	Nordbaden	93	99	78	55	86	107	105
	Südbaden	63	89	58	59	80	60	77
	SüdWürttbg.-Hohenz.	77	53	46	36	43	32	38
	Baden-Württemberg	405	357	342	288	373	354	356
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	Nordwürttemberg	2 190	2 158	1 938	1 711	1 585	1 745	1 882
	Nordbaden	1 399	1 440	1 243	1 108	1 193	1 304	1 311
	Südbaden	1 632	1 348	1 368	1 294	1 445	1 397	1 408
	SüdWürttbg.-Hohenz.	1 166	1 063	1 228	865	961	777	1 106
	Baden-Württemberg	6 387	6 009	5 777	4 978	5 184	5 223	5 707
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	Nordwürttemberg	3 092	2 962	2 727	2 444	2 381	2 552	2 701
	Nordbaden	1 802	1 823	1 583	1 438	1 601	1 699	1 679
	Südbaden	2 079	1 801	1 764	1 706	1 903	1 825	1 864
	SüdWürttbg.-Hohenz.	1 597	1 426	1 556	1 133	1 265	1 096	1 428
	Baden-Württemberg	8 570	8 012	7 630	6 721	7 150	7 172	7 672
Tuberkulose anderer Organe (Id)	Nordwürttemberg	701	658	700	552	540	550	550
	Nordbaden	318	303	297	350	288	305	278
	Südbaden	400	421	373	359	322	342	317
	SüdWürttbg.-Hohenz.	330	333	318	283	248	274	274
	Baden-Württemberg	1 749	1 715	1 681	1 544	1 398	1 471	1 419
Aktive Tuberkulose Alle Formen	Nordwürttemberg	3 793	3 620	3 427	2 996	2 921	3 102	3 251
	Nordbaden	2 120	2 136	1 873	1 788	1 889	2 004	1 957
	Südbaden	2 479	2 222	2 137	2 065	2 225	2 167	2 181
	SüdWürttbg.-Hohenz.	1 927	1 759	1 874	1 416	1 513	1 370	1 702
	Baden-Württemberg	10 319	9 727	9 311	8 265	8 548	8 643	9 091
Verhältniszahlen auf								
Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)	Nordwürttemberg	25,0	23,0	20,7	19,2	20,0	20,3	20,9
	Nordbaden	18,8	16,9	15,4	15,9	18,3	16,1	14,5
	Südbaden	24,4	22,7	20,8	21,3	22,4	21,3	21,5
	SüdWürttbg.-Hohenz.	26,1	22,3	21,3	16,2	18,2	19,3	18,7
	Baden-Württemberg	23,7	21,5	19,5	18,4	19,7	19,4	19,2
Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis	Nordwürttemberg	5,9	3,9	5,3	4,4	5,2	4,8	4,2
	Nordbaden	5,7	5,9	4,6	3,2	4,9	6,0	5,8
	Südbaden	4,0	5,5	3,6	3,6	4,7	3,5	4,4
	SüdWürttbg.-Hohenz.	5,7	3,8	3,5	2,5	3,0	2,2	2,5
	Baden-Württemberg	5,4	4,7	4,4	3,6	4,6	4,3	4,3
Nicht ansteckungsfähig (Ic)	Nordwürttemberg	74,9	72,1	63,8	55,1	50,2	54,3	57,5
	Nordbaden	85,0	85,9	73,3	64,1	67,9	72,9	72,3
	Südbaden	103,6	83,9	84,2	77,9	85,4	80,9	80,0
	SüdWürttbg.-Hohenz.	85,8	76,6	92,8	60,5	67,2	52,2	72,9
	Baden-Württemberg	85,1	78,4	74,5	62,8	64,3	63,6	68,3
Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)	Nordwürttemberg	105,8	99,0	89,8	78,7	75,3	79,4	82,6
	Nordbaden	109,5	108,7	93,3	83,2	91,1	95,0	92,6
	Südbaden	131,9	112,1	108,6	102,8	112,5	105,7	105,9
	SüdWürttbg.-Hohenz.	117,6	102,8	117,6	79,2	88,4	73,7	94,1
	Baden-Württemberg	114,2	104,5	98,4	84,8	88,6	87,3	91,8
Tuberkulose anderer Organe	Nordwürttemberg	24,0	22,0	23,1	17,8	17,1	17,1	16,8
	Nordbaden	19,3	18,1	17,1	20,2	16,4	17,1	15,3
	Südbaden	25,4	26,2	23,0	21,6	19,0	19,8	18,0
	SüdWürttbg.-Hohenz.	24,3	24,0	24,0	19,8	17,3	18,4	18,1
	Baden-Württemberg	23,3	22,4	21,7	19,5	17,3	17,9	17,0
Aktive Tuberkulose Alle Formen	Nordwürttemberg	129,8	120,9	112,9	96,5	92,4	96,5	99,4
	Nordbaden	128,8	126,8	110,4	103,4	107,5	112,1	108,0
	Südbaden	157,3	138,3	131,5	124,4	131,6	125,5	123,9
	SüdWürttbg.-Hohenz.	141,9	126,8	141,6	99,0	105,8	92,1	112,2
	Baden-Württemberg	137,6	126,9	120,1	104,3	106,0	105,2	108,7

1) Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ohne Wiedererkrankte.

Neuzugänge im Jahr ¹⁾						Regierungsbezirk Land	Diagnosegruppe
1966	1967	1968	1969	1970	1971		
Anzahl							
601	478	441	459	496	561	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
276	297	264	300	294	314	Nordbaden	
311	312	236	247	256	290	Südbaden	
286	234	215	208	222	217	Südwürttbg.-Hohenz.	
1 474	1 321	1 156	1 210	1 268	1 382	Baden-Württemberg	
104	55	Nordwürttemberg	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
105	77	Nordbaden	
66	39	Südbaden	
23	8	Südwürttbg.-Hohenz.	
298	179	Baden-Württemberg	
1 742	1 423	1 328	1 241	1 120	1 063	Nordwürttemberg	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
1 176	1 220	1 140	1 071	1 034	929	Nordbaden	
1 314	1 249	1 068	1 012	834	820	Südbaden	
823	762	741	764	712	608	Südwürttbg.-Hohenz.	
5 055	4 654	4 277	4 088	3 700	3 420	Baden-Württemberg	
2 447	1 956	1 769	1 700	1 616	1 624	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
1 557	1 594	1 404	1 371	1 328	1 243	Nordbaden	
1 691	1 600	1 304	1 255	1 090	1 110	Südbaden	
1 132	1 004	956	972	934	825	Südwürttbg.-Hohenz.	
6 827	6 154	5 433	5 298	4 968	4 802	Baden-Württemberg	
503	457	382	365	360	332	Nordwürttemberg	Tuberkulose anderer Organe (Id)
277	294	191	176	203	187	Nordbaden	
315	332	232	228	183	185	Südbaden	
265	255	211	199	166	188	Südwürttbg.-Hohenz.	
1 360	1 338	1 016	968	912	892	Baden-Württemberg	
2 950	2 413	2 151	2 065	1 976	1 956	Nordwürttemberg	Aktive Tuberkulose Alle Formen
1 834	1 888	1 595	1 547	1 531	1 430	Nordbaden	
2 006	1 932	1 536	1 483	1 273	1 295	Südbaden	
1 397	1 259	1 167	1 171	1 100	1 013	Südwürttbg.-Hohenz.	
8 187	7 492	6 449	6 266	5 880	5 694	Baden-Württemberg	
100 000 der Bevölkerung							
18,1	14,4	13,1	13,3	14,1	15,8	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane Ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis (Ia)
15,0	16,1	14,2	15,9	15,3	16,3	Nordbaden	
17,3	17,2	12,9	13,0	13,5	15,3	Südbaden	
18,5	15,0	13,6	12,9	13,5	13,2	Südwürttbg.-Hohenz.	
17,3	15,5	13,4	13,7	14,1	15,3	Baden-Württemberg	
3,1	1,7	Nordwürttemberg	Ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis (Ib)
5,7	4,2	Nordbaden	
3,7	2,2	Südbaden	
1,5	0,5	Südwürttbg.-Hohenz.	
3,5	2,1	Baden-Württemberg	
52,4	42,7	39,4	36,0	31,8	30,0	Nordwürttemberg	Nicht ansteckungsfähig (Ic)
63,9	66,0	61,1	56,6	53,7	48,1	Nordbaden	
73,3	69,0	58,2	54,2	43,8	43,3	Südbaden	
55,1	48,8	46,8	47,4	43,3	37,0	Südwürttbg.-Hohenz.	
59,4	54,4	49,4	46,4	41,1	37,9	Baden-Württemberg	
73,6	58,7	52,4	49,3	45,8	45,8	Nordwürttemberg	Tuberkulose der Atmungsorgane insgesamt (Ia - Ic)
84,6	86,3	75,3	72,5	69,0	64,4	Nordbaden	
94,3	88,4	71,0	67,3	57,3	58,6	Südbaden	
73,1	64,3	60,4	60,3	56,8	50,2	Südwürttbg.-Hohenz.	
80,2	72,0	62,8	60,1	55,2	53,3	Baden-Württemberg	
15,1	13,7	11,3	10,6	10,2	9,4	Nordwürttemberg	Tuberkulose anderer Organe (Id)
15,0	15,9	10,2	9,3	10,5	9,7	Nordbaden	
17,6	18,3	12,6	12,2	9,6	9,8	Südbaden	
17,1	16,3	13,3	12,3	10,1	11,4	Südwürttbg.-Hohenz.	
16,0	15,7	11,7	11,0	10,1	9,9	Baden-Württemberg	
88,7	72,5	63,7	59,9	56,1	55,2	Nordwürttemberg	Aktive Tuberkulose Alle Formen
99,6	102,2	85,5	81,8	79,5	74,1	Nordbaden	
111,9	106,7	83,7	79,5	66,9	68,4	Südbaden	
90,2	80,6	73,7	72,6	66,9	61,6	Südwürttbg.-Hohenz.	
96,2	87,6	74,5	71,1	65,4	63,2	Baden-Württemberg	

32. Zugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1959 und 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	ansteckungsfähig mit Bakteriennachweis I a									
	unter 15 Jahren		15 Jahre und älter				insgesamt			
			männlich		weiblich		Anzahl		auf 100 000 d.Bevölk.	
	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971
Stadtkreise										
Stuttgart ²⁾	.	5	217	149	102	42	319	196	51,0	30,9
Heilbronn ²⁾	.	.	41	5	18	4	59	9	24,3	8,8
Ulm ²⁾	.	.	46	14	8	3	54	17	31,4	18,2
Landkreise										
Aalen	.	.	15	14	5	2	20	16	14,5	10,0
Backnang	.	.	18	6	7	1	25	7	29,1	6,3
Böblingen	1	.	16	15	15	8	32	23	24,1	10,8
Crailsheim	1	.	18	8	9	3	28	11	44,3	16,0
Esslingen	2	1	32	49	21	20	55	70	29,3	27,4
Göppingen	.	.	31	20	8	4	39	24	19,9	10,5
Heidenheim	.	.	10	6	3	.	13	6	11,9	4,7
Heilbronn	.	.	.	11	.	6	.	17	.	8,6
Künzelsau	.	.	4	3	.	2	4	5	13,0	14,8
Leonberg	.	.	31	17	11	4	42	21	45,9	15,5
Ludwigsburg	.	.	52	33	20	9	75	42	32,5	13,6
Mergentheim	.	.	4	1	1	.	5	1	12,5	2,3
Nürtingen	.	1	25	7	8	3	33	11	26,5	6,8
Öhringen	.	.	11	3	3	1	14	4	32,6	8,1
Schwäbisch Gmünd	1	.	11	12	7	2	19	14	19,4	12,5
Schwäbisch Hall	.	.	7	2	3	.	10	2	17,1	3,1
Ulm	.	.	.	5	.	2	.	7	.	7,2
Vaihingen	.	1	8	8	8	2	16	11	22,4	11,6
Waiblingen	.	2	27	35	13	10	40	47	22,3	18,9
Reg.-Bez.Nordwürttemberg	8	10	624	423	270	128	902	561	30,9	15,8
Stadtkreise										
Karlsruhe ²⁾	3	1	68	26	27	14	98	41	24,9	15,8
Heidelberg ²⁾	1	.	47	12	20	11	68	23	25,4	19,0
Mannheim ²⁾	1	.	73	71	30	23	104	94	22,8	28,3
Pforzheim ²⁾	1	.	23	8	6	2	30	10	21,5	10,9
Landkreise										
Bruchsal	.	.	22	16	7	3	29	19	25,2	13,4
Buchen	.	1	20	6	10	1	30	8	48,9	11,9
Heidelberg	.	.	.	13	.	8	.	21	.	11,3
Karlsruhe	.	.	.	22	.	7	.	29	.	14,0
Mannheim	.	1	.	25	.	5	.	31	.	15,6
Mosbach	1	.	14	11	6	1	21	12	33,8	15,5
Pforzheim	.	.	.	5	.	2	.	7	.	9,3
Sinsheim	.	.	7	8	3	4	10	12	13,4	13,4
Tauberbischofsheim	.	.	6	6	7	1	13	7	17,2	8,4
Reg.-Bez.Nordbaden	7	3	280	229	116	82	403	314	24,5	16,3
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	2	1	27	22	13	10	42	33	30,7	20,0
Baden-Baden	.	.	7	8	6	3	13	11	32,0	29,6
Landkreise										
Bühl	.	1	10	14	9	10	19	25	24,4	26,9
Donauessingen	.	.	1	6	4	5	5	11	7,8	14,3
Emmendingen	1	.	27	9	14	3	42	12	41,9	9,9
Freiburg	.	.	36	13	23	3	59	16	79,2	16,7
Hochschwarzwald	.	.	7	3	1	1	8	4	19,0	8,7
Kehl	2	1	4	12	3	7	9	20	17,2	32,3
Konstanz	1	.	29	14	12	4	42	18	27,6	9,3
Lahr	.	.	11	10	4	3	15	13	19,1	14,5
Lörrach	2	1	20	8	6	4	28	13	21,2	8,3
Müllheim	.	.	6	4	2	4	8	8	15,0	12,5
Offenburg	.	.	19	16	12	7	31	23	31,8	20,1
Rastatt	.	1	14	10	3	3	17	19	14,9	13,2
Säckingen	1	.	13	5	6	2	20	7	31,3	9,2
Stockach	.	.	8	8	.	4	8	12	17,8	22,8
Überlingen	.	.	10	10	7	1	17	11	30,5	14,6
Villingen	.	1	7	6	6	2	13	9	16,3	8,9
Waldshut	.	.	20	8	8	1	28	9	43,5	12,3
Wolfach	.	.	15	11	8	5	23	16	41,8	27,7
Reg.-Bez.Südbaden	9	6	291	197	147	87	447	290	28,4	15,3
Landkreise										
Balingen	.	.	3	23	6	7	9	30	9,4	26,3
Biberach	.	.	15	4	7	4	22	8	23,7	6,9
Calw	.	.	38	20	18	3	56	23	49,1	15,7
Ehingen	1	.	4	4	2	1	7	5	16,4	9,8
Freudenstadt	.	.	3	4	2	1	5	5	8,7	7,5
Hechingen	.	.	41	6	15	2	56	8	112,4	13,7
Horb	.	.	11	2	5	1	16	3	39,1	6,1
Münsingen	.	.	6	3	9	.	15	3	38,9	7,1
Ravensburg	.	1	22	9	4	5	26	15	25,4	12,1
Reutlingen	.	.	24	23	7	10	31	33	20,2	17,1
Rottweil	.	.	27	17	13	8	40	25	33,3	18,0
Saulgau	.	1	34	4	20	.	54	5	83,0	6,9
Sigmaringen	.	.	6	1	7	.	13	1	27,6	0,8
Tettnang	.	1	7	3	5	5	12	9	17,1	9,8
Tübingen	.	.	23	16	12	4	35	20	29,3	13,3
Tuttlingen	.	.	15	10	2	6	17	16	22,5	17,5
Wangen	.	.	13	6	4	2	17	8	24,7	9,7
Reg.-Bez.Südwestfalen- Hohenzollern	1	3	292	155	138	59	431	217	31,7	13,2
Baden-Württemberg	25	22	1 487	1 004	671	356	2 183	1 382	29,1	15,3

1) Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose ohne Wiedererkrankte einschließlich Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs. - 2) 1959 einschließlich Landkreis.

Tuberkulose der Atmungsorgane										Kreis Regierungsbezirk Land
nicht ansteckungsfähig ohne Bakteriennachweis I c										
unter 15 Jahren		15 Jahre und älter				insgesamt				
		männlich		weiblich		Anzahl		auf 100 000 d.Bevölk.		
1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	
91	27	391	99	292	74	774	200	123,7	31,5	Stadtkreise
60	9	58	7	53	7	171	23	70,4	22,3	Stuttgart ²⁾
36	5	71	13	28	5	135	23	78,4	24,6	Heilbronn ²⁾
										Ulm
33	19	13	35	13	18	59	72	42,7	44,8	Landkreise
15	6	36	12	31	5	82	23	95,3	20,8	Aalen
16	8	32	30	36	11	84	49	63,4	22,9	Backnang
9	3	29	33	20	15	58	51	91,7	74,2	Böblingen
26	16	31	40	28	43	85	99	45,3	38,7	Craillsheim
19	5	41	28	16	15	76	48	38,7	21,0	Esslingen
9	9	16	11	7	17	32	37	29,3	29,2	Göppingen
.	9	.	13	.	9	.	31	.	15,7	Heidenheim
2	4	10	14	3	11	15	29	48,9	85,6	Heilbronn
14	9	51	21	34	9	99	39	108,2	28,7	Künzelsau
43	14	56	48	45	32	144	94	62,4	30,4	Leonberg
4	2	10	4	14	5	28	11	70,2	25,8	Ludwigsburg
12	9	18	13	24	8	54	30	43,3	18,4	Mergentheim
4	2	23	14	13	7	40	23	93,1	46,7	Nürtingen
34	10	25	19	29	9	88	38	89,8	33,8	Öhringen
8	3	12	9	13	8	39	20	64,9	31,0	Schwäbisch Gmünd
.	4	.	11	.	4	.	22	.	22,7	Schwäbisch Hall
8	7	16	14	11	7	35	28	48,9	29,6	Ulm
5	14	47	35	41	24	93	73	51,8	29,4	Vaihingen
448	194	986	526	756	345	2 190	1 063	74,9	30,0	Waiblingen
										Reg.-Bez.Nordwürttemberg
61	7	81	38	71	24	213	69	54,2	26,7	Stadtkreise ²⁾
87	5	117	20	84	16	288	41	107,7	33,8	Karlsruhe ²⁾
130	38	182	98	113	42	425	178	93,2	53,6	Heidelberg ²⁾
127	20	48	9	26	15	201	44	143,9	47,9	Mannheim ²⁾
										Pforzheim ²⁾
40	90	37	65	35	39	112	194	97,3	136,5	Landkreise
15	4	27	17	23	6	65	27	106,0	40,2	Bruchsal
.	32	.	26	.	22	.	80	.	43,1	Buchen
.	8	.	37	.	18	.	63	.	30,5	Heidelberg
.	17	.	27	.	23	.	67	.	33,7	Karlsruhe
29	6	10	7	4	4	43	17	69,1	21,9	Mannheim
	15		8	-	7		30		39,8	Mosbach
6	13	9	42	7	20	22	80	29,5	89,5	Pforzheim
6	8	11	22	13	9	30	39	39,6	47,0	Sinsheim
501	268	522	416	376	245	1 399	929	85,0	48,1	Tauberbischofsheim
										Reg.-Bez.Nordbaden
35	5	42	41	42	34	119	80	87,0	48,6	Stadtkreise
22	9	13	5	11	2	46	16	113,3	43,1	Freiburg im Breisgau
										Baden-Baden
63	8	34	18	22	5	119	31	152,6	33,4	Landkreise
3	2	20	3	6	-	29	5	45,1	6,5	Bühl
23	11	82	11	32	7	137	29	136,6	24,0	Donaueschingen
40	6	81	22	53	17	174	45	233,5	46,8	Emmendingen
12	2	26	3	31	12	69	17	163,5	36,9	Freiburg
16	3	16	15	17	9	49	27	93,7	43,6	Hochschwanzwald
26	16	32	39	29	21	87	76	57,2	39,4	Kehl
9	8	38	32	39	27	86	67	109,4	74,9	Konstanz
56	75	30	28	25	14	111	117	84,2	74,5	Lahr
34	5	24	14	12	4	70	23	131,6	36,0	Lörrach
13	3	56	27	48	9	117	39	120,0	34,1	Müllheim
14	28	25	23	9	15	48	66	42,2	45,9	Offenburg
20	1	15	28	20	24	55	56	86,0	73,5	Rastatt
11	7	18	6	15	6	44	19	98,2	36,1	Säckingen
19	2	33	9	26	5	78	16	139,8	21,2	Stockach
4	3	25	10	13	5	42	18	52,7	17,9	Überlingen
22	4	40	11	28	12	90	27	139,8	36,8	Villingen
15	4	28	32	19	10	62	46	120,6	79,6	Waldshut
457	205	678	377	497	238	1 632	820	103,6	43,3	Wolfach
										Reg.-Bez.Südbaden
10	6	7	22	7	6	24	34	25,1	29,8	Landkreise
50	2	32	13	18	12	100	27	103,2	23,2	Balingen
19	5	89	25	72	11	180	41	157,8	27,9	Biberach
6	2	13	8	11	6	30	16	70,3	31,2	Calw
4	4	4	4	4	4	12	12	20,9	18,0	Ehingen
22	1	39	6	45	6	106	13	212,7	22,3	Freudenstadt
8	2	9	6	7	6	24	14	58,6	28,5	Hechingen
5	25	7	28	5	12	17	65	44,1	153,5	Horb
35	13	27	18	25	14	87	45	84,9	36,3	Münsingen
13	28	45	14	33	12	91	54	59,3	28,0	Ravensburg
22	14	35	10	21	9	78	33	65,0	23,8	Reutlingen
12	3	57	15	55	6	124	24	190,5	33,1	Rottweil
42	7	21	17	22	15	85	39	180,7	69,7	Saulgau
28	22	21	16	12	4	61	42	87,0	45,7	Signaringen
1	19	26	20	8	10	38	49	31,9	32,6	Tettang
27	8	27	28	14	19	68	55	89,8	60,1	Tübingen
17	10	14	25	10	10	41	45	59,5	54,8	Tuttlingen
										Wangen
324	171	473	275	369	162	1 166	608	85,9	37,0	Reg.-Bez.Südwürttemberg-Hohenzollern
1 730	838	2 659	1 594	1 998	988	6 387	3 420	85,1	37,9	Baden-Württemberg

Noch: 32. Zugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Kreisen 1959 und 1971

Kreise Regierungsbezirke Land	Tuberkulose anderer Organe Id									
	unter 15 Jahren		15 Jahre und älter				insgesamt			
			männlich		weiblich		Anzahl		auf 100 000 d. Bevölk.	
	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971
Stadtkreise										
Stuttgart ²⁾	9	4	62	30	62	33	133	67	21,3	10,6
Heilbronn	14	-	26	5	24	4	64	9	26,4	8,8
Ulm ²⁾	5	1	9	-	28	7	42	8	24,4	8,6
Landkreise										
Aalen	6	3	10	6	9	11	25	20	18,1	12,5
Backnang	1	-	8	2	14	5	23	7	26,7	6,3
Böblingen	3	1	8	9	12	12	23	22	17,4	10,3
Crailsheim	3	-	5	1	4	4	12	5	19,0	7,3
Esslingen	3	1	18	12	16	19	37	32	19,7	12,5
Göppingen	3	-	19	8	18	8	40	16	20,4	7,0
Heidenheim	1	1	8	6	20	2	29	9	26,6	7,1
Heilbronn	-	-	-	5	-	10	-	15	-	7,6
Künzelsau	2	-	-	-	5	1	7	1	22,8	3,0
Leonberg	3	2	16	7	13	8	32	17	35,0	12,5
Ludwigsburg	16	1	33	15	22	19	71	35	30,8	11,3
Mergentheim	1	1	3	2	6	-	10	3	25,1	7,0
Nürtingen	-	1	7	8	12	8	19	17	15,2	10,4
Öhringen	1	-	5	1	2	-	8	1	18,6	2,0
Schwäbisch Gmünd	4	-	10	4	13	7	27	11	27,5	9,8
Schwäbisch Hall	4	1	3	-	10	1	17	2	29,0	3,1
Ulm	-	1	-	2	-	5	-	8	-	8,3
Vaihingen	5	-	7	8	10	3	22	11	30,7	11,6
Waiblingen	6	3	28	6	26	7	60	16	33,4	6,4
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	90	21	285	137	326	174	701	332	24,0	9,4
Stadtkreise ²⁾										
Karlsruhe	4	-	18	11	33	7	55	18	14,0	7,0
Heidelberg	3	1	19	3	38	3	60	7	22,4	5,8
Mannheim ²⁾	15	1	25	18	46	19	86	38	18,9	11,4
Pforzheim ²⁾	6	-	17	4	18	6	41	10	29,3	10,9
Landkreise										
Bruchsal	2	-	7	2	10	6	19	8	16,5	5,6
Buchen	1	-	7	4	2	5	10	9	16,3	13,4
Heidelberg	-	2	-	9	-	6	-	17	-	9,2
Karlsruhe	-	-	-	17	-	19	-	36	-	17,4
Mannheim	-	-	-	8	-	7	-	15	-	7,5
Mosbach	2	2	8	3	10	5	20	10	32,2	12,9
Pforzheim	-	-	-	2	-	1	-	3	-	4,0
Sinsheim	2	2	4	2	4	4	10	8	13,4	9,0
Tauberbischofsheim	1	-	8	3	8	5	17	8	22,5	9,6
Reg.-Bez. Nordbaden	36	8	113	86	169	93	318	187	19,3	9,7
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	1	1	17	4	21	8	39	13	28,5	7,9
Baden-Baden	3	-	2	2	3	4	8	6	19,7	16,2
Landkreise										
Bühl	9	1	5	6	6	1	20	8	25,6	8,6
Donaueschingen	2	-	6	4	5	4	13	8	20,2	10,4
Emmendingen	4	-	13	3	16	7	33	10	32,9	8,3
Freiburg	3	-	8	7	10	10	21	17	28,2	17,7
Hochschwarzwald	-	-	2	1	1	1	3	2	7,1	4,3
Kehl	1	-	2	4	-	8	3	12	5,7	19,4
Konstanz	8	3	16	5	25	12	49	20	32,2	10,4
Lahr	4	-	1	5	5	4	10	9	12,7	10,1
Lörrach	4	1	13	3	24	4	41	8	31,1	5,1
Müllheim	3	-	6	2	9	3	18	5	33,8	7,8
Offenburg	9	2	6	4	9	5	24	11	24,6	9,6
Rastatt	3	-	9	6	8	9	20	15	17,6	10,4
Säckingen	1	-	9	1	18	3	28	4	43,8	5,3
Stockach	4	1	-	4	1	3	5	8	11,2	15,2
Überlingen	1	-	3	1	9	7	13	8	23,3	10,6
Villingen	-	1	7	3	10	3	17	7	21,4	7,0
Waldshut	4	1	11	4	13	3	28	8	43,5	10,9
Wolfach	-	-	2	3	5	3	7	6	13,6	10,4
Reg.-Bez. Südbaden	64	11	138	72	198	102	400	185	25,4	9,8
Landkreise										
Balingen	3	1	5	5	6	6	14	12	14,6	10,5
Biberach	6	-	8	5	15	8	29	13	29,9	11,2
Calw	4	1	12	5	16	3	32	9	28,0	6,1
Ehingen	-	-	4	1	5	2	9	3	21,1	5,9
Freudenstadt	-	1	2	2	1	-	3	3	5,2	4,5
Hechingen	-	1	1	4	2	6	3	11	6,0	18,9
Horb	-	1	3	1	7	1	10	3	24,4	6,1
Münsingen	1	1	5	-	3	2	9	3	23,4	7,1
Ravensburg	19	1	15	1	14	8	48	10	46,8	8,1
Reutlingen	3	-	11	8	22	13	36	21	23,5	10,9
Rottweil	-	2	7	14	4	10	11	26	9,2	18,7
Saulgau	3	1	3	3	11	9	17	13	26,1	17,9
Sigmaringen	3	1	5	4	8	3	16	8	34,0	14,3
Tettnang	6	2	7	6	5	5	18	13	25,7	14,1
Tübingen	-	1	8	16	14	7	22	24	18,4	15,9
Tuttlingen	5	-	7	5	8	7	20	12	26,4	13,1
Wangen	13	2	7	2	13	-	33	4	47,9	4,9
Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern	66	16	110	82	154	90	330	188	24,3	11,4
Baden-Württemberg	256	56	646	377	847	459	1 749	892	23,3	9,9

1) Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose ohne Wiedererkrankte einschließlich Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs. - 2) 1959 einschließlich Landkreis.

Aktive Tuberkulose Ia - Id insgesamt										Kreis Regierungsbezirk Land
unter 15 Jahren		15 Jahre und älter				insgesamt				
		männlich		weiblich		Anzahl		auf 100 000 d.Bevölk.		
1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	1959	1971	
100	36	670	278	456	149	1 226	463	195,9	72,9	Stadtkreise
74	9	125	17	95	15	294	41	121,1	40,1	Stuttgart
41	6	126	27	64	15	231	48	134,2	51,4	Heilbronn 2)
										Ulm 2)
39	22	38	55	27	31	104	108	75,2	67,2	Landkreise
16	6	62	20	52	11	130	37	151,1	33,5	Aalen
20	9	56	54	63	31	139	94	104,9	44,0	Backnang
13	3	52	42	33	22	98	67	155,0	97,5	Böblingen
31	18	81	101	65	82	177	201	94,3	78,5	Crailsheim
22	5	91	56	42	27	155	88	79,0	38,5	Esslingen
10	10	34	23	30	19	74	52	67,8	41,0	Göppingen
.	9	.	29	.	25	.	63	.	31,9	Heidenheim
4	4	14	17	8	14	26	35	84,8	103,3	Heilbronn
17	11	98	45	58	21	173	77	189,1	56,7	Künzelsau
52	15	141	96	87	60	290	171	125,7	55,2	Leonberg
5	3	17	7	21	5	43	15	107,7	35,1	Ludwigsburg
12	11	50	28	44	19	106	58	85,0	35,6	Mergentheim
5	2	39	18	18	8	62	28	144,3	56,9	Nürtingen
39	10	16	35	49	18	134	63	136,7	56,0	Öhringen
12	4	22	11	31	9	65	24	111,0	37,2	Schwäbisch Gmünd
.	5	.	21	.	11	.	37	.	38,2	Schwäbisch Hall
13	8	31	30	29	12	73	50	102,0	52,9	Ulm
.11	19	102	76	80	41	193	136	107,4	54,7	Vaihingen
										Waiblingen
546	225	1 895	1 086	1 352	645	3 793	1 956	129,8	55,2	Reg.-Bez.Nordwürttemberg
68	8	167	75	131	45	366	128	93,1	49,5	Stadtkreise
91	6	183	35	142	30	416	71	155,5	58,5	Karlsruhe 2)
146	39	280	187	189	84	615	310	134,8	93,4	Heidelberg 2)
134	20	88	21	50	23	272	64	194,7	69,6	Mannheim 2)
										Pforzheim 2)
42	90	66	83	52	48	160	221	139,0	155,5	Landkreise
16	5	54	27	35	12	105	44	171,3	65,5	Bruchsal
.	34	.	48	.	36	.	118	.	63,6	Buchen
.	8	.	76	.	44	.	128	.	62,0	Heidelberg
.	18	.	60	.	35	.	113	.	56,8	Karlsruhe
32	8	32	21	20	10	84	39	135,1	50,3	Mannheim
.	15	.	15	.	10	.	40	.	53,0	Mosbach
8	20	20	52	14	28	42	100	56,2	111,8	Pforzheim
7	8	25	31	28	15	60	54	79,3	65,0	Sinsheim
										Tauberbischofsheim
544	279	915	731	661	420	2 120	1 430	128,8	71,1	Reg.-Bez.Nordbaden
38	7	86	67	76	52	200	126	146,1	76,5	Stadtkreise
25	9	22	15	20	9	67	33	165,0	88,8	Freiburg im Breisgau
										Baden-Baden
72	10	49	38	37	16	158	64	202,6	69,0	Landkreise
5	2	27	13	15	9	47	24	73,0	31,3	Bühl
28	11	122	23	62	17	212	51	211,3	42,2	Donaueschingen
43	6	125	42	86	30	254	78	340,8	81,2	Emmendingen
12	2	35	7	33	14	80	23	189,6	49,9	Freiburg
19	4	22	31	20	24	61	59	116,7	95,2	Hochschwarzwald
35	19	77	58	66	37	178	114	117,1	59,0	Kehl
13	8	50	47	48	34	111	89	141,2	99,6	Konstanz
62	77	63	39	55	22	180	138	136,6	87,9	Lahr
37	5	36	20	23	11	96	36	180,5	56,3	Lörrach
22	5	81	47	69	21	172	73	176,4	63,8	Müllheim
17	29	48	39	20	32	85	100	74,7	69,5	Offenburg
22	4	37	34	44	29	103	67	161,1	87,9	Rastatt
15	8	26	18	16	13	57	39	127,2	74,1	Säckingen
20	2	46	20	42	13	108	35	193,5	46,3	Stockach
4	5	39	19	29	10	72	34	90,4	33,8	Überlingen
26	5	71	23	49	16	146	44	226,8	59,9	Villingen
15	4	45	46	32	18	92	68	179,0	117,6	Waldshut
										Wolfach
530	222	1 107	646	842	427	2 479	1 295	157,3	68,4	Reg.-Bez.Südbaden
13	7	15	50	19	19	47	76	49,1	66,5	Landkreise
56	2	55	22	40	24	151	48	155,8	41,2	Balingen
23	6	139	50	106	17	268	73	234,9	49,8	Biberach
7	2	21	13	18	9	46	24	107,8	46,8	Calw
4	5	9	10	7	5	20	20	34,8	30,1	Ehingen
22	2	81	16	62	14	165	32	311,1	54,8	Freudenstadt
8	3	23	9	19	8	50	20	122,1	40,7	Hechingen
6	26	18	31	17	14	41	71	106,4	167,7	Horb
54	15	64	28	43	27	161	70	157,0	56,5	Münsingen
16	28	80	45	62	35	158	108	103,0	56,1	Ravensburg
22	16	69	41	38	27	129	84	107,5	60,5	Reutlingen
15	5	94	22	86	15	195	42	299,6	57,9	Rottweil
45	8	32	22	37	18	114	48	242,4	86,8	Saulgau
34	25	35	25	22	14	91	64	129,8	69,6	Sigmaringen
4	20	57	52	34	21	95	93	79,7	61,8	Tettnang
32	8	49	43	24	32	105	83	138,7	90,7	Tübingen
30	12	34	33	27	12	91	57	132,1	69,4	Tuttlingen
										Wangen
391	190	875	512	661	311	1 927	1 013	141,9	61,6	Reg.-Bez.Südwürttemberg- Hohenzollern
2 011	916	4 792	2 975	3 516	1 803	10 319	5 694	137,6	114,5	Baden-Württemberg

33. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten in den Regierungsbezirken nach Art des Zugangs 1971

Art des Zugangs	Ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane Ia		Nicht ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane Ic				Tuber- kulose anderer Organe I d	Tuberkulose alle Formen	
	insgesamt	dar. durch Röntgen- reihen- untersuchung ermittelt	%	insgesamt	dar. durch Röntgen- reihen- untersuchung ermittelt	%		insgesamt	darunter Ausländer
Baden-Württemberg									
Erstmals bekannt gewordene ¹⁾ Tuberkulose	1 337	135	10,1	3 259	606	18,6	873	5 469	1 044
Wiedererkrankte	515	21	4,1	1 196	74	6,2	222	1 933	125
darunter Übergänge aus IIa und IIb	396	15	3,8	1 039	40	3,9	138	1 573	100
Zugänge aus anderen Bundes- ländern	45	-	-	161	-	-	19	225	50
Zugänge insgesamt	1 897	156	8,2	4 616	680	14,7	1 114	7 627	1 219
Regierungsbezirk Nordwürttemberg									
Erstmals bekannt gewordene ¹⁾ Tuberkulose	547	61	11,2	1 008	218	21,6	322	1 877	475
Wiedererkrankte	193	6	3,1	386	24	6,2	89	668	68
darunter Übergänge aus IIa und IIb	139	2	1,4	305	2	0,7	54	498	49
Zugänge aus anderen Bundes- ländern	14	-	-	55	-	-	10	79	18
Zugänge insgesamt	754	67	8,9	1 449	242	16,7	421	2 624	561
Regierungsbezirk Nordbaden									
Erstmals bekannt gewordene ¹⁾ Tuberkulose	308	18	5,8	901	76	8,4	185	1 394	247
Wiedererkrankte	138	1	0,7	395	12	3,0	42	575	29
darunter Übergänge aus IIa und IIb	117	1	0,9	365	10	2,7	30	512	26
Zugänge aus anderen Bundes- ländern	6	-	-	28	-	-	2	36	11
Zugänge insgesamt	452	19	4,2	1 324	88	6,7	229	2 005	287
Regierungsbezirk Südbaden									
Erstmals bekannt gewordene ¹⁾ Tuberkulose	278	35	12,6	783	194	24,8	183	1 244	148
Wiedererkrankte	93	4	4,3	235	18	7,7	53	381	15
darunter Übergänge aus IIa und IIb	60	3	5,0	201	10	5,0	25	286	12
Zugänge aus anderen Bundes- ländern	12	-	-	37	-	-	2	51	8
Zugänge insgesamt	383	39	10,2	1 055	212	20,1	238	1 676	171
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern									
Erstmals bekannt gewordene ¹⁾ Tuberkulose	204	21	10,3	567	118	20,8	183	954	174
Wiedererkrankte	91	10	11,0	180	20	11,1	38	309	13
darunter Übergänge aus IIa und IIb	80	9	11,3	168	18	10,7	29	277	13
Zugänge aus anderen Bundes- ländern	13	-	-	41	-	-	5	59	13
Zugänge insgesamt	308	31	10,1	788	138	17,5	226	1 322	200

1) Ohne Zuzüge aus Kreisen des Landes.

34. Zugänge¹⁾ der an sonstiger aktiver endothorakaler Tuberkulose Erkrankten nach Form der Tuberkulose und Geschlecht 1971

Diagnosegruppe	Personen						Davon im Alter von ...							
							unter 15 Jahren				15 Jahren und darüber			
	insgesamt	%	männl.	%	weibl.	%	männl.	%	weibl.	%	männl.	%	weibl.	%
Nicht BCG geschützte tuberkulinpositive Reagenten	12	0,4	8	0,4	4	0,3	8	1,8	4	1,0	-	-	-	-
Endothorakale Lymphknotentuberkulose	614	18,0	329	16,1	285	20,7	290	64,2	263	68,1	39	2,5	22	2,2
Pleuritis exsudative tuberkulöser Ursache	344	10,1	190	9,3	154	11,2	14	3,1	8	2,1	176	11,0	146	14,8
Miliartuberkulose	22	0,6	8	0,4	14	1,0	2	0,4	2	0,5	6	0,4	12	1,2
Sonstige aktive endothorakale Tuberkulose	2 428	70,9	1 511	73,8	917	66,8	138	30,5	109	28,3	1 373	86,1	808	81,8
Nicht ansteckungsfähige endothorakale Tuberkulose insgesamt	3 420	100	2 046	100	1 374	100	452	100	386	100	1 594	100	988	100

1) Erstmals als bekannt gewordene Tuberkulose ohne Wiedererkrankte einschließlich Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs.

35. Zugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten nach Form der Tuberkulose und Geschlecht 1971

Diagnosegruppe	Personen						Davon im Alter von ...							
							unter 15 Jahren				15 Jahren und darüber			
	insgesamt	%	männl.	%	weibl.	%	männl.	%	weibl.	%	männl.	%	weibl.	%
Knochen- und Gelenktuberkulose	139	15,6	74	18,5	65	13,2	4	16,7	3	9,4	70	18,6	62	13,5
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	274	30,7	93	23,2	181	36,9	13	54,1	17	53,2	80	21,2	164	35,7
Hauttuberkulose	28	3,1	16	4,0	12	2,4	-	-	1	3,1	16	4,2	11	2,4
Meningitis-Tuberkulose	32	3,6	15	3,7	17	3,5	4	16,7	9	28,1	11	2,9	8	1,7
Uro- und Genital-Tuberkulose	310	34,8	166	41,4	144	29,3	3	12,5	1	3,1	163	43,3	143	31,2
Sonstige Organtuberkulose	109	12,2	37	9,2	72	14,7	-	-	1	3,1	37	9,8	71	15,5
Extrapulmonale Tuberkulose insgesamt	892	100	401	100	491	100	24	100	32	100	377	100	459	100

1) Erstmals bekanntgewordene Tuberkulose ohne Wiedererkrankte einschließlich Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs.

36. Zugänge der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer nach Alter und Geschlecht 1971

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe I d		Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckungsfähig I a		nicht ansteckungsfähig I c					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Grundzahlen								
unter 1	-	-	1	1	-	-	1	1
1 - 5	2	-	24	20	1	3	27	23
5 - 10	-	-	38	32	2	1	40	33
10 - 15	-	-	11	11	-	1	11	12
15 - 20	6	6	23	18	4	3	33	27
20 - 25	39	20	62	45	11	15	112	80
25 - 30	30	9	63	45	18	27	111	81
30 - 35	39	9	63	28	25	21	127	58
35 - 40	32	4	53	14	39	18	124	36
40 - 45	26	9	57	16	11	11	94	36
45 - 50	25	3	25	9	9	7	59	19
50 - 55	9	1	18	4	3	3	30	8
55 - 60	3	-	9	2	-	1	12	3
60 - 65	3	-	4	2	-	-	7	2
65 - 70	3	-	1	-	-	-	4	-
70 und mehr	4	-	2	1	1	-	7	1
Insgesamt	221	61	454	248	124	111	799	420

Verhältniszahlen auf 100 000 der Ausländer

unter 1	-	-	10,2	10,7	-	-	10,2	10,7
1 - 5	7,4	-	88,6	78,3	3,7	11,8	99,7	90,1
5 - 10	-	-	152,4	138,2	8,0	4,3	160,4	142,5
10 - 15	-	-	63,0	64,4	-	5,9	63,0	70,2
15 - 20	20,7	22,4	79,4	67,2	13,8	11,2	113,9	100,9
20 - 25	74,2	39,3	117,9	88,5	20,9	29,5	213,1	157,4
25 - 30	42,7	21,9	89,7	109,6	25,6	65,8	158,1	197,3
30 - 35	53,3	27,4	86,1	85,3	34,2	64,0	173,5	176,7
35 - 40	53,9	16,2	89,3	56,6	65,7	72,7	209,0	145,5
40 - 45	66,0	51,7	144,6	91,8	27,9	63,1	238,5	206,6
45 - 50	109,1	25,3	109,1	75,9	39,3	59,0	257,4	160,2
50 - 55	79,5	17,5	158,9	70,1	26,5	52,5	264,9	140,1
55 - 60	41,4	-	124,1	54,6	-	27,3	165,5	81,9
60 - 65	75,2	-	100,3	70,7	-	-	175,4	70,7
65 - 70	160,4	-	53,5	-	-	-	213,9	-
70 und mehr	168,8	-	84,4	27,1	42,2	-	295,4	27,1
Insgesamt	48,8	20,4	100,3	83,0	27,4	37,2	176,5	140,6

37. Diagnoseübergänge von der Gruppe nicht ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane (Ic) nach der Gruppe ansteckungsfähige Tuberkulose der Atmungsorgane (Ia) in den Kreisen 1968 und 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Anzahl						In % der Zugänge ¹⁾					
	1968			1971			1968			1971		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Stadtkreise												
Stuttgart	33	28	5	26	16	10	8,8	10,9	4,2	6,6	6,0	7,6
Heilbronn	7	5	2	12	10	2	9,9	11,6	7,1	37,5	55,6	14,3
Ulm	19	13	6	7	5	2	44,2	44,8	42,9	17,5	16,7	20,0
Landkreise												
Aalen	11	8	3	12	10	2	18,0	20,5	13,6	13,6	16,4	7,4
Bachnang	7	4	3	4	4	-	19,4	16,0	27,3	13,3	18,2	-
Böblingen	10	6	4	10	7	3	18,2	15,8	23,5	13,9	14,0	13,6
Crailsheim	2	2	-	16	13	3	4,1	6,1	-	25,8	31,7	14,3
Esslingen	19	11	8	6	5	1	22,6	20,0	27,6	3,6	5,2	1,4
Göppingen	9	5	4	13	11	2	13,2	13,5	12,9	18,1	21,2	10,0
Heidenheim	13	10	3	12	8	4	31,7	40,0	18,8	27,9	38,1	18,2
Heilbronn	33	27	6	6	4	2	21,3	30,0	9,2	12,5	14,3	10,0
Künzelsau	2	2	-	2	2	-	16,7	40,0	-	5,9	10,0	-
Leonberg	16	14	2	8	6	2	16,5	22,6	5,7	13,3	14,3	11,1
Ludwigsburg	29	24	5	21	18	3	15,9	19,5	8,5	15,4	20,0	6,5
Mergentheim	10	7	3	1	1	-	47,6	46,7	50,0	8,3	14,3	-
Nürtingen	8	4	4	8	7	1	7,7	6,0	10,8	19,5	25,9	7,1
Öhringen	5	4	1	9	7	2	31,3	44,4	14,3	33,3	41,2	20,0
Schwäbisch Gmünd	9	6	3	7	5	2	16,4	19,4	12,5	13,5	13,9	12,5
Schwäbisch Hall	4	2	2	-	-	-	21,1	13,3	50,0	-	-	-
Ulm	3	2	1	6	5	1	10,3	11,1	9,1	20,7	25,0	11,1
Vaihingen	9	7	2	8	6	2	27,3	35,0	15,4	20,5	22,2	16,7
Waiblingen	12	8	4	13	10	3	7,4	7,8	6,6	10,8	12,7	7,3
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	270	199	71	207	160	47	15,3	17,5	11,3	12,8	15,1	8,4
Stadtkreise												
Karlsruhe	11	10	1	7	7	-	7,7	10,8	2,0	6,4	10,5	-
Heidelberg	5	5	-	4	2	2	5,8	10,2	-	6,3	5,9	6,7
Mannheim	63	47	16	39	33	6	22,3	27,7	14,2	14,3	17,8	6,9
Pforzheim	17	15	2	7	5	2	10,4	13,8	3,7	13,0	18,5	7,4
Landkreise												
Bruchsal	20	16	4	18	15	3	9,4	11,6	5,3	8,5	10,9	4,0
Buchen	5	4	1	2	2	-	18,5	20,0	14,3	5,7	7,7	-
Heidelberg	7	6	1	8	7	1	7,1	10,2	2,6	7,9	13,0	2,1
Karlsruhe	30	22	8	13	12	1	22,4	24,4	18,2	14,1	20,0	3,1
Mannheim	22	14	8	20	17	3	22,9	21,9	25,0	20,4	28,3	7,9
Mosbach	4	2	2	1	1	-	12,5	8,7	22,2	3,5	4,4	-
Pforzheim	5	3	2	5	5	-	12,2	13,0	11,1	13,5	23,8	-
Sinsheim	7	4	3	4	4	-	10,9	11,4	10,3	4,4	6,7	-
Tauberbischofsheim	7	7	-	4	2	2	30,4	43,8	-	8,7	6,1	15,4
Reg.-Bez. Nordbaden	203	155	48	132	112	20	14,5	17,4	9,3	10,6	14,2	4,4
Stadtkreise												
Freiburg im Breisgau	17	9	8	8	6	2	11,3	10,7	11,9	7,1	9,4	4,1
Baden-Baden	5	4	1	1	-	1	17,2	21,1	10,0	3,7	-	12,5
Landkreise												
Bühl	12	11	1	9	9	-	14,3	20,4	3,3	16,1	25,0	-
Donauwiesingen	5	4	1	2	2	-	6,9	7,3	5,6	12,5	18,2	-
Emmendingen	7	6	1	7	6	1	9,7	15,4	3,0	17,1	24,0	6,3
Freiburg	12	10	2	8	5	3	27,9	38,5	11,8	13,1	13,5	12,5
Hochschwarzwald	4	3	1	1	1	-	23,5	23,1	25,0	4,8	14,3	-
Kehl	16	10	6	7	5	2	15,5	15,2	16,2	14,9	17,2	11,1
Konstanz	14	14	-	16	12	4	23,0	35,0	-	17,0	20,0	11,8
Lahr	8	5	3	9	5	4	21,1	20,8	21,4	11,3	10,6	12,1
Lörrach	21	17	4	13	8	5	15,2	21,3	6,9	10,0	11,6	8,2
Müllheim	17	8	9	4	3	1	39,5	29,6	56,3	12,9	14,3	10,0
Offenburg	14	12	2	15	12	3	10,3	14,0	4,0	24,2	26,1	18,8
Rastatt	16	14	2	10	8	2	15,8	28,6	3,9	11,8	17,8	5,0
Säckingen	10	7	3	10	5	5	16,1	18,4	12,5	15,9	14,3	17,9
Stockach	7	5	2	3	2	1	30,4	38,5	20,0	9,7	12,5	6,7
Überlingen	11	6	5	5	3	2	42,3	30,0	83,3	18,5	15,8	25,0
Villingen	3	3	-	2	2	-	7,7	13,6	-	7,4	11,1	-
Waldshut	16	13	3	5	2	3	55,2	65,0	33,3	13,9	9,5	20,0
Wolfach	6	5	1	4	1	3	16,7	20,0	9,1	6,5	2,2	18,8
Reg.-Bez. Südbaden	221	166	55	139	97	42	17,0	20,8	10,9	12,5	14,5	9,6
Landkreise												
Balingen	4	2	2	1	1	-	12,9	10,0	18,2	1,6	2,1	-
Biberach	10	8	2	5	3	2	17,5	27,6	7,1	14,3	16,7	11,8
Calw	7	3	4	7	7	-	7,5	4,2	18,2	10,9	14,6	-
Ehingen	5	4	1	3	2	1	26,3	26,7	25,0	14,3	14,3	14,3
Freudenstadt	8	3	5	6	6	-	19,1	11,5	31,3	35,3	60,0	-
Hechingen	7	3	4	4	4	-	15,2	8,6	36,4	19,1	30,8	-
Horb	4	3	1	2	2	-	16,7	17,7	14,3	11,8	22,2	-
Münsingen	3	2	1	3	3	-	4,0	6,5	2,3	4,4	6,8	-
Ravensburg	6	5	1	7	6	1	12,8	19,2	4,8	11,7	16,2	4,4
Reutlingen	12	10	2	10	7	3	8,2	11,4	3,5	11,5	1,7	9,4
Rottweil	23	16	7	9	5	4	29,5	36,4	20,6	15,5	13,9	18,2
Saulgau	3	3	-	5	4	1	9,1	15,0	-	17,2	17,4	16,7
Sigmaringen	3	3	-	6	5	1	10,7	20,0	-	15,0	20,8	6,3
Tettnang	15	7	8	11	10	1	16,3	14,6	18,2	21,6	29,4	5,9
Tübingen	6	4	2	9	8	1	9,5	14,3	5,7	13,0	17,8	4,2
Tuttlingen	6	4	2	3	3	-	18,8	23,5	13,3	4,2	7,0	-
Wangen	7	5	2	10	7	3	14,3	21,7	7,7	18,9	18,0	21,4
Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern	129	85	44	101	83	18	13,5	15,3	11,0	12,2	15,4	6,3
Baden-Württemberg	823	605	218	579	452	127	17,9	28,2	10,6	12,1	14,8	7,3

1) Zugänge der Diagnosegruppe Ia und Ic.

38. Überwachungs- und Beobachtungsfälle am 31. Dezember

Bezeichnung	1959	1966	1971	1973	1974
Überwachungsfälle	205 740	211 777	188 771	179 502	172 976
darunter					
Überwachungsbedürftige					
Tuberkulose der Atmungsorgane (4)	118 489	127 553	114 180	108 980	103 944
Tuberkulose anderer Organe (5)	8 886	9 100	7 843	7 201	6 845
Beobachtungsfälle	12 410	11 080	10 306	9 141	8 287
darunter					
Sarkoidose (8)		2 171	3 765	3 094	2 574

39. Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit nach der Todesursachenstatistik 1959 bis 1974

Jahr	Sterbefälle an Tuberkulose aller Formen				Davon an Tuberkulose								
	Anzahl			auf 100 000 der mittl. Bevölkerung	der Atmungsorgane			anderer Organe			Spätfolgen		
	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich

Baden-Württemberg

1959	1 133	791	342	15,1	1 009	726	283	124	65	59	.	.	.
1960	1 108	797	311	14,5	998	735	263	110	62	48	.	.	.
1961	994	699	295	12,8	888	646	242	106	53	53	.	.	.
1962	1 007	767	240	12,7	902	714	188	105	53	52	.	.	.
1963	1 049	748	301	13,0	969	703	266	80	45	35	.	.	.
1964	893	664	229	10,9	825	631	194	68	33	35	.	.	.
1965	965	722	243	11,5	886	677	209	79	45	34	.	.	.
1966	912	684	228	10,7	835	647	188	77	37	40	.	.	.
1967	792	582	210	9,3	719	549	170	73	33	40	.	.	.
1968	768	567	201	8,9	660	496	164	56	32	24	52	39	13
1969	809	575	234	9,2	659	486	173	63	32	31	87	57	30
1970	623	462	161	7,0	505	391	114	50	24	26	68	47	21
1971	552	405	147	6,1	418	322	96	58	30	28	76	53	23
1972	541	400	141	5,9	436	343	93	49	22	27	56	35	21
1973	470	345	125	5,1	381	282	99	36	18	18	53	45	8
1974	442	313	129	4,8	356	263	93	40	19	21	46	31	15

Regierungsbezirk Stuttgart

1973	129	98	31	3,7	93	71	22	12	7	5	24	20	4
1974	124	88	36	3,6	98	76	22	14	4	10	12	8	4

Regierungsbezirk Karlsruhe

1973	201	146	55	8,4	173	130	43	13	4	9	15	12	3
1974	189	133	56	7,9	154	113	41	17	8	9	18	12	6

Regierungsbezirk Freiburg

1973	92	57	35	5,0	77	47	30	7	3	4	8	7	1
1974	79	56	21	4,2	62	44	18	3	2	1	14	10	4

Regierungsbezirk Tübingen

1973	48	44	4	3,3	38	34	4	4	4	-	6	6	-
1974	50	36	14	3,4	43	31	12	6	5	1	1	-	1

40. Entwicklung der Tuberkulosesterblichkeit in den Regierungsbezirken nach der Todesursachenstatistik 1959 bis 1972

Jahr	Sterbefälle an Tuberkulose aller Formen				Davon an Tuberkulose									
	Anzahl			auf 100 000 der Be- völkerung	der Atmungsorgane			anderer Organe			Spätfolgen			
	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Regierungsbezirk Nordwürttemberg														
1959	381	263	118	13,0	348	244	104	33	19	14	.	.	.	
1960	389	281	108	13,0	340	258	82	49	23	26	.	.	.	
1961	358	253	105	11,8	320	233	87	38	20	18	.	.	.	
1962	351	248	103	11,3	308	228	80	43	20	23	.	.	.	
1963	327	234	93	10,3	303	221	82	24	13	11	.	.	.	
1964	288	213	75	9,0	265	203	62	23	10	13	.	.	.	
1965	307	228	79	9,4	282	215	67	25	13	12	.	.	.	
1966	307	229	78	9,2	280	218	62	27	11	16	.	.	.	
1967	257	182	75	7,7	227	169	58	30	13	17	.	.	.	
1968	245	179	66	7,3	210	154	56	18	10	8	17	15	2	
1969	262	200	62	7,6	192	151	41	23	16	7	47	33	14	
1970	152	108	44	4,3	114	90	24	15	6	9	23	12	11	
1971	139	107	32	3,9	110	88	22	15	8	7	14	11	3	
1972	152	111	41	4,3	124	96	28	11	2	9	17	13	4	
Regierungsbezirk Nordbaden														
1959	313	221	92	19,0	282	208	74	31	13	18	.	.	.	
1960	306	216	90	18,3	281	202	79	25	14	11	.	.	.	
1961	249	173	75	14,7	231	165	66	18	8	10	.	.	.	
1962	246	202	44	14,2	223	190	33	23	12	11	.	.	.	
1963	281	198	83	16,0	265	188	77	16	10	6	.	.	.	
1964	251	192	59	10,8	235	181	52	18	11	7	.	.	.	
1965	273	215	58	15,1	260	208	52	13	7	6	.	.	.	
1966	273	218	55	14,8	259	208	51	14	10	4	.	.	.	
1967	210	160	50	11,4	197	153	44	13	7	6	.	.	.	
1968	224	160	64	12,0	195	142	53	14	7	7	15	11	4	
1969	231	154	77	12,2	199	140	59	11	1	10	21	13	8	
1970	186	135	51	9,7	161	117	44	10	6	4	15	12	3	
1971	149	119	30	7,7	125	104	21	11	5	6	13	10	3	
1972	157	123	34	8,1	132	108	24	14	8	6	11	7	4	
Regierungsbezirk Südbaden														
1959	268	181	87	17,0	233	164	69	35	17	18	.	.	.	
1960	233	165	68	14,5	214	152	62	19	13	6	.	.	.	
1961	216	152	64	13,3	185	135	50	31	17	14	.	.	.	
1962	241	174	67	14,5	214	159	55	27	15	12	.	.	.	
1963	236	172	64	14,0	211	157	54	25	15	10	.	.	.	
1964	203	154	49	11,8	188	148	40	15	6	9	.	.	.	
1965	216	155	61	12,3	194	141	53	22	14	8	.	.	.	
1966	186	131	55	10,4	169	124	45	17	7	10	.	.	.	
1967	205	146	59	11,3	185	140	45	20	6	14	.	.	.	
1968	170	123	47	9,3	142	106	36	14	8	6	14	9	5	
1969	173	123	50	9,3	152	111	41	15	8	7	6	4	2	
1970	155	116	39	8,3	125	98	27	13	6	7	17	12	5	
1971	119	83	36	6,3	86	63	23	21	11	10	12	9	3	
1972	122	85	37	6,3	98	75	23	14	7	7	10	3	7	
Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern														
1959	171	126	45	12,6	146	110	36	25	16	9	.	.	.	
1960	180	135	45	13,0	163	123	40	17	12	5	.	.	.	
1961	171	121	50	12,2	152	113	39	19	8	11	.	.	.	
1962	169	143	26	11,8	157	137	20	12	6	6	.	.	.	
1963	205	144	61	14,1	190	137	53	15	7	8	.	.	.	
1964	151	105	46	10,2	139	99	40	12	6	6	.	.	.	
1965	169	124	45	11,1	150	113	37	19	11	8	.	.	.	
1966	146	106	40	9,4	127	97	30	19	9	10	.	.	.	
1967	120	94	26	7,7	110	87	23	10	7	3	.	.	.	
1968	129	105	24	8,2	113	94	19	10	7	3	6	4	2	
1969	143	98	45	8,9	116	84	32	14	7	7	13	7	6	
1970	130	103	27	8,0	105	86	19	12	6	6	13	11	2	
1971	145	96	49	8,8	97	67	30	11	6	5	37	23	14	
1972	110	81	29	6,7	82	64	18	10	5	5	18	12	6	

41. Anzahl der Tuberkulosefürsorgestellen am 31. Dezember 1971

Bezeichnung	Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestfalen- Hörsing	Baden- Württemberg
Fürsorgehauptstellen	20	9	19	17	65
Fürsorgeaußenstellen	5	1	13	14	33
Fürsorgeeinzelstellen	4	2	3	5	14

42. Personal der Fürsorgestellen am 31. Dezember 1971

Ärzte	Nord- Württemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestfalen- Hörsing	Baden- Württemberg	Davon		
						Facharzt für Lungen- krankheiten	innere krankheiten	sonstiger Arzt
Hauptamtlich ausschließlich als Tuberkulose-Fürsorgearzt	18	11	12	8	49	48	-	1
Nicht ausschließlich als Tuberkulose-Fürsorgearzt	2	-	-	1	3	3	-	-
Nebenamtlich hauptberuflich in freier Praxis	-	2	1	1	4	2	1	1
Hauptberuflich in Kranken- häusern	2	-	-	2	4	4	-	-

Noch: 42. Personal der Fürsorgestellen am 31. Dezember 1971

Sonstiges Personal	Nordwürttemberg	Nordbaden	Südbaden	Südwestfalen- Hörsing	Baden- Württemberg
Fürsorgerinnen	127	35	21	63	246
Medizinisch-technische Assistenten	36	21	15	11	83
Schreibkräfte	52	21	18	22	113

43. Leistungen der Fürsorgestellen 1968 bis 1971

Art der Leistungen	1968	1969	1970	1971
--------------------	------	------	------	------

Röntgenleistungen

Durchleuchtungen	144 098	131 202	121 858	106 647
Großaufnahmen einschließlich Teilaufnahmen	50 831	48 710	47 731	46 482
Schirmbildaufnahmen	419 598	455 494	472 714	463 327
Schichtbildserien	4 952	4 666	4 274	3 526

Laboruntersuchungen

Sputum	12 706	12 248	11 191	8 301
davon mittels Ausstrich	8 539	8 004	6 905	5 294
Kultur	4 153	4 196	4 247	3 000
Tierversuch	14	48	39	7
Kehlkopfabstriche	1 654	1 419	1 386	1 076
Magensaftuntersuchungen	208	233	268	100
Urinuntersuchungen	6 936	6 193	7 128	4 367
Sonstiges Material	41	27	28	13
Blutsenkungsproben	15 257	14 499	13 721	10 884
Blutbilder	1 106	1 280	812	772
Tuberkulinproben-perkutan	52 867	48 790	35 386	28 337
Tuberkulinproben-intrakutan	2 561	4 040	5 863	5 610

44. Personal der Fürsorgestellten 1974

Tuberkulosefürsorgearzt	Regierungsbezirk				Baden- Württemberg	Darunter Fachärzte Lungenarzt bzw. Internist/Teilgebiet Lungen- und Bronchialheilkunde
	Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen		
Hauptamtlich						
ausschließlich als Tuber- kulosefürsorgearzt	16	11	9	8	44	38
nicht ausschließlich als Tuberkulosefürsorgearzt	3	-	-	1	4	4
Nebenamtlich						
hauptberuflich in freier Praxis	-	5	-	-	5	-
hauptberuflich in Krankenhäusern	2	-	1	-	3	3

Noch: 44. Personal der Fürsorgestellten 1974

Personal	Regierungsbezirk				Baden- Württemberg
	Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen	
Fürsorgerinnen	94	23	18	45	180
Medizinisch-technische Assistenten	39	28	19	16	102
Schreibkräfte	42	28	18	23	111
Sonstiges Personal	48	20	7	11	86

45. Leistungen der Fürsorgestellten 1974

Art der Leistungen	Regierungsbezirk				Baden- Württemberg
	Stuttgart	Karlsruhe	Freiburg	Tübingen	
Röntgenleistungen					
Durchleuchtungen	20 486	16 513	13 101	8 047	58 147
Großaufnahmen einschl. Teilaufnahmen	13 685	11 615	8 458	4 292	38 050
Schirmbildaufnahmen	201 456	122 484	87 059	67 533	478 532
Schichtbildserien	4 488	1 433	812	146	6 879
Laboruntersuchungen					
Sputum	2 309	694	557	104	3 664
davon mittels Ausstrich	2 299	694	296	104	3 393
Kultur	-	-	259	-	259
Tierversuch	10	-	2	-	12
Kehlkopfabstriche	825	5	-	-	830
Magensaftuntersuchungen	40	-	12	-	52
Urinuntersuchungen	3 681	2 247	3 652	152	9 732
Sonstiges Material	-	1 110	142	-	1 252
Tuberkulinproben (im Rahmen der Tbk-Fürsorge)	3 454	1 517	3 854	9 688	18 513
Salbenprobe	3 864	6 170	976	7 832	18 842
Stempeltest	3 264	493	2 878	4 319	10 954
Mantoux	228	8	-	11	247

46. Unterbringung der ansteckungsfähigen Tuberkulösen (Ia) 1968 bis 1971, Stand jeweils 1. Oktober

Unterbringung	1968		1969		1970		1971	
	insgesamt	dar. Chroniker (länger als 2 Jahre in Ia)	insgesamt	dar. Chroniker (länger als 2 Jahre in Ia)	insgesamt	dar. Chroniker (länger als 2 Jahre in Ia)	insgesamt	dar. Chroniker (länger als 2 Jahre in Ia)
Zu Hause in ausreichender Isolierung	2 270	.	2 119	1 006	1 886	869	1 706	752
Zu Hause in nichtaus- reichender Isolierung	200	.	175	82	156	74	140	45
In Krankenhäusern, Heil- stätten und anderen Anstalten	2 712	.	2 463	567	2 239	428	1 937	374

47. Tuberkulose-Krankenhäuser 1959 und 1966 bis 1974

Jahr ¹⁾	Krankenhäuser für		Planmäßige Betten für		Stationär behandelte Kranke ²⁾	
	Erwachsene	Kinder	Erwachsene	Kinder	Erwachsene	Kinder
1959	71	8	7 858	1 161	.	.
1966	66	6	7 843	943	26 157	3 059
1969	61	7	6 931	1 046	24 176	3 849
1970	58	6	6 704	956	24 976	3 430
1971	50	6	6 015	956	23 376	3 420
1972	44	3	5 664	538	24 348	1 669
1973	35	3	4 758	478	21 085	1 434
1974	29	3	3 806	483	17 654	1 624

1) Jeweils am 31. Dezember. - 2) Im Jahr.

48. Ärzte in den Tuberkulose-Krankenhäusern am 31. Dezember 1973

Beruf Fachgebiet, Teilgebiet	Insgesamt	Davon in ... Krankenhäusern		
		öffentlichen	freigemeinnützigen	privaten
Ärzte				
Als Fachärzte tätig	115	63	20	32
darunter als				
Chirurg	6	4	2	-
Internist	37	19	2	16
darunter mit Teilgebiet Lungen- und Bronchialheilkunde	30	16	2	12
Lungenarzt	53	31	9	13
Kinderarzt	4	-	4	-
Ärzte ohne eine der vorgenannten Facharztstätigkeiten	63	30	28	5
Ärzte insgesamt	178	93	48	37

49. Pflegepersonen und sonstiges Personal in den Tuberkulose-Krankenhäusern am 31. Dezember 1973

Berufsgruppe	Insgesamt	Davon in ... Krankenhäusern		
		öffentlichen	freigemeinnützigen	privaten
Pflegepersonen zusammen	683	408	202	73
darunter				
Krankenschwestern bzw. -pfleger	425	256	107	62
Krankenpflegehelfer (-innen)	118	82	31	5
sonstige Pflegekräfte ohne staatliche Prüfung	114	70	38	6
Apotheker (-innen)	5	2	3	-
Sonstiges Apothekenpersonal	14	9	-	5
Medizinisch-technische Assistenten und Gehilfen	92	61	21	10
Sonstiges Personal im medizinisch-technischen Dienst	25	13	8	4
Krankengymnasten, Masseure und medizinische Bademeister	29	15	2	12
Beschäftigungstherapeuten	11	10	1	-
Erziehungs- und Lehrkräfte	39	2	37	-
Desinfektoren	12	11	-	1
Verwaltungskräfte	198	112	39	47
Wirtschaftskräfte	1 552	990	251	311

50. Tuberkulosehilfe der Träger der Sozialhilfe 1963 bis 1974

Jahr	Bruttoausgaben			Nettoausgaben		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		außerhalb von	in		außerhalb von	in
DM						
1963	16 346 947	10 203 094	6 143 853	12 939 961	8 745 129	4 194 832
1964	14 259 250	9 108 003	5 151 247	11 220 842	7 667 305	3 553 537
1965	14 672 794	8 920 846	5 751 948	11 628 323	7 571 109	4 057 214
1966	12 793 712	7 775 173	5 018 539	9 768 571	6 646 367	3 122 204
1967	11 367 326	7 118 024	4 249 302	7 903 134	5 785 803	2 117 331
1968	9 743 665	6 423 231	3 320 434	7 554 026	5 416 565	2 137 461
1969	8 891 528	6 079 997	2 811 531	6 845 951	5 199 073	1 646 878
1970	8 857 546	5 972 379	2 885 167	6 020 568	5 032 530	988 038
1971	9 357 677	6 640 132	2 717 545	6 873 927	5 340 581	1 533 346
1972	9 804 555	7 115 843	2 688 712	7 272 057	5 725 677	1 546 380
1973	8 939 608	6 597 826	2 341 782	6 408 902	5 083 958	1 324 944
1974	8 482 278	6 218 567	2 263 711	6 126 925	4 826 162	1 300 763