



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 98001

Agrarwirtschaft 17/98

C II 4 - m 5/98 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

02.07.1998

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 1998

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1994 bis 1998

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	1998	dagegen			
		1997	1996	1995	1994
Remstal-Stuttgart	2,2	3,2	3,0	2,3	2,3
Württembergisch Unterland	2,0	2,8	2,7	2,3	2,0
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	3,4	3,0	3,0	2,1
Württemberg 2)	2,0	2,9	2,8	2,3	2,1
Badische Bergstraße 3)	2,2				
Kraichgau 3)	2,2	2,5	2,8	2,6	2,4
Tauberfranken	2,0	3,4	2,9	3,0	2,2
Bodensee	2,0	2,6	2,4	2,4	2,4
Markgräflerland	2,2	3,2	2,8	2,5	2,4
Kaiserstuhl	2,0	3,2	2,9	2,7	2,2
Tuniberg	2,0	2,6	3,1	2,5	2,4
Breisgau	2,3	2,7	3,1	2,7	2,6
Ortenau	2,0	2,6	2,6	2,3	2,2
Baden	2,1	2,9	2,8	2,6	2,3
Baden-Württemberg	2,1	2,9	2,8	2,5	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 1998

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit als			Niederschläge als			Temperaturverlauf als		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
24	76	-	32	67	1	-	36	64
Baden								
51	49	-	66	34	0	0	35	65
Baden-Württemberg								
36	64	-	47	52	1	0	35	65

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 1998

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	-	-	-	7	93
Württembergisch Unterland	100	0	0	-	-	3	97
Kocher-Jagst-Tauber	99	1	-	-	-	17	83
Württemberg 1)	100	0	0	-	-	-	-
Badische Bergstraße 2)	99	1	-	-	-	-	100
Kraichgau 2)	100	0	-	-	-	8	92
Tauberfranken	97	3	-	-	-	19	81
Bodensee	100	-	-	-	-	33	67
Markgräflerland	99	1	-	-	-	13	87
Kaiserstuhl	100	-	-	-	-	14	86
Tuniberg	100	-	-	-	-	-	-
Breisgau	99	1	-	-	-	39	61
Ortenau	100	0	-	-	-	22	78
Baden	99	1	-	-	-	17	83
Baden-Württemberg	100	0	0	-	-	12	88

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich.

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 1998

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	98	2	-	-	-	15	85
Württembergisch Unterland	100	-	0	-	-	12	88
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	-	100
Württemberg 1)	99	1	0	-	-	11	89
Badische Bergstraße 2)	100	0	-	-	-	9	91
Kraichgau 2)	100	-	-	-	-	10	90
Tauberfranken	100	-	-	-	-	8	92
Bodensee	100	-	-	-	-	13	87
Markgräflerland	99	1	0	-	-	9	91
Kaiserstuhl	100	-	-	-	-	14	86
Tuniberg	100	-	-	-	-	-	100
Breisgau	100	-	-	-	-	27	73
Ortenau	100	-	-	-	-	11	89
Baden	100	0	0	-	-	12	88
Baden-Württemberg	100	0	0	-	-	12	88

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich.