



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 99003

Agrarwirtschaft 32/99

C II 4 - m 7/99 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

25.08.1999

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1999

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1995 bis 1999

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1999		dagegen							
			1998		1997		1996		1995	
	Junj	Juli	Junj	Juli	Junj	Juli	Junj	Juli	Junj	Juli
Remstal-Stuttgart	2,3	2,1	2,2	2,1	3,1	2,9	2,7	2,6	2,7	2,3
Württembergisch Unterland	2,1	1,9	2,2	2,1	3,1	2,7	2,8	2,6	2,5	2,4
Kocher-Jagst-Tauber	2,4	1,9	2,3	2,2	3,3	3,0	2,8	2,8	3,2	2,9
Württemberg 2)	2,1	1,9	2,2	2,1	3,1	2,7	2,8	2,6	2,6	2,4
Badische Bergstraße 3)	2,2	1,9	2,3	2,4
Kraichgau 3)	2,3	2,1	2,2	2,2
Tauberfranken	2,4	2,1	2,1	2,3	3,3	3,5	2,8	3,0	2,9	2,5
Bodensee	2,5	2,4	2,1	2,1	3,0	3,5	2,3	2,2	2,7	2,3
Markgräflerland	2,7	2,4	2,3	2,2	3,0	2,9	2,5	2,5	2,7	2,4
Kaiserstuhl	2,4	2,2	2,1	2,1	2,7	2,7	2,5	2,5	2,9	2,4
Tuniberg	2,5	2,0	2,3	2,1	3,0	2,6	2,5	2,4	2,6	2,3
Breisgau	2,6	2,4	2,2	2,3	3,0	2,8	2,7	2,7	2,8	2,6
Ortenau	2,2	1,8	2,1	2,2	3,0	2,8	2,6	2,3	2,5	2,3
Baden	2,4	2,2	2,2	2,2	2,9	2,8	2,6	2,5	2,7	2,4
Baden-Württemberg	2,3	2,1	2,2	2,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,7	2,4

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1999

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
5	81	14	5	46	49	1	62	37	.	7	93
Baden											
3	94	3	.	26	74	10	57	33	1	26	73
Baden-Württemberg											
4	87	9	3	37	60	6	60	34	1	18	81

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1999

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	94	5	1	0
Riesling	88	11	1	-
Silvaner	95	5	0	0
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	100	0	0	-
Weißer Burgunder	100	0	-	-
Kerner	94	6	0	-
Gewürztraminer	94	6	0	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	0	-
Blauer Spätburgunder	94	5	1	-
Portugieser	97	3	0	-
Lemberger	86	11	3	0
Schwarzriesling	95	5	0	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	81	16	3	0
Riesling	85	12	2	1
Silvaner	93	7	0	0
Gutedel	56	31	12	1
Ruländer	82	15	3	0
Weißer Burgunder	77	18	5	0
Auxerrois	87	8	5	-
Kerner	93	7	0	0
Gewürztraminer	76	18	5	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	50	50	0	-
Blauer Spätburgunder	83	14	3	0
Portugieser	91	6	3	0
Lemberger	71	17	6	6
Schwarzriesling	81	13	6	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	83	14	3	0
Riesling	88	11	1	0
Silvaner	94	6	0	0
Gutedel	56	31	12	1
Ruländer	83	14	3	0
Weißer Burgunder	78	17	5	0
Auxerrois	87	8	5	-
Kerner	94	6	0	0
Gewürztraminer	79	16	4	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	94	6	0	-
Blauer Spätburgunder	85	13	2	0
Portugieser	95	4	1	0
Lemberger	85	11	4	0
Schwarzriesling	93	6	1	-

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".