




Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 94001

Agrarwirtschaft 24/94

C II 4 - m 5/94 (Erscheint nur für Mai bis Oktober) Einzelpreis DM 2,40

23.06.1994



Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 1994

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1990 bis 1994

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	1994	dagegen			
		1993	1992	1991	1990
Remstal-Stuttgart	2,3	2,2	2,3	4,2	2,2
Württembergisch Unterland	2,0	1,9	2,1	4,1	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,1	2,4	2,1	4,1	2,0
Württemberg 2)	2,1	2,0	2,1	4,1	2,0
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,4	2,2	2,7	4,1	2,1
Tauberfranken	2,2	2,3	2,6	3,8	2,0
Bodensee	2,4	2,0	2,3	2,7	2,0
Markgräflerland	2,4	2,4	2,3	3,5	2,1
Kaiserstuhl 3)	2,2	2,1	2,2	3,4	2,4
Tuniberg 3)	2,4	2,0	2,2	4,0	1,9
Breisgau	2,6	2,2	2,1	3,9	1,9
Ortenau	2,2	2,1	2,1	3,5	2,0
Baden	2,3	2,2	2,3	3,6	2,2
Baden-Württemberg	2,2	2,1	2,2	3,8	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergisch Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 1994

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (dan)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

- 92 8 3 85 12 2 59 39

Baden

1 94 5 1 75 24 5 71 24

Baden-Württemberg

0 93 7 2 79 19 4 65 31

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 1994

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	99	1	-	-	-	16	84
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	6	94
Kocher-Jagst-Tauber	100	0	-	-	-	15	85
Württemberg 1)	100	0	-	-	-	10	90
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	-	10	90
Tauberfranken	99	1	-	-	-	-	-
Bodensee	100	-	-	-	-	21	79
Markgräflerland	100	-	-	-	-	13	87
Kaiserstuhl 2)	100	0	-	-	-	10	90
Tuniberg 2)	100	-	-	-	-	-	100
Breisgau	100	-	-	-	-	26	74
Ortenau	100	0	-	-	-	-	-
Baden	100	0	-	-	-	15	85
Baden-Württemberg	100	0	-	-	-	12	88

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 1994

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	99	1	0	-	-	15	85
Württembergisch Unterland	97	3	0	0	-	5	95
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	8	92
Württemberg 1)	98	2	0	0	-	8	92
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	-	18	82
Tauberfranken	99	1	-	-	-	10	90
Bodensee	100	-	-	-	-	29	71
Markgräflerland	99	1	-	-	-	20	80
Kaiserstuhl 2)	100	-	-	-	-	5	95
Tuniberg 2)	100	-	-	-	-	-	100
Breisgau	99	1	-	-	-	25	75
Ortenau	100	0	-	-	-	11	89
Baden	100	0	-	-	-	17	83
Baden-Württemberg	99	1	0	0	-	13	87

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.