



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 94003

Agrarwirtschaft 40/94

C II 4 - m 7/94 (Erscheint nur für Mai bis Oktober) Einzelpreis DM 2,40

16.08.1994

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1994

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1990 bis 1994

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1994		dagegen							
			1993		1992		1991		1990	
	Junl	Juli	Junl	Juli	Junl	Juli	Junl	Juli	Junl	Juli
Remstal-Stuttgart	2,2	1,8	1,9	2,2	2,0	2,0	3,5	3,0	2,5	2,5
Württembergisch Unterland	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	3,7	2,9	2,2	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0	3,9	3,2	2,2	1,9
Württemberg 2)	2,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	3,7	2,9	2,3	2,2
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	3,6	3,0	2,9	2,8
Tauberfranken	2,2	2,0	2,5	2,6	2,2	2,0	3,7	2,7	2,5	2,4
Bodensee	2,3	1,9	2,0	2,5	2,2	2,1	3,3	2,4	2,4	2,2
Markgräflerland	2,3	2,1	2,3	2,3	2,1	2,0	3,0	2,6	2,5	2,6
Kaiserstuhl 3)	2,1	1,9	1,9	2,0	2,1	1,9	2,9	2,7	2,9	2,8
Tuniberg 3)	2,3	1,9	2,0	2,1	1,9	1,7	2,1	2,9	2,1	2,9
Breisgau	2,5	2,4	2,2	2,4	2,1	2,0	3,5	2,8	2,5	2,5
Ortenau	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1	3,0	2,5	2,9	2,8
Baden	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,0	3,1	2,7	2,7	2,7
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	3,3	2,8	2,5	2,5

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1994

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
26	74	-	1	6	93	-	4	96	-	6	94
Baden											
32	68	-	1	7	92	-	7	93	0	7	93
Baden-Württemberg											
29	71	-	1	7	92	-	6	94	0	7	93

Zeichenklärung

- = Nichts vorhanden.
- . = Kein Nachweis vorhanden.
- / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
- 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1994

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	94	4	2	0
Riesling	87	10	3	0
Silvaner	98	2	0	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	96	2	2	-
Weißer Burgunder	100	-	-	-
Kerner	96	3	1	0
Gewürztraminer	95	5	0	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	98	2	0	-
Blauer Spätburgunder	95	4	1	0
Portugieser	100	0	0	0
Lemberger	78	20	2	0
Schwarzriesling	99	1	0	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	87	11	2	0
Riesling	84	12	4	-
Silvaner	97	3	0	0
Gutedel	85	14	1	-
Ruländer	90	9	1	0
Weißer Burgunder	91	7	2	-
Auxerrois	91	6	3	-
Kerner	98	1	1	-
Gewürztraminer	84	11	4	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	0	-
Blauer Spätburgunder	90	9	1	0
Portugieser	78	16	6	-
Lemberger	50	17	25	8
Schwarzriesling	85	8	7	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	88	10	2	0
Riesling	86	11	3	0
Silvaner	98	2	0	0
Gutedel	85	14	1	-
Ruländer	90	9	1	0
Weißer Burgunder	91	7	2	-
Auxerrois	91	6	3	-
Kerner	97	2	1	0
Gewürztraminer	86	10	4	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	98	2	0	-
Blauer Spätburgunder	91	8	1	0
Portugieser	96	3	1	0
Lemberger	78	20	2	0
Schwarzriesling	98	1	1	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten,

starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".