



Statistische Berichte Baden-Württemberg



Artikel-Nr. 3392 95003 Agrarwirtschaft 45/95
C II 4 - m 7/95 (Erscheint nur für Mai bis Oktober) Einzelpreis DM 2,40
22.08.1995

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1995

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1991 bis 1995

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1995		dagegen							
			1994		1993		1992		1991	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	2,7	2,3	2,2	1,8	1,9	2,2	2,0	2,0	3,5	3,0
Württembergisch Unterland	2,5	2,4	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	3,7	2,9
Kocher-Jagst-Tauber	3,2	2,9	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0	3,9	3,2
Württemberg 2)	2,6	2,4	2,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	3,7	2,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	3,6	3,0
Tauberfranken	2,9	2,5	2,2	2,0	2,5	2,6	2,2	2,0	3,7	2,7
Bodensee	2,7	2,3	2,3	1,9	2,0	2,5	2,2	2,1	3,3	2,4
Markgräflerland	2,7	2,4	2,3	2,1	2,3	2,3	2,1	2,0	3,0	2,6
Kaiserstuhl 3)	2,9	2,4	2,1	1,9	1,9	2,0	2,1	1,9	2,9	2,7
Tuniberg 3)	2,6	2,3	2,3	1,9	2,0	2,1	1,9	1,7	2,1	2,9
Breisgau	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,4	2,1	2,0	3,5	2,8
Ortenau	2,5	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1	3,0	2,5
Baden	2,7	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,0	3,1	2,7
Baden-Württemberg	2,7	2,4	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9	3,3	2,8

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1995

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
2	93	5	-	23	77	-	23	77	1	17	82
Baden											
10	89	1	0	16	84	-	18	82	-	9	91
Baden-Württemberg											
6	91	3	0	20	80	-	20	80	1	13	86

Zeichenerklärung
 - = Nichts vorhanden.
 . = Kein Nachweis vorhanden.
 / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1995

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	76	19	5	0
Riesling	57	24	15	4
Silvaner	78	17	5	0
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	83	15	2	0
Weißer Burgunder	89	11	-	-
Kerner	82	17	1	0
Gewürztraminer	79	16	5	0

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	77	17	6	0
Blauer Spätburgunder	80	18	2	-
Portugieser	84	15	1	-
Lemberger	63	26	10	1
Schwarzriesling	58	39	3	0

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	67	27	5	1
Riesling	62	23	13	2
Silvaner	87	12	1	0
Gutedel	80	14	6	-
Ruländer	61	31	8	0
Weißer Burgunder	65	27	7	1
Auxerrois	94	6	0	-
Kerner	75	18	7	-
Gewürztraminer	64	24	10	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	0	-
Blauer Spätburgunder	68	26	6	0
Portugieser	91	9	0	-
Lemberger	23	47	15	15
Schwarzriesling	63	24	13	0

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	69	26	5	0
Riesling	60	23	14	3
Silvaner	84	14	2	0
Gutedel	80	14	6	-
Ruländer	62	31	7	0
Weißer Burgunder	65	27	7	1
Auxerrois	94	6	0	-
Kerner	81	17	2	0
Gewürztraminer	65	23	10	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	77	17	6	0
Blauer Spätburgunder	69	25	6	0
Portugieser	85	14	1	-
Lemberger	62	26	10	2
Schwarzriesling	59	37	4	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".