

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 90001

Agrarwirtschaft 27/90

C II 4 - m 6/90 (Erscheint nur für Juni bis November (Einzelpreis DM 1,60

06.07.90

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Anfang Juni 1990

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1986 bis 1990

Anbaugebiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern ¹⁾ Anfang Juni				
	1990	dagegen			
		1989	1988	1987	1986
Württemberg²⁾	2,0	2,1	2,1	3,2	2,5
Remstal-Stuttgart	2,2	2,3	2,4	3,5	2,6
Württembergisch Unterland	1,9	2,0	2,1	3,2	2,4
Kocher-Jagst-Tauber	2,0	2,0	2,1	3,0	2,8
Baden	2,2	2,3	2,3	3,1	2,8
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,1	2,4	2,5	3,0	2,5
Badisches Frankenland	2,0	2,4	2,5	2,8	2,9
Bodensee	2,0	2,5	2,2	4,2	2,5
Markgräflerland	2,1	2,2	2,6	3,2	2,9
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,4	2,4	2,3	3,0	3,0
Breisgau	1,9	2,2	2,3	3,2	2,8
Ortenau	2,0	2,2	2,0	3,0	2,5
Baden-Württemberg	2,1	2,2	2,2	3,1	2,7

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 4/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg Anfang Juni 1990

Von den Berichterstattern beurteilen ... % die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

66	34	—	73	27	—	—	17	83
----	----	---	----	----	---	---	----	----

Baden

68	32	—	64	36	—	0	22	78
----	----	---	----	----	---	---	----	----

Baden-Württemberg

67	33	—	68	32	—	0	20	80
----	----	---	----	----	---	---	----	----

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg Anfang Juni 1990

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	—	—	—	7	93
Württembergisch Unterland	100	0	0	—	—	6	94
Kocher-Jagst-Tauber	100	0	—	—	—	17	83
Württemberg ¹⁾	100	0	0	—	—	7	93
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	—	—	—	17	83
Badisches Frankenland	98	2	0	—	—	14	86
Bodensee	100	—	—	—	—	12	88
Markgräflerland	100	—	—	—	—	9	91
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	0	—	—	—	10	90
Breisgau	99	1	—	—	—	10	90
Ortenau	100	0	—	—	—	13	87
Baden	100	0	0	—	—	13	87
Baden-Württemberg	100	0	0	—	—	10	90

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg Anfang Juni 1990

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsreblfläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	—	—	—	—	14	86
Württembergisch Unterland	100	0	0	—	—	5	95
Kocher-Jagst-Tauber	100	—	—	—	—	9	91
Württemberg ¹⁾	100	0	0	—	—	8	92
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	—	—	—	1	20	79
Badisches Frankenland	100	—	—	—	—	11	89
Bodensee	100	—	—	—	—	—	100
Markgräflerland	100	—	—	—	—	9	91
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	—	—	—	—	10	90
Breisgau	100	—	—	—	—	13	87
Ortenau	100	0	—	—	—	11	89
Baden	100	0	—	—	0	13	87
Baden-Württemberg	100	0	0	—	0	10	90

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".