

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 91001

Agrarwirtschaft 26/91

C-II 4 - m 6/91 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 1,60

04.07.1991

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Anfang Juni 1991

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1987 bis 1991

Anbaugebiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern ¹⁾ Anfang Juni				
	1991	dagegen			
		1990	1989	1988	1987
Württemberg²⁾	4,1	2,0	2,1	2,1	3,2
Remstal-Stuttgart	4,2	2,2	2,3	2,4	3,5
Württembergisch Unterland	4,1	1,9	2,0	2,1	3,2
Kocher-Jagst-Tauber	4,1	2,0	2,0	2,1	3,0
Baden	3,6	2,2	2,3	2,3	3,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	4,1	2,1	2,4	2,5	3,0
Tauberfranken	3,8	2,0	2,4	2,5	2,8
Bodensee	2,7	2,0	2,5	2,2	4,2
Markgräflerland	3,5	2,1	2,2	2,6	3,2
Kaiserstuhl	3,4	2,4 ³⁾	2,4 ³⁾	2,3 ³⁾	3,0 ³⁾
Tuniberg	4,0				
Breisgau	3,9	1,9	2,2	2,3	3,2
Ortenau	3,5	2,0	2,2	2,0	3,0
Baden-Württemberg	3,8	2,1	2,2	2,2	3,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 4/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. — 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". — 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg Anfang Juni 1991

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

48 54 — 57 43 0 94 6 0

Baden

50 50 — 50 49 1 92 8 —

Baden-Württemberg

48 52 — 53 46 1 93 7 0

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg Anfang Juni 1991

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	—	0	—	16	84
Württembergisch Unterland	99	1	0	0	2	6	92
Kocher-Jagst-Tauber	94	2	0	4	4	30	66
Württemberg ¹⁾	99	1	0	0	2	12	86
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	0	—	—	31	69
Tauberfranken	93	6	1	—	3	24	73
Bodensee	100	0	—	—	—	20	80
Markgräflerland	99	0	1	0	—	19	81
Kaiserstuhl	100	—	—	—	—	—	100
Tuniberg	100	—	—	—	—	—	100
Breisgau	98	2	0	—	—	36	64
Ortenau	99	1	—	—	—	16	84
Baden	99	1	0	0	0	23	77
Baden-Württemberg	99	1	0	0	1	18	81

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg Anfang Juni 1991

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	11	9	14	66	54	37	9
Württembergisch Unterland	13	9	22	56	31	34	35
Kocher-Jagst-Tauber	20	6	23	51	55	27	18
Württemberg ¹⁾	13	9	21	57	38	35	27
Badische Bergstraße/Kraichgau	23	13	36	28	38	38	24
Tauberfranken	33	6	36	25	39	43	18
Bodensee	100	0	—	—	7	20	73
Markgräflerland	50	18	25	7	13	52	35
Kaiserstuhl	56	17	17	10	6	59	35
Tuniberg	3	8	59	30	17	17	66
Breisgau	10	17	22	51	27	36	37
Ortenau	56	16	14	14	18	47	35
Baden	46	15	22	17	24	43	33
Baden-Württemberg	26	13	21	40	30	39	31

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".