

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 91003

Agrarwirtschaft 41/91

C II 4 - m 8/91 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 1,60

26.08.1991

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Anfang August 1991

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1987 bis 1991

Anbaugebiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern ¹⁾ Anfang des Monats ...									
	1991		dagegen							
			1990		1989		1988		1987	
	Juli	August	Juli	August	Juli	August	Juli	August	Juli	August
Württemberg²⁾	3,7	2,9	2,3	2,2	1,9	1,9	2,1	2,1	3,1	3,0
Remstal-Stuttgart	3,5	3,0	2,5	2,5	2,1	2,0	2,1	2,1	3,1	3,1
Württembergisch Unterland	3,7	2,9	2,2	2,1	1,9	1,9	2,1	2,1	3,1	3,0
Kocher-Jagst-Tauber	3,9	3,2	2,2	1,9	1,9	2,1	2,6	2,3	3,2	2,9
Baden	3,1	2,7	2,7	2,7	2,1	2,0	2,4	2,4	3,0	2,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,6	3,0	2,9	2,8	2,2	2,3	2,5	2,4	2,9	2,8
Tauberfranken	3,7	2,7	2,5	2,4	2,2	2,4	2,5	2,6	3,0	2,9
Bodensee	3,3	2,4	2,4	2,2	2,1	2,0	2,1	1,9	4,1	3,5
Markgräflerland	3,0	2,6	2,5	2,6	2,1	1,8	2,5	2,4	3,1	2,8
Kaiserstuhl	2,9	2,7	2,9 ³⁾	2,8 ³⁾	2,1 ³⁾	2,1 ³⁾	2,3 ³⁾	2,4 ³⁾	2,9 ³⁾	2,7 ³⁾
Tuniberg	2,9	2,9	2,9 ³⁾	2,8 ³⁾	2,1 ³⁾	2,1 ³⁾	2,3 ³⁾	2,4 ³⁾	2,9 ³⁾	2,7 ³⁾
Breisgau	3,5	2,8	2,5	2,5	2,0	1,9	2,4	2,3	3,1	2,9
Ortenau	3,0	2,5	2,9	2,8	2,0	1,8	2,1	2,2	3,1	3,2
Baden-Württemberg	3,3	2,8	2,5	2,5	2,0	2,0	2,3	2,3	3,0	2,9

1) Noten: 1,0 = sehr gut – weit besser als normal, 2,0 = gut – besser als normal, 3,0 = mittel – normal, 4,0 = gering – schlechter als normal, 5,0 = sehr gering – weit schlechter als normal. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg

Von den Berichterstattern beurteilen ... %											
die Niederschläge			den Temperaturverlauf			die Sonnenscheindauer			die Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut

Württemberg

27 73 – 1 21 78 – 29 71 – 16 84

Baden

25 75 – 0 20 79 – 30 70 0 16 84

Baden-Württemberg

26 74 – 1 20 79 – 30 70 0 16 84

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1991

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			

Württemberg¹⁾

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	90	9	1	0
Riesling	82	13	5	0
Silvaner	95	4	0	1
Gutedel	100	0	—	—
Ruländer	92	7	1	0
Weißer Burgunder	100	0	—	—
Auxerrois	—	—	—	—
Kerner	93	6	1	0
Gewürztraminer	82	0	0	18

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	91	6	2	1
Blauer Spätburgunder	91	8	1	—
Portugieser	90	8	0	2
Lemberger	70	20	7	3
Schwarzriesling	96	4	0	—

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	83	13	3	1
Riesling	70	23	5	2
Silvaner	90	10	0	0
Gutedel	84	15	1	0
Ruländer	81	14	3	2
Weißer Burgunder	80	17	2	1
Auxerrois	89	11	0	—
Kerner	85	14	1	0
Gewürztraminer	64	24	7	5

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	0	—
Blauer Spätburgunder	78	17	4	1
Portugieser	90	10	0	0
Lemberger	45	22	22	11
Schwarzriesling	92	8	0	—

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	84	12	3	1
Riesling	78	16	5	1
Silvaner	92	8	0	0
Gutedel	84	15	1	0
Ruländer	81	14	3	2
Weißer Burgunder	80	17	2	1
Auxerrois	89	11	0	—
Kerner	91	8	1	0
Gewürztraminer	66	23	6	5

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	92	6	1	1
Blauer Spätburgunder	78	17	4	1
Portugieser	91	8	0	1
Lemberger	68	20	8	4
Schwarzriesling	95	5	0	—

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25% der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50% der Blüten, starke = Schäden von 50% und darüber der Blüten.