



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 92003

Agrarwirtschaft 41/92

C II 4 - m 8/92 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 1,60

17.08.1992

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1992

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1988 bis 1992

Anbaugebiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern ¹⁾ Ende des Monats ...									
	1992		dagegen							
			1991		1990		1989		1988	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Württemberg²⁾	1,8	1,8	3,7	2,9	2,3	2,3	1,9	1,9	2,1	2,1
Remstal-Stuttgart	2,0	2,0	3,5	3,0	2,5	2,5	2,1	2,0	2,1	2,1
Württembergisch Unterland	1,8	1,7	3,7	2,9	2,2	2,2	1,9	1,9	2,1	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	2,0	2,0	3,9	3,2	2,2	2,2	1,9	2,1	2,6	2,3
Baden	2,1	2,0	3,1	2,7	2,7	2,7	2,1	2,0	2,4	2,4
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,1	2,1	3,6	3,0	2,9	2,9	2,2	2,3	2,5	2,4
Tauberfranken	2,2	2,0	3,7	2,7	2,5	2,5	2,2	2,4	2,5	2,6
Bodensee	2,2	2,1	3,3	2,4	2,4	2,4	2,1	2,0	2,1	1,9
Markgräflerland	2,1	2,0	3,0	2,6	2,5	2,5	2,1	1,8	2,5	2,4
Kaiserstuhl ³⁾	2,1	1,9	2,9	2,7	2,9	2,9	2,1	2,1	2,3	2,4
Tuniberg ³⁾	1,9	1,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,1	2,1	2,3	2,4
Breisgau	2,1	2,0	3,5	2,8	2,5	2,5	2,0	1,9	2,4	2,3
Ortenau	1,9	2,1	3,0	2,5	2,9	2,9	2,0	1,8	2,1	2,2
Baden-Württemberg	2,0	1,9	3,3	2,8	2,5	2,5	2,0	2,0	2,3	2,3

1) Noten: 1,0 = sehr gut – weit besser als normal, 2,0 = gut – besser als normal, 3,0 = mittel – normal, 4,0 = gering – schlechter als normal, 5,0 = sehr gering – weit schlechter als normal. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg

Von den Berichterstatlern beurteilt ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
9	90	1	0	16	84	–	25	75	–	5	95
Baden											
9	89	2	–	21	79	0	33	67	0	9	91
Baden-Württemberg											
9	89	2	0	19	81	0	30	70	0	7	93

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1992

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg²⁾				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	88	11	1	0
Riesling	76	21	3	0
Silvaner	95	5	0	—
Gutedel	—	—	—	—
Ruländer	87	11	2	—
Weißer Burgunder	67	33	—	—
Auxerrois	—	—	—	—
Kerner	88	11	1	—
Gewürztraminer	86	14	0	—
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	91	9	0	—
Blauer Spätburgunder	87	12	1	—
Portugieser	97	2	1	—
Lemberger	75	21	4	0
Schwarzriesling	93	6	1	0

Baden				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	76	22	2	0
Riesling	71	21	4	4
Silvaner	98	2	0	0
Gutedel	79	14	7	—
Ruländer	91	8	1	—
Weißer Burgunder	87	10	2	1
Auxerrois	93	7	0	0
Kerner	87	12	1	0
Gewürztraminer	87	13	0	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	100	0	0	0
Blauer Spätburgunder	85	14	1	0
Portugieser	92	8	0	—
Lemberger	13	62	25	0
Schwarzriesling	87	11	2	—

Baden-Württemberg				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	78	20	2	0
Riesling	75	21	3	1
Silvaner	97	3	0	0
Gutedel	79	14	7	—
Ruländer	91	8	1	—
Weißer Burgunder	87	10	2	1
Auxerrois	93	7	0	0
Kerner	88	11	1	0
Gewürztraminer	87	13	0	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	91	9	0	0
Blauer Spätburgunder	85	14	1	0
Portugieser	97	3	0	—
Lemberger	75	21	4	0
Schwarzriesling	93	6	1	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25% der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50% der Blüten, starke = Schäden von 50% der Blüten und darüber. — 2) Einschließlich der Weinbaubereiche „Württembergischer Bodensee“ und „Oberer Neckar“.