



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 93003

Agrarwirtschaft 44/93

C II 4 - m 8/93 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 2,-

17.08.1993

## Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1993

### 1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1989 bis 1993

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1993		dagegen							
			1992		1991		1990		1989	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	1,9	2,2	2,0	2,0	3,5	3,0	2,5	2,5	2,1	2,0
Württembergisch Unterland	1,8	1,9	1,8	1,7	3,7	2,9	2,2	2,1	1,9	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	2,1	2,0	2,0	3,9	3,2	2,2	1,9	1,9	2,1
Württemberg 2)	1,8	2,0	1,8	1,8	3,7	2,9	2,3	2,2	1,9	1,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,1	2,2	2,1	2,1	3,6	3,0	2,9	2,8	2,2	2,3
Tauberfranken	2,5	2,6	2,2	2,0	3,7	2,7	2,5	2,4	2,2	2,4
Bodensee	2,0	2,5	2,2	2,1	3,3	2,4	2,4	2,2	2,1	2,0
Markgräflerland	2,3	2,3	2,1	2,0	3,0	2,6	2,5	2,6	2,1	1,8
Kaiserstuhl 3)	1,9	2,0	2,1	1,9	2,9	2,7	2,9	2,8	2,1	2,1
Tuniberg 3)	2,0	2,1	1,9	1,7	2,1	2,9	2,1	2,9	2,2	2,1
Breisgau	2,2	2,4	2,1	2,0	3,5	2,8	2,5	2,5	2,0	1,9
Ortenau	2,0	2,1	2,0	2,1	3,0	2,5	2,9	2,8	2,0	1,8
Baden	2,1	2,2	2,1	2,0	3,1	2,7	2,7	2,7	2,1	2,0
Baden-Württemberg	2,0	2,1	2,0	1,9	3,3	2,8	2,5	2,5	2,0	2,0

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergisch Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

### 2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1993

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
9	85	6	13	66	21	26	63	11	3	49	48
Baden											
12	79	9	16	66	18	26	68	6	5	52	43
Baden-Württemberg											
10	82	8	14	67	19	26	66	8	4	51	45

#### Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.
- . = Kein Nachweis vorhanden.
- / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
- 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1993

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke
Württemberg 2)				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	82	16	2	0
Riesling	81	16	3	0
Silvaner	91	8	1	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	85	15	0	-
Weißer Burgunder	100	0	-	-
Kerner	87	10	3	0
Gewürztraminer	92	8	0	-
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	95	4	1	0
Blauer Spätburgunder	94	5	1	0
Portugieser	96	3	1	0
Lemberger	75	20	5	0
Schwarzriesling	96	4	0	-
Baden				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	75	20	5	0
Riesling	70	24	6	0
Silvaner	95	5	0	0
Gutedel	69	25	6	0
Ruländer	87	12	1	0
Weißer Burgunder	86	13	1	0
Auxerrois	87	13	0	-
Kerner	77	18	4	1
Gewürztraminer	66	29	5	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	100	0	-	-
Blauer Spätburgunder	83	16	1	0
Portugieser	97	0	3	-
Lemberger	70	20	10	-
Schwarzriesling	92	4	3	1
Baden-Württemberg				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	76	20	4	0
Riesling	77	19	4	0
Silvaner	94	6	0	0
Gutedel	69	25	6	0
Ruländer	87	12	1	0
Weißer Burgunder	86	13	1	0
Auxerrois	87	13	0	-
Kerner	86	11	3	0
Gewürztraminer	67	28	5	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	95	4	1	0
Blauer Spätburgunder	84	15	1	0
Portugieser	96	3	1	0
Lemberger	75	20	5	0
Schwarzriesling	95	4	1	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".