



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 96001

Agrarwirtschaft 33/96

C II 4 - m 5/96 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

26.06.1996

## Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 1996

### 1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1992 bis 1996

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	1996	dagegen			
		1995	1994	1993	1992
Remstal-Stuttgart	3,0	2,3	2,3	2,2	2,3
Württembergisch Unterland	2,7	2,3	2,0	1,9	2,1
Kocher-Jägst-Tauber	3,0	3,0	2,1	2,4	2,1
Württemberg 2)	2,8	2,3	2,1	2,0	2,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,8	2,6	2,4	2,2	2,7
Tauberfranken	2,9	3,0	2,2	2,3	2,6
Bodensee	2,4	2,4	2,4	2,0	2,3
Markgräflerland	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3
Kaiserstuhl	2,9	2,7	2,2	2,1	2,2
Tübingen	3,1	2,5	2,4	2,0	2,2
Breisgau	3,1	2,7	2,6	2,2	2,1
Ortenau	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1
Baden	2,8	2,6	2,3	2,2	2,3
Baden-Württemberg	2,8	2,5	2,2	2,1	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 1996

Von den Berichterstattem beurteilt ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu noch	zu gering	ausreichend	zu noch	ungünstig	normal	günstig

#### Württemberg

68 31 1 11 75 14 53 44 3

#### Baden

59 41 0 15 73 12 55 42 3

#### Baden-Württemberg

62 37 1 13 74 13 54 43 3

### 3. Schäden durch Winterfröste an Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 1996

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	94	5	1	0	2	64	34
Württembergisch Unterland	99	1	0	-	3	50	47
Kocher-Jagst-Tauber	98	2	-	-	4	66	30
Württemberg 1)	98	2	0	0	3	55	42
Badische Bergstraße/Kraichgau	92	7	1	-	6	75	19
Tauberfranken	99	1	-	-	-	-	-
Bodensee	100	-	-	-	-	60	40
Markgräflerland	100	0	-	-	2	62	36
Kaiserstuhl 2)	98	2	-	-	10	61	29
Tuniberg 2)	92	6	2	-	-	86	14
Breisgau	97	3	-	-	11	66	23
Ortenau	99	1	0	-	-	-	-
Baden	98	2	0	-	5	66	29
Baden-Württemberg	98	2	0	0	4	61	35

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 1996

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	9	50	11
Württembergisch Unterland	100	-	0	-	7	65	27
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	93	17
Württemberg 1)	100	-	0	-	7	71	22
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	10	72	18
Tauberfranken	100	-	-	-	7	68	25
Bodensee	100	-	-	-	7	40	53
Markgräflerland	100	0	-	-	8	66	26
Kaiserstuhl	100	-	-	-	14	62	24
Tuniberg	100	0	-	-	29	71	-
Breisgau	100	0	-	-	3	80	17
Ortenau	100	-	-	-	2	68	30
Baden	100	0	-	-	8	68	24
Baden-Württemberg	100	0	0	-	7	70	23

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".