



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 96003

Agrarwirtschaft 50/96

CII 4 - m 7/96 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

19.08.1996

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1996

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1992 bis 1996

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1996		dagegen							
			1995		1994		1993		1992	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	2,7	2,6	2,7	2,3	2,2	1,8	1,9	2,2	2,0	2,0
Württembergisch Unterland	2,8	2,6	2,5	2,4	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7
Kocher-Jagst-Tauber	2,8	2,8	3,2	2,9	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0
Württemberg 2)	2,8	2,6	2,6	2,4	2,0	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,7	2,7	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1
Tauberfranken	2,8	3,0	2,9	2,5	2,2	2,0	2,5	2,6	2,2	2,0
Bodensee	2,3	2,2	2,7	2,3	2,3	1,9	2,0	2,5	2,2	2,1
Markgräflerland	2,5	2,5	2,7	2,4	2,3	2,1	2,3	2,3	2,1	2,0
Kaiserstuhl	2,5	2,5	2,9	2,4	2,1	1,9	1,9	2,0	2,1	1,9
Tuniberg	2,5	2,4	2,6	2,3	2,3	1,9	2,0	2,1	1,9	1,7
Breisgau	2,7	2,7	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,4	2,1	2,0
Ortenau	2,6	2,3	2,5	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1
Baden	2,6	2,5	2,7	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,0
Baden-Württemberg	2,7	2,5	2,7	2,4	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	1,9

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1996

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
5	93	2	9	73	18	10	78	12	1	62	37
Baden											
12	84	4	11	67	22	13	67	20	2	59	39
Baden-Württemberg											
9	88	3	10	70	20	12	71	17	2	60	38

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.
/ = Kein Nachweis vorhanden.
/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1996

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	64	30	6	0
Riesling	53	28	16	3
Silvaner	64	29	7	0
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	63	35	2	0
Weißer Burgunder	58	42	0	-
Kerner	74	23	3	0
Gewürztraminer	54	32	14	0
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	68	29	3	0
Blauer Spätburgunder	62	34	4	0
Portugieser	85	14	1	0
Lemberger	53	36	11	0
Schwarzriesling	75	20	5	0

Baden				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	70	20	9	1
Riesling	47	22	26	5
Silvaner	73	22	5	0
Gutedel	43	37	18	2
Ruländer	69	17	12	2
Weißer Burgunder	71	21	7	1
Auxerrois	85	9	6	0
Kerner	69	24	6	1
Gewürztraminer	60	21	14	5
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	0	100	0	0
Blauer Spätburgunder	74	20	5	1
Portugieser	71	16	10	3
Lemberger	50	7	36	7
Schwarzriesling	54	31	14	1

Baden-Württemberg				
Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	68	22	9	1
Riesling	52	26	19	3
Silvaner	69	25	6	0
Gutedel	43	37	18	2
Ruländer	69	17	12	2
Weißer Burgunder	71	21	7	1
Auxerrois	85	9	6	0
Kerner	74	23	3	0
Gewürztraminer	60	22	14	4
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	68	29	3	0
Blauer Spätburgunder	73	21	5	1
Portugieser	83	14	3	0
Lemberger	53	35	11	1
Schwarzriesling	75	20	5	0

1) Schwache = Schaden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".