



# Statistische Berichte Baden-Württemberg



Artikel-Nr. 3392 97001

Agrarwirtschaft 25/97

C II 4 - m 5/97 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

17.06.1997

## Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 1997

### 1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1993 bis 1997

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	1997	dagegen			
		1996	1995	1994	1993
Remstal-Stuttgart	3,2	3,0	2,3	2,3	2,2
Württembergisch Unterland	2,8	2,7	2,3	2,0	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	3,4	3,0	3,0	2,1	2,4
Württemberg 2)	2,9	2,8	2,3	2,1	2,0
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,8	2,6	2,4	2,2
Tauberfranken	3,4	2,9	3,0	2,2	2,3
Bodensee	2,6	2,4	2,4	2,4	2,0
Markgräflerland	3,2	2,8	2,5	2,4	2,4
Kaiserstuhl	3,2	2,9	2,7	2,2	2,1
Tuniberg	2,6	3,1	2,5	2,4	2,0
Breisgau	2,7	3,1	2,7	2,6	2,2
Ortenau	2,6	2,6	2,3	2,2	2,1
Baden	2,9	2,8	2,6	2,3	2,2
Baden-Württemberg	2,9	2,8	2,5	2,2	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 1997

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

#### Württemberg

30	70	-	50	50	-	27	64	9
----	----	---	----	----	---	----	----	---

#### Baden

24	76	-	19	81	0	31	60	9
----	----	---	----	----	---	----	----	---

#### Baden-Württemberg

27	73	-	33	67	0	29	62	9
----	----	---	----	----	---	----	----	---

### 3. Schäden durch Winterfröste an Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 1997

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	84	6	4	6	2	65	33
Württembergisch Unterland	85	11	3	1	2	49	49
Kocher-Jagst-Tauber	51	19	16	14	13	79	8
Württemberg 1)	84	11	3	2	3	58	39
Badische Bergstraße/Kraichgau	93	7	0	-	-	56	44
Tauberfranken	43	27	19	11	-	-	-
Bodensee	88	12	-	-	-	67	33
Markgräflerland	74	17	8	1	2	60	38
Kaiserstuhl 2)	76	19	4	1	-	71	29
Tuniberg 2)	82	12	3	3	-	57	43
Breisgau	85	9	6	0	3	76	21
Ortenau	95	5	-	-	-	-	-
Baden	79	14	5	2	1	65	34
Baden-Württemberg	81	13	4	2	2	62	36

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

### 4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 1997

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	48	16	20	16	20	71	9
Württembergisch Unterland	69	17	10	4	9	72	19
Kocher-Jagst-Tauber	79	17	2	2	46	46	8
Württemberg 1)	64	17	12	7	17	68	15
Badische Bergstraße/Kraichgau	85	12	2	1	5	59	36
Tauberfranken	50	24	12	14	39	61	-
Bodensee	98	2	-	-	8	75	17
Markgräflerland	36	24	32	8	16	67	17
Kaiserstuhl 2)	44	17	22	17	14	62	24
Tuniberg 2)	87	11	2	-	-	57	43
Breisgau	74	16	7	3	12	76	12
Ortenau	75	18	7	0	6	66	28
Baden	60	17	15	8	13	65	22
Baden-Württemberg	62	17	14	7	15	66	19

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.