



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 97003

Agrarwirtschaft 39/97

CII 4 - m 7/97 (Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

01.09.1997

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juni 1997

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1993 bis 1997



Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats ...									
	1997		dagegen							
			1996		1995		1994		1993	
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli
Remstal-Stuttgart	3,1	2,9	2,7	2,6	2,7	2,3	2,2	1,8	1,9	2,2
Württembergisch Unterland	3,1	2,7	2,8	2,6	2,5	2,4	1,9	1,8	1,8	1,9
Kocher-Jagst-Tauber	3,3	3,0	2,8	2,8	3,2	2,9	2,1	2,0	2,2	2,1
Württemberg 2)	3,1	2,7	2,8	2,6	2,6	2,4	2,0	1,8	1,8	2,0
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,2
Tauberfranken	3,3	3,5	2,8	3,0	2,9	2,5	2,2	2,0	2,5	2,6
Bodensee	3,0	3,5	2,3	2,2	2,7	2,3	2,3	1,9	2,0	2,5
Markgräflerland	3,0	2,9	2,5	2,5	2,7	2,4	2,3	2,1	2,3	2,3
Kaiserstuhl	2,7	2,7	2,5	2,5	2,9	2,4	2,1	1,9	1,9	2,0
Tübingen	3,0	2,6	2,5	2,4	2,6	2,3	2,3	1,9	2,0	2,1
Breisgau	3,0	2,8	2,7	2,7	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,4
Ortenau	3,0	2,8	2,6	2,3	2,5	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1
Baden	2,9	2,8	2,6	2,5	2,7	2,4	2,2	2,1	2,1	2,2
Baden-Württemberg	3,0	2,8	2,7	2,5	2,7	2,4	2,1	2,0	2,0	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1997

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
0	76	24	21	70	9	42	57	1	10	71	19
Baden											
1	61	38	37	57	6	57	40	3	15	67	18
Baden-Württemberg											
1	67	32	30	63	7	50	48	2	13	69	18

Zeichenerklärung
- = Nichts vorhanden.
/ = Kein Nachweis vorhanden.
/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 6 41-21 30, E-Mail: stala.bw@t-online.de, Internet: <http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de>

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1997

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebläche 1)			
	keine	schwache	mittlere	starke

Württemberg 2)

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	62	24	11	3
Riesling	45	24	21	10
Silvaner	55	30	14	1
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	77	12	9	2
Weißer Burgunder	79	7	14	-
Kerner	63	25	10	2
Gewürztraminer	48	28	10	14

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	68	19	12	1
Blauer Spätburgunder	72	23	5	0
Portugieser	74	20	4	2
Lemberger	44	26	24	6
Schwarzriesling	76	19	4	1

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	63	22	12	3
Riesling	48	21	23	8
Silvaner	78	16	5	1
Gutedel	34	22	32	12
Ruländer	65	25	9	1
Weißer Burgunder	66	24	9	1
Auxerrois	69	31	0	0
Kerner	66	26	7	1
Gewürztraminer	49	31	12	8

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	50	50	0	-
Blauer Spätburgunder	68	21	9	2
Portugieser	81	16	3	0
Lemberger	13	34	33	20
Schwarzriesling	31	57	11	1

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	63	22	12	3
Riesling	46	23	22	9
Silvaner	68	22	9	1
Gutedel	34	22	32	12
Ruländer	65	25	9	1
Weißer Burgunder	66	24	9	1
Auxerrois	69	31	0	0
Kerner	63	26	9	2
Gewürztraminer	48	31	12	9

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	68	19	12	1
Blauer Spätburgunder	69	21	8	2
Portugieser	75	19	4	2
Lemberger	43	27	24	6
Schwarzriesling	73	22	4	1

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".