

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 83003

Agrarwirtschaft 36/83

C II 4 - m 8/83 (Erscheint nur für Juni bis November)

16.8.83

Wachstumstand der Reben Anfang August 1983

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet	1983		Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	1983	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern ¹⁾			Begutachtungsziffern ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	2,5	2,3	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,0	2,5
Württembergisches Unterland	2,2	2,0	Breisgau	2,8	2,4
Kocher-Jagst-Tauber	2,4	2,1	Ortenau	2,5	2,2
Württemberg	2,3	2,1	Baden	2,7	2,4
dagegen 1982	1,9	1,8	dagegen 1982	2,1	2,2
1981	3,5	3,3	1981	2,7	2,8
1980	2,5	3,2	1980	2,7	3,8
1979	2,1	2,0	1979	2,2	2,1
			Baden-Württemberg	2,5	2,3
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,4	dagegen 1982	2,0	2,0
Badisches Frankenland	2,1	2,2	1981	3,0	3,0
Bodensee	2,5	2,1	1980	2,6	3,6
Markgräflerland	2,6	2,3	1979	2,2	2,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
72	27	1	0	7	93	-	2	98	0	11	89
Baden											
71	27	2	2	9	89	-	2	98	1	14	85
Baden-Württemberg											
71	27	2	1	8	91	-	2	98	1	13	86

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	81	15	4	-
Riesling	75	19	6	-
Silvaner	90	8	2	-
Gutedel	93	7	-	-
Ruländer	93	7	-	-
Weißer Burgunder	100	-	-	-
Auxerrois	-	-	-	-
Kerner	86	12	2	-
Gewürztraminer	95	5	-	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	90	9	1	-
Blauer Spätburgunder	85	13	2	-
Portugieser	87	11	2	-
Lemberger	71	21	8	-
Schwarzriesling	88	11	1	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	84	12	3	1
Riesling	87	11	2	-
Silvaner	92	6	2	-
Gutedel	83	15	2	-
Ruländer	93	6	-	1
Weißer Burgunder	91	9	-	-
Auxerrois	90	9	1	-
Kerner	-	-	-	-
Gewürztraminer	81	15	3	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	99	1	-	-
Blauer Spätburgunder	94	5	-	1
Portugieser	91	8	1	-
Lemberger	95	5	-	-
Schwarzriesling	98	2	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	84	12	3	1
Riesling	79	16	5	-
Silvaner	91	7	2	-
Gutedel	83	15	2	-
Ruländer	93	6	-	1
Weißer Burgunder	91	9	-	-
Auxerrois	90	9	1	-
Kerner	86	12	2	-
Gewürztraminer	82	14	3	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	90	9	1	-
Blauer Spätburgunder	93	6	-	1
Portugieser	87	11	2	-
Lemberger	71	21	8	-
Schwarzriesling	89	10	1	-

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.