

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 84003

Agrarwirtschaft 42/84

C II 4 - m 8/84 (Erscheint nur für Juni bis November)

16.8.84

## Wachstumstand der Reben Anfang August 1984

### 1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	1984		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	1984	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>			Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>	
Remstal-Stuttgart	3,0	2,7	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,7	2,6
Württembergisch Unterland	3,0	2,8	Breisgau	2,7	2,8
Kocher-Jagst-Tauber	3,2	3,0	Ortenau	3,0	2,9
Württemberg	3,0	2,8	Baden	2,8	2,7
dagegen 1983	2,3	2,1	dagegen 1983	2,7	2,4
1982	1,9	1,8	1982	2,1	2,2
1981	3,5	3,3	1981	2,7	2,8
1980	2,5	3,2	1980	2,7	3,8
			Baden-Württemberg	2,9	2,7
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,9	2,8	dagegen 1983	2,5	2,3
Badisches Frankenland	3,4	3,4	1982	2,0	2,0
Bodensee	2,7	2,3	1981	3,0	3,0
Markgräflerland	2,8	2,7	1980	2,6	3,6

1) Note: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

### 2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
3	91	6	27	52	21	34	61	5	10	66	24
Baden											
18	78	4	28	49	23	26	54	20	12	55	33
Baden-Württemberg											
12	83	5	27	51	22	30	57	13	11	60	29

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 3. Verrieselungsschäden 1984

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
Schäden in % der Ertragsrebläche <sup>1)</sup>				

## Württemberg

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	76	20	4	-
Riesling	75	19	5	1
Silvaner	85	12	3	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	80	15	5	-
Weißer Burgunder	88	12	-	-
Kerner	84	14	2	-
Gewürztraminer	62	33	4	1

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	83	13	4	-
Blauer Spätburgunder	74	18	7	1
Portugieser	79	17	4	-
Lemberger	61	22	14	3
Schwarzriesling	61	27	12	-

## Baden

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	65	28	7	-
Riesling	76	18	6	-
Silvaner	69	28	3	-
Gutedel	60	29	10	1
Ruländer	58	27	13	2
Weißer Burgunder	64	27	7	2
Auxerrois	63	29	7	1
Gewürztraminer	48	32	15	5

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	92	8	-	-
Blauer Spätburgunder	62	24	12	2
Portugieser	82	15	3	-
Lemberger	84	13	3	-
Schwarzriesling	85	10	5	-

## Baden-Württemberg

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	66	27	7	-
Riesling	75	19	5	1
Silvaner	77	20	3	-
Gutedel	60	29	10	1
Ruländer	59	26	13	2
Weißer Burgunder	64	27	7	2
Auxerrois	63	29	7	1
Kerner	84	14	2	-
Gewürztraminer	49	32	14	5

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	83	13	4	-
Blauer Spätburgunder	63	23	12	2
Portugieser	79	17	4	-
Lemberger	61	22	14	3
Schwarzriesling	62	26	12	-

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.