

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 85001

Agrarwirtschaft 27/85

C II 4 - m 6/85 (Erscheint nur für Juni bis November)

20.6.85

## Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1985

### 1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	Anfang Juni 1985	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Anfang Juni 1985
	Begutachtungsziffer <sup>1)</sup>		Begutachtungsziffer <sup>1)</sup>
Remstal-Stuttgart	3,9	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,8
Württembergisch Unterland	4,4	Breisgau	3,7
Kocher-Jagst-Tauber	4,9	Ortenau	3,9
Württemberg	4,3	Baden	3,9
dagegen 1984	2,6	dagegen 1984	2,5
1983	2,4	1983	2,8
1982	2,1	1982	2,3
1981	3,8	1981	2,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	4,1	Baden-Württemberg	4,1
Badisches Frankenland	4,9	dagegen 1984	2,5
Bodensee	4,4	1983	2,6
Markgräflerland	3,9	1982	2,2
		1981	3,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

### 2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstattem beurteilten ..... % die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

#### Württemberg

-	100	0	0	93	7	29	62	9
---	-----	---	---	----	---	----	----	---

#### Baden

4	95	1	3	86	11	48	50	2
---	----	---	---	----	----	----	----	---

#### Baden-Württemberg

2	97	1	2	89	9	40	55	5
---	----	---	---	----	---	----	----	---

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

### 3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1985

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten ..... % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	6	15	20	59	25	59	16
Württembergisch Unterland	10	7	20	63	25	60	15
Kocher-Jagst-Tauber	5	-	5	90	43	57	-
Württemberg	9	8	19	64	27	59	14
Badische Bergstraße/Kraichgau	19	12	30	39	30	60	10
Badisches Frankenland	13	1	3	83	47	50	3
Bodensee	13	14	11	62	33	54	13
Markgräflerland	18	24	29	29	7	80	13
Kaiserstuhl-Tuniberg	31	22	25	22	3	91	6
Breisgau	22	19	35	24	9	75	16
Ortenau	26	21	28	25	25	68	7
Baden	24	19	27	30	21	69	10
Baden-Württemberg	18	15	24	43	24	64	12

### 4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ..... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	97	1	1	1	77	23	-
Württembergisch Unterland	95	3	1	1	80	19	1
Kocher-Jagst-Tauber	96	4	-	-	100	-	-
Württemberg	95	3	1	1	81	18	1
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	-	-	-	66	33	1
Badisches Frankenland	98	2	-	-	97	3	-
Bodensee	100	-	-	-	73	27	-
Markgräflerland	97	3	-	-	59	38	3
Kaiserstuhl-Tuniberg	77	12	7	4	55	42	3
Breisgau	85	6	9	-	59	41	-
Ortenau	92	5	2	1	39	59	2
Baden	89	6	4	1	62	36	2
Baden-Württemberg	91	5	3	1	70	29	1