

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 85003

Agrarwirtschaft 41/85

C II 4 - m 8/85 (Erscheint nur für Juni bis November)

21.8.85

Wachstumstand der Reben Anfang August 1985

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	1985		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	1985	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern ¹⁾			Begutachtungsziffern ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	3,7	3,2	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,7	3,3
Württembergisch Unterland	4,3	3,9	Breisgau	3,8	3,2
Kocher-Jagst-Tauber	4,6	4,6	Ortenau	3,7	3,3
Württemberg	4,2	3,8	Baden	3,8	3,4
dagegen 1984	3,0	2,8	dagegen 1984	2,8	2,7
1983	2,3	2,1	1983	2,7	2,4
1982	1,9	1,8	1982	2,1	2,2
1981	3,5	3,3	1981	2,7	2,8
			Baden-Württemberg	4,0	3,6
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,8	3,6	dagegen 1984	2,9	2,7
Badisches Frankenland	4,6	4,3	1983	2,5	2,3
Bodensee	3,9	3,2	1982	2,0	2,0
Markgräflerland	3,8	3,5	1981	3,0	3,0

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstatlern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
17	83	-	0	33	67	2	44	54	1	22	77
Baden											
12	87	1	3	35	62	4	41	55	2	33	65
Baden-Württemberg											
15	85	0	2	34	64	3	42	55	2	28	70

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden 1985

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	82	12	3	3
Riesling	77	19	4	-
Silvaner	80	9	5	6
Gutedel	100	-	-	-
Ruländer	70	25	5	-
Weißer Burgunder	-	100	-	-
Kerner	83	14	2	1
Gewürztraminer	62	27	3	8

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	82	12	2	4
Blauer Spätburgunder	72	22	4	2
Portugieser	81	15	3	1
Lemberger	69	23	7	1
Schwarzriesling	73	20	6	1

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	63	27	8	2
Riesling	75	21	4	-
Silvaner	72	22	4	2
Gutedel	66	27	7	-
Ruländer	60	29	10	1
Weißer Burgunder	61	26	12	1
Auxerrois	56	32	11	1
Gewürztraminer	41	23	22	14

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	81	2	17	-
Blauer Spätburgunder	66	25	8	1
Portugieser	77	13	9	1
Lemberger	98	2	-	-
Schwarzriesling	83	11	3	3

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	66	25	7	2
Riesling	76	20	4	-
Silvaner	76	16	4	4
Gutedel	66	27	7	-
Ruländer	60	29	10	1
Weißer Burgunder	61	26	12	1
Auxerrois	56	32	11	1
Kerner	83	14	2	1
Gewürztraminer	42	23	21	14

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	82	12	2	4
Blauer Spätburgunder	66	25	8	1
Portugieser	80	15	4	1
Lemberger	69	23	7	1
Schwarzriesling	74	19	6	1

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.