

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 86001

Agrarwirtschaft 24/86

C II 4 - m 6/86 (Erscheint nur für Juni bis November)

25.6.86

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1986

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	Anfang Juni 1986	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Anfang Juni 1986
	Begutachtungsziffer ¹⁾		Begutachtungsziffer ¹⁾
Remstal-Stuttgart	2,6	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,0
Württembergisch Unterland	2,4	Breisgau	2,8
Kocher-Jagst-Tauber	2,8	Ortenau	2,5
Württemberg ²⁾	2,5	Baden	2,8
dagegen 1985	4,3	dagegen 1985	2,5
1984	2,6	1984	2,8
1983	2,4	1983	2,3
1982	2,1	1982	2,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	Baden-Württemberg	2,7
Badisches Frankenland	2,9	dagegen 1985	4,1
Bodensee	2,5	1984	2,5
Markgräflerland	2,9	1983	2,6
		1982	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstellern beurteilten % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

- 98 2 - 83 17 6 48 46

Baden

2 91 7 1 66 33 26 58 16

Baden-Württemberg

1 94 5 0 74 26 17 54 29

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1986

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	87	11	2	-	-	30	70
Württembergisch Unterland	95	4	0	1	-	28	72
Kocher-Jagst-Tauber	78	13	6	3	-	57	43
Württemberg ¹⁾	92	6	1	1	-	32	68
Badische Bergstraße/Kraichgau	93	4	2	1	-	44	56
Badisches Frankenland	56	34	6	4	-	86	14
Bodensee	94	4	2	-	-	43	57
Markgräflerland	75	20	4	1	-	38	62
Kaiserstuhl-Tuniberg	61	17	11	11	-	30	70
Breisgau	85	8	6	1	-	58	42
Ortenau	98	2	-	-	-	32	68
Baden	77	13	6	4	-	45	55
Baden-Württemberg	83	10	4	3	-	39	61

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	-	42	58
Württembergisch Unterland	100	-	-	-	1	27	72
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	57	43
Württemberg ¹⁾	100	-	-	-	0	36	64
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	-	-	-	-	41	59
Badisches Frankenland	100	-	-	-	-	78	22
Bodensee	100	-	-	-	-	21	79
Markgräflerland	98	2	-	-	2	49	49
Kaiserstuhl-Tuniberg	99	1	0	-	-	67	33
Breisgau	100	-	-	-	3	70	27
Ortenau	100	-	-	-	-	34	66
Baden	99	1	-	-	1	50	49
Baden-Württemberg	99	1	-	-	1	43	56

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".