

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 86002

Agrarwirtschaft 33/86

C II 4 - m 7/86 (Erscheint nur für Juni bis November)

23.7.86

## Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1986

### 1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	1986		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	1986	
	Anfang Juni	Anfang Juli		Anfang Juni	Anfang Juli
	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>			Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>	
Remstal-Stuttgart	2,6	2,3	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,0	2,4
Württembergisch Unterland	2,4	2,2	Breisgau	2,8	2,4
Kocher-Jagst-Tauber	2,8	2,6	Ortenau	2,5	2,1
Württemberg <sup>2)</sup>	2,5	2,2	Baden	2,8	2,3
dagegen 1985	4,3	4,2	dagegen 1985	2,5	3,8
1984	2,6	3,0	1984	2,8	2,8
1983	2,4	2,3	1983	2,3	2,7
1982	2,1	1,9	1982	2,9	2,1
			Baden-Württemberg	2,7	2,3
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,3	dagegen 1985	4,1	4,0
Badisches Frankenland	2,9	2,4	1984	2,5	2,9
Bodensee	2,5	2,1	1983	2,6	2,5
Markgräflerland	2,9	2,4	1982	2,2	2,0

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
1	95	4	2	21	77	2	36	62	-	14	86
Baden											
16	79	5	2	30	68	3	41	56	-	24	76
Baden-Württemberg											
9	86	5	2	26	72	3	38	59	-	19	81

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 3. Beginn der Blüte nach Rebsorten 1986

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	% der Meldungen								

Württemberg<sup>1)</sup>

<b>Weißweinsorten</b>									
Müller-Thurgau	-	44	56	-	19	58	22	1	-
Riesling	-	31	68	1	15	55	29	1	-
Silvaner	-	25	73	2	11	64	24	1	-
Gutedel	-	17	83	-	12	57	31	-	-
Ruländer	-	38	62	-	13	62	24	1	-
Weißer Burgunder	-	27	73	-	5	71	24	-	-
Kerner	1	38	61	-	17	59	23	1	-
Gewürztraminer	-	30	70	-	16	62	20	2	-
<b>Rotweinsorten</b>									
Blauer Trollinger	-	27	69	4	11	54	32	3	-
Blauer Spätburgunder	1	47	51	1	15	62	22	1	-
Portugieser	2	43	55	-	15	59	25	1	-
Lemberger	1	36	62	1	14	59	26	1	-
Schwarzriesling	1	33	65	1	14	62	23	1	-

## Baden

<b>Weißweinsorten</b>									
Müller-Thurgau	0	42	57	1	19	56	23	2	-
Riesling	1	34	61	4	14	57	28	1	-
Silvaner	-	31	64	5	13	55	29	3	-
Gutedel	-	12	79	9	11	42	36	11	-
Ruländer	-	40	58	2	16	58	25	-	1
Weißer Burgunder	1	38	58	3	14	61	24	1	-
Auxerrois	-	40	56	4	10	58	31	1	-
Gewürztraminer	-	20	75	5	17	55	25	3	-
<b>Rotweinsorten</b>									
Blauer Trollinger	-	18	82	-	13	47	40	-	-
Blauer Spätburgunder	0	42	58	0	17	57	25	1	-
Portugieser	-	48	52	-	8	67	25	-	-
Lemberger	-	33	67	-	18	64	18	-	-
Schwarzriesling	-	25	72	3	11	55	31	3	-

## Baden-Württemberg

<b>Weißweinsorten</b>									
Müller-Thurgau	0	43	57	0	19	57	23	1	-
Riesling	0	33	65	2	14	56	29	1	-
Silvaner	-	27	70	3	12	60	26	2	-
Gutedel	-	13	81	6	11	48	34	7	-
Ruländer	-	40	59	1	15	60	25	0	0
Weißer Burgunder	1	36	60	3	13	62	24	1	-
Auxerrois	-	40	56	4	10	58	31	1	-
Kerner	1	38	61	-	17	59	23	1	-
Gewürztraminer	-	24	73	3	17	57	23	3	-
<b>Rotweinsorten</b>									
Blauer Trollinger	-	26	70	4	11	53	33	3	-
Blauer Spätburgunder	1	43	55	1	17	59	23	1	-
Portugieser	2	44	54	-	13	61	25	1	-
Lemberger	1	36	62	1	15	59	25	1	-
Schwarzriesling	1	31	67	1	14	60	25	1	-

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".