

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 87001

Agrarwirtschaft 29/87

C II 4 - m 6/87 (Erscheint nur für Juni bis November)

14.7.87

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1987

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	Anfang Juni 1987	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Anfang Juni 1987
	Begutachtungsziffer ¹⁾		Begutachtungsziffer ¹⁾
Remstal-Stuttgart	3,5	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,0
Württembergisch Unterland	3,2	Breisgau	3,2
Kocher-Jagst-Tauber	3,0	Ortenau	3,0
Württemberg ²⁾	3,2	Baden	3,1
dagegen 1986	2,5	dagegen 1986	2,8
1985	4,3	1985	3,9
1984	2,6	1984	2,8
1983	2,4	1983	2,3
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,0	Baden-Württemberg	3,1
Badisches Frankenland	2,8	dagegen 1986	2,7
Bodensee	4,2	1985	4,1
Markgräflerland	3,2	1984	2,5
		1983	2,6

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstattem beurteilten % die (den)								
Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
0	95	5	-	58	42	67	29	4
Baden								
5	94	1	-	68	32	67	30	3
Baden-Württemberg								
3	94	3	-	64	36	67	30	3

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1987

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	34	14	20	32	7	63	30
Württembergisch Unterland	52	16	20	12	3	55	42
Kocher-Jagst-Tauber	50	31	15	4	4	63	33
Württemberg ¹⁾	49	16	20	15	4	59	37
Badische Bergstraße/Kraichgau	79	18	2	1	1	62	37
Badisches Frankenland	46	26	27	1	-	44	56
Bodensee	8	10	17	65	14	50	36
Markgräflerland	55	26	12	7	9	66	25
Kaiserstuhl-Tuniberg	71	14	11	4	-	52	48
Breisgau	52	24	21	3	3	78	19
Ortenau	51	15	23	11	14	78	8
Baden	60	19	14	7	6	63	31
Baden-Württemberg	56	18	16	10	5	61	34

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	37	59	4
Württembergisch Unterland	100	-	-	-	12	74	14
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	4	88	8
Württemberg ¹⁾	100	-	-	-	20	70	10
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	-	-	-	5	60	35
Badisches Frankenland	100	-	-	-	-	74	26
Bodensee	100	-	-	-	79	21	-
Markgräflerland	98	1	1	-	27	62	11
Kaiserstuhl-Tuniberg	98	2	-	-	-	79	21
Breisgau	99	1	-	-	6	94	-
Ortenau	99	1	-	-	19	76	5
Baden	99	1	-	-	15	68	17
Baden-Württemberg	99	1	-	-	17	69	14

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".