

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 87002

Agrarwirtschaft 33/87

C II 4 - m 7/87 (Erscheint nur für Juni bis November)

24.7.87

## Wachstumstand der Reben Anfang Juli 1987

### 1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	1987		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	1987	
	Anfang Juni	Anfang Juli		Anfang Juni	Anfang Juli
	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>			Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>	
Remstal-Stuttgart	3,5	3,1	Kaiserstuhl-Tuniberg	3,0	2,9
Württembergisch Unterland	3,2	3,1	Breisgau	3,2	3,1
Kocher-Jagst-Tauber	3,0	3,2	Ortenau	3,0	3,1
Württemberg <sup>2)</sup>	3,2	3,1	Baden	3,1	3,0
dagegen 1986	2,5	2,2	dagegen 1986	2,8	2,3
1985	4,3	4,2	1985	3,9	3,8
1984	2,6	3,0	1984	2,5	2,8
1983	2,4	2,3	1983	2,8	2,7
Badische Bergstraße/Kraichgau	3,0	2,9	Baden-Württemberg	3,1	3,0
Badisches Frankenland	2,8	3,0	dagegen 1986	2,7	2,3
Bodensee	4,2	4,1	1985	4,1	4,0
Markgräflerland	3,2	3,1	1984	2,5	2,9
			1983	2,6	2,5

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1,2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten sechs Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut

#### Württemberg

- 10 90 89 9 2 94 5 1 52 46 2

#### Baden

- 14 86 86 11 3 95 5 0 51 47 2

#### Baden-Württemberg

- 12 88 87 10 3 94 5 1 52 46 2

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 3. Beginn der Blüte nach Rebsorten 1987

Rebsorten	Beginn				Dauer				
	bis 10.6.	11.6. bis 20.6.	21.6. bis 30.6.	nach dem 30.6.	bis 4 Tage	5 bis 7 Tage	8 bis 10 Tage	11 bis 14 Tage	15 Tage und mehr
	Σ der Meldungen								

Württemberg<sup>1)</sup>

## Weißweinsorten

Müller-Thurgau	-	2	11	87	18	52	26	3	1
Riesling	-	-	7	93	9	59	26	5	1
Silvaner	-	1	4	95	10	59	25	4	2
Gutedel	-	-	2	98	11	51	27	8	3
Ruländer	-	-	10	90	18	47	31	4	-
Weißer Burgunder	-	-	-	100	6	55	28	11	-
Kerner	-	-	10	90	10	62	24	4	-
Gewürztraminer	-	-	10	90	10	64	21	5	-

## Rotweinsorten

Blauer Trollinger	-	-	3	97	5	51	36	6	2
Blauer Spätburgunder	-	-	8	92	9	59	21	9	2
Portugieser	-	2	8	90	19	48	26	7	-
Lemberger	-	-	7	93	13	61	21	5	-
Schwarzriesling	-	-	6	94	11	55	25	7	2

## Baden

## Weißweinsorten

Müller-Thurgau	0	1	38	61	15	58	23	2	2
Riesling	-	-	24	76	12	53	29	5	1
Silvaner	-	1	19	80	9	62	25	3	1
Gutedel	-	-	17	83	7	41	39	9	4
Ruländer	-	1	36	63	18	61	19	2	0
Weißer Burgunder	-	1	42	57	14	62	20	3	1
Auxerrois	-	-	30	70	17	55	23	3	2
Gewürztraminer	-	-	34	66	17	49	29	4	1

## Rotweinsorten

Blauer Trollinger	-	6	6	88	17	58	17	-	8
Blauer Spätburgunder	-	1	40	59	14	59	23	3	1
Portugieser	-	5	19	76	7	70	20	-	3
Lemberger	-	-	12	88	17	58	17	-	8
Schwarzriesling	-	-	8	92	4	64	20	8	4

## Baden-Württemberg

## Weißweinsorten

Müller-Thurgau	0	2	26	72	17	56	24	2	1
Riesling	-	-	15	85	11	56	27	5	1
Silvaner	-	1	10	89	10	60	25	4	1
Gutedel	-	-	12	88	8	45	35	8	4
Ruländer	-	1	28	71	18	57	22	3	0
Weißer Burgunder	-	1	34	65	13	61	21	4	1
Auxerrois	-	-	30	70	17	55	23	3	2
Kerner	-	-	10	90	10	62	24	4	-
Gewürztraminer	-	-	25	75	15	54	26	4	1

## Rotweinsorten

Blauer Trollinger	-	0	4	96	6	51	34	6	3
Blauer Spätburgunder	-	1	27	72	12	59	22	5	2
Portugieser	-	3	10	87	16	53	25	5	1
Lemberger	-	-	7	93	13	60	21	5	1
Schwarzriesling	-	-	7	93	10	57	24	7	2

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".