

STATISTISCHE BERICHTE

Statistisches Land Baden-Württemberg
Bibliothek
Stuttgart

Artikel-Nr. 3392 88001

Agrarwirtschaft 33/88

Cl II 4 - m 6/88 (Erscheint nur für Juni bis November)

13.7.88

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1988

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich	Begutachtungsziffer ¹⁾	Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffer ¹⁾
	Anfang Juni 1988		Anfang Juni 1988
Remstal-Stuttgart	2,4	Württemberg ²⁾	2,1
Württembergisch Unterland	2,1	dagegen 1987	3,2
Eoher-Jagst-Tauber	2,1	1986	2,5
		1985	4,3
		1984	2,6
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	Baden	2,3
Badisches Frankenland	2,5	dagegen 1987	3,1
Bodensee	2,2	1986	2,8
Markgräflerland	2,6	1985	3,9
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,3	1984	2,8
Breisgau	2,3		
Ortenau	2,0	Baden-Württemberg	2,2
		dagegen 1987	3,1
		1986	2,7
		1985	4,1
		1984	2,5

¹⁾ Skalen: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - ²⁾ Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
0	84	16	15	84	1	-	21	79
Baden								
0	94	6	5	94	1	1	35	64
Baden-Württemberg								
0	89	11	10	89	1	1	28	71

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1988

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	0	0	2	27	71
Württembergisch Unterland	99	1	0	-	-	18	82
Kocher-Jagst-Tauber	99	1	-	-	-	40	60
Württemberg ¹⁾	99	1	0	0	0	23	77
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	0	-	-	25	75
Badisches Frankenland	98	2	-	-	4	53	43
Bodensee	100	0	-	-	-	44	56
Markgräflerland	97	1	1	1	-	33	67
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	10	90
Breisgau	98	2	-	-	-	27	73
Ortenau	97	1	1	1	-	29	71
Baden	99	1	0	0	0	30	70
Baden-Württemberg	99	1	0	0	0	27	73

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	-	-	2	15	83
Württembergisch Unterland	100	-	-	-	-	8	92
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	-	16	84
Württemberg ¹⁾	100	0	-	-	0	11	89
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	-	15	85
Badisches Frankenland	99	1	-	-	-	21	79
Bodensee	100	-	-	-	-	-	100
Markgräflerland	100	-	-	-	-	24	76
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	7	93
Breisgau	100	-	-	-	-	10	90
Ortenau	100	0	-	-	-	7	93
Baden	100	0	-	-	-	14	86
Baden-Württemberg	100	0	-	-	0	13	87

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".