

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3392 88003

Agrarwirtschaft 47/88

C II 4 - m 8/88 (Erscheint nur für Juni bis November)

15.8.88

Wachstumstand der Reben Anfang August 1988

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich	Begutachtungsziffern ¹⁾		Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern ¹⁾	
	Anfang			Anfang	
	Juli	August		Juli	August
			Württemberg ²⁾	2,1	2,1
Perstal-Stuttgart	2,1	2,1	dagegen 1987	3,1	3,0
Württembergisch Unterland	2,1	2,1	1986	2,2	2,3
Foher-Jagst-Tauber	2,6	2,3	1985	4,2	3,8
			1984	3,0	2,8
			Baden	2,4	2,4
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,4	dagegen 1987	3,0	2,9
Badisches Frankenland	2,5	2,6	1986	2,3	2,2
Bodensee	2,1	1,9	1985	3,8	3,4
Markgräflerland	2,5	2,4	1984	2,8	2,7
Foiserstuhl-Tuniberg	2,3	2,4			
Ereisgau	2,4	2,3			
Ortenau	2,1	2,2			
			Baden-Württemberg	2,3	2,3
			dagegen 1987	3,0	2,9
			1986	2,3	2,2
			1985	4,0	3,6
			1984	2,9	2,7

Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten ... & die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
11	88	1	0	34	66	1	64	35	-	12	88
Baden											
7	92	1	1	36	63	1	56	43	-	14	86
Baden-Württemberg											
9	90	1	1	35	64	1	59	40	-	13	87

3. Verrieselungsschäden 1988

Rebsorten	Keine	Schwache	Mittlere	Starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche ¹⁾			

Württemberg

Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	89	10	1	-
Riesling	83	16	1	-
Silvaner	90	10	-	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	93	6	1	-
Weißer Burgunder	72	28	-	-
Kerner	92	8	-	-
Gewürztraminer	81	17	2	-
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	92	8	-	-
Blauer Spätburgunder	91	9	-	-
Portugieser	92	8	-	-
Lemberger	77	21	2	-
Schwarzriesling	87	13	-	-

Baden

Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	84	14	2	-
Riesling	87	12	1	-
Silvaner	94	6	-	-
Gutedel	60	29	6	5
Ruländer	88	11	1	-
Weißer Burgunder	87	12	1	-
Auxerrois	79	17	4	-
Gewürztraminer	83	15	2	-
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	88	1	11	-
Blauer Spätburgunder	88	10	2	-
Portugieser	91	9	-	-
Lemberger	90	10	-	-
Schwarzriesling	91	8	1	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:				
Müller-Thurgau	85	13	2	-
Riesling	84	15	1	-
Silvaner	92	8	-	-
Gutedel	60	29	6	5
Ruländer	88	11	1	-
Weißer Burgunder	87	12	1	-
Auxerrois	79	17	4	-
Kerner	92	8	-	-
Gewürztraminer	83	15	2	-
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	92	8	-	-
Blauer Spätburgunder	88	10	2	-
Portugieser	92	8	-	-
Lemberger	77	21	2	-
Schwarzriesling	87	13	-	-

¹⁾ Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.