

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 78003

Agrarwirtschaft 31/78

C II 4 - m 8/78 (Erscheint nur für Juni bis November)

11.8.78

## Wachstumstand der Reben Anfang August 1978

Wachstumstand der Reben Anfang August 1978

Weinbaubereich Weinbaugebiet	1978		Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	1978	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>			Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>	
Remstal-Stuttgart	2,6	2,7	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,8	3,2
Württembergisches Unterland	2,5	2,6	Breisgau	2,6	3,0
Kocher-Jagst-Tauber	2,6	3,0	Ortenau	2,7	3,1
Württemberg	2,5	2,6	Baden	2,7	3,0
dagegen 1977	2,1	1,9	dagegen 1977	2,3	2,2
1976	1,9	2,1	1976	1,8	1,9
1975	2,0	2,0	1975	2,0	2,2
1974	3,0	3,0	1974	3,1	3,2
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,5	2,9	Baden-Württemberg	2,6	2,9
Badisches Frankenland	2,5	3,1	dagegen 1977	2,2	2,1
Bodensee	2,8	2,8	1976	1,8	2,0
Markgräflerland	2,7	2,9	1975	2,0	2,1
			1974	3,1	3,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

## Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattem beurteilten .... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
0	48	52	60	33	7	65	33	2	30	63	7
Baden											
0	69	31	64	29	7	70	27	3	43	53	4
Baden-Württemberg											
0	59	41	62	31	7	68	30	2	37	57	6

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet



## Verrieselungsschäden

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche <sup>1)</sup>			

## Württemberg

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	61	25	12	2
Riesling	51	25	20	4
Silvaner	48	29	19	4
Gutedel	53	17	28	2
Ruländer	52	29	17	2
Weißer Burgunder	68	17	13	2
Auxerrois	-	-	-	-
Kerner	66	26	7	1
Gewürztraminer	15	19	6	60

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	60	29	10	1
Blauer Spätburgunder	56	28	12	4
Portugieser	62	29	8	1
Lemberger	56	22	20	2
Schwarzriesling	60	24	15	1

## Baden

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	42	27	25	6
Riesling	33	23	30	14
Silvaner	44	39	15	2
Gutedel	26	16	38	20
Ruländer	33	27	29	11
Weißer Burgunder	30	31	29	10
Auxerrois	29	27	25	19
Kerner	-	-	-	-
Gewürztraminer	13	13	17	57

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	75	14	11	0
Blauer Spätburgunder	36	26	30	8
Portugieser	45	25	22	8
Lemberger	66	15	10	9
Schwarzriesling	45	37	16	2

## Baden-Württemberg

## Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	45	27	23	5
Riesling	44	24	24	8
Silvaner	46	34	17	3
Gutedel	26	16	38	20
Ruländer	35	27	28	10
Weißer Burgunder	30	31	29	10
Auxerrois	29	27	25	19
Kerner	66	26	7	1
Gewürztraminer	13	13	16	58

## Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	60	29	10	1
Blauer Spätburgunder	38	26	28	8
Portugieser	60	28	10	2
Lemberger	56	22	20	2
Schwarzriesling	59	25	15	1

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.